



CKD分析總覽


總覽	整體概況	生理指標 vs CKD	風險族群分析	年齡分析	bmi指標分析
----	------	-------------	--------	------	---------



年齡層分布(50以上為高齡)



高風險族群分布




- 1.高風險族群 CKD 發生率較高
- 2.年齡為重要影響因子
- 3.eGFR 與 CKD 分期呈顯著關聯


整體概況

總覽	整體概況	生理指標 vs CKD	風險族群分析	年齡分析	bmi指標分析
----	------	-------------	--------	------	---------

男女占比(0:男性,1:女性)




CKD分期分布



生理指標和CKD的關係

總覽	整體概況	生理指標 vs CKD	風險族群分析	年齡分析	bmi指標分析
----	------	-------------	--------	------	---------

腎絲球過濾率(eGFR)和CKD的關係




血清肌酸酐	target
▲	
0	健康
1	輕度
2	中度
3	中度
4	重度
5	重度
6	腎衰竭
7	腎衰竭
8	腎衰竭
9	腎衰竭

- eGFR 隨 CKD 分期下降
- Creatinine 隨 CKD 分期上升

風險族群分析

總覽	整體概況	生理指標 vs CKD	風險族群分析	年齡分析	bmi指標分析
----	------	-------------	--------	------	---------

高低風險族群確診人數(0:低風險,1:高風險)



● 中度 ● 重度 ● 健康 ● 腎衰竭 ● 輕度

低風險族群確診人數(重度以上)

5.80%

高風險族群確診人數(重度以上)


6.18%

曾經罹患高血壓或糖尿病者，確診率會比沒有相關病史者高

年齡與CKD趨勢

總覽	整體概況	生理指標 vs CKD	風險族群分析	年齡分析	bmi指標分析
----	------	-------------	--------	------	---------

年齡層和CKD分期的分布(以50歲為分界)



● 中度 ● 重度 ● 健康 ● 腎衰竭 ● 輕度

高齡族群確診率(重度以上)

6.34%

中低齡族群確診率(重度以上)

5.78%


- CKD 風險隨年齡上升
- 50歲以上族群風險顯著提高

BMI指標分析


總覽	整體概況	生理指標 vs CKD	風險族群分析	年齡分析	bmi指標分析
----	------	-------------	--------	------	---------

BMI指標和CKD分期的分布關係


- 中度
- 重度
- 健康
- 腎衰竭
- 輕度



BMI過高者確診率(重度以上)



BMI正常者確診率(重度以上)



BMI過高也會增加罹患CKD的風險