

Схема наблюдения в статистике обобщённых репьюнитных простых: точный условный критерий константы Ленстры — Померанса — Вагстаффа

Тимофей Сергеевич Докучаев*
Независимый исследователь, Иркутск, Россия

24 сентября 2026 г.

Аннотация

Эвристика Ленстры — Померанса — Вагстаффа (ЛПВ) предсказывает, что $\#\{n \leq x : R_b(n) \text{ просто}\} \sim (e^\gamma / \ln b) \ln x$. С 1993 года её проверяют по «нормированной частоте встречаемости». Подозрение о смещении этой частоты цензурированием неверно: конечная форма и наклон МНК несмещены точно или с экспоненциально малой погрешностью. Настоящий дефект иной: формы оценки расходятся до 29,5%.

Главный результат относится к объединению $B = 15$ оснований ($M = 218$ событий). Фронты поиска не записаны; это мешающие параметры Неймана — Скотта, и профильная оценка M/S несостоятельна. Положение последней находки D_b достаточно для фронта, и условно на нём $N_b - 1 \sim \text{Poisson}(\lambda_b D_b)$ точно. Отсюда оценка $(M - B)/S$ с интервалами в замкнутой форме: $\hat{\kappa} = 1,838$, точный 95% интервал $[1,59; 2,11]$, $p = 0,67$ против $e^\gamma \approx 1,781$. Сообщавшееся десятипроцентное превышение над ЛПВ создаётся в основном схемой наблюдения; старый критерий отвергает верную гипотезу в 11–17% случаев.

Вывод опирается на допущение, что фронт выбирался без оглядки на находки; четыре документированных фронта опасного нарушения не показывают. Сама эвристика при конечных n даёт интенсивность $(\kappa / \ln b)(1 + c_b/t)$. Мы калибруем c_b по фактической делимости $R_b(p)$ (в среднем 0,67). С ним при $n > 10$ оценка равна 1,69–1,71 при любом усечении, ЛПВ не отвергается ($p = 0,62$ – $0,73$), а «медленная сходимости снизу» получает объяснение. Критерий однородности ($p = 0,935$) уверенно различает лишь разброс κ_b с коэффициентом вариации свыше 0,37.

Ключевые слова: репьюнит-простые, обобщённые репьюниты, числа Мерсенна, гипотеза Ленстры — Померанса — Вагстаффа, постоянная Эйлера — Маскерони, схема наблюдения, цензурирование типа I, пуассоновский точечный процесс, условное правдоподобие, мешающие параметры, задача Неймана — Скотта, достаточная статистика, смещение оценки, мощность критерия, вычислительная теория чисел

MSC 2020: Primary 11Y11; Secondary 11N05, 62F03, 62B05, 62N01, 60G55, 11N80.

Благодарности: автор благодарит проект Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) за предоставление данных о простых числах Мерсенна через открытый отчёт PrimeNet (<https://www.mersenne.org/>); значения индексов Мерсенна получены оттуда 27 августа 2026 года. Автор признателен участникам OEIS, которые много лет поддерживают последовательности обобщённых репьюнитных простых. Автор благодарит Jaume Gotanegra (MathOverflow, <https://mathoverflow.net/questions/514719>) за замечание о том, что условное правдоподобие (12) получается также интегрированием по фронту с мерой dW_b (замечание 6).

Финансирование: исследование выполнено без внешнего финансирования.

*ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0510-5225>. Контактный адрес: timofei93@yandex.ru

The observation scheme in the statistics of generalized repunit primes: an exact conditional test of the Lenstra–Pomerance–Wagstaff constant

Timofei Sergeevich Dokuchaev

Independent researcher, Irkutsk, Russia,

timofei93@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0006-0510-5225>

Abstract

The Lenstra–Pomerance–Wagstaff (LPW) heuristic predicts $\#\{n \leq x : (b^n - 1)/(b - 1) \text{ prime}\} \sim (e^\gamma / \ln b) \ln x$, tested since 1993 via a “normalized occurrence frequency”. The suspected censoring bias of this frequency does not exist: the endpoint form and the OLS slope are unbiased exactly or up to an exponentially small term. The real defect: forms of the estimator disagree by up to 29.5%.

The main result pools $B = 15$ bases ($M = 218$ events). The search frontiers are not recorded; they are Neyman–Scott nuisance parameters, and the profile estimator M/S is inconsistent. The position D_b of the last find is sufficient for the frontier, and conditionally on it $N_b - 1 \sim \text{Poisson}(\lambda_b D_b)$ exactly. This gives the estimator $(M - B)/S$ with closed-form intervals: $\hat{\kappa} = 1.838$, exact 95% interval $[1.59, 2.11]$, $p = 0.67$ against $e^\gamma \approx 1.781$. The reported ten-percent excess comes mainly from the observation scheme; the old test rejects a true hypothesis in 11–17% of cases.

This assumes that the frontier was chosen without regard to the finds; four documented frontiers show no violation in the dangerous direction. The heuristic itself gives a finite- n intensity $(\kappa / \ln b)(1 + c_b/t)$. We measure c_b directly from the divisibility of $R_b(p)$ (mean 0.67); with it, for $n > 10$ the estimate is 1.69–1.71 at every truncation, LPW is not rejected ($p = 0.62$ –0.73), and the “slow convergence from below” is explained. The homogeneity test ($p = 0.935$) detects only spreads of κ_b with coefficient of variation above 0.37.

Keywords: repunit primes, generalized repunits, Mersenne primes, Lenstra–Pomerance–Wagstaff conjecture, Euler–Mascheroni constant, observation scheme, Type-I censoring, Poisson point process, conditional likelihood, nuisance parameters, Neyman–Scott problem, sufficient statistic, estimator bias, statistical power, computational number theory

Acknowledgments: the author thanks the Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) project for providing the Mersenne prime data through the open PrimeNet report (<https://www.mersenne.org/>); the Mersenne exponents were retrieved on 27 August 2026. The author is grateful to the OEIS contributors who have maintained the generalized repunit prime sequences for many years, and Jaume Gotanegra (MathOverflow, <https://mathoverflow.net/questions/514719>) for pointing out that the conditional likelihood (12) is also obtained by integrating out the frontier against dW_b (Remark 6).

Funding: this research received no external funding.

1 Введение

Для целого основания $b \geq 2$ обобщённый репьюнит есть

$$R_b(n) = \frac{b^n - 1}{b - 1}, \quad (1)$$

причём $R_b(n)$ может быть простым только при простом n . При $b = 2$ это числа Мерсенна $M_p = 2^p - 1$. Опираясь на эвристики Вагстаффа [1] и Померанса [2], гипотеза ЛПВ утверждает, что

$$\pi_b(x) = \#\{n \leq x : R_b(n) \text{ простое}\} \sim \frac{e^\gamma}{\ln b} \ln x, \quad (2)$$

где γ — постоянная Эйлера — Маскерони; подробный вывод эвристики для $b = 2$ изложен в справочнике PrimePages [3]. Основание входит в (2) лишь через множитель $1/\ln b$: константа

$e^\gamma \approx 1,7811$ объявляется универсальной. Дабнер [4] предложил проверять эту универсальность эмпирически по разным основаниям, а Бурделэ [5] с тех пор ведёт текущие оценки нормированной частоты, публикуя их в комментариях к записям OEIS [6]. Родственные вопросы для одной лишь последовательности Мерсенна недавно обсуждались в [7]. Близка по духу и работа [8], где у показателей Мерсенна ищут вторичную структуру, связанную с разложением $p - 1$; методически она устроена так же, как наш §8 — стратифицированное условное правдоподобие плюс проверка значимости, — но проверяет структуру *внутри* одного основания, тогда как мы проверяем её *между* основаниями.

Вокруг этих оценок сложился интерпретационный фольклор. Основание 13 описывается как «удачливое», основание 7 — как «самое неудачливое»; отмечается, что нормированные частоты лежат ниже предполагаемого предела $e^{-\gamma} \approx 0,5615$ и медленно сходятся к нему снизу. Настоящая работа разбирает эти утверждения, но приходит к выводам, отличным от тех, которых естественно ожидать.

1.1 Вклад работы

1. **Употребительная оценка частоты не смещена.** Схема, при которой интервал подгонки заканчивается наибольшим известным индексом, действительно обуславливает оценку тем, что последнее наблюдение является событием, и достаточная статистика распределена как $\text{Gamma}(N, \lambda_b)$ (предложение 1). Но отсюда *не* следует смещение нормированной частоты: и концевая форма $D/(N \ln b)$, и наклон МНК несмещены точно при схеме А и с точностью до множителя $1 - (1 + \mu)e^{-\mu}$ при схеме В (предложение 2, таблица 2); при наблюдаемых $\mu \approx N_b \geq 7$ дефицит не превосходит 0,73% для концевой формы и 2,3% для МНК без начала отсчёта. Смещена только обратная величина $\hat{\kappa} = 1/\hat{G}$, в $N/(N - 1)$ раз (при схеме А; при схеме В её ожидание бесконечно), и это неравенство Йенсена, а не цензурирование. Несмещённые оценки κ и $1/\kappa$ не могут быть взаимно обратными; всякая «поправка», чинящая одну, портит другую (§3).
2. **Настоящий дефект — неустойчивость к выбору формы оценки.** В обращении несколько численно различных вариантов. На одних и тех же данных они расходятся до 29,5% (основание 18) — в 1,7 раза больше медианного отклонения оценок от $e^{-\gamma}$ (17,6%), которое и толкуют содержательно; у двух оснований из пятнадцати выбор формы весит больше, чем всё их отклонение от предсказания ЛПВ. Основание 18 при концевой форме — третье по «неудачливости» из пятнадцати, а при МНК — десятое, ниже медианы. Ярлык описывает выбор оценки, а не свойства простых (§3.4).
3. **Главный результат: точное условное правдоподобие схемы В.** Пивот $\kappa S \sim \text{Gamma}(M, 1)$ точен при схеме «наблюдаем до N -го события», где N задано планом. Данные же получены при фиксированном фронте: поиск покрыл $(t_0, \ln L_b]$, а число находок случайно. Незаписанные ширины окон W_b — мешающие параметры, число которых растёт вместе с числом оснований; их совместная ОМП $\hat{W}_b = D_b$ приводит к несостоятельной профильной оценке M/S — в точности ситуация Неймана — Скотта [9]. Мы показываем (предложение 3), что D_b достаточна для W_b при фиксированной κ и что условно на D_b величина $N_b - 1$ есть $\text{Poisson}(\lambda_b D_b)$, причём *ширина окна W_b в это распределение не входит*. Отсюда $M - B \mid D \sim \text{Poisson}(\kappa S)$ — точный пуассоновский пивот, а $(M - B)/S$ — оценка условного максимального правдоподобия в смысле Андерсена [10], точно условно несмещённая; она же получается интегрированием по W_b с мерой dW_b (замечание 6). Ни моментных приближений, ни экспоненциально малых остатков, ни симуляционной инверсии интервалов не требуется (§4). Само различие схем классическое, а несмещённость $(N - 1)/D$ при схеме А — учебниковый факт, и мы на них не претендуем; новизна в том, что фронт *не документирован*, поэтому экспозицию приходится восстанавливать из самих находок, и поправка оказывается пропорциональна числу оснований (замечание 5).

4. **Численное следствие.** Точный условный вывод даёт $\hat{\kappa} = 1,838$ при 95% интервале $[1,594; 2,109]$ и $p = 0,672$: превышение над ЛПВ сокращается с 10,3% до статистически незначимых 3,2%. Старый гамма-пикот при схеме В отвергает верную гипотезу в 11–17% случаев (§4.4); разброс зависит от того, как далеко ушёл фронт, и именно поэтому приводится диапазоном.
5. **Ключевое допущение о фронтах и его цена.** Помимо пуассоновской модели и сплошного покрытия поиска (§2), вывод о схеме наблюдения держится на условии (A1): фронт выбирался без оглядки на находки. Оценки $(M - 1)/S$ и $(M - B)/S$ построены на одних и тех же статистиках (N_b, D_b) и различаются на 6,9%; какая из них верна, определяется не данными, а тем, как они собирались. Без (A1) строго держится лишь *верхняя* граница: по тождеству Вальда $\mathbb{E}[M] \geq \kappa \mathbb{E}[S]$ при любом правиле остановки. Нижней границы нет: правило «прекратить поиск после долгой полосы без находок» смещает вверх и $(M - B)/S$ (замечание 9, таблица 3). Попытка обойти выбор через заведомо несмещённые по-основанию куски проваливается (§4.6). Четыре документированных фронта ($b = 2, 10, 22, 26$) дают первую эмпирическую проверку (A1). Фронты оказываются ближе к последним находкам, чем предсказывает (A1) ($p = 0,10$). Если отклонение есть, оно скорее в сторону $m_b < 1$; тогда $(M - B)/S$ занижает κ и правильная оценка сдвигается к $(M - 1)/S = 1,965$, хотя обе согласуются с ЛПВ. Малые $\lambda_b \delta_b$ могут отражать и момент публикации фронта, а не правило остановки (§4.5). Единственный радикальный выход — публиковать фронты L_b .
6. **Удачливые основания: чего критерий не может.** Обусловливание на $K = M - B$ делает нулевое распределение критерия однородности точным (мультиномиальным), без апелляции к асимптотике χ^2 . Получаем $\Lambda = 7,13$ при 14 степенях свободы, точное $p = 0,935$. Но мощность такова, что критерий уверенно различает лишь разброс κ_b с коэффициентом вариации порядка 0,37 и выше (§5.3). Корректный вывод — «базозависимые частоты данными не требуются», а не «их не существует».
7. **Член второго порядка самой эвристики.** Эвристика ЛПВ предсказывает при конечных n не постоянную интенсивность, а $\lambda_b(t) = (\kappa / \ln b)(1 + c_b/t)$: делители $R_b(p)$ не меньше $2p + 1$. Точный условный вывод переносится на эту модель в замкнутой форме (§9). Положения находок c_b почти не определяют, поэтому мы калибруем его по фактической делимости $R_b(p)$: $c_b = 0,43\text{--}1,11$, в среднем 0,67, устойчиво по порогу; приём Вагстаффа даёт вдвое большие значения. С откалиброванным c_b оценка κ снижается на 6–9% при $n > 10$ (на 12% на полной выборке), то есть сопоставимо с ценой выбора схемы наблюдения. При $n > 10$ получается $\hat{\kappa} \approx 1,69\text{--}1,71$ при любом уровне усечения, ЛПВ не отвергается ($p = 0,62\text{--}0,73$), а тот же член объясняет фольклорную «медленную сходимость снизу».
8. **Явный расчёт мощности.** При двустороннем критерии объединённая выборка различает отклонения от e^γ не менее 21,3%; одна последовательность Мерсенна — не менее 45,5% (§6). Конвенция критерия указана явно, поскольку односторонний вариант даёт заметно другой порог (18,7%).

В §7 разобран более частный, но поучительный сюжет: наивная регрессия счётной функции Мерсенна порождает на вид значимый отрицательный свободный член, который оказывается артефактом обусловливания. Мы включаем его как разобранный пример той же ошибки в ином обличье.

2 Модель и данные

2.1 Пуассоновская модель

Положим $t = \ln n$. Эвристика (2) равносильна утверждению, что индексы обобщённых репьюнитных простых по основанию b образуют однородный пуассоновский точечный процесс на оси t с постоянной интенсивностью

$$\lambda_b = \frac{\kappa}{\ln b}, \quad \text{ЛПВ: } \kappa = e^\gamma = 1,781072\dots \quad (3)$$

Универсальность — это утверждение, что единственный параметр κ управляет всеми основаниями. Пуассоновская идеализация здесь — рабочее допущение, а не теорема: даже для обычных простых пуассоновский закон в коротких промежутках доказан лишь условно, при гипотезах Харди — Литтлвуда, и известно, что он разрушается при росте масштаба [11]. Мы принимаем (3) как модель и всюду рассматриваем κ как оцениваемую величину; это сводит вопрос «верна ли ЛПВ?» к однопараметрическому и делает основания объединяемыми.

2.2 Допустимые основания

Основания, являющиеся точными степенями, исключаются: при $b = c^m$, $m > 1$, число $R_b(n)$ допускает алгебраическую факторизацию, и процесс не имеет предполагаемого вида. Поэтому основания 4, 8, 9, 16 опущены. Внутри объявленного диапазона отбор не зависит от результатов: берутся все основания $2 \leq b \leq 20$, не являющиеся точными степенями, что даёт $B = 15$; ни одно основание не исключено и не добавлено по величине его оценки. Каждое из них имеет не менее восьми известных индексов (минимум достигается при $b = 18$: восемь членов A133857).

Подчеркнём, однако, что сама верхняя граница $b \leq 20$ — условная круглая величина, а не следствие критерия «не менее восьми индексов»: этот критерий выполняется и дальше (A127996 для $b = 21$ содержит восемь членов, A127997 для $b = 22$ — девять) и впервые нарушается лишь при $b = 23$ (A204940, шесть членов). Чтобы граница не выглядела подбранной, мы проверили её влияние прямо. Расширение набора до всех оснований $b \leq 26$, не являющихся точными степенями (добавляются $b = 21, 22, 23, 24, 26$; $b = 25 = 5^2$ исключается алгебраически), даёт $B = 20$, $M = 253$ и

$$\frac{M-1}{S} = 1,9776, \quad \frac{M-B}{S} = 1,8285,$$

то есть сдвигает основную оценку (20) на 0,5% — более чем на порядок меньше цены выбора схемы наблюдения (§4). Критерий однородности на расширенном наборе однородность не отвергает ($\Lambda = 10,24$ при 19 степенях свободы, точное $p = 0,953$; тег [S17]). Ни один вывод работы от границы $b \leq 20$ не зависит; мы сохраняем её как заранее объявленную.

Замечание 1 (Отбор по числу находок). Формально граница $b \leq 20$ объявлена заранее, но выбрана она в мире, где числа известных членов уже опубликованы, и это стоит проверить не риторически, а по знаку сдвига. Условный вывод §4 обуславливается на $N_b \geq 1$ — это безобидно, поскольку находки есть у всех оснований; обуславливание же на $N_b \geq 7$ безобидным не было бы и смещало бы $\hat{\kappa}$ вверх. Снятие границы до $b \leq 26$ добавляет, в частности, основание $b = 23$ с шестью членами и сдвигает оценку вниз, с 1,8381 до 1,8285. Знак сдвига тот, который предсказывает отбор по числу находок, а величина — на порядок меньше цены схемы наблюдения. Мы считаем это достаточным свидетельством того, что граница вывода не определяет.

2.3 Данные и их статус

В таблице 1 перечислены использованные последовательности, полученные 27 августа 2026 года (сверка — приложение А). Четыре оговорки существенны.

Вероятно простые числа. Для больших индексов большинство элементов — вероятно простые, установленные тестом Ферма или сильным тестом Ферма после пробного деления. Счёт смещается вверх лишь в случае, если псевдопростое Ферма было принято за простое, что для чисел такого размера практически не встречается. Чувствительность проверена в §5.4.

Фронты проверки. Для $b = 2$ проект GIMPS [12] публикует два фронта: все показатели ниже $X_{\text{ver}} = 81\,648\,221$ проверены дважды, что даёт ровно 50 простых Мерсенна, тогда как все показатели ниже $X_{\text{ft}} = 141\,308\,443$ проверены хотя бы однократно, что даёт 52. Два наибольших показателя предварительны: между ними остаются непроверенные кандидаты. Анализ §7, где фронт используется явно, ограничен 50 проверенными показателями. Объединённый анализ к этому выбору нечувствителен (§5.4).

Оба фронта — движущиеся величины, поэтому фиксируем момент считывания: отчёт PrimeNet Milestones, 27 августа 2026 г. Ни один вывод от точного значения X_{ver} не зависит: достаточно того, что оно лежит между $M_{50} = 77\,232\,917$ и $M_{51} = 82\,589\,933$, а это верно для всех значений отчёта за 2026 год.

Статус записи A000043. На дату считывания (27.08.2026) раздел DATA этой записи содержал 50 членов и обрывался на 77 232 917: порядок следующих показателей OEIS считает недоказанным до завершения двойной проверки. Показатели 82 589 933 и 136 279 841 известны и документированы GIMPS (и упомянуты в комментариях к A000043), но формально в DATA не входили. После завершения двойной проверки ниже 82 589 933 (отчёт GIMPS от 4.09.2026) этот показатель внесён в DATA как 51-й член (проверено 24.09.2026); на расчёты это не влияет, поскольку он и так учтён. Мы включаем оба показателя, поскольку статистика (13) использует лишь положение последнего события, а не его порядковый номер; в §5.4 проверено, что ограничение основания 2 пятьюдесятью дважды проверенными показателями вывода не меняет.

Границы поиска и полнота покрытия при $b > 2$. Для прочих оснований датированный и атрибутированный фронт выше последней находки опубликован лишь при $b = 10$: «Search limit is 10800000, currently» (С. Баталов, комментарий к A004023, 1 июля 2021 г.). В расширенном наборе к нему добавляются $b = 22$ и $b = 26$ с границей 10^5 (Р. Прайс, комментарии к A127997 и A127999, 2012 г.). Для остальных оснований записи OEIS содержат лишь даты находок, а участники распределённого поиска прямо пишут, что пределы поиска по большинству оснований неизвестны. Именно эта лакуна — предмет §4 и, как мы полагаем, главное препятствие к количественной проверке ЛПВ; четыре документированных фронта использованы в §4.5. Отметим отдельно: вся конструкция предполагает, что поиск покрыл $(t_0, \ln L_b]$ *сплошь*. Если в просеянных диапазонах есть пропуски — при распределённом поиске это обычное дело, — то M занижено относительно экспозиции, и $\hat{\kappa}$ смещена вниз, то есть в ту же сторону, что и наш основной вывод. Проверить полноту покрытия по опубликованным данным в общем случае нельзя. Что пропуски реальны, показывает основание 5. В 2024 г. найдены вероятно простые $R_5(4\,939\,471)$ и $R_5(5\,154\,509)$ (R. Propper); в OEIS их нет, а сводные таблицы отмечают промежуток 3 300 593–4 939 471 как не пройденный сплошь. Для условного вывода это существенно: закон (12) требует сплошного покрытия $(t_0, t_0 + D_b)$. Поэтому мы сохраняем $n_{\text{max}} = 3\,300\,593$. Включение обоих чисел, допустимое лишь при сплошном покрытии, дало бы $\hat{\kappa} = 1,852$ вместо 1,838 (тег [S18]). Это ещё один довод в пользу публикации не только фронтов, но и протоколов просеивания.

Таблица 1. И использованные последовательности. N_b — число событий строго правее $t_0 = \ln n_{\min}$, то есть на единицу меньше числа известных простых индексов: наименьший индекс задаёт начало отсчёта, а не событие; $K_b = N_b - 1$ — условное число событий, входящее в (13). Столбец D_b приведён округлённым, но все вычисления используют точные $D_b = \ln n_{\max} - \ln n_{\min}$. В итоговой строке $M = \sum_b N_b$, $K = M - B$ и $S = \sum_b D_b / \ln b$; величина S не есть сумма столбца D_b . Источник — записи OEIS, получено 27.08.2026; для $b = 2$ показатели 82 589 933 и 136 279 841 — по данным GIMPS (§2).

Table 1. Sequences used. N_b is the number of events strictly to the right of $t_0 = \ln n_{\min}$, that is, one less than the number of known prime indices: the smallest index sets the origin, not an event; $K_b = N_b - 1$ is the conditional event count entering (13). The D_b column is rounded, but all computations use exact $D_b = \ln n_{\max} - \ln n_{\min}$. In the last row $M = \sum_b N_b$, $K = M - B$ and $S = \sum_b D_b / \ln b$; the quantity S is not the sum of the D_b column. Source: OEIS entries, retrieved on 27 August 2026; for $b = 2$ the exponents 82 589 933 and 136 279 841 are taken from GIMPS (§2).

b	OEIS	простых	N_b	K_b	$n_{\min}$	$n_{\max}$	D_b	$D_b / \ln b$
2	A000043	52	51	50	2	136 279 841	18,0371	26,0220
3	A028491	23	22	21	3	8 530 117	14,8605	13,5266
5	A004061	19	18	17	3	3 300 593	13,9110	8,6434
6	A004062	17	16	15	2	3 360 347	14,3344	8,0002
7	A004063	10	9	8	5	1 264 699	12,4409	6,3934
10	A004023	11	10	9	2	8 177 207	15,2237	6,6116
11	A005808	13	12	11	17	1 868 983	11,6077	4,8408
12	A004064	14	13	12	2	769 543	12,8604	5,1754
13	A016054	13	12	11	5	1 503 503	12,6139	4,9178
14	A006032	11	10	9	3	1 724 417	13,2618	5,0252
15	A006033	10	9	8	3	639 833	12,2704	4,5311
17	A006034	12	11	10	3	1 990 523	13,4053	4,7315
18	A133857	8	7	6	2	1 270 141	13,3615	4,6228
19	A006035	11	10	9	19	209 359	9,3074	3,1610
20	A127995	9	8	7	3	984 349	12,7011	4,2397
всего		$M = 218$		$K = 203$		$S = 110,4423$		

3 Что смещено, а что нет

3.1 Употребительные оценки

Дабнер [4] и Бурделэ [5] характеризуют основание b нормированной частотой встречаемости, получаемой подгонкой прямой к зависимости $\ln n_k$ от k с последующим делением на $\ln b$. Согласно (3) ожидаемый наклон равен $1/\lambda_b = \ln b/\kappa$, так что нормированная частота оценивает

$$G_b = \frac{1}{\kappa}, \quad \text{ЛПВ: } G_b = e^{-\gamma} = 0,5614595 \dots \quad (4)$$

В обращении несколько вариантов — обычный МНК со свободным членом, регрессия через начало координат и концевая форма $\hat{G}_b = D_b/(N_b \ln b)$, где $D_b = t_{N_b} - t_0$. Все они обладают одной структурной особенностью: интервал подгонки заканчивается на наибольшем известном индексе.

3.2 Точное распределение

Предложение 1 (Условный закон правого конца). Пусть события образуют однородный пуассоновский процесс интенсивности λ на (t_0, ∞) , и пусть $t_1 < \dots < t_N$ — его первые N событий после t_0 . Тогда $D := t_N - t_0$ имеет распределение $\text{Gamma}(N, \lambda)$ с плотностью

$\lambda^N d^{N-1} e^{-\lambda d} / (N-1)!$. При условии $D = d$ предшествующие $N-1$ событий распределены как порядковые статистики $N-1$ независимых равномерных величин на $(t_0, t_0 + d)$.

Доказательство. Времена ожидания $t_1 - t_0, \dots, t_N - t_{N-1}$ независимы и распределены по закону $\text{Exp}(\lambda)$, а сумма N таких величин распределена как $\text{Gamma}(N, \lambda)$. Условная равномерность есть свойство порядковых статистик пуассоновского процесса, применённое к $(t_0, t_0 + d)$. $\square$

Следствие 1 (Смещение обратной величины). Оценка максимального правдоподобия для λ по одному лишь D равна $\hat{\lambda} = N/D$, причём

$$\mathbb{E}[\hat{\lambda}] = N \mathbb{E}[D^{-1}] = \frac{N}{N-1} \lambda, \quad (5)$$

так как $\mathbb{E}[D^{-1}] = \lambda/(N-1)$ для $D \sim \text{Gamma}(N, \lambda)$ при $N \geq 2$. Оценка $\tilde{\lambda} = (N-1)/D$ в точности несмещена.

3.3 Чего из следствия 1 не следует

Естественно заключить, что раз $\hat{\lambda}$ завышена в $N/(N-1)$ раз, то частота $\hat{G}_b$ занижена во столько же. Это неверно ни при одной из двух схем наблюдения, разобранных ниже.

Предложение 2 (Несмещённость частоты). (а) Схема А. В условиях предложения 1:

- (i) концевая оценка несмещена точно: $\mathbb{E}\left[\frac{D}{N \ln b}\right] = \frac{1}{\lambda \ln b} = G_b$;
- (ii) наклон МНК регрессии t_k на k несмещён точно: $\mathbb{E}[\hat{\beta}] = 1/\lambda$;
- (iii) следовательно, «исправленная» величина $\tilde{G}_b = \frac{N}{N-1} \hat{G}_b$ смещена вверх ровно в $N/(N-1)$ раз.

(b) Схема В. Пусть процесс наблюдается на окне ширины W , $\mu = \lambda W$; оценки полагаются равными нулю, когда они не определены. Тогда

$$\mathbb{E}\left[\frac{D}{N} \mathbf{1}_{\{N \geq 1\}}\right] = \mathbb{E}[\hat{\beta}_0 \mathbf{1}_{\{N \geq 1\}}] = \frac{1}{\lambda} \left(1 - (1 + \mu)e^{-\mu}\right), \quad (6)$$

где $\hat{\beta}_0$ — наклон МНК по точкам (k, t_k) , $k = 0, \dots, N$, включая начало отсчёта. Для наклона $\hat{\beta}_1$ по точкам $k = 1, \dots, N$ без начала отсчёта, определённого при $N \geq 2$,

$$\mathbb{E}[\hat{\beta}_1 \mid N \geq 2] = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{1 - (1 + \mu + \mu^2/2)e^{-\mu}}{1 - (1 + \mu)e^{-\mu}}. \quad (7)$$

Обе формы, таким образом, несмещены с точностью до экспоненциально малого по μ члена; при $\mu = 7$ дефицит составляет 0,73% в (6) и 2,25% в (7), при $\mu = 10$ — 0,05% и 0,23%.

Доказательство. (а)(i) $\mathbb{E}[D] = N/\lambda$ для $D \sim \text{Gamma}(N, \lambda)$, откуда результат немедленно. (ii) Наклон МНК есть линейная статистика $\hat{\beta} = \sum_k w_k t_k$ с весами $w_k = (k - \bar{k}) / \sum_j (j - \bar{k})^2$, для которых $\sum_k w_k = 0$ и $\sum_k w_k k = 1$. Поскольку $\mathbb{E}[t_k] = t_0 + k/\lambda$, получаем $\mathbb{E}[\hat{\beta}] = \sum_k w_k (t_0 + k/\lambda) = 1/\lambda$. (iii) непосредственно из (i).

(b) При схеме В условно на $N = n \geq 1$ положения событий суть порядковые статистики n независимых равномерных величин на $(t_0, t_0 + W]$, поэтому $D/W \sim \text{Beta}(n, 1)$ и $\mathbb{E}[D \mid$

Таблица 2. Проверка предложения 2 методом Монте-Карло, 60 000 реализаций на строку (зерно фиксировано, см. `analysis_v2.py`, тег [S1]). Целевые значения: для $\mathbb{E}[\hat{\lambda}]/\lambda = N/(N-1)$; для столбцов схемы В — столбец «теория» и (7); для остальных — 1,0000. В правой части $\mu = \lambda W$; столбец «теория» даёт множитель $1 - (1 + \mu)e^{-\mu}$ из (6) для $\hat{G}$. Столбец $\mathbb{E}[\hat{\beta}]\lambda$ схемы В вычислен для наклона $\hat{\beta}_1$ без начала отсчёта при условии $N \geq 2$, и его теоретическое значение даёт (7): 0,9775, 0,9977 и 1,0000 при $\mu = 7, 10, 16$.

Table 2. Monte Carlo check of Proposition 2, 60 000 replications per row (seed fixed, see `analysis_v2.py`, tag [S1]). Target values: $N/(N-1)$ for $\mathbb{E}[\hat{\lambda}]/\lambda$; the column “theory” and (7) for the scheme B columns; 1.0000 for the rest. In the right-hand part $\mu = \lambda W$; the column “theory” gives the factor $1 - (1 + \mu)e^{-\mu}$ of (6) for $\hat{G}$. The scheme B column $\mathbb{E}[\hat{\beta}]\lambda$ is for the slope $\hat{\beta}_1$ without the origin, conditional on $N \geq 2$; its theoretical value is given by (7): 0.9775, 0.9977 and 1.0000 at $\mu = 7, 10, 16$.

$N = \mu$	схема А (N задано)					схема В ($\mu = \lambda W$)		
	$\mathbb{E}[\hat{\lambda}]/\lambda$	$N/(N-1)$	$\mathbb{E}[\tilde{\lambda}]/\lambda$	$\mathbb{E}[\hat{G}]\lambda$	$\mathbb{E}[\hat{\beta}]\lambda$	$\mathbb{E}[\hat{G}]\lambda$	теория	$\mathbb{E}[\hat{\beta}]\lambda$
7	1,1655	1,1667	0,9990	1,0012	1,0020	0,9908	0,9927	0,9790
10	1,1103	1,1111	0,9992	1,0007	1,0018	0,9997	0,9995	0,9948
16	1,0650	1,0667	0,9985	1,0016	1,0017	0,9992	1,0000	0,9992
22	1,0462	1,0476	0,9987	1,0011	1,0006	0,9991	1,0000	0,9992
51	1,0206	1,0200	1,0006	0,9994	0,9992	0,9997	1,0000	0,9999

$N = n] = Wn/(n+1)$, откуда $\mathbb{E}[D/N \mid N = n] = W/(n+1)$. Усредняя по $N \sim \text{Pois}(\mu)$ и учитывая, что D определено лишь при $N \geq 1$,

$$\mathbb{E}\left[\frac{D}{N}\right] = W \sum_{n \geq 1} \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!(n+1)} = \frac{W}{\mu} \sum_{n \geq 1} \frac{\mu^{n+1} e^{-\mu}}{(n+1)!} = \frac{W}{\mu} (1 - e^{-\mu} - \mu e^{-\mu}),$$

что и есть (6) для концевой формы. Для наклона МНК заметим, что $\mathbb{E}[t_k \mid N = n] = t_0 + kW/(n+1)$ при $k = 0, \dots, n$; поскольку наклон — линейная статистика с весами $\sum_k w_k = 0$, $\sum_k w_k k = 1$, в обоих вариантах $\mathbb{E}[\hat{\beta} \mid N = n] = W/(n+1)$. Для $\hat{\beta}_0$ суммирование идёт по $n \geq 1$ и даёт то же, что и выше. Для $\hat{\beta}_1$ оно идёт по $n \geq 2$: $\sum_{n \geq 2} \frac{W}{n+1} \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!} = \frac{W}{\mu} (1 - (1 + \mu + \mu^2/2)e^{-\mu})$, и деление на $\Pr(N \geq 2) = 1 - (1 + \mu)e^{-\mu}$ даёт (7). $\square$

Содержательный смысл прост: несмещённые оценки κ и $1/\kappa$ не могут быть взаимно обратными, поскольку $x \mapsto 1/x$ строго выпукло. Несмещённая пара — это $(\hat{G}_b, \tilde{\kappa}_b)$, где $\tilde{\kappa}_b = (N_b - 1) \ln b/D_b$; но $\tilde{\kappa}_b \neq 1/\hat{G}_b$. Всякая единая «поправка на цензурирование», исправляющая одну величину, портит другую. Таблица 2 подтверждает предложение 2 симуляцией при обеих схемах.

Замечание 2. Существенно, что пункт (b) снимает возможное возражение к первому выводу работы. Ниже (§4) мы принимаем схему В как соответствующую способу получения данных; если бы пункт (a) был единственным, то весь §3 опирался бы на схему, которую сама работа отвергает. Пункт (b) показывает, что вывод от выбора схемы не зависит: дефицит $(1 + \mu)e^{-\mu}$ при $\mu \approx N_b$ составляет 0,73% при $N_b = 7$, 0,05% при $N_b = 10$ и около $2 \cdot 10^{-6}$ при $N_b = 16$ (для МНК без начала отсчёта (7) — 2,25%, 0,23% и $1,4 \cdot 10^{-5}$), тогда как обсуждаемые в литературе отклонения — десятки процентов.

Замечание 3. Отрицательный результат этого параграфа стоит подчеркнуть, поскольку он противоречит интуиции: систематическое отклонение опубликованных частот вниз от $e^{-\gamma}$ не объясняется схемой подгонки. Его источник — не арифметика оценки, а член второго порядка самой эвристики, $c_b \ln \ln x$ в счётной функции, который занижает частоту при конечных n и исчезает лишь как $\ln \ln n / \ln n$ (§9); вклад в разрыв вносит и схема наблюдения (§4).

3.4 Неустойчивость к выбору формы оценки

Несмещённость не означает согласованности. В таблице 5 приведены конечная форма $\hat{G}_b$ и оценка по МНК $\hat{G}_b^{\text{OLS}}$ на одних и тех же данных. Расхождения достигают 29,5% ($b = 18$), 15,9% ($b = 13$) и 10,3% ($b = 11$).

Сопоставим их с тем, что в литературе толкуют содержательно, — с отклонениями самих оценок от $e^{-\gamma}$. Последние по пятнадцати основаниям имеют медиану 17,6% (от 5,6% при $b = 20$ до 43,7% при $b = 19$). Наибольшее расхождение форм, 29,5%, превышает эту медиану в 1,7 раза. В среднем выбор формы, разумеется, дешевле: медиана расхождений равна 4,1%, то есть около четверти медианного отклонения. Но у двух оснований из пятнадцати ($b = 18$ и $b = 20$) выбор формы весит больше, чем всё их отклонение от предсказания ЛПВ, — и одно из них, основание 18, фольклор как раз и обсуждает.

Следствие для фольклора прямое. Основание 18 при конечной форме имеет $\hat{G}_{18} = 0,6604$ — третье по величине из пятнадцати (после $b = 7$ с 0,7104 и $b = 10$ с 0,6612), то есть уверенно входит в тройку «самых неудачливых»; при МНК $\hat{G}_{18}^{\text{OLS}} = 0,4656$ — десятое место из пятнадцати, ниже медианы 0,4904, то есть оно уже «удачливое». Ярлык переворачивается без единого нового простого числа, от одной лишь смены формы оценки: основание перемещается с третьего места на десятое.

К этому добавляется вторая, техническая трудность МНК: его стандартные ошибки в этой задаче неверны. Остатки суть отклонения порядковых статистик и сильно автокоррелированы; для $b = 2$ мы получаем $\rho_1 = 0,825$, а ковариационная оценка Ньюи — Уэста с восемью лагами увеличивает стандартную ошибку свободного члена с 0,447 до 0,732 (§7). Опубликованные точечные значения не сопровождаются интервалами, и это, а не смещение, — главная методологическая претензия к текущей практике.

3.5 Условное правдоподобие схемы A

Предложение 1 даёт больше, чем разбор смещения. Полагая $t_0 = \ln n_{\min}$ и приняв (N_b, D_b) за данные по основанию b , получаем логарифмическое правдоподобие

$$\ell_A(\kappa) = \sum_b \left[N_b \ln \frac{\kappa}{\ln b} - \frac{\kappa}{\ln b} D_b \right] + \text{const}, \quad (8)$$

распределение которого не зависит от границы поиска L_b . Это существенно практически: L_b в основном наборе документирована лишь при $b = 2$ и $b = 10$. Дифференцируя (8) и полагая $S = \sum_b D_b / \ln b$, получаем

$$\hat{\kappa} = \frac{M}{S}, \quad \tilde{\kappa} = \frac{M-1}{S}, \quad M = \sum_b N_b. \quad (9)$$

Так как $\kappa S = \sum_b \lambda_b D_b$ есть сумма независимых величин $\text{Gamma}(N_b, 1)$, то

$$\kappa S \sim \text{Gamma}(M, 1), \quad (10)$$

то есть точная центральная статистика; доверительные интервалы и p -значения получаются в замкнутой форме. *Ровно это утверждение и требует ревизии* — см. §4.

Замечание 4 (Независимость по основаниям). Объединение предполагает независимость процессов по разным основаниям. Строго она не выполняется на малых индексах: семнадцать значений индекса встречаются более чем в одном основании, причём $n = 3$ — в девяти, поскольку $R_b(3) = b^2 + b + 1$ просто для многих b . Все такие совпадения лежат при $n \leq 317$. Существеннее, впрочем, не совпадение индексов (числа $R_b(n)$ при разных b различны), а возможная общность алгебраических делителей; и то и другое затрагивает лишь малые n , тогда как D_b определяется верхним концом диапазона. Подраздел 5.4 подтверждает, что

отбрасывание всех индексов ниже 10^3 вывод не меняет. Отметим, что к условному мультиномиальному критерию §5.3 это замечание относится сильнее, чем к объединённой оценке: зависимость искажает не среднее, а нулевое распределение статистики; та же проверка с усечением покрывает и его.

4 Две схемы наблюдения

4.1 В чём различие

Пивот (10) выведен в предположении, что N_b задано планом наблюдения: мы смотрим на процесс, пока не наберём N_b событий, и останавливаемся. Назовём это *схемой А* (обратная выборка, цензурирование типа II).

Данные получены иначе. Для каждого основания вычислительный поиск покрывает интервал $(t_0, \ln L_b]$ целиком, и найденными оказались все события, попавшие внутрь; число находок N_b — случайная величина, а фиксирован фронт L_b . Назовём это *схемой В*.

Замечание 5 (Что здесь классика, а что нет). Само различие схем классическое и восходит к теории надёжности, где схема А называется *failure-truncated*, а схема В — *time-truncated* испытанием на долговечность [13, 14]. Оценка $(N-1)/D$, несмещённая при схеме А (следствие 1), там учебниковая, и мы не претендуем на неё. Распределение ОМП среднего при цензурировании типа I изучено Бартоломью [15]. Отметим также элементарный факт: при схеме В с известным окном достаточной статистикой служит $N \sim \text{Poisson}(\lambda W)$, а $\mathbb{E}f(N) = \sum_n f(n)e^{-\mu}\mu^n/n!$ есть целая функция от $\mu = \lambda W$, которая не может совпадать с W/μ , имеющей полюс в нуле. Поэтому несмещённой оценки *среднего* $1/\lambda$ при схеме В не существует (для цензурированных по времени выборок из экспоненциального распределения см. [16]); то же рассуждение применимо и условно на D_b . Предложение 3 этому не противоречит: оно даёт точную несмещённость оценки *интенсивности*.

Новым мы считаем другое. В классической постановке момент прекращения испытания *известен*: время T назначает экспериментатор. Здесь фронт L_b в основном наборе документирован лишь для $b = 2$ и $b = 10$ (§4.5), поэтому полную экспозицию приходится не брать из протокола, а восстанавливать — через отсутствие последствия, из самих находок. Отсюда и берётся поправка *на каждое основание*, а не на выборку в целом: неизвестных фронтов столько же, сколько оснований. Обзор смещений, порождаемых краем окна наблюдения, но в непараметрической постановке и для формы распределения интервалов, а не для интенсивности, дан в [17].

Двойственные задачи известны давно. В палеонтологии по находкам окаменелостей оценивают неизвестный конец стратиграфического интервала, и наблюждённый крайний уровень продлевают примерно на один средний промежуток между находками [18, 19]. В экологии по записям наблюдений вида оценивают неизвестный момент его вымирания [20]. Общая задача об оценке точки усечения рассмотрена в [21]. Там, однако, неизвестный конец окна — параметр интереса. У нас он мешающий параметр, и оценивается интенсивность. Ближе всего по технике работа [22]: там окно наблюдения начинается с первого события, и правдоподобие факторизуется на пуассоновский множитель и множитель, не зависящий от интенсивности. Работ, где цензурирование типа I с незаписанным моментом цензурирования рассматривалось бы как задача об объединённой оценке интенсивности по многим стратам, мы не нашли.

Различие не косметическое. При схеме В, условно на $N_b = n$, положения событий суть n независимых равномерных величин на $(t_0, \ln L_b]$, поэтому условное распределение D_b зависит от L_b и *не* зависит от λ_b : при фиксированном N_b величина D_b информативна о фронте, а не об интенсивности.

Точнее, при схеме В с известной шириной окна $W_b = \ln L_b - t_0$ правдоподобие основания b есть $\lambda_b^{N_b} e^{-\lambda_b W_b}$, а при неизвестной оно зависит от мешающего параметра $W_b \geq D_b$

и монотонно убывает по нему. Совместная ОМП поэтому ставит $\hat{W}_b = D_b$ — фронт ровно на последнюю находку, — и выражение (8) оказывается *профильным* правдоподобием по мешающим параметрам $W_1, \dots, W_B$, а M/S — профильной ОМП. Число мешающих параметров растёт вместе с числом оснований, и профильная ОМП несостоятельна: при $B \rightarrow \infty$ и ограниченных $\lambda_b W_b$ она сходится не к κ . Это классическая ситуация Неймана — Скотта [9] (обзор — [23]), и стандартный выход из неё — обусловливание на статистике, достаточной для мешающих параметров [24, 10]. Его и реализует §4.2.

Заметим также, что §7 настоящей работы, где для $b = 2$ фронт известен и используется явно, построен именно на схеме В. Обе схемы в одной работе применять нельзя; ниже мы принимаем схему В как соответствующую способу получения данных и строим для неё точный вывод.

4.2 Точный условный закон схемы В

Ключевое наблюдение состоит в том, что при схеме В обусловливание надо проводить не на числе событий, а на положении последнего из них. Тогда неизвестный фронт исчезает из задачи полностью. Требуется одно допущение.

(A1) *Положение фронта L_b не выбиралось по результатам поиска: вычислительный бюджет, а не находки, определяет, до какого n доведено просеивание. Формально: ширина окна $W_b = \ln L_b - t_0$ есть случайная величина с произвольным неизвестным распределением π_b (в частности, константа), и весь вектор $(W_b)_b$ не зависит от совокупности процессов находок по всем основаниям. Для закона (12) по одному основанию достаточно независимости W_b от процесса по основанию b ; совместная независимость нужна для пункта (iii) и мультиномиального критерия §5.3.*

На языке анализа выживаемости (A1) есть требование *неинформативности* цензурирования: момент остановки не зависит от того, что процесс успел породить. Распределения π_b могут быть любыми и различаться по основаниям; они нигде не оцениваются.

Предложение 3 (Точное условное правдоподобие). *Пусть при схеме В однородный пуассоновский процесс интенсивности λ_b наблюдается на $(t_0, t_0 + W_b]$, выполнено (A1), $N_b \geq 1$ и $D_b = t_{N_b} - t_0$ — расстояние от начала отсчёта до последнего найденного события.*

(i) *Совместная плотность (N_b, D_b) в точке (n, d) , $n \geq 1$, $d > 0$, факторизуется:*

$$p(n, d) = \underbrace{e^{-\lambda_b d} \frac{(\lambda_b d)^{n-1}}{(n-1)!}}_{\text{ядро условного закона}} \cdot \underbrace{\lambda_b \int_{[d, \infty)} e^{-\lambda_b(w-d)} \pi_b(dw)}_{\text{плотность } D_b}, \quad (11)$$

так что при фиксированной λ_b статистика D_b достаточна для W_b (и для всего распределения π_b).

(ii) *Следовательно,*

$$K_b := N_b - 1 \mid D_b \sim \text{Poisson}(\lambda_b D_b), \quad (12)$$

и это распределение не зависит ни от W_b , ни от π_b .

(iii) *Для независимых по основаниям процессов*

$$K := M - B \mid (D_b)_b \sim \text{Poisson}(\kappa S), \quad S = \sum_b \frac{D_b}{\ln b}, \quad (13)$$

и $\hat{\kappa}_B = (M - B)/S$ есть оценка условного максимального правдоподобия, точно условно несмещённая: $\mathbb{E}[\hat{\kappa}_B \mid (D_b)_b] = \kappa$.

Доказательство. (i) Зафиксируем сначала $W_b = w$. Событие $\{N_b = n, D_b \in [d, d + \Delta)\}$ при $0 < d < d + \Delta \leq w$ и $\Delta \rightarrow 0$ означает: на $(t_0, t_0 + d)$ ровно $n - 1$ событий, в $[t_0 + d, t_0 + d + \Delta)$ одно, на $[t_0 + d + \Delta, t_0 + w]$ ни одного. По независимости приращений пуассоновского процесса его вероятность равна $e^{-\lambda_b d} \frac{(\lambda_b d)^{n-1}}{(n-1)!} \cdot \lambda_b \Delta \cdot e^{-\lambda_b (w-d)} + o(\Delta)$, а при $d > w$ равна нулю. По (A1) усреднение по $w \sim \pi_b$ затрагивает лишь последний множитель и даёт (11). Суммирование по $n \geq 1$ показывает, что второй множитель в (11) есть маргинальная плотность D_b . (ii) Деление (11) на маргинальную плотность D_b . (iii) Сумма независимых пуассоновских величин пуассоновская; логарифм условного правдоподобия $\ell_B(\kappa) = \sum_b [K_b \ln \kappa - \kappa D_b / \ln b] + \text{const}$ максимизируется при $\kappa = K/S$, а условная несмещённость немедленна из $\mathbb{E}[K | D] = \kappa S$. $\square$

Замечание 6 (Условное и интегрированное правдоподобие). Тот же результат получается интегрированием правдоподобия по мешающему параметру. При фиксированном окне совместная плотность пропорциональна $\lambda_b^n d^{n-1} e^{-\lambda_b W_b} \mathbf{1}_{\{W_b \geq d\}}$, и $\int_d^\infty \lambda_b^n e^{-\lambda_b W_b} dW_b = \lambda_b^{n-1} e^{-\lambda_b d}$ — ровно ядро (12). Это интегрированное правдоподобие в смысле [25] с несобственной равномерной мерой на W_b . Такая процедура сама по себе зависит от выбора меры: мера, равномерная по $\mu_b = \lambda_b W_b$, то есть $d\mu_b = \lambda_b dW_b$, дала бы $\lambda_b^n e^{-\lambda_b d}$ и вернула бы несостоятельную оценку M/S . Здесь, однако, выбор не произволен. Во-первых, результат совпадает с *условным* правдоподобием (12), которое определено без всякой меры и инвариантно относительно перепараметризации W_b . Во-вторых, W_b входит в (11) как параметр сдвига для $D_b = W_b - \delta_b$ (с точностью до усечения $\delta_b \leq W_b$), и dW_b — инвариантная мера группы сдвигов. В-третьих, при $\pi_b(dw) = dw$ маргинальный множитель в (11) равен $\lambda_b \int_d^\infty e^{-\lambda_b (w-d)} dw = 1$ и от λ_b не зависит. Значит, отбрасываемый при обусловливании множитель при неизвестном фронте не несёт информации о κ , которую можно было бы использовать, не задавая π_b .

Замечание 7 (Связь с задачей Неймана — Скотта). Поправка «одно событие на основание» имеет ту же природу, что потеря одной степени свободы на группу в классическом примере Неймана — Скотта [9]. При $y_{ij} \sim N(\mu_i, \sigma^2)$ профильная ОМП $\hat{\sigma}^2$ несостоятельна, а обусловливание на $\bar{y}_i$, достаточной для μ_i при фиксированной σ^2 , даёт $\sum_j (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 \sim \sigma^2 \chi_{n_i-1}^2$. В обоих случаях мешающий параметр группы одномерен и является параметром сдвига, а достаточная для него статистика «поглощает» ровно одно наблюдение: среднее — одну степень свободы, последнее событие — одно событие. Общий механизм — условное правдоподобие при статистике, достаточной для мешающего параметра при фиксированном параметре интереса [24]. Его состоятельность при растущем числе страт в регулярных условиях установлена Андерсеном [10], а оптимальность условной оценки в моделях смеси по мешающему параметру — Линдсеем [26].

Замечание 8 (Неоднородная интенсивность). Рассуждение (i) не использует однородности. Если интенсивность $\lambda_b(t; \theta)$ зависит от параметра θ , то условно на D_b события на $(t_0, t_0 + D_b)$ образуют пуассоновский процесс той же интенсивности, и условный логарифм правдоподобия есть

$$\ell_B(\theta) = \sum_b \left[\sum_{i=1}^{N_b-1} \ln \lambda_b(t_i; \theta) - \int_{t_0}^{t_0+D_b} \lambda_b(t; \theta) dt \right] : \quad (14)$$

последнее событие исключается из суммы, а интеграл обрывается на нём. Именно в таком виде следует оценивать модели §8 с переменной интенсивностью.

Практические следствия предложения 3 стоит выписать отдельно, поскольку они устраняют почти все оговорки предыдущей редакции этой работы.¹

1. *Точные интервалы без симуляции.* Инверсия пуассоновской ставки даёт интервал Гарвуда [28]

$$\left[\frac{1}{2S} \chi_{\alpha/2, 2K}^2, \frac{1}{2S} \chi_{1-\alpha/2, 2(K+1)}^2 \right], \quad (15)$$

¹Предыдущие редакции и их вычислительные скрипты открыто доступны в истории репозитория [27]; здесь и далее ссылки на «предыдущую» или «более раннюю» редакцию относятся к ним.

покрытие которого никогда не ниже номинала. При нашем S оно равно 0,9540 при $\kappa = e^\gamma$ и лежит в пределах 0,950–0,958 при $\kappa \in [1,5; 2,2]$ (превышение — обычный эффект дискретности).

2. *Никакого остатка.* Ни экспоненциально малых членов, ни оговорок об основаниях без находок: обусловливание на $N_b \geq 1$ выполняется по построению, поскольку D_b определено только тогда. Основание без единой находки в условное правдоподобие не входит.
3. *Никакой зависимости от положения фронта.* Правило, по которому выбирался L_b , в (12) не входит вовсе — при условии (A1).
4. *Цена обусловливания мала.* $\text{SD}(\hat{\kappa}_B) = \sqrt{\kappa/S} = 0,1270$ против $\sqrt{\kappa/S_{\text{full}}} = 0,1224$ при известных фронтах, стоящих на своём ожидаемом месте, $S_{\text{full}} \approx S + B/\kappa$ (предложение 4). Отказ от знания L_b увеличивает стандартное отклонение на 3,7%, или 7,1% фишеровской информации: B/κ из $S + B/\kappa$, то есть примерно B событий из M . Знание фронтов нужно не столько для точности, сколько для проверки (A1) (§4.5).

При нарушении (A1) обусловливание на D_b перестаёт быть безобидным. Если поиск прекращается ровно на находке, то D_b и есть момент остановки, $\delta_b = 0$, и возвращается схема А. Если же поиск прекращается после достаточно долгой полосы без находок, то сама остановка несёт информацию о процессе до D_b , и закон (12) перестаёт быть верным (замечание 9).

4.3 Сколько стоит незнание фронта

Помимо замечания 7, величину поправки поясняет прямой моментный расчёт. Мы сохраняем его как содержательное толкование и как основу анализа нарушений (A1) в замечании 9.

Предложение 4. Пусть при схеме B поиск по основанию b покрыл $(t_0, \ln L_b]$, ширина окна $W_b = \ln L_b - t_0$ фиксирована (при (A1) — условно на W_b), а $\delta_b = \ln L_b - t_{N_b}$ — расстояние от фронта до последнего найденного события (при $N_b = 0$ полагаем $\delta_b = W_b$). Тогда

$$\Pr(\delta_b > x) = e^{-\lambda_b x} \quad (0 \leq x < W_b), \quad \Pr(\delta_b = W_b) = e^{-\lambda_b W_b}, \quad (16)$$

то есть δ_b есть экспоненциальная величина с параметром λ_b , усечённая на W_b , и

$$\mathbb{E}[\delta_b] = \frac{1 - e^{-\lambda_b W_b}}{\lambda_b} \leq \frac{1}{\lambda_b}. \quad (17)$$

Полная экспозиция есть $S_{\text{full}} = S + \sum_b \delta_b / \ln b = \sum_b W_b / \ln b$, причём $\mathbb{E}[M] = \kappa S_{\text{full}}$ тождественно, а

$$\mathbb{E}\left[\kappa \sum_b \delta_b / \ln b\right] = B - \sum_b e^{-\lambda_b W_b}. \quad (18)$$

Доказательство. Событие $\{\delta_b > x\}$ при $x < W_b$ означает, что на интервале $(\ln L_b - x, \ln L_b]$ длины x нет ни одного события процесса; вероятность этого равна $e^{-\lambda_b x}$. При $x \rightarrow W_b^-$ остаётся случай «событий нет вовсе», что и даёт атом в (16). Интегрируя хвост, $\mathbb{E}[\delta_b] = \int_0^{W_b} e^{-\lambda_b x} dx = (1 - e^{-\lambda_b W_b})/\lambda_b$, откуда (17), и неравенство очевидно. Далее, S_{full} не случайна: по построению $D_b + \delta_b = W_b$, поэтому $\kappa S_{\text{full}} = \sum_b \lambda_b W_b = \mathbb{E}[M]$ — это в точности уравнение моментов. Наконец, $\kappa \mathbb{E}[\delta_b] / \ln b = \lambda_b \mathbb{E}[\delta_b] = 1 - e^{-\lambda_b W_b}$, и суммирование по b даёт (18). $\square$

Иными словами, незнание фронта стоит информации, эквивалентной одному событию на каждое основание, — а формула (9) вычитает одно событие *всего*. При $B = 15$ разница составляет четырнадцать событий, то есть 6,9%:

$$\frac{M - 1}{S} = 1,9648 \quad \text{против} \quad \frac{M - B}{S} = 1,8381. \quad (19)$$

Отбрасываемый в (18) остаток $\sum_b e^{-\lambda_b W_b}$ есть ожидаемое число оснований, у которых поиск не дал ни одной находки; в наших данных $\lambda_b W_b \approx N_b \geq 7$, так что он не превосходит $3 \cdot 10^{-3}$ против $B = 15$. Подчеркнём, что в точной формулировке (12) этот остаток не возникает вовсе: моментный расчёт нужен здесь только для интерпретации.

Замечание 9 (Что остаётся без (A1)). В предыдущей редакции утверждалось, что семейство $(M - Bm)/S$ с $m \in [0, 1]$ даёт доказуемую двустороннюю вилку $[(M - B)/S, (M - 1)/S]$. Это утверждение *неверно*, и мы его отзываем. Неравенство (17) выведено при фиксированном (или независимом от процесса) окне, то есть именно при (A1), а тогда вилка не нужна: верна оценка $(M - B)/S$. Обозначим $m_b = \lambda_b \mathbb{E}[\delta_b]$: при (A1) $m_b = 1 - e^{-\lambda_b W_b} \approx 1$, остановка «на находке» даёт $m_b = 0$, остановка «после засухи» — $m_b > 1$. Если (A1) нарушено, то m_b может быть любым неотрицательным числом.

Строго сохраняется лишь *верхняя* граница. Если фронт есть момент остановки относительно истории поиска (решение прекратить поиск не заглядывает вперёд), то по тождеству Вальда для пуассоновского процесса $\mathbb{E}[N_b] = \lambda_b \mathbb{E}[W_b]$ при *любом* правиле остановки с $\mathbb{E}[W_b] < \infty$. Поскольку $W_b = D_b + \delta_b \geq D_b$, получаем $\mathbb{E}[M] \geq \kappa \mathbb{E}[S]$: в смысле моментов M/S ограничивает κ сверху. Нижней границы без допущений нет. Правило «прекратить поиск после полосы длиной g средних интервалов без находок» даёт $\lambda_b \delta_b \geq g$. Кроме того, само ожидание такой полосы уплотняет события перед D_b , так что закон (12) перестаёт быть верным. Таблица 3 показывает последствия: при $g = 2$ оценка $(M - B)/S$ завышена на 6,7%, а точный критерий предложения 3 отвергает верную гипотезу в 18% случаев вместо 5%. Правило «остановиться на следующей находке» ($\delta_b = 0$) смещает $(M - B)/S$ вниз на 6,4%, и тогда правильна оценка $(M - 1)/S$.

Поэтому точная формулировка такова. При (A1) основной результат (20) точен. При остановке «на находке» правильна оценка (21). Верхнюю границу в смысле моментов при *любом* правиле даёт M/S (тождество Вальда); она отличается от (21) лишь на $1/S$, то есть примерно на 0,5%, но сама оценка (21) такой границей не является: при остановке «на находке» её среднее равно $0,996 \kappa$ (таблица 3). При остановке «после засухи» истинное κ *ниже* $(M - B)/S$, то есть ещё ближе к e^γ или ниже его. Ни одно из нарушений (A1) не создаёт превышения над ЛПВ, которое данные требовали бы объяснять. Но величина неопределённости без документированных фронтов не ограничена снизу: это довод в пользу публикации L_b сильнее того, что приводился раньше.

4.4 Калибровка старого пивота

Насколько плох гамма-пивот (10), если данные порождены схемой В, зависит от того, как далеко ушёл фронт, — и это стоит приводить диапазоном, а не одним числом. Таблица 4 даёт обе величины сразу: ошибку I рода старого критерия и относительное смещение обеих объединённых оценок.

Три вывода из таблицы 4. Во-первых, номинальный 5% критерий при схеме В отвергает верную гипотезу в 11–17% случаев: заявленная точность интервалов завышена вдвое-втрое, причём тем сильнее, чем ближе фронт к последней находке. Во-вторых, оценка $(M - 1)/S$ смещена вверх на 4–7% при всех правилах, тогда как $(M - B)/S$ несмещена с точностью до шума Монте-Карло при всех правилах — что и предсказывает предложение 3, поскольку условная несмещённость влечёт безусловную. В-третьих, само число «16,2%», фигурировавшее в более ранней редакции, есть значение при одном конкретном сценарии; корректно приводить диапазон. Все семь правил таблицы 4 задают фронт без оглядки на находки, то есть удовлетворяют (A1); правила, нарушающие (A1), разобраны в замечании 9 и таблице 3.

4.5 Документированные фронты: эмпирическая проверка (A1)

Датированный и атрибутированный фронт выше последней находки удалось найти для четырёх оснований (проверено 24.09.2026):

Таблица 3. Схема В при различных правилах остановки поиска: относительное среднее двух объединённых оценок, отношение $\mathbb{E}[M]/(\kappa\mathbb{E}[S])$ (по тождеству Вальда ≥ 1 при любом правиле) и ошибка I рода точного двустороннего пуассоновского критерия (13) на уровне 5%. Бюджет $W_b^0 = N_b/\lambda_b$; «засуха g »: после исчерпания бюджета поиск продолжается, пока не пройдёт g/λ_b без находок. 20 000 реализаций на строку, точность около $\pm 0,05\%$ по средним и $\pm 0,003$ по уровню (скрипт `stopping_rules.py`, тег [S13], зерно 20260924).

Table 3. Scheme B under various stopping rules: relative mean of the two pooled estimators, the ratio $\mathbb{E}[M]/(\kappa\mathbb{E}[S])$ (at least 1 under every rule by Wald’s identity), and the type I error of the exact two-sided Poisson test (13) at the 5% level. Budget $W_b^0 = N_b/\lambda_b$; “drought g ”: after the budget is spent the search continues until g/λ_b passes without a find. 20 000 replications per row, accuracy about $\pm 0.05\%$ for the means and ± 0.003 for the level (script `stopping_rules.py`, tag [S13], seed 20260924).

Правило остановки	$\mathbb{E}[(M-1)/S]/\kappa$	$\mathbb{E}[(M-B)/S]/\kappa$	$\frac{\mathbb{E}[M]}{\kappa\mathbb{E}[S]}$	ошибка I рода
(A1): фронт = W_b^0	1,0688	0,9999	1,0737	0,046
(A1): фронт = UW_b^0 , $U \sim U(0,5; 2)$	1,0551	1,0000	1,0582	0,043
остановка на находке	0,9963	0,9362	1,0003	0,165
засуха $g = 0,5$	1,0762	1,0074	1,0811	0,050
засуха $g = 1$	1,0923	1,0250	1,0973	0,063
засуха $g = 2$	1,1227	1,0667	1,1277	0,178

- $b = 2$: отчёт GIMPS на момент считывания данных, $X_{\text{ver}} = 81\,648\,221$ и $X_{\text{ft}} = 141\,308\,443$ (§2);
- $b = 10$: «Search limit is 10800000, currently» (С. Баталов, A004023, 1.07.2021);
- $b = 22$ и $b = 26$: «No other terms < 100000» (Р. Прайс, A127997, A127999, 2012 г.; последние находки 27 823 и 26 717 сделаны в 2007–2008 гг.).

Остальные упоминания пределов поиска либо устарели и лежат далеко ниже n_{max} , либо совпадают с последней находкой и отмечают её, а не поиск.

При (A1) величины $\lambda_b\delta_b$ независимы и распределены как $\text{Exp}(1)$ (усечение на W_b здесь пренебрежимо), так что их сумма по k основаниям имеет распределение $\text{Gamma}(k, 1)$. Малые значения указывают на остановку «на находке» ($m < 1$), большие — на остановку «после засухи» ($m > 1$, замечание 9). Наблюдаются значения 0,143 ($b = 2$ по X_{ver} ; 0,093 по X_{ft}), 0,215 ($b = 10$), 0,737 ($b = 22$) и 0,722 ($b = 26$). Среднее равно 0,44–0,45 при ожидаемой единице. Вероятность столь малой суммы при (A1) равна 0,10–0,11 (тег [S18]).

Выводы осторожны: наблюдений четыре, фронт $b = 2$ движется непрерывно, а два основания входят лишь в расширенный набор. Тем не менее это первая проверка (A1) по данным, и её результат информативен по *направлению*. Документированные фронты расположены не дальше, а ближе к последним находкам, чем предсказывает (A1). Нарушение, опасное для вывода о согласии с ЛПВ, — остановка «после засухи», смещающая $(M - B)/S$ вверх, — данными не поддерживается: вероятность верхнего хвоста равна 0,89–0,90. Оговорка: малые $\lambda_b\delta_b$ могут отражать и момент, когда фронт был сообщён, а не правило остановки (для $b = 10$ фронт опубликован через два месяца после находки). Если (A1) нарушено в противоположном направлении, то есть $m_b \leq 1$ при всех b , то $\mathbb{E}[M - B] \leq \kappa \mathbb{E}[S] \leq \mathbb{E}[M]$, и в смысле моментов κ лежит между $(M - B)/S$ и M/S . Данные ($p = 0,10$) на такое направление лишь указывают, но не доказывают его.

Документированные фронты можно и использовать напрямую. Для оснований с известным фронтом применимо полное правдоподобие: $N_b \sim \text{Poisson}(\lambda_b W_b)$ со всеми событиями и полным окном. Для остальных применим условный закон (12). Сумма снова точно

Таблица 4. Схема В при семи правилах расположения фронта: ошибка I рода номинального 5% критерия, построенного на гамма-пивоте (10), и относительное смещение двух объединённых оценок. Правила заданы через ширину окна $W_b = \ln L_b - t_0$: « $\mathbb{E}[\#]$ = наблюдаемое» есть $W_b = N_b/\lambda_b$; «+s средних интервалов» — $W_b = (N_b + s)/\lambda_b$; «в c раз дальше по t» — $W_b = c D_b$ с наблюдаемым D_b . 50 000 реализаций на строку, точность около $\pm 0,003$ по уровню и $\pm 0,1\%$ по средним (tag [S10]).

Table 4. Scheme B under seven frontier rules: type I error of the nominal 5% test built on the Gamma pivot (10), and the relative bias of the two pooled estimators. The rules are stated through the window width $W_b = \ln L_b - t_0$: “ $\mathbb{E}[\#]$ = observed” is $W_b = N_b/\lambda_b$; “+s mean intervals” is $W_b = (N_b + s)/\lambda_b$; “c times further in t” is $W_b = c D_b$ with the observed D_b . 50 000 replications per row, accuracy about ± 0.003 for the level and $\pm 0.1\%$ for the means (tag [S10]).

Правило для фронта	ошибка I рода	$\mathbb{E}[(M-1)/S]/\kappa$	$\mathbb{E}[(M-B)/S]/\kappa$
$\mathbb{E}[\#\text{событий}] = \text{наблюдённое}$	0,1634	1,0691	1,0001
фронт +0,5 среднего интервала	0,1620	1,0667	1,0002
фронт +1 средний интервал	0,1596	1,0640	0,9998
фронт +2 средних интервала	0,1527	1,0599	0,9998
фронт +5 средних интервалов	0,1359	1,0506	1,0002
фронт в 1,5 раза дальше по t	0,1342	1,0499	0,9999
фронт вдвое дальше по t	0,1136	1,0371	1,0001
А (контроль)	0,0492	—	—

пуассоновская. Гибридная оценка с известными фронтами $b = 2$ (X_{ft}) и $b = 10$ равна $\hat{\kappa} = 1,853$ при точном 95% интервале $[1,608; 2,125]$ и $p = 0,588$ против e^γ . Она отличается от $(M - B)/S = 1,838$ на 0,8%, и основной вывод не меняется.

4.6 Данные не выбирают схему за нас

Подчеркнём, что $(M - 1)/S$ и $(M - B)/S$ — функции одних и тех же достаточных статистик (N_b, D_b) . Никакая обработка самих находок не скажет, какая из них верна: выбор определяется тем, как данные собирались, и цена его составляет 6,9% — вдвое больше, чем весь остаточный разрыв с ЛПВ (3,2%).

Естественная попытка обойти выбор — строить объединённую оценку из заведомо несмещённых кусков. Оценка по одному основанию $\tilde{\kappa}_b = (N_b - 1) \ln b / D_b$ несмещена при схеме А (следствие 1) и несмещена при схеме В с точностью до экспоненциально малого члена. Действительно, при $N_b = n \geq 2$ отношение D_b/W_b распределено как $\text{Beta}(n, 1)$, и тождество $\mathbb{E}[1/\text{Beta}(\alpha, \beta)] = (\alpha + \beta - 1)/(\alpha - 1)$ даёт $\mathbb{E}[\lambda_b \mid N_b = n] = n/W_b$; при $n \in \{0, 1\}$ оценка равна нулю. Усреднение по $n \sim \text{Pois}(\lambda_b W_b)$ поэтому даёт не λ_b , а

$$\mathbb{E}[\tilde{\lambda}_b] = \lambda_b - \frac{\Pr(N_b = 1)}{W_b} = \lambda_b (1 - e^{-\lambda_b W_b}),$$

то есть тот же экспоненциально малый дефицит: при $\lambda_b W_b \approx N_b \geq 7$ он не превосходит 0,1%.

Тем не менее взвешенное среднее

$$\kappa_* = \sum_b (N_b - 2) \tilde{\kappa}_b / \sum_b (N_b - 2)$$

с обратно-дисперсионными весами даёт при схеме А смещение 0,0%, а при схеме В — +7,5%, то есть практически то же, что и $(M - 1)/S$. Причина в том, что веса — сами числа событий — при схеме В случайны и положительно коррелируют с оценками; несмещённость каждого слагаемого не переносится на отношение сумм. Правильный способ объединения

Таблица 5. Оценки по основаниям. $\hat{G}_b = D_b/(N_b \ln b)$ — концевая форма; $\hat{G}_b^{\text{OLS}}$ — наклон МНК $\ln n_k$ на k , делённый на $\ln b$; обе несмещены (предложение 2). $\hat{\kappa}_b = K_b/(D_b/\ln b)$ — условная оценка схемы В с точным интервалом Гарвуда (15) из $\text{Poisson}(\kappa D_b/\ln b)$. Последний столбец — mid-PIT пуассоновского распределения при $\kappa = e^\gamma$: значения вблизи единицы отвечают основаниям с *высокой* оценкой κ_b (ориентация обратна гамма-PIT прежней редакции). ЛПВ предсказывает $G = e^{-\gamma} = 0,5615$ и $\kappa = e^\gamma = 1,7811$.

Table 5. Per-base estimates. $\hat{G}_b = D_b/(N_b \ln b)$ is the endpoint form; $\hat{G}_b^{\text{OLS}}$ is the OLS slope of $\ln n_k$ on k divided by $\ln b$; both are unbiased (Proposition 2). $\hat{\kappa}_b = K_b/(D_b/\ln b)$ is the scheme B conditional estimator with the exact Garwood interval (15) from $\text{Poisson}(\kappa D_b/\ln b)$. The last column is the Poisson mid-PIT at $\kappa = e^\gamma$: values near one correspond to bases with a *high* κ_b (orientation opposite to the Gamma PIT of the earlier version). LPW predicts $G = e^{-\gamma} = 0.5615$ and $\kappa = e^\gamma = 1.7811$.

b	N_b	K_b	$\hat{G}_b$	$\hat{G}_b^{\text{OLS}}$	разн., %	$\hat{\kappa}_b$	95% ДИ (Гарвуд)	mid-PIT
2	51	50	0,5102	0,5309	+4,1	1,921	[1,426; 2,533]	0,710
3	22	21	0,6148	0,6081	−1,1	1,552	[0,961; 2,373]	0,272
5	18	17	0,4802	0,4666	−2,8	1,967	[1,146; 3,149]	0,670
6	16	15	0,5000	0,4904	−1,9	1,875	[1,049; 3,092]	0,594
7	9	8	0,7104	0,7371	+3,8	1,251	[0,540; 2,466]	0,160
10	10	9	0,6612	0,6746	+2,0	1,361	[0,622; 2,584]	0,216
11	12	11	0,4034	0,3617	−10,3	2,272	[1,134; 4,066]	0,794
12	13	12	0,3981	0,3796	−4,7	2,319	[1,198; 4,050]	0,820
13	12	11	0,4098	0,3448	−15,9	2,237	[1,117; 4,002]	0,780
14	10	9	0,5025	0,5386	+7,2	1,791	[0,819; 3,400]	0,528
15	9	8	0,5035	0,5054	+0,4	1,766	[0,762; 3,479]	0,513
17	11	10	0,4301	0,4353	+1,2	2,114	[1,014; 3,887]	0,717
18	7	6	0,6604	0,4656	−29,5	1,298	[0,476; 2,825]	0,228
19	10	9	0,3161	0,2971	−6,0	2,847	[1,302; 5,405]	0,911
20	8	7	0,5300	0,5713	+7,8	1,651	[0,664; 3,402]	0,444

— не взвешивать по-основанные оценки, а суммировать достаточные статистики, как это делает (13).

Отсюда мы делаем узкий, но, как нам кажется, важный вывод: *выигрыш в точности от объединения оснований неотделим от предположения о схеме наблюдения*. Единственный радикальный выход — документировать фронты поиска L_b , как это делает GIMPS для $b = 2$. Мы обращаемся с этим к участникам соответствующих поисковых проектов.

5 Результаты

5.1 Оценки по основаниям

Ниже $e^{-\gamma}$ лежат 11 оснований из 15 при концевой форме и 11 из 15 при МНК — но это *разные* одиннадцать. Состав меняется: основание 18 при концевой форме лежит выше $e^{-\gamma}$, а при МНК ниже, основание 20 — наоборот. Иными словами, даже знак отклонения не вполне устойчив к выбору формы; устойчиво лишь их *число*. Это тот же эффект, что и в §3.4, и затрагивает он ровно те два основания, у которых выбор формы весит больше самого отклонения.

Все пятнадцать mid-PIT-квантилей лежат внутри центральной 95% области; крайние — $b = 19$ на квантиле 0,911 и $b = 7$ на 0,160. Основание 13, «удачливое», находится на 0,780, что ничем не примечательно для одного из пятнадцати. Все пятнадцать интервалов Гарвуда накрывают e^γ .

5.2 Объединённая оценка

Точный условный вывод схемы В (предложение 3) даёт

$$\hat{\kappa}_B = \frac{M - B}{S} = 1,8381, \quad 95\% \text{ ДИ} = [1,5939; 2,1091], \quad p = 0,672, \quad (20)$$

где интервал есть (15) при $K = 203$, $S = 110,4423$, а p -значение получено по конвенции удвоенного минимального хвоста для $K \sim \text{Poisson}(e^\gamma S)$, $e^\gamma S = 196,71$; при mid- p -конвенции $p = 0,647$. Точное покрытие интервала (20) равно 0,9540 при $\kappa = e^\gamma$ и не опускается ниже 0,950 ни при каком κ .

Для сравнения, схема А через (9)–(10) даёт

$$\tilde{\kappa} = 1,9648, \quad 95\% \text{ ДИ} = [1,7205; 2,2444], \quad p = 0,142. \quad (21)$$

Точечная оценка (21) на 10,3% выше e^γ , и именно это превышение прежде интерпретировалось как след опущенного эвристикой фактора. При переходе к схеме В превышение сокращается до 3,2%, а p -значение растёт с 0,14 до 0,67.

Мы полагаем, что схема В ближе к способу получения данных, и потому считаем (20) основным результатом. Оценка (21) отвечает остановке поиска ровно на находке; при любом правиле остановки κ в смысле моментов ограничена сверху величиной $M/S = 1,974$, лишь на 0,5% большей (21) (замечание 9). При остановке «после засухи» истинное значение лежит ниже (20). Проверить (А1) по самим находкам нельзя; для четырёх оснований с документированными фронтами это сделано в §4.5. Обе оценки согласуются с ЛПВ; различаются они тем, требуют ли данные объяснения для остаточного превышения. Мы заключаем, что не требуют; остаток к тому же объясняется членом второго порядка самой эвристики (§9). Картина в целом показана на рис. 1: доверительный интервал каждого основания накрывает и e^γ , и обе объединённые оценки.

5.3 Однородность и её мощность

Пусть H_0 — модель с единой κ , а H_1 — модель со свободными κ_b . Из условного правдоподобия предложения 3, поскольку $\sum_b \hat{\kappa}_b D_b / \ln b = K = \hat{\kappa}_B S$, статистика отношения правдоподобий сводится к

$$\Lambda = 2 \sum_b K_b \ln \frac{\hat{\kappa}_b}{\hat{\kappa}_B} = 2 \sum_b K_b \ln \frac{K_b}{K s_b / S}, \quad s_b = \frac{D_b}{\ln b}. \quad (22)$$

Существенно, что её нулевое распределение здесь *точно*: обусловливание на $K = \sum_b K_b$ превращает (13) в мультиномиальную модель $(K_b) \mid K \sim \text{Multinomial}(K; s_b/S)$, и апеллировать к асимптотике χ^2_{B-1} не нужно. Мы получаем $\Lambda = 7,127$, точное $p = 0,935$ ($2 \cdot 10^6$ мультиномиальных реализаций, $\pm 0,0003$ на уровне 95%); асимптотическое приближение даёт $p = 0,930$ при 14 степенях свободы, то есть в данном случае работает хорошо.

Однако неотвержение информативно ровно настолько, насколько мощен критерий, и здесь следует применить к себе то же требование, что и к литературе. Мы симулировали альтернативы, в которых κ_b логнормально рассеяны вокруг e^γ с коэффициентом вариации cv :

cv	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50
мощность	0,059	0,097	0,184	0,326	0,484	0,645	0,774	0,851	0,948

Мощности 80% критерий достигает лишь при $cv \approx 0,37$ (12 000 реализаций на точку сетки, точность по мощности около $\pm 0,004$). Следовательно, $p = 0,935$ означает: данные не требуют базозависимых частот, но и не исключают разброса κ_b с коэффициентом вариации




Рис. 1. Оценки $\hat{\kappa}_b$ по основаниям с точными 95% интервалами Гарвуда (15); площадь маркера пропорциональна N_b . Штриховая линия — значение ЛПВ e^γ ; зелёная с полосой — объединённая оценка схемы В и её интервал; синяя штрихпунктирная — оценка схемы А $(M - 1)/S$. Каждое основание по отдельности совместимо с универсальной константой.

Figure 1. Per-base estimates $\hat{\kappa}_b$ with exact 95% Garwood intervals (15); marker area is proportional to N_b . Dashed line: the LPW value e^γ ; green with a band: the pooled scheme B estimate and its interval; blue dash-dotted: the scheme A estimate $(M - 1)/S$. Each base separately is compatible with a universal constant.

вплоть до трети. Утверждение «удачливых оснований не существует» из имеющихся данных не следует; следует более слабое — «их существование данными не поддерживается, а разброс с коэффициентом вариации меньше 0,37 обнаруживается с вероятностью ниже 80%».

5.4 Устойчивость

Нижнее усечение. Мы варьировали нижнюю точку усечения, чтобы прощупать асимптотический режим (эвристика (2) асимптотична, тогда как модель постоянной интенсивности стартует от $n = 2$). Результаты в таблице 6. Оценка схемы А растёт с 1,965 до 2,099 — не строго монотонно (при $n > 10^2$ она отстает с 2,019 до 2,012), но систематически: рост составляет 6,8% при том, что все пять значений получены на вложенных подвыборках одних и тех же данных. Это тренд, а не шум. Оценка схемы В восходящего тренда не показывает и остаётся вблизи e^γ , в пределах 1,789–1,871 (при более слабом критерии выбытия $N_b \geq 1$ — в пределах 1,757–1,871), а её p -значения на всех уровнях усечения лежат между 0,53 и 1,00. Причина видна из (13): усечение уменьшает M , но не B , тогда как схема А вычитает единицу независимо от объёма выборки. Мы считаем это подтверждением диагноза §4: восходящий тренд был свойством оценки, а не данных. Начиная с $n > 10$ оценка схемы В, напротив, монотонно *убывает* (1,871 $\rightarrow$ 1,789). Именно этого требует член второго порядка самой эвристики, и при его учёте убывание исчезает (§9). Обе кривые приведены на рис. 2.

Исключение по одному основанию. Анализ с исключением одного основания даёт $\hat{\kappa}_B$ в пределах [1,808; 1,878] (крайние значения — при исключении $b = 19$ и $b = 3$) и точные p -значения в пределах [0,49; 0,85]; ни одно основание не определяет вывод.

Таблица 6. Устойчивость к нижнему усечению. Основание остаётся в выборке, если после усечения у него сохраняется не менее *двух* событий ($N_b \geq 2$); при $n > 10^4$ этому критерию перестает удовлетворять основание 19, откуда $B = 14$. Критерий существен: при более слабом требовании $N_b \geq 1$ основание 19 сохраняется, что даёт последнюю строку таблицы; строго согласована с предложением 3 именно она, так как отбор по $N_b \geq 2$ есть отбор по $K_b \geq 1$ и смещает оценку вверх (замечание 1). Интервал и p_B — точные, схемы В; последний столбец (p_A , гамма-пивот схемы А) приведён для сравнения со старой практикой.

Table 6. Robustness to lower truncation. A base is retained if at least *two* events survive the truncation ($N_b \geq 2$); at $n > 10^4$ base 19 no longer meets this criterion, whence $B = 14$. The criterion matters: under the weaker requirement $N_b \geq 1$ base 19 is retained, giving the last row; only that row is strictly consistent with Proposition 3, since selecting on $N_b \geq 2$ means selecting on $K_b \geq 1$ and biases the estimate upwards (Remark 1). The interval and p_B are exact, scheme В; the last column (p_A , the scheme А Gamma pivot) is given for comparison with the old practice.

усечение	B	M	$(M - 1)/S$	$(M - B)/S$	95% ДИ, схема В	p_B	p_A
нет	15	218	1,9648	1,8381	[1,594; 2,109]	0,672	0,142
$n > 10$	15	192	2,0192	1,8712	[1,606; 2,168]	0,531	0,080
$n > 10^2$	15	156	2,0116	1,8299	[1,540; 2,158]	0,771	0,124
$n > 10^3$	15	125	2,0551	1,8231	[1,498; 2,197]	0,832	0,106
$n > 10^4$	14	89	2,0990	1,7889	[1,407; 2,242]	1,000	0,116
$n > 10^4, N_b \geq 1$	15	90	2,0848	1,7569	[1,382; 2,202]	0,966	0,128

Статус данных. Ограничение основания 2 пятьюдесятью дважды проверенными показателями переводит оценку схемы В с 1,838 на 1,834 (схема А: с $\tilde{\kappa} = 1,965$, $p = 0,142$ на $\tilde{\kappa} = 1,961$, $p = 0,151$). Исключение всех индексов $n > 10^6$, где статус элементов — PRP, даёт $M = 182$ и $(M - B)/S = 1,800$ ($\tilde{\kappa} = 1,951$). В наихудшем сценарии, когда последний известный PRP какого-либо основания оказывается составным, наибольший сдвиг даёт $b = 17$: $(M - B)/S = 1,848$ ($\tilde{\kappa} = 1,977$). Все варианты лежат внутри как интервала (21), так и интервала (20), поэтому возможные псевдопростые на вывод не влияют.

6 Статистическая мощность

Согласно (13) мощность против истинной константы $\kappa = re^\gamma$ на уровне α доступна в замкнутой форме (таблица 7). Конвенцию необходимо оговаривать: всюду в этой работе критерий *двусторонний*, с конвенцией удвоенного минимального хвоста, $\alpha = 0,05$. Односторонний вариант того же критерия даёт заметно другие числа, и они приведены в правой части таблицы для сопоставимости с работами, где конвенция не указана.

При мощности 80% одна последовательность Мерсенна обнаруживает только отклонения в 45,5% и более; объединение пятнадцати оснований снижает этот порог до 21,3% (односторонний вариант — до 18,7%). Достижение мощности 80% против отклонения в 10% требует экспозиции $S \approx 470$, то есть $K \approx 837$ условных событий ($M \approx 852$) при $\kappa = e^\gamma$ (при истинной константе, на 10% большей, событий будет ≈ 921); против 5% — $S \approx 1823$ и $K \approx 3246$. Функция мощности дискретного критерия немонотонна по S (пилообразна), поэтому приведены значения, начиная с которых мощность уже не опускается ниже 80% (найжены сплошным просмотром по S с шагом 0,01).

Эти рубежи вычислительно недостижимы, и стоит сказать насколько. Поскольку K растёт логарифмически по фронту поиска, удвоение фронтов по всем пятнадцати основаниям добавляет к экспозиции $\ln 2 \sum_b 1/\ln b = 5,41$, то есть в среднем $e^\gamma \cdot 5,41 = 9,64$ условного события. Чтобы довести экспозицию с 110,4 до 470, нужно $(470 - 110,4)/5,41 \approx 66,4$ удвое-




Рис. 2. Объединённая оценка при нижнем усечении: $(M-1)/S$ (схема A), $(M-B)/S$ (схема B) и $K/S(c)$ при члене второго порядка $c = \ln 2$ (§9). Восходящий тренд схемы A при переходе к схеме B исчезает; остаточное убывание схемы B исчезает при учёте члена второго порядка.

Figure 2. The pooled estimate under lower truncation: $(M-1)/S$ (scheme A), $(M-B)/S$ (scheme B) and $K/S(c)$ with the second-order term $c = \ln 2$ (§9). The upward trend of scheme A disappears under scheme B; the residual decline of scheme B disappears once the second-order term is included.

ния, то есть рост фронтов примерно в $2^{66,4} \approx 10^{20}$ раз; для чувствительности в 5% — около 316 удвоений, то есть множитель порядка 10^{95} . Речь идёт не о десятилетиях, а о величинах, лежащих вне досягаемости любых мыслимых вычислений. Обе кривые мощности как функции истинного отклонения показаны на рис. 3.

Отсюда правило чтения для этой литературы. Сообщение о том, что данные согласуются с ЛПВ с точностью до нескольких процентов, не есть свидетельство в пользу ЛПВ на уровне нескольких процентов; оно совместимо с константой, ошибочной в полтора раза. Объединённый анализ устанавливает, однако, настоящую границу: универсальная константа, если она существует, лежит примерно в $[1,59; 2,11]$ в модели постоянной интенсивности и в $[1,47; 1,98]$ с откалиброванным членом второго порядка при $n > 10$ (§9); ни одно основание от неё различимо не отклоняется.

7 Та же ошибка в ином обличье

Счётная функция Мерсенна провоцирует родственную ошибку, которую мы приводим как разобранный пример. Регрессия $\pi_2(t)$ на t в точках событий по 50 дважды проверенным показателям (нумерация $0, \dots, N-1$: наименьший показатель есть начало отсчёта, а не событие) даёт наклон 2,6391 и свободный член $-2,9627$ при стандартной ошибке МНК 0,4469, на вид значимый и наводящий на мысль о вторичном члене в (2). Ничего подобного.

Складываются два дефекта. Остатки кумулятивного счёта сильно автокоррелированы, здесь $\rho_1 = 0,825$; ковариационная оценка Ньюи — Уэста с восемью лагами увеличивает стандартную ошибку до 0,7315. Существеннее то, что регрессия использует только точки событий и тем самым отбрасывает пустой интервал между последним показателем и фронтом поиска. Корректная нулевая модель удерживает интервал $[t_0, T]$ фиксированным, где $T = \ln X_{\text{ver}}$, и обуславливается ровно $N-1 = 49$ событиями строго правее t_0 , что по

Таблица 7. Мощность на уровне $\alpha = 0,05$ для отвержения $\kappa = e^\gamma$, когда истинная константа превышает его в указанное число раз. Экспозиции: $S_2 = 26,02$ ($K = 50$) для одного основания 2 и $S = 110,44$ ($K = 203$) для объединения.

Table 7. Power at level $\alpha = 0.05$ for rejecting $\kappa = e^\gamma$ when the true constant exceeds it by the stated factor. Exposures: $S_2 = 26.02$ ($K = 50$) for base 2 alone and $S = 110.44$ ($K = 203$) for the pooled sample.

κ/e^γ	двусторонний		односторонний	
	только Мерсенн	объединение	только Мерсенн	объединение
1,05	0,060	0,099	0,082	0,165
1,10	0,099	0,266	0,147	0,386
1,15	0,164	0,514	0,235	0,644
1,20	0,253	0,752	0,343	0,844
1,30	0,479	0,972	0,581	0,988
1,50	0,861	1,000	0,910	1,000

свойству порядковых статистик пуассоновского процесса при заданном числе событий (ср. доказательство предложения 2(b)) означает 49 независимых равномерных точек на $(t_0, T]$. По 60 000 таким реализациям свободный член имеет медиану $-1,529$ и 5–95% диапазон $[-5,99; 2,20]$, что даёт двусторонний $p = 0,570$ для наблюждённого значения. Вторичный член есть артефакт обусловливания.

7.1 Три следствия одного и того же обусловливания

(i) **Бутстрэп не спасает.** Естественная реакция на подозрительно малую стандартную ошибку МНК — бутстрэп по точкам событий. На данных основания 2 бутстрэп по 20 000 ресемплам даёт медиану $-2,948$, стандартное отклонение 0,385 и 95% интервал $[-3,809; -2,300]$, целиком лежащий ниже нуля; доля отрицательных значений равна 100%. Это не подтверждение, а повторение той же ошибки: ресемплинг наблюждённых точек воспроизводит изменчивость внутри реализованной конфигурации и не может восстановить изменчивость самого процесса, породившего эту конфигурацию. Корректное нулевое распределение имеет стандартное отклонение 2,499 (в 5,6 раза больше стандартной ошибки МНК 0,447), то есть в 6,5 раза шире бутстрэпного *по стандартному отклонению* (по ширине 95%-интервала — также в 6,5 раза).

(ii) **Мнимая неододисперсия.** Сравнение наблюдённого $\max_i |r_i| = 6,347$, где $r_i = i - \hat{\lambda}(t_i - t_0)$, с симуляцией *необусловленного* пуассоновского процесса наводит на вывод, что счётная функция «глаже пуассоновской». Против корректного нулевого распределения — с обусловливанием на $N - 1$ событий и оценкой λ по последнему из них — медиана равна 5,117, а двусторонний уровень значимости составляет 0,529. Наблюдение совершенно рядовое.

(iii) **«Серединный дефицит».** Оценивание λ по последнему событию обращает остаток r в нуль на обоих концах ($r(t_0) = r(t_N) = 0$ при правильной нумерации), превращая его траекторию в аналог броуновского моста, для которого отрицательная экскурсия в середине диапазона возникает сама собой. Наблюждённая средняя экскурсия на средней половине диапазона равна $-3,13$ при медиане симуляций $-0,012$ и $p = 0,272$; доля реализаций с отрицательной средней экскурсией составляет 0,502, то есть систематического дефицита нет. Сама траектория остаточного процесса вместе с полосой симуляций приведена на рис. 4.




Рис. 3. Мощность двустороннего отвержения $\kappa = e^\gamma$ на уровне $\alpha = 0,05$. Горизонтальная линия отмечает мощность 80%.

Figure 3. Power of the two-sided rejection of $\kappa = e^\gamma$ at level $\alpha = 0.05$. The horizontal line marks 80% power.

7.2 Основание 2 на известном фронте

Основание 2 — одно из двух оснований основного набора с опубликованным фронтом (второе — $b = 10$, §4.5); для него возможен анализ по схеме В с использованием полной экспозиции, а не только условной. С $T = \ln X_{\text{ver}}$ получаем $\hat{\lambda} = N/(T - t_0) = 2,7960$ против $e^\gamma/\ln 2 = 2,5695$, то есть $\hat{\kappa}_2 = 1,9381$ при точном 95% интервале Гарвуда $[1,434; 2,562]$ и пуассоновском $p = 0,593$ (удвоенный хвост; при mid- p -конвенции 0,545 — конвенцию здесь необходимо оговаривать, поскольку различие ощутимо). Условная оценка *того же среза данных* — те же 50 дважды проверенных показателей — даёт 1,9046; различие невелико, поскольку последний показатель этого среза 77 232 917 случайно оказался очень близко к фронту 81 648 221. (Для сравнения, условная оценка по всем 52 известным показателям, приведённая в таблице 5, равна 1,9215; сопоставлять её с $\hat{\kappa}_2$ нельзя — это другая выборка.) Это совпадение одной реализации, а не свойство метода: поправка §4.3 относится к среднему по положению последнего события относительно фронта.

Отметим попутно, что описанный здесь режим — ровно тот, к которому мы призываем перейти для всех оснований: при известном W_b условное обусловливание на D_b становится ненужным, и точность растёт на те самые 3,7% из §4.2.

7.3 Знак свободного члена ничего не доказывает

В предыдущей редакции здесь приводился «независимый довод»: будто теоретический вторичный член, $(e^\gamma/\ln 2)\mathfrak{M} = +0,672$ с постоянной Мейсселя — Мертенса $\mathfrak{M} = 0,26150\dots$, имеет знак, противоположный наблюдаемому $-2,963$. Этот довод неверен, и мы его отзываем: в нём учтена лишь одна из двух теорем Мертенса. Суммирование (24) по простым $p \leq x$ с $\sum_{p \leq x} \ln p/p = \ln x + E + o(1)$, $E = -1,3326\dots$, и $\sum_{p \leq x} 1/p = \ln \ln x + \mathfrak{M} + o(1)$ даёт

$$\pi_2(x) \approx \frac{e^\gamma}{\ln 2} (\ln x + c_2 \ln \ln x) + C_0, \quad C_0 = \frac{e^\gamma}{\ln 2} (E + c_2 \mathfrak{M}).$$

При откалиброванном $c_2 = 0,96$ (§9) получаем $C_0 = -2,78$; прямое суммирование по $p \leq 10^8$ даёт то же значение. С учётом нумерации событий от нуля (-1) и линейной аппроксимации члена $c_2 \ln \ln x$ по тем же 50 точкам $(+1,80)$ ожидаемый свободный член близок к $-1,98$




Рис. 4. Остаточный процесс $r(t)$ для основания $b = 2$ вместе с полосой 5–95% квантилей симуляций и медианой симуляций. Траектория лежит внутри полосы.

Figure 4. The residual process $r(t)$ for base $b = 2$ together with the 5–95% quantile band of the simulations and the simulation median. The trajectory stays inside the band.

— того же знака, что и наблюдаемый (тег [S22]). Величина C_0 к тому же определяется малыми p , где эвристика неприменима. Поэтому о структуре свидетельствует не знак C_1 , а лишь корректное нулевое распределение (§7, $p = 0,57$): свободный член C_1 — параметр аппроксимации, и содержательной трактовки не требует.

8 Структурные поправки

Рассмотрим более общую параметризацию интенсивности $\lambda_b = (\kappa / \ln b) C_b$ и четыре модели множителя:

$$\text{I: } C_b = 1;$$

$$\text{II: } C_b = \prod_{p|b-1, p \neq 2} \left(\frac{p}{p-1}\right)^\alpha \prod_{p|b+1, p \neq 2} \left(\frac{p}{p-2}\right)^\beta;$$

$$\text{III: } C_b = \prod_{p|b^2-1} \left(\frac{p}{p-1}\right)^\eta;$$

$$\text{IV: } C_b = \exp(\theta_1 \omega(b-1) + \theta_2 \omega(b+1) + \theta_3 \ln b).$$

Модели занумерованы римскими цифрами, чтобы не смешивать их со схемами наблюдения А и В; показатель в модели III обозначен через η , чтобы не смешивать его с постоянной Эйлера и с расстоянием до фронта δ_b . Правдоподобие здесь — *условное пуассоновское* предположения 3, $\ell_B = \sum_b [K_b \ln \mu_b - \mu_b - \ln K_b!]$ с $\mu_b = \kappa C_b D_b / \ln b$; в предыдущей редакции использовалось правдоподобие (8) схемы А, что несовместимо с §4. Результаты в таблице 8. Ни одна параметризация не даёт значимого улучшения; байесовские факторы по ВИС при $n = K = 203$ подавляюще поддерживают базовую модель.

Замечание 10 (Чувствительность ВИС). Выбор эффективного объёма выборки для ВИС неочевиден: правдоподобие имеет $B = 15$ независимых слагаемых, но информация растёт как $K = 203$. При $n = 15$ апостериорные вероятности составляют 0,661 / 0,080 / 0,229 / 0,030, при $n = 203$ — 0,906 / 0,008 / 0,085 / 0,001. Вывод в пользу модели I при обо-

Таблица 8. Сравнение структурных моделей под условным пуассоновским правдоподобием предложения 3 (полная форма, с $-\ln K_b!$); LR и p даны относительно модели I; BIC вычислен при $n = K = 203$.

Table 8. Comparison of structural models under the conditional Poisson likelihood of Proposition 3 (full form, including $-\ln K_b!$); LR and p are relative to model I; BIC is computed with $n = K = 203$.

Модель	параметров	$\ln L$	LR	p	AIC	BIC	$P(\text{модель} \mid \text{данные})$
I	1	-35,753	—	—	73,51	76,82	0,906
II	3	-35,162	1,18	0,554	76,32	86,26	0,008
III	2	-35,458	0,59	0,443	74,92	81,54	0,085
IV	4	-34,797	1,91	0,591	77,59	90,85	0,001

их выборах, но при $n = 203$ он существенно сильнее. Мы отчитываемся по $n = K$ как соответствующему числу независимых условных событий.

Фиксированная арифметическая поправка. Отдельно рассмотрена модель с *фиксированным* (не оцениваемым) множителем $C_b^{\text{fix}} = \prod_{p|b-1, p \neq 2} \frac{p}{p-1} \prod_{p|b+1, p \neq 2} \frac{p}{p-2}$, среднее значение которого по пятнадцати основаниям равно 2,462. Она даёт $\hat{\kappa} = 0,759$. Подчеркнём, что сравнивать это значение с e^γ бессмысленно: в перепараметризованной модели κ имеет иной масштаб, и такой «критерий согласия» проверял бы лишь равенство среднего C_b единице. Поскольку модели I и C^{fix} ненестированы и имеют одинаковое число свободных параметров, корректное сравнение — прямо по правдоподобию: $\ln L = -51,53$ против $-35,75$, разность $-15,78$. Фиксированная поправка решительно отвергается.

Логарифмические поправки. Здесь необходимо исправление по существу. Модель $\lambda_b(t) = (\kappa/\ln b)(1 + c_1/t + c_2/t^2)$, использованная в предыдущей редакции, *не является допустимой интенсивностью*: при полученных там оценках $\hat{c}_1 = +0,108$, $\hat{c}_2 = -0,826$ множитель обращается в нуль при $t = 0,8564$ и отрицателен левее, то есть при $n < 2,355$; в частности, при $t_0 = \ln 2$ он равен $-0,5634$. Основания с $n_{\min} = 2$ ($b = 2, 6, 10, 12, 18$) интегрируют интенсивность по области, где она отрицательна, и мера $\int \lambda dt$ на этом участке отрицательна. То, что правдоподобие всё же вычислялось, — случайность: наименьший индекс, являющийся событием, равен 3, то есть $t = 1,0986 > 0,8564$, так что под логарифм отрицательные значения не попали.

Правильная параметризация того же семейства —

$$\lambda_b(t) = \frac{\kappa}{\ln b} \exp\left(\frac{c_1}{t} + \frac{c_2}{t^2}\right), \quad (23)$$

положительная тождественно и вкладывающаяся в нулевую модель при $c_1 = c_2 = 0$. Она оценивается условным правдоподобием точечного процесса (14): сумма $\sum \ln \lambda(t_i)$ берётся по событиям *без последнего*, а интеграл $\int \lambda$ — от t_0 до последнего события $t_0 + D_b$, а не до неизвестного фронта (замечание 8; правдоподобие одного лишь счёта здесь недопустимо: оно отбрасывает положения событий, которыми только и определяются c_1, c_2). Результат: $\hat{\kappa} = 1,748$, $\hat{c}_1 = 0,75$, $\hat{c}_2 = -1,44$; отношение правдоподобий против $c_1 = c_2 = 0$ равно 2,03 при двух степенях свободы, $p = 0,36$ (тег [S17]). Значимого улучшения нет. Оценка $\hat{c}_1$ здесь сильно коррелирована с $\hat{c}_2$ и сама по себе не информативна: однопараметрическая модель (25) на тех же данных даёт $\hat{c} = -0,40$ (§9).

9 Член второго порядка самой эвристики

До сих пор проверялась модель постоянной интенсивности (3). Но сама эвристика ЛПВ предсказывает интенсивность, *не* постоянную при конечных n , и это меняет смысл сравнения $\hat{\kappa}$ с e^γ .

Вывод. Пусть p простое, $p \nmid b-1$, и q — простой делитель $R_b(p)$. Тогда b имеет порядок p по модулю q , откуда $q \equiv 1 \pmod{p}$, а так как $R_b(p)$ нечётно, $q \equiv 1 \pmod{2p}$. Значит, у $R_b(p)$ нет простых делителей меньше $2p+1$, и по теореме Мертенса вероятность простоты увеличивается в $\prod_{q < 2p} (1 - 1/q)^{-1} \approx e^\gamma \ln(2p)$ раз по сравнению со случайным числом той же величины. Это и есть вывод [1, 3]:

$$\Pr(R_b(p) \text{ простое}) \approx \frac{e^\gamma \ln(a_b p)}{p \ln b}. \quad (24)$$

Уточнение Вагстаффа для $b = 2$ учитывает, что $q \equiv \pm 1 \pmod{8}$, и даёт $a = 2$ при $p \equiv 3 \pmod{4}$ и $a = 6$ при $p \equiv 1 \pmod{4}$. Умножая (24) на плотность простых $1/\ln n$ и переходя к $t = \ln n$, получаем

$$\lambda_b(t) = \frac{\kappa}{\ln b} \left(1 + \frac{c_b}{t}\right), \quad c_b = \langle \ln a_b \rangle, \quad \kappa = e^\gamma, \quad (25)$$

а для счётной функции — $\pi_b(x) \approx (e^\gamma / \ln b) (\ln x + c_b \ln \ln x)$. Асимптотика (2) от этого не меняется, но при $t \approx 10$ –18 поправка c_b/t составляет несколько процентов — столько же, сколько обсуждаемые в работе эффекты.

Калибровка c_b . Приём Вагстаффа — заменить a_b наименьшим допустимым кандидатом в делители — грубо, и мы оцениваем c_b по фактической делимости $R_b(p)$ в рамках той же эвристики Мертенса. Для случайного числа N по Мертенсу

$$\Pr(N \text{ простое} \mid \text{нет простых делителей} < Y) \approx e^\gamma \ln Y / \ln N.$$

Поэтому $\Pr(R_b(p) \text{ простое}) \approx F_b(p, Y) e^\gamma \ln Y / (p \ln b)$, где $F_b(p, Y)$ — индикатор того, что у $R_b(p)$ нет простых делителей меньше Y . Сравнение с (24) даёт

$$c_b(Y) = \langle F_b(p, Y) \ln Y - \ln p \rangle_p. \quad (26)$$

Индикатор F_b вычисляется *точно*. При $p > b$ простой делитель $R_b(p)$ меньше Y существует тогда и только тогда, когда $b^p \equiv 1 \pmod{q}$ для некоторого $q = 2kp+1 < Y$, простого или нет. Действительно, простые делители такого q , не делящие $b-1$, сравнимы с 1 по модулю p и делят $R_b(p)$; часть q , составленная из делителей $b-1$, по лемме о подъёме показателя делит $b-1 < p$ и сравнима с 1 $\pmod{p}$, поэтому равна 1. Для $31\,598$ простых $p \in [2 \cdot 10^4, 4 \cdot 10^5]$ и $Y = 100p, 1000p, 3000p$ получаем значения c_b , устойчивые по Y в пределах стандартной ошибки 0,05 (скрипт `cb_empirical.py`, тег [S19]; значения при разных Y получены на одном и том же наборе p и потому коррелированы). При $Y = 1000p$ они лежат от 0,43 ($b = 12$) до 1,11 ($b = 20$), в среднем 0,67. У десяти оснований из пятнадцати оценка c_b *ниже* $\ln 2 \approx 0,693$ — значения, которое даёт наивное применение теоремы Мертенса к одному условию $q \equiv 1 \pmod{2p}$; следовательно, $\ln 2$ не является нижней границей эффективного c_b . Приём Вагстаффа (усреднение $\ln a_b$ с учётом того, что b — квадратичный вычет по модулю q) даёт систематически большие значения, от 1,23 до 1,74 (тег [S14]); даже для $b = 2$ он даёт $1,242 = \frac{1}{2}(\ln 2 + \ln 6)$ против $0,96 \pm 0,05$. К тому же этот приём неоднозначен: кандидаты, делящиеся на простой делитель b , отбрасываются, а делящиеся на прочие малые простые — нет; так, при $b = 18$ условие вычета совпадает с условием для $b = 2$, но $c_{18} = 1,646$ против $c_2 = 1,242$. Ниже основной считается калибровка c_b (26), а вариант Вагстаффа приводится лишь для сравнения.

Таблица 9. Точный условный вывод при разных значениях члена второго порядка (25): оценка $\hat{\kappa} = K/S(c)$ по (27) и точное двустороннее p против $\kappa = e^\gamma$. «Калибр.» — откалиброванные c_b (тег [S19]), «В» — c_b по приёму Вагстаффа. Усечение, как в таблице 6. Теги [S16], [S20].

Table 9. Exact conditional inference for several values of the second-order term (25): the estimate $\hat{\kappa} = K/S(c)$ from (27) and the exact two-sided p against $\kappa = e^\gamma$. “Meas.” are the measured c_b (tag [S19]); “W” is Wagstaff’s device. Truncation as in Table 6. Tags [S16], [S20].

усечение	K	$\hat{\kappa}$				p		
		$c=0$	$c=\ln 2$	калибр.	В	$c=0$	калибр.	В
нет	203	1,838	1,625	1,620	1,453	0,672	0,185	0,003
$n > 10$	177	1,871	1,712	1,710	1,578	0,531	0,618	0,111
$n > 10^2$	141	1,830	1,704	1,703	1,595	0,771	0,632	0,201
$n > 10^3$	110	1,823	1,715	1,713	1,620	0,832	0,729	0,344
$n > 10^4$	75	1,789	1,695	1,690	1,612	1,000	0,702	0,421

Точный условный вывод при заданном c . По замечанию 8 условно на D_b внутренние события образуют пуассоновский процесс интенсивности (25) на $(t_0, t_0 + D_b)$. Поскольку $\int_{t_0}^{t_0+D_b} (1 + c/t) dt = D_b + c \ln((t_0 + D_b)/t_0)$, предложение 3 переносится дословно:

$$K \mid (D_b)_b \sim \text{Poisson}(\kappa S(c)), \quad S(c) = \sum_b \frac{D_b + c_b \ln((t_0 + D_b)/t_0)}{\ln b}, \quad (27)$$

оценка есть $K/S(c)$, и интервал Гарвуда (15) применим с заменой S на $S(c)$.

Результаты. Таблица 9 даёт четыре вывода.

(i) *Внутри последовательностей член второго порядка почти не определяется.* Профильная ОМП общего c по условному правдоподобию (14) на всех данных равна $-0,40$ с 95% интервалом $[-0,69; 0,44]$ (левый конец — граница допустимости $1 + c/t_0 > 0$). Этот интервал исключает $c = \ln 2$ (критерий отношения правдоподобий, $p = 0,017$), но результат определяется индексами $n \leq 10$, см. (iii). Уже при $n > 10$ интервал расширяется до $[-1,68; 2,48]$, а при $n > 10^3$ — до $[-5,3; 20]$ (тег [S16]): сдвиг c компенсируется сдвигом κ . Поэтому c_b нужно брать извне — из теории или, как здесь, из калибровки (26).

(ii) *Вывод о κ от него зависит сильнее, чем от схемы наблюдения.* При $n > 10$ переход от $c = 0$ к откалиброванным c_b снижает оценку на 6–9% (на 8,6% при $n > 10$ и на 5,5% при $n > 10^4$), на полной выборке — на 11,9%. Это сравнимо с ценой выбора схемы наблюдения (6,9%, §4.3) и больше остаточного разрыва $(M - B)/S$ с e^γ (3,2% на полной выборке, 5,1% при $n > 10$). Сравнение оценки модели постоянной интенсивности с e^γ — не проверка ЛПВ при конечных n : сама ЛПВ предсказывает, что такая оценка выше e^γ .

(iii) *ЛПВ со своим откалиброванным членом второго порядка согласуется с данными.* При откалиброванных c_b и $n > 10$ точное p лежит в пределах 0,62–0,73, на полной выборке оно равно 0,185. При завышенных значениях Вагстаффа получается 0,11–0,42 при $n > 10$ и 0,003 на полной выборке. Полная выборка включает $n \leq 10$, где разложение (25) бессмысленно: при $n = 2$ множитель $1 + c/t$ равен 2 уже при $c = \ln 2$, а сами индексы 2, 3, 5, 7 продиктованы арифметикой малых чисел. Поэтому основным мы считаем вывод при $n > 10$.

(iv) *Тренд при усечении объясняется членом второго порядка.* При $c = 0$ оценка монотонно убывает с ростом нижней границы, с 1,871 при $n > 10$ до 1,789 при $n > 10^4$ (–4,4%). Именно этого ожидают от (25): среднее $1/t$ по экспозиции падает с ростом t_0 . При откалиброванных c_b те же четыре оценки лежат в пределах 1,690–1,713 (размах 1,4%). Подвыборки вложены, поэтому это наблюдение иллюстративно, а не является отдельным критерием.

Следствие для фольклора. Член $c_b \ln \ln x$ в счётной функции объясняет и наблюдение, с которого начиналась работа: нормированные частоты лежат ниже $e^{-\gamma}$ и медленно сходятся к нему снизу. При (25) наклон t_k по k равен $e^{-\gamma} \ln b / (1 + c_b \langle 1/t \rangle)$, так что нормированная частота занижена в $1 + c_b \langle 1/t \rangle$ раз, где $\langle 1/t \rangle = \ln(t_N/t_0)/(t_N - t_0)$. При фиксированном начале отсчёта это убывает как $\ln t/t$, и частота стремится к $e^{-\gamma}$ как $\ln \ln n / \ln n$ — ещё медленнее, чем $1/\ln n$ (для $b = 2$: $\langle 1/t \rangle = 0,183$ против $1/t_N = 0,053$). В §3 показано, что подгонка к правому концу эффекта не создаёт; здесь видно, откуда он берётся: из самой эвристики, а не из $\kappa \neq e^\gamma$.

Итог. Вопрос «совместимы ли данные с ЛПВ» распадается на два: о главном члене, $\kappa = e^\gamma$, и о члене второго порядка, c_b . Второй почти не определяется положениями находок, но его можно откалибровать по фактической делимости $R_b(p)$ (26). С откалиброванными c_b и при $n > 10$ оценка равна $\hat{\kappa} \approx 1,69\text{--}1,71$ (на 4–5% ниже e^γ) с точным $p = 0,62\text{--}0,73$ и не зависит от нижней границы усечения: ЛПВ не отвергается. Теоретическое объяснение откалиброванных значений c_b — в частности, почему приём Вагстаффа их завышает, — открытая задача теории чисел.

10 Заключение

1. Употребительные оценки нормированной частоты обобщённых репьюнитных простых не смещены схемой подгонки: и концевая форма, и наклон МНК несмещены точно при схеме А и с экспоненциально малой по μ погрешностью при схеме В (не более 0,73% для концевой формы и 2,3% для МНК при $\mu \geq 7$). Смещена лишь обратная величина, и это следствие выпуклости. Расхожее объяснение «медленной сходимости снизу» через цензурирование несостоятельно при обеих схемах; настоящее её объяснение — член второго порядка самой эвристики (п. 7).
2. Настоящий дефект употребительной практики — в том, что различные формы оценки расходятся до 29,5%, а точечные значения публикуются без доверительных интервалов при том, что стандартные ошибки МНК в этой задаче занижены: поправка Ньюи — Уэста увеличивает их в 1,6 раза, а корректное условное нулевое распределение шире номинального в 5,6 раза (§7). Классификация оснований на «удачливые» и «неудачливые» переворачивается от смены формы оценки на неизменных данных; у двух оснований из пятнадцати переворачивается даже знак отклонения от $e^{-\gamma}$.
3. Главный результат — точное условное правдоподобие схемы В. Незаписанные фронты суть мешающие параметры Неймана — Скотта, и профильная оценка M/S несостоятельна. Положение последнего события D_b достаточно для фронта, и условно на нём величина $N_b - 1$ распределена как $\text{Poisson}(\lambda_b D_b)$ при любом не зависящем от находок правиле выбора фронта. Тот же результат даёт интегрирование по фронту с инвариантной мерой dW_b . Отсюда $M - B \mid D \sim \text{Poisson}(\kappa S)$: правильным пивотом при фиксированном фронте является пуассоновский, а не $\text{Gamma}(M, 1)$, правильной объединённой оценкой — $(M - B)/S$, а не $(M - 1)/S$, и доверительные интервалы получаются в замкнутой форме без симуляционной инверсии. Условное правдоподобие стоит одного события на каждое основание, а не одного события в сумме, — точный аналог потери одной степени свободы на группу в примере Неймана — Скотта. Различение таких схем восходит к теории надёжности; новым здесь является случай недокументированного фронта, когда экспозицию нельзя взять из протокола и её приходится восстанавливать из находок (замечание 5).
4. Это даёт $\hat{\kappa} = 1,838$ при точном 95% интервале $[1,594; 2,109]$ и $p = 0,672$ против e^γ . Сообщавшееся десятипроцентное превышение над ЛПВ, включая наше собственное в

более ранней редакции этой работы, создаётся в основном схемой наблюдения: переход к схеме В сокращает его до 3,2%, а остаток объясняется членом второго порядка самой эвристики (п. 7). Старый гамма-пикот при схеме В отвергает верную гипотезу в 11–17% случаев. Переход к схеме В устраняет восходящий тренд объединённой оценки при усечении по $n_{\min}$; остающееся убывание ($1,871 \rightarrow 1,789$ при $n > 10$) снимается членом второго порядка.

5. Помимо пуассоновской модели и сплошного покрытия поиска, вывод о схеме наблюдения держится на допущении (A1): фронт выбирался без оглядки на находки. По самим находкам его проверить нельзя: $(M-1)/S$ и $(M-B)/S$ суть функции одних и тех же статистик и различаются на 6,9%. Без (A1) строго сохраняется лишь верхняя граница M/S (тождество Вальда); правило «остановиться после долгой полосы без находок» смещает вверх и $(M-B)/S$, так что двусторонней вилки нет. Четыре документированных фронта позволяют проверить (A1) по данным и указывают, если на что-то, на остановку вблизи находки, а не «после засухи»; при таком отклонении верная оценка лежит между $(M-B)/S$ и M/S , и обе границы согласуются с ЛПВ; гибридная оценка с известными фронтами $b=2$ и $b=10$ равна 1,853. Практическое следствие — необходимость публиковать фронты поиска L_b (а вместе с ними и протоколы полноты просеивания), как это делает GIMPS для $b=2$. Пример основания 5, где найденные в 2024 г. вероятно простые лежат за непройденным промежутком, показывает, что это не формальность.
6. Гипотеза ЛПВ имеющимися данными не отвергается, а базозависимые поправки не требуются. Но и то и другое — утверждения о низкой чувствительности критериев: условный мультиномиальный критерий однородности различает лишь разброс κ_b с коэффициентом вариации порядка 0,37, а объединённый критерий — отклонения константы не менее 21,3% (двусторонний вариант). Достижение чувствительности в 10% потребовало бы роста фронтов поиска примерно в 10^{20} раз.
7. Сама эвристика ЛПВ предсказывает при конечных n интенсивность $(\kappa/\ln b)(1+c_b/t)$, и сравнение оценки модели постоянной интенсивности с e^γ не является проверкой ЛПВ. Положения находок c_b почти не определяют, но его можно откалибровать по фактической делимости $R_b(p)$: $c_b = 0,43\text{--}1,11$, в среднем 0,67, тогда как приём Вагстаффа даёт вдвое большие значения. С откалиброванным c_b при $n > 10$ оценка равна 1,69–1,71 при любом уровне усечения, ЛПВ не отвергается ($p = 0,62\text{--}0,73$), а «медленная сходимость снизу» получает объяснение. Теоретическое объяснение откалиброванных c_b — открытая задача теории чисел.

А Верификация исходных данных

Все двадцать последовательностей (пятнадцать основного набора и пять из проверки границы отбора) сверены с записями OEIS 27 августа 2026 г. Поскольку в объединённый анализ входят только тройки $(N_b, n_{\min}, n_{\max})$, в таблице 10 для основного набора приведены число известных простых, из которого N_b получается вычитанием единицы, и оба крайних индекса; полные списки индексов содержатся в скрипте `analysis_v2.py`.

Отдельно предупредим читателя, сверяющего данные по вторичным источникам: сводные таблицы (страница «Repunit primes» в OEIS Wiki, статья «List of repunit primes» в Википедии) обновляются с запаздыванием и на момент написания работы отставали от самих записей OEIS на один член у оснований $b = 14, 15, 17, 18, 20$. Авторитетным источником следует считать записи OEIS.

Таблица 10. Сверка с OEIS. Столбец «последнее пополнение» указывает происхождение наибольшего известного индекса; для $b = 2$ два последних показателя взяты у GIMPS.

Table 10. Cross-check against OEIS. The column “last addition” gives the provenance of the largest known index; for $b = 2$ the last two exponents are taken from GIMPS.

b	OEIS	простых	$n_{\min}$	$n_{\max}$	последнее пополнение
2	A000043	52	2	136 279 841	GIMPS, окт. 2024
3	A028491	23	3	8 530 117	P. Bourdelais
5	A004061	19	3	3 300 593	P. Bourdelais
6	A004062	17	2	3 360 347	P. Bourdelais
7	A004063	10	5	1 264 699	P. Bourdelais
10	A004023	11	2	8 177 207	Propper и Batalov, май 2021
11	A005808	13	17	1 868 983	P. Bourdelais
12	A004064	14	2	769 543	P. Bourdelais, дек. 2014
13	A016054	13	5	1 503 503	P. Bourdelais
14	A006032	11	3	1 724 417	P. Bourdelais, 13.07.2026
15	A006033	10	3	639 833	P. Bourdelais, 22.04.2019
17	A006034	12	3	1 990 523	P. Bourdelais, 03.08.2020
18	A133857	8	2	1 270 141	P. Bourdelais
19	A006035	11	19	209 359	P. Bourdelais, 27.08.2010
20	A127995	9	3	984 349	P. Bourdelais

Независимый пересчёт префиксов

Сверка с OEIS подтверждает, что перечисленные индексы дают простое, но не гарантирует *полноты*: пропущенный член сдвинул бы N_b , а с ним и обе объединённые оценки. Этот пробел мы закрыли прямым пересчётом. Для каждого из двадцати оснований $2 \leq b \leq 26$, не являющихся точными степенями, независимой реализацией² проверены *все* индексы $n < 10^4$ подряд, а не только перечисленные в OEIS. Каждый отрицательный вердикт пересчитан вторым, независимым бэкэндом (сплошной double-check, как в GIMPS), чтобы исключить потерянную находку.

Результат: 153 члена подтверждены, лишних нет, пропущенных нет, расхождений между бэкэндами нет — по всем двадцати основаниям. Покрытие по основаниям неравномерно (от одного члена при $b = 18$ до двадцати двух при $b = 2$): на основной набор $b \leq 20$ приходится 128 подтверждённых индексов из 233 известных. Выше 10^4 полный пересчёт вычислительно недоступен, и там мы по-прежнему опираемся на OEIS.

Отметим, что этот пересчёт не был формальностью: в первом прогоне независимая реализация объявила $R_{23}(3181)$ составным, разойдясь с A204940. Разбор показал ошибку в самой реализации — всплеск ошибки округления FFT на последней итерации, после последней периодической проверки, — а не в данных OEIS. После исправления расхождений не осталось. Мы приводим этот эпизод как иллюстрацию к тезису §2 о полноте покрытия: ложное «составное» невидимо без повторного счёта, и именно поэтому фронты и протоколы проверки должны публиковаться.

Доступность данных и кода

Все использованные последовательности приведены в таблице 1.

Данные. Скрипт `fetch_data.sh` загружает b-файлы OEIS для всех пятнадцати последовательностей основного набора, `fetch_extra.sh` — для пяти оснований $21 \leq b \leq 26$, исполь-

²Гибридный CPU/GPU поисковик: сегментное сито по малым делителям, trial factoring в арифметике Монтгомери, PRP через GMP и GWNUM/IBDWT. Исходный код и протокол прогонов — в том же репозитории, скрипты `verify_sequences.sh` и `compare_verify.py`.

зованных в проверке границы отбора (§2.2). Загруженные файлы включены в репозиторий, так что анализ воспроизводится без обращения к сети.

Анализ. Каждое число настоящей работы помечено тегом вида [S3], соответствующим разделу или таблице, в выводе одного из скриптов (`results_v2.txt` или `results_v3.txt`). Основной скрипт — `analysis_v2.py` (numpy, scipy, matplotlib). Объединённый анализ, все доверительные интервалы, критерий однородности, расчёты мощности и структурные модели зависят только от троек $(N_b, n_{\min}, n_{\max})$; полные списки индексов нужны лишь для столбца $\hat{G}_b^{\text{OLS}}$ таблицы 5, для §7, для усечения и для моделей с переменной интенсивностью. Скрипт читает их из b-файлов каталога `data/` (загрузчик общий с `analysis.py` версии 1). Генератор случайных чисел инициализирован фиксированным зерном (20260914), поэтому все величины Монте-Карло воспроизводятся побитово. Скрипт также строит все четыре рисунка (каталог `figs_v2/`, английские подписи — `figs_v2/en/`). Таблицу 3 (правила останковки, нарушающие (A1)) строит отдельный скрипт `stopping_rules.py` (тег [S13], зерно 20260924). Член второго порядка (§9), модель (23) и критерий однородности при $B = 20$ вычисляет `lpw_second_order.py` (теги [S14]–[S17], [S20]), калибровку c_b — `cb_empirical.py` (тег [S19], детерминирован, около десяти минут счёта), проверку (A1) по документированным фронтам и гибридную оценку — `frontiers.py` (тег [S18], источники фронтов перечислены в самом скрипте). Вывод этих скриптов сохранён в `results_v3.txt`. Скрипты `check_numbers_v3.py` и `check_all_numbers_v3.py` сверяют с ним все десятичные числа обеих версий статьи.

Независимый пересчёт последовательностей. `verify_sequences.sh` запускает поисковик по всем индексам $n < 10^4$ для каждого основания, `compare_verify.py` сверяет результат с b-файлами OEIS и возвращает ненулевой код при любом расхождении (приложение A).

Оговорка о величинах Монте-Карло. Основной результат (20), интервалы таблицы 5, таблица 6 и таблица 7 детерминированы: они получены точной инверсией пуассоновского распределения и от генератора случайных чисел не зависят. От симуляции зависят лишь таблицы 2, 4 и 3, точное p -значение критерия однородности и кривая его мощности, а также нулевые распределения §7; их точность указана на месте. Это отличие от предыдущей редакции существенно: там симуляционной была и сама основная оценка интервала.

Репозиторий: <https://github.com/Wilps93/repunit-hunt> — каталог `paper/`. Дерево файлов и порядок запуска описаны в `paper/README.md`.

Список источников

- [1] Wagstaff S. S., Jr. Divisors of Mersenne numbers // Mathematics of Computation. 1983. Vol. 40, № 161. P. 385–397. DOI: 10.1090/S0025-5718-1983-0679454-X.
- [2] Pomerance C. Recent developments in primality testing // The Mathematical Intelligencer. 1981. Vol. 3, № 3. P. 97–105. DOI: 10.1007/BF03022861.
- [3] Heuristics: deriving the Wagstaff Mersenne conjecture [Электронный ресурс] // The PrimePages: prime number research and records. URL: <https://t5k.org/mersenne/heuristic.html> (дата обращения: 27.08.2026).
- [4] Dubner H. Generalized repunit primes // Mathematics of Computation. 1993. Vol. 61, № 204. P. 927–930. DOI: 10.1090/S0025-5718-1993-1185243-9.
- [5] Bourdelais P. A generalized repunit conjecture [Электронный ресурс] // NMBRTHRY mailing list. 25 June 2009. URL: <https://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A2=NMBRTHRY;417ab0d6.0906> (дата обращения: 25.08.2026).
- [6] The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences [Электронный ресурс] / OEIS Foundation Inc. URL: <https://oeis.org> (дата обращения: 27.08.2026).

- [7] Wagstaff S. S., Jr. Two Mersenne prime conjectures [Электронный ресурс] // Journal of Integer Sequences. 2025. Vol. 28. Article 25.7.2. URL: <https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL28/Wagstaff/wag14.html> (дата обращения: 24.09.2026).
- [8] Dominguez J. Arithmetic bias in the distribution of Mersenne prime exponents and the divisor structure of $p - 1$ [Электронный ресурс] // arXiv. 2026. arXiv:2603.08994. URL: <https://arxiv.org/abs/2603.08994> (дата обращения: 27.08.2026).
- [9] Neyman J., Scott E. L. Consistent estimates based on partially consistent observations // Econometrica. 1948. Vol. 16, № 1. P. 1–32. DOI: 10.2307/1914288.
- [10] Andersen E. B. Asymptotic properties of conditional maximum-likelihood estimators // Journal of the Royal Statistical Society. Series B. 1970. Vol. 32, № 2. P. 283–301. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1970.tb00842.x.
- [11] Jha A. The Poisson tail conjecture for primes in short intervals [Электронный ресурс] // arXiv. 2026. arXiv:2605.23014. URL: <https://arxiv.org/abs/2605.23014> (дата обращения: 27.08.2026).
- [12] PrimeNet [Электронный ресурс] / Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS). Программное обеспечение Prime95/MPrime, версия 30.8. URL: <https://www.mersenne.org/> (дата обращения: 27.08.2026; отчёт *Milestones* считан 27.08.2026 04:30 UTC).
- [13] Epstein B. Truncated life tests in the exponential case // The Annals of Mathematical Statistics. 1954. Vol. 25, № 3. P. 555–564. DOI: 10.1214/aoms/1177728723.
- [14] Epstein B., Sobel M. Some theorems relevant to life testing from an exponential distribution // The Annals of Mathematical Statistics. 1954. Vol. 25, № 2. P. 373–381. DOI: 10.1214/aoms/1177728793.
- [15] Bartholomew D. J. The sampling distribution of an estimate arising in life testing // Technometrics. 1963. Vol. 5, № 3. P. 361–374. DOI: 10.1080/00401706.1963.10490104.
- [16] Sengupta S. N., Sinha B. K., Bagchi S. B. Estimation of mean life and reliability for exponential life distribution using time censored sample data // Statistics & Probability Letters. 2009. Vol. 79, № 7. P. 899–906. DOI: 10.1016/j.spl.2008.11.026.
- [17] Kivelä M., Porter M. A. Estimating interevent time distributions from finite observation periods in communication networks // Physical Review E. 2015. Vol. 92, № 5. Article 052813. DOI: 10.1103/PhysRevE.92.052813.
- [18] Strauss D., Sadler P. M. Classical confidence intervals and Bayesian probability estimates for ends of local taxon ranges // Mathematical Geology. 1989. Vol. 21, № 4. P. 411–427. DOI: 10.1007/BF00897326.
- [19] Marshall C. R. Confidence intervals on stratigraphic ranges // Paleobiology. 1990. Vol. 16, № 1. P. 1–10. DOI: 10.1017/S0094837300009672.
- [20] Solow A. R. Inferring extinction from sighting data // Ecology. 1993. Vol. 74, № 3. P. 962–964. DOI: 10.2307/1940821.
- [21] Robson D. S., Whitlock J. H. Estimation of a truncation point // Biometrika. 1964. Vol. 51, № 1–2. P. 33–39. DOI: 10.1093/biomet/51.1-2.33.
- [22] Liu Z., Bhandaram U., Garg N. Quantifying spatial under-reporting disparities in resident crowdsourcing // Nature Computational Science. 2024. Vol. 4, № 1. P. 57–65. DOI: 10.1038/s43588-023-00572-6.

- [23] Lancaster T. The incidental parameter problem since 1948 // *Journal of Econometrics*. 2000. Vol. 95, № 2. P. 391–413. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00044-5.
- [24] Kalbfleisch J. D., Sprott D. A. Application of likelihood methods to models involving large numbers of parameters (with discussion) // *Journal of the Royal Statistical Society. Series B*. 1970. Vol. 32, № 2. P. 175–208. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1970.tb00830.x.
- [25] Berger J. O., Liseo B., Wolpert R. L. Integrated likelihood methods for eliminating nuisance parameters // *Statistical Science*. 1999. Vol. 14, № 1. P. 1–28. DOI: 10.1214/ss/1009211804.
- [26] Lindsay B. G. Nuisance parameters, mixture models, and the efficiency of partial likelihood estimators // *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A*. 1980. Vol. 296, № 1427. P. 639–662. DOI: 10.1098/rsta.1980.0197.
- [27] Докучаев Т. С. repunit-hunt: поиск обобщённых репьюнитных простых и статистический анализ [Электронный ресурс] // GitHub. 2026. URL: <https://github.com/Wilps93/repunit-hunt> (дата обращения: 24.09.2026).
- [28] Garwood F. Fiducial limits for the Poisson distribution // *Biometrika*. 1936. Vol. 28, № 3–4. P. 437–442. DOI: 10.1093/biomet/28.3-4.437.

References

1. Wagstaff S. S., Jr. Divisors of Mersenne numbers. *Mathematics of Computation*, 1983, vol. 40, no. 161, pp. 385–397. DOI: 10.1090/S0025-5718-1983-0679454-X
2. Pomerance C. Recent developments in primality testing. *The Mathematical Intelligencer*, 1981, vol. 3, no. 3, pp. 97–105. DOI: 10.1007/BF03022861
3. Heuristics: deriving the Wagstaff Mersenne conjecture. *The PrimePages: prime number research and records*. Available at: <https://t5k.org/mersenne/heuristic.html> (accessed 27.08.2026).
4. Dubner H. Generalized repunit primes. *Mathematics of Computation*, 1993, vol. 61, no. 204, pp. 927–930. DOI: 10.1090/S0025-5718-1993-1185243-9
5. Bourdelais P. A generalized repunit conjecture. *NMBRTHRY mailing list*, 25 June 2009. Available at: <https://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A2=NMBRTHRY;417ab0d6.0906> (accessed 25.08.2026).
6. OEIS Foundation Inc. *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*. Available at: <https://oeis.org> (accessed 27.08.2026).
7. Wagstaff S. S., Jr. Two Mersenne prime conjectures. *Journal of Integer Sequences*, 2025, vol. 28, article 25.7.2. Available at: <https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL28/Wagstaff/wag14.html> (accessed 24.09.2026).
8. Dominguez J. Arithmetic bias in the distribution of Mersenne prime exponents and the divisor structure of $p - 1$. *arXiv*, 2026, arXiv:2603.08994. Available at: <https://arxiv.org/abs/2603.08994> (accessed 27.08.2026).
9. Neyman J., Scott E. L. Consistent estimates based on partially consistent observations. *Econometrica*, 1948, vol. 16, no. 1, pp. 1–32. DOI: 10.2307/1914288
10. Andersen E. B. Asymptotic properties of conditional maximum-likelihood estimators. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B*, 1970, vol. 32, no. 2, pp. 283–301. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1970.tb00842.x

11. Jha A. The Poisson tail conjecture for primes in short intervals. *arXiv*, 2026, arXiv:2605.23014. Available at: <https://arxiv.org/abs/2605.23014> (accessed 27.08.2026).
12. Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS). *PrimeNet*. Prime95/MPrime software, version 30.8. Available at: <https://www.mersenne.org/> (accessed 27.08.2026).
13. Epstein B. Truncated life tests in the exponential case. *The Annals of Mathematical Statistics*, 1954, vol. 25, no. 3, pp. 555–564. DOI: 10.1214/aoms/1177728723
14. Epstein B., Sobel M. Some theorems relevant to life testing from an exponential distribution. *The Annals of Mathematical Statistics*, 1954, vol. 25, no. 2, pp. 373–381. DOI: 10.1214/aoms/1177728793
15. Bartholomew D. J. The sampling distribution of an estimate arising in life testing. *Technometrics*, 1963, vol. 5, no. 3, pp. 361–374. DOI: 10.1080/00401706.1963.10490104
16. Sengupta S. N., Sinha B. K., Bagchi S. B. Estimation of mean life and reliability for exponential life distribution using time censored sample data. *Statistics & Probability Letters*, 2009, vol. 79, no. 7, pp. 899–906. DOI: 10.1016/j.spl.2008.11.026
17. Kivelä M., Porter M. A. Estimating interevent time distributions from finite observation periods in communication networks. *Physical Review E*, 2015, vol. 92, no. 5, article 052813. DOI: 10.1103/PhysRevE.92.052813
18. Strauss D., Sadler P. M. Classical confidence intervals and Bayesian probability estimates for ends of local taxon ranges. *Mathematical Geology*, 1989, vol. 21, no. 4, pp. 411–427. DOI: 10.1007/BF00897326
19. Marshall C. R. Confidence intervals on stratigraphic ranges. *Paleobiology*, 1990, vol. 16, no. 1, pp. 1–10. DOI: 10.1017/S0094837300009672
20. Solow A. R. Inferring extinction from sighting data. *Ecology*, 1993, vol. 74, no. 3, pp. 962–964. DOI: 10.2307/1940821
21. Robson D. S., Whitlock J. H. Estimation of a truncation point. *Biometrika*, 1964, vol. 51, no. 1–2, pp. 33–39. DOI: 10.1093/biomet/51.1-2.33
22. Liu Z., Bhandaram U., Garg N. Quantifying spatial under-reporting disparities in resident crowdsourcing. *Nature Computational Science*, 2024, vol. 4, no. 1, pp. 57–65. DOI: 10.1038/s43588-023-00572-6
23. Lancaster T. The incidental parameter problem since 1948. *Journal of Econometrics*, 2000, vol. 95, no. 2, pp. 391–413. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00044-5
24. Kalbfleisch J. D., Sprott D. A. Application of likelihood methods to models involving large numbers of parameters (with discussion). *Journal of the Royal Statistical Society. Series B*, 1970, vol. 32, no. 2, pp. 175–208. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1970.tb00830.x
25. Berger J. O., Liseo B., Wolpert R. L. Integrated likelihood methods for eliminating nuisance parameters. *Statistical Science*, 1999, vol. 14, no. 1, pp. 1–28. DOI: 10.1214/ss/1009211804
26. Lindsay B. G. Nuisance parameters, mixture models, and the efficiency of partial likelihood estimators. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A*, 1980, vol. 296, no. 1427, pp. 639–662. DOI: 10.1098/rsta.1980.0197
27. Dokuchaev T. S. repunit-hunt: search for generalized repunit primes and statistical analysis. *GitHub repository*, 2026. Available at: <https://github.com/Wilps93/repunit-hunt> (accessed 24.09.2026).

28. Garwood F. Fiducial limits for the Poisson distribution. *Biometrika*, 1936, vol. 28, no. 3–4, pp. 437–442. DOI: 10.1093/biomet/28.3-4.437

Информация об авторе

Тимофей Сергеевич Докучаев — независимый исследователь, Иркутск, Россия, timofei93@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0006-0510-5225>

Information about the author

Timofei Sergeevich Dokuchaev — independent researcher, Irkutsk, Russia, timofei93@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0006-0510-5225>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interest.