

Задачки деда. Старый хитрее, стырый мудрее. Старый жизнь блять отжил.

ОПГ Овчинников

22 октября 2023 г.

Артемиий

1. Асимптотика. Обозначения o , \mathcal{O} , Θ , Ω , ω .

Асимптотика - поведение функции при стремлении аргумента к бесконечности.

Пусть $f(n)$ и $g(n)$ - две функции, которые стремятся к бесконечности, тогда:

- $f(n) = o(g(n))$, если g доминирует над f асимптотически, то есть $\forall(C > 0) \exists N : \forall(n \in N) |f(n)| < C|g(n)|$
- $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$, если f ограничена сверху функцией g асимптотически, то есть $\forall(C > 0) \exists N : \forall(n \in N) |f(n)| \leq C|g(n)|$
- $f(n) = \Theta(g(n))$, если f ограничена снизу и сверху функцией g асимптотически, то есть $\forall(C_1 > 0), (C_2 > 0) \exists N : \forall(n \in N) C_1|g(n)| \leq |f(n)| \leq C_2|g(n)|$
- $f(n) = \Omega(g(n))$, если f ограничена снизу функцией g асимптотически, то есть $\forall(C > 0) \exists N : \forall(n \in N) |f(n)| \geq C|g(n)|$
- $f(n) = \omega(g(n))$, если f доминирует над g асимптотически, то есть $\forall(C > 0) \exists N : \forall(n \in N) |f(n)| > C|g(n)|$

Прекрасная лекция на 30-40 минут, в которой эти штуки объясняют в том числе графически, что намного легче для понимания, даже необязательно всё смотреть: *ТЫК*.

2. Основные свойства асимптотики. Асимптотика многочлена.

Тут если первый билет понять, проблем быть не должно.

Транзитивность:

- $f(n) = \Theta(g(n)) \wedge g(n) = \Theta(h(n)) \Rightarrow f(n) = \Theta(h(n))$

- $f(n) = \mathcal{O}(g(n)) \wedge g(n) = \mathcal{O}(h(n)) \Rightarrow f(n) = \mathcal{O}(h(n))$
- $f(n) = \Omega(g(n)) \wedge g(n) = \Omega(h(n)) \Rightarrow f(n) = \Omega(h(n))$
- $f(n) = o(g(n)) \wedge g(n) = o(h(n)) \Rightarrow f(n) = o(h(n))$
- $f(n) = \omega(g(n)) \wedge g(n) = \omega(h(n)) \Rightarrow f(n) = \omega(h(n))$

Рефлексивность:

$$f(n) = \Theta(g(n)) \Rightarrow f(n) = \mathcal{O}(g(n)); f(n) = \Omega(g(n))$$

Симметричность:

$$f(n) = \Theta(g(n)) \Rightarrow g(n) = \Theta(f(n))$$

Перестановочная симметрия:

$$f(n) = \mathcal{O}(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \Omega(f(n))$$

$$f(n) = o(g(n)) \Leftrightarrow g(n) = \omega(f(n))$$

Хз, на вики нет названия))))):

- $C \cdot o(f(n)) = o(f(n))$
 $C \cdot \mathcal{O}(f(n)) = \mathcal{O}(f)$
- $o(C \cdot f) = o(f)$
 $\mathcal{O}(C \cdot f) = \mathcal{O}(f)$
- $o(-f) = o(f)$
 $\mathcal{O}(-f) = \mathcal{O}(f)$
- $o(f) + o(f) = o(f)$
 $o(f) + \mathcal{O}(f) = \mathcal{O}(f) + \mathcal{O}(f) = \mathcal{O}(f)$
- $\mathcal{O}(f) \cdot \mathcal{O}(g) = \mathcal{O}(fg)$
 $o(f) \cdot \mathcal{O}(g) = o(f) \cdot o(f) = o(fg)$
- $\mathcal{O}(\mathcal{O}(f)) = \mathcal{O}(f)$
 $o(o(f)) = o(\mathcal{O}(f)) = \mathcal{O}(o(f)) = o(f)$

Асимптотика многочлена:

$P(x)$ - многочлен, тогда $P(x) = \Theta(x^{\deg P})$ при старшем коэффициенте > 0 .

$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_kx^k$, все слагаемые кроме a_kx^k являются $o(x^{\deg P})$.

Значит вся сумма является $\Theta(x^k)$.

3. Определение o , ω , \mathcal{O} через пределы.

$$f = o(g): \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

$$f = \omega(g): \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{g(n)}{f(n)} = 0$$

$$f = \mathcal{O}(g): \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} < \infty$$

4. Отношение доминирования между основными функциями.

Если я правильно понял, то вот:

$$\log \log n < \log n < n < n \log n < n^2 < n^3 < 2^n < n! < n^n$$

5-6. Определение однородных линейных рекуррентных соотношений (ОЛ-РУ). Алгоритм поиска решения. Случай разных корней характеристического уравнения. Случай кратных корней характеристического уравнения.

Определение:

Последовательность $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ называется однородной линейной рекуррентной последовательностью порядка k , если существуют натуральное число k и числа a_1, a_2, \dots, a_k (действительные или комплексные, причем $a_k \neq 0$) такие, что для любого n справедливо $u_{n+k} = a_1 u_{n+k-1} + a_2 u_{n+k-2} + \dots + a_k u_n$ (\leftarrow это и называется однородным линейным рекуррентным соотношением порядка k).

Алгоритм решения (далее будут примеры, на которых понятнее):

$$f_{n-k} = a_1 f_{n+k-1} + \dots + a_k f_n$$

$$r^k = a_1 r^{k-1} + \dots + a_k$$

$$r^k - a_1 r^{k-1} - \dots - a_k = 0$$

Далее находим корни получившегося уравнения и считаем кратность L каждого корня

Общее решение:

$$f_{n+k} = S_1 + S_2 + \dots + S_k, \text{ причём}$$

$$S_i = (c_{i1} + c_{i2}n + c_{i3}n^2 + \dots + c_{iL}n^{L-1}) \cdot r_i^n$$

$$r_i^n \leftarrow \text{сам корень}$$

Ищем частное решение (получаем k первых элементов и составляем систему):

$$f_0 = v_0, f_1 = v_1, \dots, f_k = v_k$$

$$\begin{cases} v_0 = \sum_{j=1}^k S_j \\ v_1 = \sum_{j=1}^k S_j \\ \dots \\ v_k = \sum_{j=1}^k S_j \end{cases}$$

Проверяем, совпадают ли ответы на первых членах, сравнивая с изначальной рекуррентной формулой.

Примеры:

C кратностью корней

$$f(n-2) = -6f(n-1) - 9f(n), \text{ где } f(0) = 1, f(1) = 5$$

$$r^2 = -6r - 9$$

$$r^2 + 6r + 9 = 0$$

$$(r+3)^2 = 0, \text{ где степень } 2 - \text{ и есть кратность}$$

$$r = -3 \text{ (корень)}$$

Общее решение:

$$f(n) = n^0 \cdot c_1 \cdot (-3)^n + n^1 \cdot c_2 \cdot (-3)^n = (-3)^n \cdot (c_1 + n \cdot c_2)$$

Степени у n соответствуют кратности $[0, L-1] \cap \mathbb{Z}$

В данном случае $[0, 1] \cap \mathbb{Z}$, то есть n^0 и n^1 у соответствующих корней

Напомним, что $f(0) = 1, f(1) = 5$

$$\begin{cases} (-3)^0 \cdot (c_1 + 0 \cdot c_2) = 1 \\ (-3)^1 \cdot (c_1 + 1 \cdot c_2) = 5 \end{cases}$$

Решив систему, получаем $c_1 = 1$ и $c_2 = -\frac{8}{3}$ Частное решение:

$$f(n) = (-3)^n \cdot (1 - n \cdot \frac{8}{3})$$

Проверка:

а) Рекуррент

$$f(2) = -6 \cdot 5 - 9 = -39$$

$$f(3) = -6 \cdot (-39) - 9 \cdot 5 = 189$$

$$f(4) = -6 \cdot 189 - 9 \cdot (-39) = -783$$

б) Явная формула

$$f(2) = (-3)^2 \cdot (1 - 2 \cdot \frac{8}{3}) = -39$$

$$f(3) = (-3)^3 \cdot (1 - 3 \cdot \frac{8}{3}) = 189$$

$$f(4) = (-3)^4 \cdot (1 - 4 \cdot \frac{8}{3}) = -783$$

Разные корни + как избавиться от свободного члена (просто число без $f(\dots)$)

$$f(n+2) - 12f(n+1) + 27f(n) = 8, \text{ где } f(0) = 4, f(1) = -2$$

Чтобы избавиться от свободного члена (8) и всё равно получить верное решение, нужно увеличить каждое слагаемое в индексе на 1, затем вычесть из полученного выражения изначальное:

$$\begin{cases} f(n+3) - 12f(n+2) + 27f(n+1) = 8 \\ f(n+2) - 12f(n+1) + 27f(n) = 8 \end{cases}$$

$$\text{Получаем: } f(n+3) - 13f(n+2) + 39f(n+1) - 27f(n) = 0$$

$$r^3 - 13r^2 + 39r - 27 = 0$$

$$(r-1)(r-3)(r-9) = 0$$

$$r_1 = 1, r_2 = 3, r_3 = 9$$

Никакой кратности (одинаковых корней) у нас нет, значит у каждого слагаемого

в общем решении будет множитель $n^0 = 1$

$$f(n) = c_1 + c_2 \cdot 3^n + c_3 \cdot 9^n$$

$$\begin{cases} f(0) = c_1 + c_2 + c_3 = 4 \\ f(1) = c_1 + 3c_2 + 9c_3 = -2 \\ f(2) = c_1 + 9c_2 + 81c_3 = -124 \end{cases}$$

Решаем систему (photomath тема) и получаем, что $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = \frac{17}{3}$, $c_3 = -\frac{13}{6}$

$$f(n) = \frac{1}{2} + \frac{17}{3} \cdot 3^n - \frac{13}{6} \cdot 9^n$$

Проверка:

а) Рекуррент

$$f(2) = 8 + 12f(1) - 27f(0) = 8 + 12 \cdot (-2) - 27 \cdot 4 = -124$$

$$f(3) = 8 + 12f(2) - 27f(1) = 8 + 12 \cdot (-124) - 27 \cdot (-2) = -1426$$

$$f(4) = 8 + 12f(3) - 27f(2) = 8 + 12 \cdot (-1426) - 27 \cdot (-124) = -13756$$

б) Явная формула

$$f(2) = \frac{1}{2} + \frac{17}{3} \cdot 3^2 - \frac{13}{6} \cdot 9^2 = -124$$

$$f(3) = \frac{1}{2} + \frac{17}{3} \cdot 3^3 - \frac{13}{6} \cdot 9^3 = -1426$$

$$f(4) = \frac{1}{2} + \frac{17}{3} \cdot 3^4 - \frac{13}{6} \cdot 9^4 = -13756$$

7. Числа Фибоначчи. Определение, формула в замкнутом виде.

Числа Фибоначчи - элементы числовой последовательности, в которой первые два числа равны 1 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих; однородное линейное рекуррентное соотношение второго порядка

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Формула в замкнутом виде:

$$F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^n - (-\varphi)^{-n}}{\varphi - (-\varphi^{-1})} = \frac{\varphi^n - (-\varphi)^{-n}}{2\varphi - 1}$$

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} - \text{золотое сечение}$$

Формула без золотого сечения:

$$F_n = \frac{1}{2^n \sqrt{5}} ((1+\sqrt{5})^n - (1-\sqrt{5})^n)$$

8. Определение неоднородных линейных рекуррентных соотношений (НЛРУ). Общий алгоритм поиска решения.

Определение:

Последовательность $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ называется неоднородной линейной рекуррентной последовательностью порядка k , если существует натуральное число k , числа a_1, a_2, \dots, a_k (действительные или комплексные, причем $a_k \neq 0$) и функция

$b_n = f(n)$ такие, что $u_{n+k} = a_1 u_{n+k-1} + a_2 u_{n+k-2} + \dots + a_k u_n + b_n$ (\leftarrow это и называется неоднородным линейным рекуррентным соотношением порядка k).

Алгоритм решения (примеры для лучшего понимания далее в билетах 10, 12, 13):

$$g(n) = a_1 n^k + \dots + a_{k+1}$$

1) Решаем ОЛРУ

2) Рассмотрим частное решение нерекуррентной части

$$f_p(n) = a_1 n^k + \dots + a_{k+1} = g(n)$$

Подставим данное $f_p(n)$ в исходное рекуррентное уравнение

$$f_a(f_p(n)) + f_{a-1}(f_p(n)) + \dots + f_{a-k}(f_p(n)) = g(n)$$

Соответствующие члены и будут членами частного решения нерекуррентной части. Если корень решения ОЛРУ равен 1, то при подстановке $f_p(n)$ в рекуррентное уравнение у нас оно может не сойтись $\Rightarrow f_p(n)$ (и будем так перебирать, пока не получится корректный ответ)

3) Общим решением такого НЛРУ будет общее решение ОЛРУ + частное решение нерекуррентной части

10. Поиск частного решения НЛРУ при функции-константе.

См билеты 5-6, а именно пример *Разные корни + как избавиться от свободного члена (просто число без $f(\dots)$)*

12. Поиск частного решения НЛРУ при функции-многочлене.

Пример:

$$f(n+2) - 2f(n+1) + f(n) = -9n - 1$$

$$1) r^2 - 2r + 1 = 0$$

$$(r-1)^2 = 0$$

$$r = 1 (!)$$

$$f_r(n) = c_1 + n \cdot c_2 \quad 2) f_p(n) = an^2 + bn$$

$$(a(n+2)^2 + b(n+2)) - 2(a(n+1)^2 + b(n+1)) + (an^2 + bn) = -9n - 1$$

$2a = -9n - 1$ - грусть печаль, нам такое не надо

$$f_p(n) = an^3 + bn^2$$

$$(a(n+2)^2 + b(n+2)^2) - 2(a(n+1)^3 + b(n+1)^2) + (an^3 + bn^2) = -9n - 1$$

$$6a_n + (6a + 2b) = -9n - 1$$

$$\begin{cases} 6a = -9 \\ 6a + 2b = -1 \end{cases}$$

Получаем $a = -1,5$, $b = 4$

$$f_p(n) = -1,5n^3 + 4n^2$$

3) Общая формула:

$$f(n) = f_r(n) + f_p(n) = c_1 + nc_2 - 1,5n^3 + 4n^2$$

(Далее можно получить частную формулу и проверить её, как мы это делаем в

ОЛРУ)

Игорь (платница межбак)

13. Поиск частного решения НЛРУ при функции-экспоненте.

$g(n)$ - экспонента $= d \cdot (\alpha)^n$

1) Вновь отдельно решаем ОЛРУ, отбросив нереккурентную часть и получаем $f_r(n)$

2) В этот раз начинаем с $f_p(n) = d \cdot (\alpha)^n$ и, при необходимости, по аналогии с предыдущим алгоритмом перебираем варианты, умножением на n (обычно, если один из корней ОЛРУ равен α , то надо умножить на n и перебирать с $f_p(n) = d \cdot (\alpha)^n \cdot n$).

Так получаем частное решение нереккурентной части для НЛРУ с экспонентой.

3) Вновь, $f(n) = f_r(n) + f_p(n)$

Пример:

$$f(n+2) + 19f(n+1) + 90f(n) = 2 \cdot (-10)^{n+2}$$

$$1) r^2 + 19r + 90 = 0$$

$$(r+10)(r+9) = 0$$

$$r_1 = -10, r_2 = -9$$

$$f_r(n) = (-10)^n c_1 + (-9)^n c_2$$

$$2) f_p(n) = d \cdot (-10)^{n+2} \cdot n$$

$$(d \cdot (-10)^{n+4} \cdot (n+2)) + 19(d \cdot (-10)^{n+3} \cdot (n+1)) + 90(d \cdot (-10)^{n+2} \cdot n) = 2 \cdot (-10)^{n+2}$$

Поделим на $(-10)^{n+2}$

$$(d \cdot (-10)^2 \cdot (n+2)) + 19(d \cdot (-10) \cdot (n+1)) + 9(d \cdot n) = 2$$

$$d = 0,2 \Rightarrow f_p(n) = 0,2 \cdot (-10)^{n+2} \cdot n$$

$$3) f(n) = (-10)^n c_1 + (-9)^n c_2 + 0,2(-10)^{n+2} n$$

(Далее можно получить частную формулу и проверить её, как мы это делаем в ОЛРУ)

15. Решение рекуррентных уравнений подстановкой на примере $T(n) = aT(n/m) + bn$, $T(1) = b$. «Угадывание» итогового решения.

17. Рекуррентные соотношения: основная теорема. Формулировка.

Мастер теорема (теорема о просто рекуррентном соотношении)

Пусть $T(n) = aT(\frac{n}{b}) + f(n)$, где $f(n) = n^c$. При этом $a > 0$, $b > 1$, $c \geq 0$. Определим глубину рекурсии $k = \log_b n$. Тогда верно одно из трёх:

$$\begin{cases} T(n) = \Theta(a^k) = \Theta(n^{\log_b a}), a > b^c \\ T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^c), a < b^c \\ T(n) = \Theta(k \cdot f(n)) = \Theta(n^c \log n), a = b^c \end{cases}$$

18. Оценка сумм через интеграл. Основная идея, оценки сверху и снизу.
ФОТО

19. Асимптотическая оценка $\sum_{i=0}^{n-1} i^k$, $\sum_{i=0}^{n-1} \log i$, $\sum_{i=0}^{n-1} i \log i$.

21. Алгоритм Евклида поиска НОД.
ФОТО

22. Расширенный алгоритм Евклида.
ФОТО

23. Понятие мультипликативного обратного. Поиск с помощью алгоритма Евклида.
ФОТО

24. Число бинарных деревьев с n вершинами в рекурсивной и нерекурсивной форме. Идея решения через производящие функции.
ФОТО

25. Понятие правильной скобочной последовательности (ПСП). Число ПСП длиной $2n$.
ФОТО

Эрнест

26. Понятие пути Дика. Количество путей Дика длиной $2n$.

28. Понятие сложности алгоритма. Лучший, худший, средний случай.

29. Ханойская башня. Алгоритм. Доказательство принадлежности к классу экспоненциальных задач.

30. Ханойская башня. Оценка сложности через решение рекуррентного уравнения.

32. Вычисление веса двоичного вектора. Полный перебор. Оценка сложности.

33. Вычисление веса двоичного вектора. Предвычисление. Оценка сложности.

34. Вычисление веса двоичного вектора со сложностью $\mathcal{O}(W(x))$. Особенности реализации.

36. Задача коммивояжёра. Формулировка, вариации условий, матрица стоимости.

37. Формализация постановки задачи. Описание решения задачи коммивояжёра как перечисления гамильтоновых циклов.

38. Формализация постановки задачи. Описание решения задачи коммивояжёра как поиска гамильтонова цикла.

Амина

39. Особенности асимптотической оценки сложности алгоритма.

40. Особенности точной оценки реализации алгоритма.

41. Определение методов частных целей, подъёма вверх, отрабатывания назад.

42. Применение методов разработки алгоритмов на примере задачи о джипе.

43. Отрабатывание назад. Задача о спичках.

44. Подъём вверх. Задача о миссионерах и каннибалах.

45. Частные цели. Задача о греческом кресте.

46. Подъём вверх. Задача о переливании.

47. Отрабатывание назад. Задача о пиратах.

50. Подъём вверх. Задача о лёгкой фальшивой монете. Обоснование поиска улучшенного решения.

Гордей

51. Задача о лёгкой фальшивой монете. Достаточное условие оптимальности решения.

52. Рекурсия. Задача о разбиении.

54. Рекурсия. Задача Иосифа Флавия. Рекуррентное решение.

56. Умножение однократной декомпозицией: идея, время работы.

57. Умножение рекурсивной декомпозицией: идея, время работы.

58. Связь умножения чисел и многочленов. Умножение за $\mathcal{O}(n^2)$.

59. Алгоритм Карацубы: идея, время работы.

60. Понятие кодов, сохраняющих разность.

61. Композиция. Построение кодов, сохраняющих разность, с квадратичным увеличением слов.

62. Композиция. Построение кодов, сохраняющих разность, с экспоненциальным

Остатки

63. Эвристика. Метод ближайшего соседа в задаче коммивояжёра.

64. Эвристика. Задача о расписании процессоров.