

KIT DE PRÉPARATION OFFICIEL : CONCOURS SANTÉ

SECTION : INFIRMIERS, SAGES-FEMMES ET TECHNICIENS DE SANTÉ

I. CONSEILS POUR LES ÉPREUVES DE SANTÉ

Le concours de santé exige de la précision et de la rapidité.

1. **Rigueur scientifique** : Dans les matières comme la biologie ou la chimie, utilisez les termes exacts. Une approximation peut être considérée comme une erreur médicale.
2. **Gestion du QCM** : Lisez attentivement les consignes. Une mauvaise réponse peut parfois être pénalisante (points négatifs). Si vous ne savez pas, passez à la question suivante.
3. **Éthique** : Gardez toujours à l'esprit les valeurs de l'agent de santé : empathie, secret professionnel et réactivité.

II. BIOLOGIE ET ANATOMIE HUMAINE (ESSENTIELS)

- **L'Appareil Circulatoire** : Le cœur est un muscle (myocarde) composé de 4 cavités (2 oreillettes et 2 ventricules). Le sang riche en oxygène circule par les artères, le sang pauvre en oxygène par les veines.
- **Le Système Immunitaire** : Les globules blancs (leucocytes) sont les défenseurs de l'organisme. Les vaccins permettent de stimuler la mémoire immunitaire.
- **La Cellule** : Unité de base du vivant. Éléments clés à retenir : noyau (ADN), cytoplasme, membrane plasmique et mitochondries (énergie).

III. CHIMIE ET DOSAGES (NOTIONS CLÉS)

- **Les Solutions** : Concentration (C) = Masse (m) / Volume (V). Très important pour le calcul des doses de médicaments ou de perfusions.
- **Le pH** : Échelle de 0 à 14.
 - pH < 7 : Acide
 - pH = 7 : Neutre
 - pH > 7 : Basique (alcalin)
- **L'eau** : Élément vital. Le corps humain est composé d'environ 65 % d'eau.

IV. ENTRAÎNEMENT : CALCUL DE DOSES ET LOGIQUE

Sujet d'application :

Un infirmier doit administrer 500 mg d'un antibiotique à un patient. Le médicament est disponible sous forme de flacon de 2 grammes dilué dans 10 ml d'eau distillée. Combien de millilitres (ml) l'infirmier doit-il prélever ?

Correction détaillée :

1. **Conversion des unités** : 2 grammes = 2 000 mg.
2. **Mise en place de la règle de trois** :
 - 2 000 mg → 10 ml
 - 500 mg → X ml
3. **Calcul** :
$$X = \frac{500 \times 10}{2000}$$
4. **Résultat** : $X = 2,5$ ml.

L'infirmier doit donc prélever 2,5 ml pour respecter la prescription.

V. TEST DE CONNAISSANCES GÉNÉRALES EN SANTÉ (QCM)

1. Quelle est la durée normale d'une grossesse en semaines d'aménorrhée ?

- A) 32 semaines
- B) 41 semaines
- C) 45 semaines
- Réponse : B

2. Quelle maladie est transmise par l'anophèle femelle ?

- A) La Dengue
- B) Le Paludisme
- C) La Fièvre Jaune
- Réponse : B

3. Quelle est la tension artérielle considérée comme normale pour un adulte au repos ?

- A) 12/8 (120/80 mmHg)
- B) Le Paludisme
- C) La Fièvre Jaune
- Réponse : B

3. Quelle est la tension artérielle considérée comme normale pour un adulte au repos ?

- A) 12/8 (120/80 mmHg)
- B) 16/10 (160/100 mmHg)
- C) 9/5 (90/50 mmHg)
- Réponse : A

4. Quel organe produit l'insuline dans le corps humain ?

- A) Le Foie
- B) Le Pancréas
- C) Les Reins
- Réponse : B