Дуб Черешчатый (Quércus róbur)

Местообитание: западная Европа и европейская часть России; лесостепь, лес

Вид входит в Международную Красную книгу: да, LC – вызывающие наименьшие опасения

Особенности размножения: <u>пветки разнополые</u>. Цветение начинается у деревьев возрастом от 40 до 60 лет вместе с распусканием листьев — обычно в мае. <u>Растение однодомное</u>. Из каждой завязи обычно развивается только по одному желудю. <u>Плод — это желудь</u>, созревают в сентябре-октябре. Желуди <u>распространяются птицами</u>.



Абиотические факторы среды обитания	Приспособленность вида
1) Почвенные	Очень длинный стержневой корень
	С 6-8 лет начинают развиваться боковые корни, тоже уходящие глубоко в землю
	Требователен к почвенному плодородию (наилучшие древесности на мощных серых лесных суглинистых почвах и деградированных черноземах)
	Предпочтительна влажная и рыхлая почва
2) Климатические особенности	Теплолюбивый, не идет далеко на север и высоко в горы
	Высокая морозостойкость
	Не выносит затенения сверху, но боковое притенение стимулирует рост подроста.
	Ветроустойчив
3) Влага	Не переносит избыток влаги
	Засухоустойчив (ввиду длинного корня)

Дуб черешчатый — официальная цветочная эмблема шведской провинции Блекинге.