

Capgras Sendromu

Capgras Sendromu, kişinin kendisi için önemli ve tanıdık bir insanın -çoğunlukla eşi, aile üyesi veya yakın bir yakınının- aslında gerçek kişi olmadığına ve onun yerine tıpatıp benzeyen bir sahtekarın geçtiğine inanmasıyla karakterize edilen nadir bir sanrısallık kimliklendirme sendromudur. Hastanın gördüğü kişi fiziksel olarak aynı görünebilir, hasta onun gerçek yakını olduğuna inanmaz. Bu nedenle Capgras Sendromu halk arasında “ikiz sanrısı” olarak da ifade edilmektedir. Sendrom ilk kez 1923 yılında Fransız psikiyatrist Joseph Capgras ve Jean Reboul-Lachaux tarafından tanımlanmış ve başlangıçta *l'illusion des sosies* (“benzerlerin/ikizlerin yanılsaması”) olarak adlandırılmıştır.

Capgras Sendromunun en belirgin özelliği, kişinin tanıdığı birini tanımasına rağmen onun gerçek kişi olduğuna dair duygusal ve öznel aşinalık hissini kaybetmesidir. Örneğin hasta eşinin yüzünü görebilir ve onun görünüşünün aynı olduğunu kabul edebilir; ancak buna rağmen “Bu kişi eşime çok benziyor fakat eşim değil, onun yerine geçen bir sahtekar” şeklinde kesin bir inanca sahip olabilir. Bu inanç, sıradan bir şüphe veya kararsızlık değildir; hasta çoğunlukla bu düşünceye güçlü biçimde inanır. Bazı vakalarda yanlış kimliklendirme yalnızca insanlar için değil, hayvanlar veya cansız nesneler için de ortaya çıkabilir.

Belirtileri ve Hastanın Yaşadığı Durum

Capgras Sendromunun temel belirtisi yakın ve tanıdık bir kişinin yerine başka birinin geçtiğine ilişkin sanrısallık inançtır. Hastalar özellikle kendileri için önemli kişileri “sahtekar” olarak değerlendirebilir. Bu durum hastada kaygı, huzursuzluk, korku, kuşku, ajitasyon ve öfkeye neden olabilir. Hasta gerçek yakınının kendisini kandırdığına veya birilerinin onun yerini değiştirdiğine inanabildiği için, çevresindeki kişilerin açıklamalarını kabul etmekte zorlanabilir.

Sanrı ilerledikçe hasta, “gerçek kişinin” kim olduğunu kanıtlamaya yönelik davranışlar gösterebilir. Örneğin karşısındaki kişinin gerçekten

eşi veya yakını olduğunu kanıtlamasını isteyebilir. Bu durum kişilerarası ilişkilerin bozulmasına ve aile içinde ciddi çatışmalara neden olabilir. Özellikle hasta karşısındaki kişiyi sahtekar ve tehdit olarak algılasa saldırgan veya şiddet içeren davranışlar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, Capgras Sendromu olan herkesin şiddet uygulamadığı; şiddet içermeyen vakaların da önemli bir bölüm oluşturduğu belirtilmektedir.

Capgras Sendromunun dikkat çekici bir başka yönü, belirtilerin altta yatan hastalığa göre değişebilmesidir. 2026 tarihli geniş kohort çalışmasında belirtilerin özellikle akşam veya gece saatlerinde kötüleştiği bildirilmiştir. Bu durumun olumsuz duygusal durumlarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

Neden Ortaya Çıkar?

Capgras Sendromunun tek bir nedeni yoktur. Güncel bilgiler, sendromun özellikle beynin yüzleri tanıma, duygusal tepki oluşturma, hafıza, öz-izleme ve gerçekliği değerlendirme süreçlerinin bozulmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Önemli açıklamalardan biri, kişinin tanıdığı yüzü görsel olarak tanıyabilmesine rağmen, o kişiye ilişkin normal duygusal aşinalık hissini oluşmamasıdır. Normalde tanıdığımız bir insanın yüzünü gördüğümüzde yalnızca yüzünü tanımayız; aynı zamanda o kişiye yönelik bir “tanıdıklık” veya duygusal yakınlık hissederiz. Capgras Sendromunda yüz tanıma ile bu duygusal tepki arasındaki bağlantının bozulabileceği düşünülmektedir. Böylece hasta “Bu kişi tıpatıp eşime benziyor ama onu görünce eşimi görüyormuşum gibi hissetmiyorum” deneyimini yaşayabilir ve bu farklılığı “eşimin yerine bir sahtekar geçti” şeklinde açıklayabilir.

Beynin özellikle sağ frontal bölgeleri, temporal bölgeleri ve limbik sisteminin bu süreçte önemli olduğu düşünülmektedir. Daha yeni nörogörüntüleme bulguları ise Capgras Sendromunda özellikle sağ frontal disfonksiyonla birlikte yaygın bilateral kortikal tutulum görülebileceğini göstermektedir. Bu nedenle sendrom yalnızca bir “yüzü tanıyamama” problemi olarak değil; yüz tanıma, duygular, hafıza,

gerçeklik değerlendirmesi ve kişinin kendi düşüncelerini kontrol etme süreçlerinin birlikte bozulduğu daha karmaşık bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Hangi Hastalıklarla Birlikte Görülebilir?

Capgras Sendromu tek başına ortaya çıkabileceği gibi çeşitli psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarla birlikte görülebilir. Kaynaklarda özellikle Lewy cisimcikli demans, Alzheimer hastalığı, şizofreni, şizoaffektif bozukluk, bipolar bozukluk, epilepsi, Parkinson hastalığı, serebrovasküler hastalıklar ve çeşitli beyin hasarları ile ilişkili olduğu bildirilmektedir.

Üçüncü kaynakta incelenen 204 hastalık geniş kohortta, vakaların %69'unda nörodejeneratif hastalıkların bulunduğu ve en sık görülen tanının Lewy cisimcikli demans (%58) olduğu bildirilmiştir. Psikotik bozukluklar ise vakaların %9'unu oluşturmuştur. Bu bulgular Capgras Sendromunun özellikle nörodejeneratif hastalıklar bağlamında önemli bir klinik belirti olabileceğini göstermektedir.

Tanı ve Tedavi

Capgras Sendromunun tanısı öncelikle klinik değerlendirmeye dayanır. Ancak sendroma yol açabilecek nörolojik veya tıbbi durumların belirlenmesi için gerekli durumlarda laboratuvar incelemeleri ve beyin görüntülemeleri yapılabilir. Özellikle demans, beyin lezyonları, nörodejeneratif hastalıklar ve diğer organik nedenlerin araştırılması önemlidir.

Tedavide tek bir standart yöntem bulunmamaktadır. Bunun temel nedeni Capgras Sendromunun farklı hastalıkların sonucunda ortaya çıkabilmesi ve hastalığın nadir olması nedeniyle tedavi çalışmalarının sınırlı olmasıdır. Genel yaklaşım, altta yatan hastalığın tedavi edilmesi, uygun hastalarda antipsikotik ilaçların kullanılması ve psikoterapötik/psikososyal destek sağlanmasıdır. Hastanın inancıyla doğrudan çatışmak veya onu zorla ikna etmeye çalışmak yerine, hastanın yaşadığı korku ve kaygıyı anlamaya yönelik

empatik ve sakin bir iletişim kurulması önerilmektedir.

Özellikle aile ve bakım verenlerin hastanın yaşadığı durumu anlaması önemlidir. Hastanın “sahtekar” olarak gördüğü kişinin kendisiyle karşı karşıya gelmesi bazen kaygıyı ve saldırganlığı artırabileceğinden, açık, sakin ve güven verici iletişim önem taşır. Kendisine veya başkasına zarar verme riski bulunan hastalarda ise daha yoğun psikiyatrik değerlendirme ve gerektiğinde hastaneye yatırma gündeme gelebilir.

Kısaca

Capgras Sendromu, kişinin tanıdığı ve sevdiği birinin gerçek kişi olmadığını, onun yerine aynı görünen bir sahtekarın geçtiğini düşünmesi ile ortaya çıkan nadir bir sanrısız yanlıştır kimliklendirme sendromudur. Temel sorun yalnızca yüzü tanıyamamak değildir; yüz tanıma ile o kişiye ilişkin duygusal aşinalık, hafıza ve gerçeklik değerlendirmesi arasındaki bağlantıların bozulması söz konusudur. Bu nedenle hasta yakınına görebilir ve onun görünüşünü tanıyabilir ancak ona karşı “bu benim yakını” hissini yaşayamayabilir.

Sendrom; Lewy cisimcikli demans ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra şizofreni ve diğer psikiyatrik veya nörolojik hastalıklarla ilişkili olabilir. Hastada kaygı, kuşku, ajitasyon ve kişilerarası çatışmalar görülebilir; bazı vakalarda yanlış tanımlanan kişiye yönelik saldırganlık riski de ortaya çıkabilir. Bu nedenle Capgras Sendromu hem hastanın hem de ailesinin yaşamını önemli ölçüde etkileyebilen, erken fark edilmesi, altta yatan nedenin araştırılması ve uygun şekilde yönetilmesi gereken bir klinik tablodur.

Kaynaklar:

1) Shah KP, Jain SB, Wadhwa R. Capgras Syndrome. 2023 May 29. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2026 Jan-. PMID: 34033319.

2) Brigo F. Capgras Syndrome in Popular Media: A Cinematic Exploration in Kinds of Kindness (2024). Clin



Neuropsychiatry. 2025 Apr;22(2):165-166. doi: 10.36131/cnfioritieditore20250207. PMID: 40401142; PMCID: PMC12090369.

3) Watanabe H, Whitwell JL, Bhaskaran JG, Lowe VJ, Josephs KA. Imposter in the brain: aetiological, clinical and neuroimaging characteristics of Capgras syndrome. Brain. 2026 Apr 7;149(4):1224-1238. doi: 10.1093/brain/awaf378. PMID: 41059767; PMCID: PMC13058470.

Ali Bocakkıtay

Founder, Wionpav Labs

Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University