

PRAKTIKUM FISIKA KOMPUTASI

ANALISIS DOUBLE PENDULUM

Nama : Wira Satya Baladika

NIM : 1227030037

KODE PROGRAM

```
import numpy as np
import sympy as smp
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import animation
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from matplotlib.animation import PillowWriter
from IPython.display import HTML

t, m, g, L1, L2, w, C, alph, beta = smp.symbols(r't m g L_1 L_2
\omega C \alpha \beta')

the1, the2, = smp.symbols(r'\theta_1, \theta_2 ', cls=smp.Function)

the1 = the1(t)
the1_d = smp.diff(the1, t)
the1_dd = smp.diff(the1_d, t)

the2 = the2(t)
the2_d = smp.diff(the2, t)
the2_dd = smp.diff(smp.diff(the2, t), t)

x1, y1, x2, y2, = smp.symbols('x_1, y_1, x_2, y_2', cls=smp.Function)
x1= x1(t, the1)
y1= y1(t, the1)
x2= x2(t, the1, the2)
y2= y2(t, the1, the2)

x1 = smp.cos(w*t)+L1*smp.sin(the1)
y1 = -L1*smp.cos(the1)
x2 = smp.cos(w*t)+L1*smp.sin(the1) + L2*smp.sin(the2)
y2 = -L1*smp.cos(the1) -L2*smp.cos(the2)

smp.diff(x1, t)
```

```

vx1_f = smp.lambdify((t,w,L1,L2,the1,the2,the1_d,the2_d),
smp.diff(x1, t))
vx2_f = smp.lambdify((t,w,L1,L2,the1,the2,the1_d,the2_d),
smp.diff(x2, t))
vy1_f = smp.lambdify((t,w,L1,L2,the1,the2,the1_d,the2_d),
smp.diff(y1, t))
vy2_f = smp.lambdify((t,w,L1,L2,the1,the2,the1_d,the2_d),
smp.diff(y2, t))

```

```

T = 1/2 * (smp.diff(x1,t)**2 + smp.diff(y1, t)**2) + \
      1/2 * m * (smp.diff(x2, t)**2 + + smp.diff(y2, t)**2)
V = g*y1 + m*g*y2
L = T-V

```

```

LE1 = smp.diff(L, the1) - smp.diff(smp.diff(L, the1_d), t)
LE1 = LE1.simplify()

```

```

LE2 = smp.diff(L, the2) - smp.diff(smp.diff(L, the2_d), t)
LE2 = LE2.simplify()

```

```
LE1
```

```
LE2
```

```

sols = smp.solve([LE1, LE2], (the1_dd, the2_dd),
                  simplify=False, rational=False)

```

```
sols[the1_dd]
```

```

a = LE1.subs([(smp.sin(the1-the2), the1-the2),
              (smp.cos(the1-the2), 1),
              (smp.cos(the1), 1),
              (smp.sin(the1), the1),
              (the1, C*smp.cos(w**t)),
              (the2, C*alph*smp.cos(w**t)),
              (m, 1),
              (L2, L1),
              ]).doit().series(C, 0, 2).removeO().simplify()
b = LE2.subs([(smp.sin(the1-the2), the1-the2),
              (smp.cos(the1-the2), 1),
              (smp.cos(the1), 1),
              (smp.cos(the2), 1),
              (smp.sin(the1), the1),
              (smp.sin(the2), the2),

```

```

    (the1, C*smp.cos(w**t)),
    (the2, C*alph*smp.cos(w**t)),
    (m, 1),
    (L2, L1),
    ]).doit().series(C, 0, 2).removeO().simplify()

```

```
yeet = smp.solve([a.args[1], b.args[2]], (w, alph))
```

```
yeet[2][0]
```

```
yeet [0][0]
```

```
smp.limit(yeet[1][0].subs(C, beta/L1).simplify(), beta, smp.oo)
```

```
dz1dt_f = smp.lambdify((t, m, g, w, L1, L2, the1, the2, the1_d,
the2_d), sols[the1_dd])
```

```
dthe1dt_f = smp.lambdify(the1_d, the1_d)
```

```
dz2dt_f = smp.lambdify((t, m, g, w, L1, L2, the1, the2, the1_d,
the2_d), sols[the2_dd])
```

```
dthe2dt_f = smp.lambdify(the2_d, the2_d)
```

```

def dSdt(S, t):
    the1, z1, the2, z2 = S
    return [
        dthe1dt_f(z1),
        dz1dt_f(t, m, g, w, L1, L2, the1, the2, z1, z2),
        dthe2dt_f(z2),
        dz2dt_f(t, m, g, w, L1, L2, the1, the2, z1, z2),
    ]

```

```

t = np.linspace(0,20,1000)
g = 9.81
m=1
L1 = 20
L2 = 20
w = np.sqrt(g/L1)
ans = odeint(dSdt, y0=[0, 0, 0, 0], t=t)

```

```
plt.plot(ans.T[0])
```

```

def get_energy(w):
    t = np.linspace(0,100,2000)
    ans = odeint(dSdt, y0=[0.1, 0.1, 0, 0], t=t)
    vx1 = vx1_f(t,w,L1,L2,ans.T[0],ans.T[2],ans.t[1],ans.T[3])

```

```

vx2 = vx2_f(t,w,L1,L2,ans.T[0],ans.T[2],ans.t[1],ans.T[3])
vy1 = vy1_f(t,w,L1,L2,ans.T[0],ans.T[2],ans.t[1],ans.T[3])
vy2 = vy2_f(t,w,L1,L2,ans.T[0],ans.T[2],ans.t[1],ans.T[3])
E = 1/2 * np.mean(vx1**2+vx2**2+vy1**2+vy2**2)
return E

```

```

ws = np.linspace(0.4, 1.3, 100)
Es = np.vectorize(get_energy)(ws)

```

```

plt.plot(ws, Es)
plt.axvline(1.84775*np.sqrt(g/L1), c='k', ls='--')
plt.axvline(0.76536*np.sqrt(g/L1), c='k', ls='--')
plt.grid()

```

```

t = np.linspace(0, 200, 20000)
g = 9.81
m=1
L1 = 20
L2 = 20
w = ws[ws>1][np.argmax(Es[ws>1])]
ans = odeint(dSdt, y0=[0.1, 0.1, 0, 0], t=t)

```

```

def get_x0y0x1y1x2y2(t, the1, the2, L1, L2):
    return (np.cos(w*t),
            0*t,
            np.cos(w*t) + L1*np.sin(the1),
            -L1*np.cos(the1),
            np.cos(w*t) + L1*np.sin(the1) + L2*np.sin(the2),
            -L1*np.cos(the1) - L2*np.cos(the2),
            )

```

```

x0, y0, x1, y1, x2, y2 = get_x0y0x1y1x2y2(t, ans.T[0], ans.T[2], L1,
L2)

```

```

ln1.set_data([x0[::10][i], x1[::10][i], x2[::10][i]], [y0[::10][i],
y1[::10][i], y2[::10][i]])
trail1 = 50
trail2 = 50
ln2.set_data(x1[::10][i:max(1,i-trail1):-1],
y1[::10][i:max(1,i-trail1):-1])
ln3.set_data(x2[::10][i:max(1,i-trail2):-1],
y2[::10][i:max(1,i-trail2):-1])

```

```

fig, ax = plt.subplots(1,1, figsize=(8,8))

```

```

ax.set_facecolor('k')
ax.get_xaxis().set_ticks([])
ax.get_yaxis().set_ticks([])
ln1, = plt.plot([], [], 'ro--', lw=3, markersize=8)
ln2, = ax.plot([], [], 'ro-', markersize = 8, alpha=0.05,
color='cyan')
ln3, = ax.plot([], [], 'ro-', markersize = 8, alpha=0.05, color='cyan')
ax.set_ylim(-44,44)
ax.set_xlim(-44,44)

ani = animation.FuncAnimation(fig, animate, frames=2000, interval=50)
HTML(ani.to_html5_video())

```

PENJELASAN

Pada praktikum ini, terdapat kode program yang dimana kita bisa menurunkan rumus pendulum yang diketahui melalui kode program yang diatas. lalu membuat grafik dari pada kasus soal yang ditanyakan sehingga mendapatkan grafik yang sempurna sesuai dengan studi kasus yang didapatkan. Pada praktikum ini, kita bisa membuat animasi perihal double pendulum yang dimana terdapat dua massa yang bergerak dengan dua arah yang sama.