


# Энциклопедия современной китайской акупунктуры

14 каналов и 361 классических точек по стандарту ВОЗ 2008, условные коды мужского и женского тела, миофасциальные триггерные точки, эндокринология и циркадные ритмы — с разделением традиционной модели и научных данных.



**361**

точек 14 каналов

**14**

схем каналов + 4  
обзорные

**33**

точек-триггеров

**♂ / ♀**

условные коды тела

# Оглавление

1. Как пользоваться энциклопедией: коды, обозначения, ограничения
2. Современная китайская акупунктура: определение, история, стандарты
3. Три уровня знания: традиция, механизмы, клинические данные
4. Локализация точек: пропорциональный цунь и ориентиры
5. Классификация точек и система каналов
6. Атлас 14 каналов
  1. **LU** — Канал лёгких
  2. **LI** — Канал толстой кишки
  3. **ST** — Канал желудка
  4. **SP** — Канал селезёнки
  5. **HT** — Канал сердца
  6. **SI** — Канал тонкой кишки
  7. **BL** — Канал мочевого пузыря
  8. **KI** — Канал почек
  9. **PC** — Канал перикарда
  10. **TE** — Канал тройного обогревателя
  11. **GB** — Канал желчного пузыря
  12. **LR** — Канал печени
  13. **GV** — Заднесрединный канал (Ду-май)
  14. **CV** — Переднесрединный канал (Жэнь-май)
7. Внеканальные (экстра-) точки
8. Миофасциальные триггерные точки и акупунктура
9. Мужское и женское тело: различия, значимые для акупунктуры
10. Эндокринология и циркадные ритмы (♂ / ♀)
11. Современные методики
12. Доказательная база
13. Безопасность и противопоказания
14. Источники

## МЕДИЦИНСКАЯ ОГОВОРКА

Издание носит справочно-образовательный характер. Это не руководство по самолечению и не инструкция по введению игл. Иглоукалывание выполняет только обученный специалист стерильными одноразовыми иглами. При острых или тяжёлых симптомах (боль в груди, признаки инсульта, кровотечение, высокая лихорадка) нужна неотложная медицинская помощь, а не акупунктура.

# 1 Как пользоваться энциклопедией

## 1.1. Система кодов

Каждая точка имеет два обозначения.

### МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОД ВОЗ

Буквенно-цифровой код по стандарту *WHO Standard Acupuncture Point Locations in the Western Pacific Region* (2008): две латинские буквы канала и номер точки по ходу канала, например **LU1**, **ST36**, **CV12**. Экстра-точки обозначаются по области: **EX-HN** (голова и шея), **EX-CA** (грудь и живот), **EX-B** (спина), **EX-UE** и **EX-LE** (верхняя и нижняя конечность).

### УСЛОВНЫЙ КОД ТЕЛА ♂ / ♀ (ВВЕДЁН В ЭТОМ ИЗДАНИИ)

По вашему запросу к каждой точке добавлен условный латинский буквенно-цифровой код для мужского и женского тела:

- M-ST36** – точка ST36 на мужском теле
- F-ST36** – точка ST36 на женском теле
- M-EXHN03** / **F-EXHN03** – экстра-точка EX-HN3

**Важно:** это условная нотация издания, а не международный стандарт. Код взаимно однозначно сопоставлен с кодом ВОЗ: [пол]-[канал][номер из 2 цифр]. Если для точки есть задокументированные половые различия (ориентир, беременность, традиционные «женские» или «мужские» показания), в таблице под локализацией стоит розовая плашка ♂/♀.

## 1.2. Обозначения в таблицах и на схемах

| Обозначение                                 | Значение                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ST36 Zusanli</b> (двойное подчёркивание) | Точка, локализация которой совпадает с типичным расположением миофасциального триггера по атласу Travell & Simons (сопоставление по Dorsher, 2008; подробнее — раздел 8). На схемах такие точки обведены чёрным кольцом. |
| <b>TrP</b>                                  | Та же метка в колонке «Категория / метки».                                                                                                                                                                               |
| <b>Б</b>                                    | Точка традиционно избегается или применяется с осторожностью при беременности.                                                                                                                                           |
| <b>!</b>                                    | Анатомически опасная зона: плевра и лёгкое, крупный сосуд, нерв, глазное яблоко, продолговатый мозг.                                                                                                                     |
| ♂ / ♀ плашка                                | Задокументированное половое различие (ориентир, противопоказание, традиционное показание, данные РКИ).                                                                                                                   |
| ПСЛ / ЗСЛ                                   | Передняя / задняя срединная линия.                                                                                                                                                                                       |
| цунь (寸, B-cun)                             | Пропорциональная единица длины, у каждого человека своя (раздел 4).                                                                                                                                                      |
| (трад.)                                     | Показание взято из традиционной литературы и в клинических испытаниях не подтверждено.                                                                                                                                   |

## 1.3. Принцип «не придумывать»: откуда взяты данные

|                          |                                           |                                    |                        |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Локализации<br>WHO 2008. | Категории точек<br>Классические категории | Показания<br>Традиционные, кратко. | Наука<br>Рецензируемые |
|--------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|

Формулировки  
сокращены и  
переведены,  
анатомическая суть  
сохранена.



(пять шу-точек, юань,  
ло, си, бэй-шу, мю, хуэй  
и др.) по стандартным  
учебникам ТКМ.



Это не доказанные  
клинические эффекты.



публикации (раздел 14):  
РКИ, метаанализы,  
обзоры Cochrane,  
клинические  
руководства.

### ОБ ИЛЛЮСТРАЦИЯХ — ЧЕСТНО

Схемы в издании — **упрощённые топографические диаграммы**, построенные по координатам анатомических ориентиров из стандарта ВОЗ. Они показывают порядок точек, ход канала и взаимное расположение, но **не заменяют анатомический атлас**. Двусторонние точки показаны на одной стороне тела. Для точной локализации опирайтесь на текстовое описание в таблице и на официальный атлас: WHO Standard Acupuncture Point Locations (2008) или GB/T 12346-2021. Реалистичные рисунки меридианов в открытом доступе (Public Domain) есть на Wikimedia Commons, в категории *Meridian (Chinese medicine)*.

## 2 Современная китайская акупунктура

**Краткий вывод.** Современная китайская акупунктура (现代针灸) объединяет классическую систему каналов и точек, стандартизированную на государственном и международном уровне, с методами биомедицины: электростимуляцией, нейроанатомической локализацией, рандомизированными испытаниями. Её теоретическое ядро (ци, каналы) остаётся традиционной концептуальной моделью. Отдельные клинические эффекты процедуры, прежде всего при хронической боли и тошноте, подтверждены исследованиями.

### 2.1. Временная линия

| Период                             | Событие                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эпоха Хань (ок. II–I вв. до н. э.) | Формирование канона «Хуанди нэйцзин» (黄帝内经); раздел «Линшу» описывает систему каналов и иглоукалывание.                                                                                                                                |
| III в. н. э.                       | Хуанфу Ми — «Чжэньцзю цзяи цзин» (针灸甲乙经), первый систематический трактат по акупунктуре и прижиганию.                                                                                                                                  |
| 1027 г.                            | Ван Вэйи создаёт бронзовые учебные фигуры и трактат «Тун жэнь шусюэ чжэньцзю ту цзин».                                                                                                                                                 |
| 1601 г.                            | Ян Цзичжоу — «Чжэньцзю дачэн» (针灸大成), крупный компендиум эпохи Мин.                                                                                                                                                                    |
| 1817 г.                            | Ли Сюэчуань — «Чжэньцзю фэнъюань»: фиксирует классическое число 361 точки на 14 каналах.                                                                                                                                               |
| 1822 г.                            | Указом императора Даогуана акупунктура исключена из Императорской медицинской академии.                                                                                                                                                |
| 1950-е гг.                         | Институционализация ТКМ в КНР: университеты, НИИ, интеграция с западной медициной. С конца 1950-х — исследования «акупунктурной анальгезии».                                                                                           |
| 1970-е гг.                         | Рост интереса на Западе. Работы Хань Цзишэна (Пекинский университет) о роли эндогенных опиоидов в электроакупунктуре.                                                                                                                  |
| 1991 г.                            | ВОЗ публикует стандартную международную номенклатуру точек акупунктуры.                                                                                                                                                                |
| 2008 г.                            | WHO Standard Acupuncture Point Locations in the Western Pacific Region: единые локализации 361 точки.                                                                                                                                  |
| 2010 г.                            | ЮНЕСКО включает «Акупунктуру и прижигание традиционной китайской медицины» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия.                                                                                             |
| 2021 г.                            | Национальный стандарт КНР GB/T 12346-2021 «Наименования и расположение точек акупунктуры». Публикация в <i>Nature</i> (Liu et al.) о нейроанатомической основе электроакупунктуры ST36 у мышей (ось «блуждающий нерв — надпочечники»). |

### 2.2. Что считается «современной» китайской акупунктурой

### ТРАДИЦИОННОЕ ЯДРО

- 12 основных каналов, 8 чудесных сосудов, коллатерали ло;
- 361 классическая точка и внеканальные точки;
- дифференциация синдромов (辨证), принципы подбора точек;
- прижигание (мокса), банки, гуаша как смежные методы.

### СОВРЕМЕННЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

- стандартизация локализаций и номенклатуры (ВОЗ, GB/T);
- электроакупунктура с заданной частотой и интенсивностью;
- скальповая (краниальная) и аурикулярная акупунктура;
- анатомически ориентированное иглоукалывание (dry needling);
- РКИ с плацебо-контролем, нейровизуализация, изучение механизмов на моделях.

### 3 Три уровня знания

В теме постоянно смешиваются три разных утверждения. Их нужно различать: наука отвечает на каждое по-своему.

**① ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ**

Ци циркулирует по каналам, связанным с органами. Точки — «отверстия» (穴), где можно воздействовать на поток.

**Статус:** концептуальная модель. Каналы как отдельные анатомические или физические структуры не обнаружены.

**② МЕХАНИЗМЫ**

Стимуляция иглой активирует афферентные нервные волокна. Дальше подключаются спинальные и супраспинальные механизмы контроля боли: эндогенные опиоиды (энкефалины, β-эндорфин, динарфин), диффузный ноцицептивный тормозной контроль, вегетативные рефлексы, локальные эффекты в соединительной ткани.

**Статус:** многое показано в эксперименте, у человека изучено частично.

**③ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ**

Метаанализы показывают умеренный эффект при хронической боли (спина, шея, остеоартроз, головная боль) и при тошноте (PC6). Разница с «фиктивной» акупунктурой обычно меньше, чем с отсутствием лечения.

**Статус:** частично подтверждён; величина специфического эффекта — предмет дискуссий.

**ПРАКТИЧЕСКОЕ СЛЕДСТВИЕ**

Эффективность процедуры при некоторых состояниях не доказывает теорию меридианов, и наоборот. Поэтому в издании традиционные показания помечены «(трад.)», а клинические данные собраны в разделах 10 и 12.

#### 3.1. Ключевые механизмы (по данным экспериментальных исследований)

| Механизм              | Суть                                                                                                                                                                                                                           | Источник                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Эндогенные опиоиды    | Низкочастотная электроакупунктура (~2 Гц) преимущественно повышает энкефалины и β-эндорфин, высокочастотная (~100 Гц) — динарфин.                                                                                              | Han J.S., 2003–2004                           |
| Вегетативные рефлексы | Электростимуляция ST36 у мышей низкой интенсивности активирует ось «блуждающий нерв — надпочечники» через нейроны, экспрессирующие PROKR2, и снижает системное воспаление. Эффект зависит от места и интенсивности стимуляции. | Liu S. et al., <i>Nature</i> , 2021           |
| Аденозин (локально)   | Вращение иглы у мышей повышает местный аденозин; анальгезия зависит от A1-рецепторов.                                                                                                                                          | Goldman N. et al., <i>Nat Neurosci</i> , 2010 |
| Контекст и ожидания   | Ритуал, внимание, ожидание — существенная часть клинического эффекта, что видно по результатам «фиктивной» акупунктуры.                                                                                                        | Vickers A.J. et al., 2018                     |

## 4 Локализация точек

Точки ищут тремя способами: по анатомическим ориентирам (кости, мышцы, складки, соски, пупок), по **пропорциональному костному цуню** (B-cun) и по пальцевому цуню. Основной метод стандарта ВОЗ — пропорциональный: расстояние между двумя ориентирами делится на фиксированное число цуней. Поэтому система одинаково работает для мужчин, женщин и людей любого роста.

### 4.1. Пропорциональные отрезки (B-cun), WHO 2008

| Область | Отрезок                                                                          | Цуней |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Голова  | Передняя линия роста волос — задняя линия роста волос (по срединной линии)       | 12    |
| Голова  | Глабелла (середина между бровями) — передняя линия роста волос                   | 3     |
| Голова  | Задняя линия роста волос — остистый отросток C7                                  | 3     |
| Голова  | Между углами лба у передней линии роста волос (ST8–ST8)                          | 9     |
| Голова  | Между сосцевидными отростками                                                    | 9     |
| Грудь   | Надгрудинная ямка — грудино-мечевидное соединение                                | 9     |
| Грудь   | Между сосками (у мужчин); у женщин — по ширине, эквивалентной межсосковой        | 8     |
| Живот   | Грудино-мечевидное соединение — центр пупка                                      | 8     |
| Живот   | Центр пупка — верхний край лобкового симфиза                                     | 5     |
| Спина   | Между медиальными краями лопаток                                                 | 6     |
| Бок     | Вершина подмышечной впадины — свободный конец 11-го ребра                        | 12    |
| Рука    | Передняя (задняя) подмышечная складка — локтевая складка                         | 9     |
| Рука    | Локтевая складка — складка запястья                                              | 12    |
| Нога    | Верхний край лобкового симфиза — основание надколенника                          | 18    |
| Нога    | Вершина большого вертела — подколенная складка                                   | 19    |
| Нога    | Ягодичная складка — подколенная складка                                          | 14    |
| Нога    | Подколенная складка — выступ латеральной лодыжки                                 | 16    |
| Нога    | Нижний край медиального мыщелка большеберцовой кости — выступ медиальной лодыжки | 13    |
| Нога    | Выступ медиальной лодыжки — подошва                                              | 3     |

### ПАЛЬЦЕВОЙ ЦУНЬ (F-CUN)

- **1 цунь** — ширина межфалангового сустава большого пальца пациента;
- **1 цунь** — расстояние между концами складок средней фаланги согнутого среднего пальца;
- **3 цуня** — ширина четырёх сомкнутых пальцев (II–V) на уровне проксимальных межфаланговых суставов.

Пальцевой цунь — вспомогательный метод, при расхождении приоритет у пропорционального.

### МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ ТЕЛО В ИЗМЕРЕНИИ

Пропорциональная система не зависит от пола. Исключение — ориентир «сосок»: у женщин его положение вариабельно, поэтому точки груди отсчитывают по межреберьям и расстоянию от ПСЛ (4 цуня — сосковая линия; 6 цуней — латеральная линия SP). У CV1 ориентиры промежности различаются по полу; это описано в самом стандарте ВОЗ (раздел 9).

## 5 Классификация точек и система каналов

### 5.1. Специальные категории точек (традиционная систематика)

| Категория                                    | Описание                                                                                                                                   | Примеры                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пять шу-точек (五输穴)                          | На каждом из 12 каналов дистальнее локтя или колена: цзин-колодец, ин-ручей, шу-поток, цзин-река, хэ-море. Соотносятся с пятью элементами. | LU11, LU10, LU9, LU8, LU5                                                                                                              |
| Юань (原穴), «источник»                        | По одной на каждом из 12 каналов, в области запястья или голеностопа.                                                                      | LU9, LI4, ST42, LR3                                                                                                                    |
| Ло (络穴), «связующая»                         | Место отхождения коллатерали к парному каналу. Всего 15 (12 + CV15, GV1, SP21).                                                            | LU7, PC6, SP4, ST40                                                                                                                    |
| Си-щель (郄穴)                                 | Точки «накопления», традиционно применяются при острых состояниях. Всего 16.                                                               | LU6, ST34, SP8, PC4                                                                                                                    |
| Бэй-шу (背俞穴)                                 | На спине (линия BL в 1,5 цуня от ЗСЛ), связаны с органами.                                                                                 | BL13 (лёгкие), BL23 (почки)                                                                                                            |
| Мю (募穴)                                      | На груди и животе, «точки сбора» органов.                                                                                                  | LU1, CV12, ST25, LR14                                                                                                                  |
| Восемь точек-собирателей (八会穴)               | Связаны с тканями и субстанциями.                                                                                                          | LR13 (плотные органы), CV12 (полые органы), CV17 (ци), BL17 (кровь), GB34 (сухожилия), LU9 (сосуды), BL11 (кости), GB39 (костный мозг) |
| Нижние хэ-точки (下合穴)                        | Точки полых органов на ноге.                                                                                                               | ST36, ST37, ST39, BL39, BL40, GB34                                                                                                     |
| Восемь точек-ключей чудесных сосудов (八脉交会穴) | Открывают чудесные сосуды, применяются парами.                                                                                             | SP4-PC6, SI3-BL62, GB41-TE5, LU7-KI6                                                                                                   |

### 5.2. Восемь чудесных сосудов (奇经八脉)

| Сосуд                          | Код | Точка-ключ | Ход (кратко)                                                                        |
|--------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ду-май 督脉 (заднесрединный)     | GV  | SI3        | Промежность → по позвоночнику → макушка → верхняя десна; собственные точки GV1-GV28 |
| Жэнь-май 任脉 (переднесрединный) | CV  | LU7        | Промежность → по ПСЛ → подбородок; собственные точки CV1-CV24                       |
| Чун-май 冲脉                     | —   | SP4        | Из малого таза вместе с каналом почек (KI11-KI21)                                   |
| Дай-май 带脉 («опоясывающий»)    | —   | GB41       | Опоясывает талию: LR13, GB26-GB28                                                   |
| Инь-цяо 阴跷脉                    | —   | KI6        | От медиальной лодыжки к внутреннему углу глаза                                      |
| Ян-цяо 阳跷脉                     | —   | BL62       | От латеральной лодыжки к внутреннему углу глаза и затылку                           |
| Инь-вэй 阴维脉                    | —   | PC6        | Связывает иньские каналы (KI9 → CV22-23)                                            |
| Ян-вэй 阳维脉                     | —   | TE5        | Связывает янские каналы (BL63 → GV15-16)                                            |

### 5.3. Порядок циркуляции 12 каналов (традиционная модель)






Иньские каналы руки идут от груди к пальцам, янские каналы руки — от пальцев к голове, янские каналы ноги — от головы к стопе, иньские каналы ноги — от стопы к груди и животу.

## 6 Атлас 14 каналов — обзорные карты

Цвета каналов одинаковы во всём издании. Точки-триггеры (двойное подчёркивание в таблицах) обведены чёрным кольцом. Двусторонние каналы показаны на одной стороне тела.

- LU · Канал лёгких    LI · Канал толстой кишки    ST · Канал желудка    SP · Канал селезёнки    HT · Канал сердца
- SI · Канал тонкой кишки    BL · Канал мочевого пузыря    KI · Канал почек    PC · Канал перикарда
- TE · Канал тройного обогревателя    GB · Канал желчного пузыря    LR · Канал печени
- GV · Заднесрединный канал (Ду-май)    CV · Переднесрединный канал (Жэнь-май)





Голова, латеральная проекция: ST, SI, BL, TE, GB, GV

## КАК ЧИТАТЬ КАРТЫ

- Линия — наружный ход канала (внутренние ветви не показаны).
- Точка — локализация по опорным ориентирам ВОЗ, в масштабе пропорционального цуня.
- Точки кисти и стопы, лежащие на ладонной или подошвенной стороне (например, KI1, PC8), показаны у края силуэта.
- Схемы упрощены: при расхождении со словесным описанием приоритет у описания.

## ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ


Из грудной клетки (LU1) по передне-латеральной поверхности руки к большому пальцу (LU11).

## ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ

03:00–05:00 (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- LU1 — Мю лёгких
- LU5 — Хэ-море (вода)
- LU6 — Си-щель
- LU7 — Ло; точка-ключ Жэнь-май
- LU8 — Цзин-река (металл)
- LU9 — Шу-поток / Юань; точка-собиратель сосудов
- LU10 — Ин-ручей (огонь)
- LU11 — Цзин-колодец (дерево)



Вид спереди

| Код ВОЗ / название       | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                               | Традиционные показания                        | Категория / метки                |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>LU1</b><br>Zhongfu 中府 | <b>M-LU01</b><br><b>F-LU01</b> | Переднебоковая грудная стенка, на уровне 1-го межреберья, 6 цуней латеральнее передней срединной линии (ПСЛ)         | Кашель, одышка, боль в груди и плече          | Мю лёгких<br><b>TrP</b> <b>!</b> |
| <b>LU2</b><br>Yunmen 云门  | <b>M-LU02</b><br><b>F-LU02</b> | В углублении подключичной ямки, медиальнее клювовидного отростка, 6 цуней латеральнее ПСЛ                            | Кашель, одышка, боль в плече                  | <b>!</b>                         |
| <b>LU3</b><br>Tianfu 天府  | <b>M-LU03</b><br><b>F-LU03</b> | Передне-латеральная поверхность плеча, у латерального края двуглавой мышцы, 3 цуня ниже передней подмышечной складки | Кашель, носовое кровотечение, боль в плече    |                                  |
| <b>LU4</b><br>Xiabai 侠白  | <b>M-LU04</b><br><b>F-LU04</b> | Передне-латеральная поверхность плеча, у латерального края двуглавой мышцы, 4 цуня ниже передней подмышечной складки | Кашель, боль в груди и плече                  |                                  |
| <b>LU5</b><br>Chize 尺泽   | <b>M-LU05</b><br><b>F-LU05</b> | На локтевой складке, в углублении латеральнее сухожилия двуглавой мышцы плеча                                        | Кашель, лихорадка, боль в горле, боль в локте | Хэ-море (вода)                   |
| <b>LU6</b><br>Kongzui 孔最 | <b>M-LU06</b><br><b>F-LU06</b> | Передне-латеральная поверхность предплечья, на линии LU5–LU9, 7 цуней проксимальнее ладонной складки запястья        | Кровохарканье, кашель, боль в горле           | Си-щель                          |

| Код ВОЗ / название          | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                              | Традиционные показания                                 | Категория / метки                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LU7</b><br>Lieque 列缺     | <b>M-LU07</b><br><b>F-LU07</b> | Радиальный край предплечья, между сухожилиями длинной отводящей и короткого разгибателя большого пальца, в борозде длинной отводящей мышцы, 1,5 цуня проксимальнее складки запястья | Кашель, головная боль, скованность шеи                 | Ло; точка-ключ<br>Жэнь-май                                                                                                       |
| <b>LU8</b><br>Jingqu 经渠     | <b>M-LU08</b><br><b>F-LU08</b> | Передне-латеральная поверхность предплечья, между шиловидным отростком лучевой кости и лучевой артерией, 1 цунь проксимальнее складки запястья                                      | Кашель, боль в горле, боль в запястье                  | Цзин-река (металл)<br>                        |
| <b>LU9</b><br>Taiyuan 太渊    | <b>M-LU09</b><br><b>F-LU09</b> | Передне-латеральная сторона запястья, между шиловидным отростком лучевой кости и ладьевидной костью, в углублении локтевое сухожилия длинной отводящей мышцы большого пальца        | Кашель, одышка, слабый пульс (трад.)                   | Шу-поток / Юань; точка-собиратель сосудов<br> |
| <b>LU10</b><br>Yuji 鱼际      | <b>M-LU10</b><br><b>F-LU10</b> | Латеральнее середины 1-й пястной кости, на границе ладонной и тыльной кожи                                                                                                          | Кашель, боль в горле, лихорадка                        | Ин-ручей (огонь)                                                                                                                 |
| <b>LU11</b><br>Shaoshang 少商 | <b>M-LU11</b><br><b>F-LU11</b> | Большой палец кисти, радиальнее дистальной фаланги, 0,1 цуня от радиального угла ногтевого ложа                                                                                     | Боль в горле, лихорадка; в традиции — неотложная точка | Цзин-колодец (дерево)                                                                                                            |



## 6.2 Канал толстой кишки

Large Intestine Meridian · 手阳明大肠经 · Шоу ян-мин

20 точек  
5 TrP · 1 Б

### ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ


От указательного пальца (LI1) по задне-латеральной поверхности руки, через плечо и шею к крылу носа (LI20).

### ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ


05:00–07:00 (концепция цзы-у лю-чжу;  
научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- LI1 — Цзин-колодец
- LI2 — Ин-ручей
- LI3 — Шу-поток
- LI4 — Юань
- LI5 — Цзин-река
- LI6 — Ло
- LI7 — Си-щель
- LI11 — Хэ-море



Вид сзади



Вид спереди

| Код ВОЗ / название           | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                             | Традиционные показания                                      | Категория / метки           |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>LI1</b><br>Shangyang 商阳   | <b>M-LI01</b><br><b>F-LI01</b> | Указательный палец, радиальнее дистальной фаланги, 0,1 цуня от радиального угла ногтевого ложа                                     | Боль в горле, зубная боль, лихорадка                        | Цзин-колодец                |
| <b>LI2</b><br>Erjian 二间      | <b>M-LI02</b><br><b>F-LI02</b> | Указательный палец, в углублении дистальнее радиальной стороны 2-го пястно-фалангового сустава, на границе ладонной и тыльной кожи | Носовое кровотечение, зубная боль, боль в горле             | Ин-ручей                    |
| <b>LI3</b><br>Sanjian 三间     | <b>M-LI03</b><br><b>F-LI03</b> | Тыл кисти, в углублении радиальнее и проксимальнее 2-го пястно-фалангового сустава                                                 | Зубная боль, боль в горле, боль в пальцах                   | Шу-поток                    |
| <b>LI4</b><br><u>Hegu</u> 合谷 | <b>M-LI04</b><br><b>F-LI04</b> | Тыл кисти, радиальнее середины 2-й пястной кости<br><br>♂ —<br>♀ Избегать при беременности (классическая традиция)                 | Головная боль, зубная боль, лицевая боль, заложенность носа | Юань<br><b>TrP</b> <b>Б</b> |
| <b>LI5</b><br>Yangxi 阳溪      | <b>M-LI05</b><br><b>F-LI05</b> | Задне-латеральная сторона запястья, на радиальной стороне тыльной складки, в «анатомической табакерке»                             | Головная боль, боль в запястье                              | Цзин-река                   |
| <b>LI6</b><br>Pianli 偏历      | <b>M-LI06</b><br><b>F-LI06</b> | Задне-латеральная поверхность предплечья, на линии LI5–LI11, 3 цуня проксимальнее тыльной складки запястья                         | Носовое кровотечение, отёки, боль в предплечье              | Ло                          |

| Код ВОЗ / название                  | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                              | Традиционные показания                         | Категория / метки |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>LI7</b><br>Wenliu 温溜             | <b>M-LI07</b><br><b>F-LI07</b> | Задне-латеральная поверхность предплечья, на линии LI5–LI11, 5 цуней проксимальнее тыльной складки запястья         | Головная боль, боль в горле, боль в предплечье | Си-щель           |
| <b>LI8</b><br>Xialian 下廉            | <b>M-LI08</b><br><b>F-LI08</b> | Задне-латеральная поверхность предплечья, на линии LI5–LI11, 4 цуня дистальнее LI11                                 | Боль в локте и руке, боли в животе             |                   |
| <b>LI9</b><br>Shanglian 上廉          | <b>M-LI09</b><br><b>F-LI09</b> | Задне-латеральная поверхность предплечья, на линии LI5–LI11, 3 цуня дистальнее LI11                                 | Боль в плече и руке, онемение                  |                   |
| <b>LI10</b><br><u>Shousanli</u> 手三里 | <b>M-LI10</b><br><b>F-LI10</b> | Задне-латеральная поверхность предплечья, на линии LI5–LI11, 2 цуня дистальнее LI11                                 | Боль и слабость в руке, боль в плече           | TrP               |
| <b>LI11</b><br><u>Quchi</u> 曲池      | <b>M-LI11</b><br><b>F-LI11</b> | Латеральная сторона локтя, в середине линии между LU5 и латеральным надмыщелком плечевой кости                      | Лихорадка, кожный зуд, боль в локте            | Хэ-море<br>TrP    |
| <b>LI12</b><br>Zhouliao 肘髎          | <b>M-LI12</b><br><b>F-LI12</b> | Задне-латеральная сторона локтя, выше латерального надмыщелка, спереди от латерального надмыщелкового гребня        | Боль и онемение в локте                        |                   |
| <b>LI13</b><br>Shouwuli 手五里         | <b>M-LI13</b><br><b>F-LI13</b> | Латеральная поверхность плеча, на линии LI11–LI15, 3 цуня проксимальнее локтевой складки                            | Боль в локте и плече                           | !                 |
| <b>LI14</b><br><u>Binao</u> 臂臑      | <b>M-LI14</b><br><b>F-LI14</b> | Латеральная поверхность плеча, у переднего края дельтовидной мышцы, 7 цуней выше LI11                               | Боль в плече и руке                            | TrP               |
| <b>LI15</b><br><u>Jianyu</u> 肩髃     | <b>M-LI15</b><br><b>F-LI15</b> | Плечевой пояс, в углублении между передним концом латерального края акромиона и большим бугорком плечевой кости     | Боль и ограничение движений в плече            | TrP               |
| <b>LI16</b><br>Jugu 巨骨              | <b>M-LI16</b><br><b>F-LI16</b> | Плечевой пояс, в углублении между акромиальным концом ключицы и остью лопатки                                       | Боль в плече                                   | !                 |
| <b>LI17</b><br>Tianding 天鼎          | <b>M-LI17</b><br><b>F-LI17</b> | Переднебоковая область шеи, на уровне перстневидного хряща, у заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы (ГКС) | Боль в горле, осиплость                        |                   |
| <b>LI18</b><br>Futu 扶突              | <b>M-LI18</b><br><b>F-LI18</b> | Переднебоковая область шеи, на уровне верхнего края щитовидного хряща, между передним и задним краями ГКС           | Кашель, осиплость, боль в горле                | !                 |
| <b>LI19</b><br>Kouheliao 口禾髎        | <b>M-LI19</b><br><b>F-LI19</b> | Лицо, на уровне нижнего края ноздри, прямо под латеральным краем ноздри                                             | Заложенность носа, носовое кровотечение        |                   |
| <b>LI20</b><br>Yingxiang 迎香         | <b>M-LI20</b><br><b>F-LI20</b> | В носогубной складке, на уровне середины латерального края крыла носа                                               | Заложенность носа, ринит, лицевая боль         |                   |

# ST 6.3 Канал желудка

Stomach Meridian · 足阳明胃经 · Цзу ян-мин

45 точек  
5 TrP · 6 Б

## ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ


От подглазничной области (ST1) по лицу, шее, груди, животу, передней поверхности бедра и голени ко 2-му пальцу стопы (ST45).

## ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ

07:00–09:00 (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- ST25 — Мю толстой кишки
- ST34 — Си-щель
- ST36 — Хэ-море; нижняя хэ-точка желудка
- ST37 — Нижняя хэ-точка толстой кишки
- ST39 — Нижняя хэ-точка тонкой кишки
- ST40 — Ло
- ST41 — Цзин-река
- ST42 — Юань
- ST43 — Шу-поток
- ST44 — Ин-ручей
- ST45 — Цзин-колодец



Вид спереди

| Код ВОЗ / название       | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                                   | Традиционные показания                       | Категория / метки |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>ST1</b><br>Chengqi 承泣 | <b>M-ST01</b><br><b>F-ST01</b> | Лицо, между глазным яблоком и нижним краем глазницы, прямо под зрачком                                                   | Покраснение и боль глаз, слезотечение        | !                 |
| <b>ST2</b><br>Sibai 四白   | <b>M-ST02</b><br><b>F-ST02</b> | Лицо, в подглазничном отверстии                                                                                          | Боль и зуд глаз, лицевая боль                |                   |
| <b>ST3</b><br>Juliao 巨髎  | <b>M-ST03</b><br><b>F-ST03</b> | Лицо, прямо под зрачком, на уровне нижнего края крыла носа                                                               | Лицевая боль, зубная боль                    |                   |
| <b>ST4</b><br>Dicang 地仓  | <b>M-ST04</b><br><b>F-ST04</b> | Лицо, 0,4 цуня латеральнее угла рта                                                                                      | Слюнотечение, парез лица                     |                   |
| <b>ST5</b><br>Daying 大迎  | <b>M-ST05</b><br><b>F-ST05</b> | Лицо, кпереди от угла нижней челюсти, в углублении у переднего края прикрепления жевательной мышцы, над лицевой артерией | Зубная боль, отёк щеки                       | !                 |
| <b>ST6</b><br>Jiache 颊车  | <b>M-ST06</b><br><b>F-ST06</b> | Лицо, на ширину одного поперечного пальца (среднего) кпереди и кверху от угла нижней челюсти                             | Зубная боль, тризм, лицевая боль             | TrP               |
| <b>ST7</b><br>Xiaguan 下关 | <b>M-ST07</b><br><b>F-ST07</b> | Лицо, в углублении между серединой нижнего края скуловой дуги и вырезкой нижней челюсти                                  | Боль в ВНЧС, зубная боль, шум в ушах         | TrP               |
| <b>ST8</b><br>Touwei 头维  | <b>M-ST08</b><br><b>F-ST08</b> | Голова, 0,5 цуня выше передней линии роста волос в углу лба, 4,5 цуня латеральнее ПСЛ                                    | Головная боль, головокружение, боль в глазах |                   |

| Код ВОЗ / название           | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                | Традиционные показания                                       | Категория / метки     |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ST9</b><br>Renying 人迎     | <b>M-ST09</b><br><b>F-ST09</b> | Переднебоковая область шеи, на уровне верхнего края щитовидного хряща, у переднего края ГКС, над общей сонной артерией                                                | Боль в горле, одышка                                         | !                     |
| <b>ST10</b><br>Shuitu 水突     | <b>M-ST10</b><br><b>F-ST10</b> | Переднебоковая область шеи, на уровне перстневидного хряща, у переднего края ГКС                                                                                      | Боль в горле, кашель                                         |                       |
| <b>ST11</b><br>Qishe 气舍      | <b>M-ST11</b><br><b>F-ST11</b> | Переднебоковая область шеи, в малой надключичной ямке, между грудинной и ключичной головками ГКС, над грудинным концом ключицы                                        | Боль в горле, скованность шеи                                | !                     |
| <b>ST12</b><br>Quepen 缺盆     | <b>M-ST12</b><br><b>F-ST12</b> | В большой надключичной ямке, 4 цуня латеральнее ПСЛ, в углублении над верхним краем ключицы                                                                           | Кашель, боль в надключичной области                          | !                     |
| <b>ST13</b><br>Qihu 气户       | <b>M-ST13</b><br><b>F-ST13</b> | Передняя грудная стенка, под ключицей, 4 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                         | Кашель, одышка, боль в груди                                 | !                     |
| <b>ST14</b><br>Kufang 库房     | <b>M-ST14</b><br><b>F-ST14</b> | Передняя грудная стенка, в 1-м межреберье, 4 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                     | Кашель, чувство распираания в груди                          | !                     |
| <b>ST15</b><br>Wuyi 屋翳       | <b>M-ST15</b><br><b>F-ST15</b> | Передняя грудная стенка, во 2-м межреберье, 4 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                    | Кашель, боль в груди                                         | !                     |
| <b>ST16</b><br>Yingchuang 膺窗 | <b>M-ST16</b><br><b>F-ST16</b> | Передняя грудная стенка, в 3-м межреберье, 4 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                     | Кашель, боль в груди                                         | !                     |
| <b>ST17</b><br>Ruzhong 乳中    | <b>M-ST17</b><br><b>F-ST17</b> | Передняя грудная стенка, в центре соска<br>♂ Ориентир положения ЗСЛ/сосковой линии<br>♀ У женщин положение соска вариабельно — отсчёт по межреберьям и 4 цуням от ПСЛ | Служит ориентиром; иглоукалывание и прижигание не проводятся |                       |
| <b>ST18</b><br>Rugen 乳根      | <b>M-ST18</b><br><b>F-ST18</b> | Передняя грудная стенка, в 5-м межреберье, 4 цуня латеральнее ПСЛ<br>♂ —<br>♀ Лежит у основания молочной железы; trad. — лактация                                     | Кашель, боль в груди; в традиции — недостаток лактации       | !                     |
| <b>ST19</b><br>Burong 不容     | <b>M-ST19</b><br><b>F-ST19</b> | Верхняя часть живота, 6 цуней выше центра пупка, 2 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                               | Боль в эпигастрии, рвота                                     |                       |
| <b>ST20</b><br>Chengman 承满   | <b>M-ST20</b><br><b>F-ST20</b> | Верхняя часть живота, 5 цуней выше центра пупка, 2 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                               | Боль в эпигастрии, вздутие                                   |                       |
| <b>ST21</b><br>Liangmen 梁门   | <b>M-ST21</b><br><b>F-ST21</b> | Верхняя часть живота, 4 цуня выше центра пупка, 2 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                | Боль в эпигастрии, рвота, снижение аппетита                  |                       |
| <b>ST22</b><br>Guanmen 关门    | <b>M-ST22</b><br><b>F-ST22</b> | Верхняя часть живота, 3 цуня выше центра пупка, 2 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                | Вздутие, боль в животе                                       |                       |
| <b>ST23</b><br>Taiyi 太乙      | <b>M-ST23</b><br><b>F-ST23</b> | Верхняя часть живота, 2 цуня выше центра пупка, 2 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                | Боль в эпигастрии, беспокойство                              |                       |
| <b>ST24</b><br>Huaroumen 滑肉门 | <b>M-ST24</b><br><b>F-ST24</b> | Верхняя часть живота, 1 цунь выше центра пупка, 2 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                | Боль в эпигастрии, рвота                                     |                       |
| <b>ST25</b><br>Tianshu 天枢    | <b>M-ST25</b><br><b>F-ST25</b> | Живот, 2 цуня латеральнее центра пупка                                                                                                                                | Диарея, запор, боль в животе                                 | Мю толстой кишки<br>Б |

| Код ВОЗ / название                  | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                      | Традиционные показания                                                         | Категория / метки                              |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>ST26</b><br>Wailing 外陵           | <b>M-ST26</b><br><b>F-ST26</b> | Нижняя часть живота, 1 цунь ниже центра пупка, 2 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                       | Боль в животе                                                                  | <b>Б</b>                                       |
| <b>ST27</b><br>Daju 大巨              | <b>M-ST27</b><br><b>F-ST27</b> | Нижняя часть живота, 2 цуня ниже центра пупка, 2 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                       | Вздутие внизу живота, затруднённое мочеиспускание                              | <b>Б</b>                                       |
| <b>ST28</b><br>Shuidao 水道           | <b>M-ST28</b><br><b>F-ST28</b> | Нижняя часть живота, 3 цуня ниже центра пупка, 2 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                       | Затруднённое мочеиспускание, отёки, боль внизу живота                          | <b>Б</b>                                       |
| <b>ST29</b><br>Guilai 归来            | <b>M-ST29</b><br><b>F-ST29</b> | Нижняя часть живота, 4 цуня ниже центра пупка, 2 цуня латеральнее ПСЛ<br>♂ Трад. — паховая грыжа<br>♀ Трад. — аменорея, дисменорея                                          | Боль внизу живота; традиционно — нарушения менструального цикла, паховая грыжа | <b>Б</b>                                       |
| <b>ST30</b><br>Qichong 气冲           | <b>M-ST30</b><br><b>F-ST30</b> | Паховая область, на уровне верхнего края лобкового симфиза, 2 цуня латеральнее ПСЛ, над пульсацией бедренной артерии                                                        | Боль в паху, урогенитальные нарушения (трад.)                                  | <b>Б</b> <b>!</b>                              |
| <b>ST31</b><br>Biguan 髀关            | <b>M-ST31</b><br><b>F-ST31</b> | Передняя поверхность бедра, в углублении между проксимальными частями прямой мышцы бедра, портняжной мышцы и мышцы, напрягающей широкую фасцию                              | Боль в бедре, слабость ноги                                                    |                                                |
| <b>ST32</b><br><u>Futu</u> 伏兔       | <b>M-ST32</b><br><b>F-ST32</b> | Передне-латеральная поверхность бедра, на линии от латерального края основания надколенника к передней верхней подвздошной ости (ПВПО), 6 цуней выше основания надколенника | Боль и слабость в ноге                                                         | <b>TrP</b>                                     |
| <b>ST33</b><br>Yinshi 阴市            | <b>M-ST33</b><br><b>F-ST33</b> | Передне-латеральная поверхность бедра, латеральнее сухожилия прямой мышцы бедра, 3 цуня выше основания надколенника                                                         | Онемение, боль в колене                                                        |                                                |
| <b>ST34</b><br>Liangqiu 梁丘          | <b>M-ST34</b><br><b>F-ST34</b> | Передне-латеральная поверхность бедра, между латеральной широкой мышцей и латеральным краем сухожилия прямой мышцы бедра, 2 цуня выше основания надколенника                | Боль в колене, острая боль в эпигастрии (трад.)                                | Си-цель                                        |
| <b>ST35</b><br>Dubi 犊鼻              | <b>M-ST35</b><br><b>F-ST35</b> | Передняя поверхность колена, в углублении латеральнее связки надколенника                                                                                                   | Боль и отёк колена                                                             |                                                |
| <b>ST36</b><br><u>Zusanli</u> 足三里   | <b>M-ST36</b><br><b>F-ST36</b> | Передняя поверхность голени, на линии ST35–ST41, 3 цуня ниже ST35                                                                                                           | Боль в эпигастрии, тошнота, вздутие, общая слабость (трад.)                    | Хэ-море; нижняя хэ-точка желудка<br><b>TrP</b> |
| <b>ST37</b><br><u>Shangjuxu</u> 上巨虚 | <b>M-ST37</b><br><b>F-ST37</b> | Передняя поверхность голени, на линии ST35–ST41, 6 цуней ниже ST35                                                                                                          | Диарея, боль в животе                                                          | Нижняя хэ-точка толстой кишки<br><b>TrP</b>    |
| <b>ST38</b><br>Tiaokou 条口           | <b>M-ST38</b><br><b>F-ST38</b> | Передняя поверхность голени, на линии ST35–ST41, 8 цуней ниже ST35                                                                                                          | Боль в плече (трад.), боль в голени                                            |                                                |
| <b>ST39</b><br>Xiajuxu 下巨虚          | <b>M-ST39</b><br><b>F-ST39</b> | Передняя поверхность голени, на линии ST35–ST41, 9 цуней ниже ST35                                                                                                          | Боль внизу живота, диарея                                                      | Нижняя хэ-точка тонкой кишки                   |

| Код ВОЗ / название          | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                    | Традиционные показания                       | Категория / метки                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ST40</b><br>Fenglong 丰隆  | <b>M-ST40</b><br><b>F-ST40</b> | Передне-латеральная поверхность голени, у латерального края передней большеберцовой мышцы, 8 цуней выше выступа латеральной лодыжки                       | Кашель с мокротой, головокружение (трад.)    | Ло                                                                                          |
| <b>ST41</b><br>Jiexi 解溪     | <b>M-ST41</b><br><b>F-ST41</b> | Передняя поверхность голеностопного сустава, в углублении в центре, между сухожилиями длинного разгибателя большого пальца и длинного разгибателя пальцев | Боль в голеностопе, головная боль            | Цзин-река                                                                                   |
| <b>ST42</b><br>Chongyang 冲阳 | <b>M-ST42</b><br><b>F-ST42</b> | Тыл стопы, в месте сочленения основания 2-й плюсневой кости с промежуточной клиновидной костью, над пульсацией тыльной артерии стопы                      | Боль в стопе, лицевая боль                   | Юань<br> |
| <b>ST43</b><br>Xiangu 陷谷    | <b>M-ST43</b><br><b>F-ST43</b> | Тыл стопы, между 2-й и 3-й плюсневыми костями, в углублении проксимальнее 2-го плюснефалангового сустава                                                  | Отек лица, боль в стопе                      | Шу-поток                                                                                    |
| <b>ST44</b><br>Neiting 内庭   | <b>M-ST44</b><br><b>F-ST44</b> | Тыл стопы, между 2-м и 3-м пальцами, проксимальнее края межпальцевой перепонки, на границе тыльной и подошвенной кожи                                     | Зубная боль, носовое кровотечение, лихорадка | Ин-ручей                                                                                    |
| <b>ST45</b><br>Lidui 厉兑     | <b>M-ST45</b><br><b>F-ST45</b> | 2-й палец стопы, латеральнее дистальной фаланги, 0,1 цуня от латерального угла ногтевого ложа                                                             | Лихорадка, нарушения сна (трад.)             | Цзин-колодец                                                                                |

## ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ


От большого пальца стопы (SP1) по медиальной поверхности ноги, живота и боковой груди к 6-му межреберью (SP21).

## ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ

09:00–11:00 (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- SP1 — Цзин-колодец
- SP2 — Ин-ручей
- SP3 — Шу-поток / Юань
- SP4 — Ло; точка-ключ Чун-май
- SP5 — Цзин-река
- SP6 — Пересечение трёх иньских каналов ноги
- SP8 — Си-щель
- SP9 — Хэ-море
- SP21 — Большая ло селезёнки



Вид спереди

| Код ВОЗ / название        | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                  | Традиционные показания                 | Категория / метки      |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| <b>SP1</b><br>Yinbai 隐白   | <b>M-SP01</b><br><b>F-SP01</b> | Большой палец стопы, медиальнее дистальной фаланги, 0,1 цуня от медиального угла ногтевого ложа<br><br>♂ —<br>♀ Трад. — маточные кровотечения           | Маточные кровотечения (трад.), вздутие | Цзин-колодец           |
| <b>SP2</b><br>Dadu 大都     | <b>M-SP02</b><br><b>F-SP02</b> | Большой палец стопы, в углублении дистальнее 1-го плюснефалангового сустава, на границе тыльной и подошвенной кожи                                      | Вздутие, лихорадка                     | Ин-ручей               |
| <b>SP3</b><br>Taibai 太白   | <b>M-SP03</b><br><b>F-SP03</b> | Медиальная сторона стопы, в углублении проксимальнее 1-го плюснефалангового сустава, на границе тыльной и подошвенной кожи                              | Вздутие, диарея, ощущение тяжести      | Шу-поток / Юань        |
| <b>SP4</b><br>Gongsun 公孙  | <b>M-SP04</b><br><b>F-SP04</b> | Медиальная сторона стопы, передне-нижнее основания 1-й плюсневой кости, на границе тыльной и подошвенной кожи                                           | Боль в эпигастрии, рвота, диарея       | Ло; точка-ключ Чун-май |
| <b>SP5</b><br>Shangqiu 商丘 | <b>M-SP05</b><br><b>F-SP05</b> | Медиальная сторона стопы, передне-нижнее медиальной лодыжки, в углублении посередине между бугристостью ладьевидной кости и выступом медиальной лодыжки | Вздутие, боль в голенистопе            | Цзин-река              |

| Код ВОЗ / название              | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                                                                                     | Традиционные показания                                                       | Категория / метки                                 |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>SP6</b><br>Sanyinjiao 三阴交    | <b>M-SP06</b><br><b>F-SP06</b> | Медиальная поверхность голени, позади медиального края большеберцовой кости, 3 цуня выше выступа медиальной лодыжки<br><br>♂ Трад. — урогенитальные нарушения<br>♀ Трад. — дисменорея, нерегулярные менструации; избегать при беременности | Нарушения менструального цикла, урогенитальные нарушения, бессонница (трад.) | Пересечение трёх иньских каналов ноги<br><b>Б</b> |
| <b>SP7</b><br>Lougou 漏谷         | <b>M-SP07</b><br><b>F-SP07</b> | Медиальная поверхность голени, позади медиального края большеберцовой кости, 6 цуней выше выступа медиальной лодыжки                                                                                                                       | Вздутие, онемение ноги                                                       |                                                   |
| <b>SP8</b><br>Diji 地机           | <b>M-SP08</b><br><b>F-SP08</b> | Медиальная поверхность голени, позади медиального края большеберцовой кости, 3 цуня ниже SP9                                                                                                                                               | Дисменорея (трад.), боль в животе                                            | Си-щель                                           |
| <b>SP9</b><br>Yinlingquan 阴陵泉   | <b>M-SP09</b><br><b>F-SP09</b> | Медиальная поверхность голени, в углублении между нижним краем медиального мыщелка и медиальным краем большеберцовой кости                                                                                                                 | Отёки, затруднённое мочеиспускание, боль в колене                            | Хэ-море                                           |
| <b>SP10</b><br><u>Xuehai</u> 血海 | <b>M-SP10</b><br><b>F-SP10</b> | Передне-медиальная поверхность бедра, на выпуклости медиальной широкой мышцы, 2 цуня выше медиального края основания надколенника                                                                                                          | Нарушения менструального цикла (трад.), кожный зуд                           | <b>ТгР</b>                                        |
| <b>SP11</b><br>Jimen 箕门         | <b>M-SP11</b><br><b>F-SP11</b> | Медиальная поверхность бедра, на границе нижней и средней третей линии от медиального края основания надколенника к SP12, между портняжной и длинной приводящей мышцами, над бедренной артерией                                            | Затруднённое мочеиспускание, боль в паху                                     | <b>!</b>                                          |
| <b>SP12</b><br>Chongmen 冲门      | <b>M-SP12</b><br><b>F-SP12</b> | Паховая область, на паховой складке, латеральнее пульсации бедренной артерии                                                                                                                                                               | Боль в животе, грыжа (трад.)                                                 | <b>!</b>                                          |
| <b>SP13</b><br>Fushe 府舍         | <b>M-SP13</b><br><b>F-SP13</b> | Нижняя часть живота, 4,3 цуня ниже центра пупка, 4 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                                                                                    | Боль внизу живота, грыжа (трад.)                                             | <b>Б</b>                                          |
| <b>SP14</b><br>Fujie 腹结         | <b>M-SP14</b><br><b>F-SP14</b> | Нижняя часть живота, 1,3 цуня ниже центра пупка, 4 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                                                                                    | Боль вокруг пупка, диарея                                                    | <b>Б</b>                                          |
| <b>SP15</b><br>Daheng 大横        | <b>M-SP15</b><br><b>F-SP15</b> | Живот, 4 цуня латеральнее центра пупка                                                                                                                                                                                                     | Запор, диарея, боль в животе                                                 |                                                   |
| <b>SP16</b><br>Fuai 腹哀          | <b>M-SP16</b><br><b>F-SP16</b> | Верхняя часть живота, 3 цуня выше центра пупка, 4 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                                                                                     | Боль в животе, нарушения пищеварения                                         |                                                   |
| <b>SP17</b><br>Shidou 食窦        | <b>M-SP17</b><br><b>F-SP17</b> | Боковая грудная стенка, в 5-м межреберье, 6 цуней латеральнее ПСЛ                                                                                                                                                                          | Боль в боку и груди                                                          | <b>!</b>                                          |
| <b>SP18</b><br>Tianxi 天溪        | <b>M-SP18</b><br><b>F-SP18</b> | Боковая грудная стенка, в 4-м межреберье, 6 цуней латеральнее ПСЛ<br><br>♂ —<br>♀ Трад. — лактация; ткань молочной железы над межреберьем                                                                                                  | Боль в груди, кашель; в традиции — недостаток лактации                       | <b>!</b>                                          |
| <b>SP19</b><br>Xiongxiang 胸乡    | <b>M-SP19</b><br><b>F-SP19</b> | Боковая грудная стенка, в 3-м межреберье, 6 цуней латеральнее ПСЛ                                                                                                                                                                          | Боль и распирание в груди                                                    | <b>!</b>                                          |
| <b>SP20</b><br>Zhourong 周荣      | <b>M-SP20</b><br><b>F-SP20</b> | Боковая грудная стенка, во 2-м межреберье, 6 цуней латеральнее ПСЛ                                                                                                                                                                         | Кашель, распирание в груди                                                   | <b>!</b>                                          |

| Код ВОЗ / название      | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                 | Традиционные показания            | Категория / метки                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SP21</b><br>Dabao 大包 | <b>M-SP21</b><br><b>F-SP21</b> | Боковая грудная стенка, в 6-м межреберье, на средней подмышечной линии | Боль в боку, общая ломота (трад.) | Большая ло<br>селезёнки<br> |

### ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ


Из подмышечной впадины (НТ1) по передне-медиальной поверхности руки к мизинцу (НТ9).

### ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ

11:00–13:00 (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- НТ3 — Хэ-море
- НТ4 — Цзин-река
- НТ5 — Ло
- НТ6 — Си-щель
- НТ7 — Шу-поток / Юань
- НТ8 — Ин-ручей
- НТ9 — Цзин-колодец



Вид спереди

| Код ВОЗ / название        | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                 | Традиционные показания                           | Категория / метки |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>НТ1</b><br>Jiquan 极泉   | <b>M-НТ01</b><br><b>F-НТ01</b> | В центре подмышечной впадины, над пульсацией подмышечной артерии                                                                                       | Боль в груди, боль в плече, онемение руки        | !                 |
| <b>НТ2</b><br>Qingling 青灵 | <b>M-НТ02</b><br><b>F-НТ02</b> | Медиальная поверхность плеча, прямо над медиальным краем двуглавой мышцы, 3 цуня выше локтевой складки                                                 | Боль в плече и руке, головная боль               | !                 |
| <b>НТ3</b><br>Shaohai 少海  | <b>M-НТ03</b><br><b>F-НТ03</b> | Передне-медиальная сторона локтя, впереди от медиального надмыщелка плечевой кости, на уровне локтевой складки                                         | Боль в локте, тремор руки, боль в сердце (трад.) | Хэ-море           |
| <b>НТ4</b><br>Lingdao 灵道  | <b>M-НТ04</b><br><b>F-НТ04</b> | Передне-медиальная поверхность предплечья, у радиального края сухожилия локтевого сгибателя запястья, 1,5 цуня проксимальнее ладонной складки запястья | Боль в сердце (трад.), внезапная потеря голоса   | Цзин-река         |
| <b>НТ5</b><br>Tongli 通里   | <b>M-НТ05</b><br><b>F-НТ05</b> | Передне-медиальная поверхность предплечья, у радиального края сухожилия локтевого сгибателя запястья, 1 цунь проксимальнее ладонной складки запястья   | Сердцебиение, потеря голоса (трад.)              | Ло                |
| <b>НТ6</b><br>Yinxī 阴郄    | <b>M-НТ06</b><br><b>F-НТ06</b> | Передне-медиальная поверхность предплечья, у радиального края сухожилия локтевого сгибателя запястья, 0,5 цуня проксимальнее ладонной складки запястья | Ночная потливость, сердцебиение (трад.)          | Си-щель           |

| Код ВОЗ / название         | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                                       | Традиционные показания                                 | Категория / метки |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>HT7</b><br>Shenmen 神门   | <b>M-HT07</b><br><b>F-HT07</b> | Передне-медиальная сторона запястья, у радиального края сухожилия локтевого сгибателя запястья, на ладонной складке запястья | Бессонница, тревога, сердцебиение (трад.)              | Шу-поток / Юань   |
| <b>HT8</b><br>Shaofu 少府    | <b>M-HT08</b><br><b>F-HT08</b> | Ладонь, в углублении между 4-й и 5-й пястными костями, проксимальнее 5-го пястно-фалангового сустава                         | Сердцебиение, зуд половых органов (трад.)              | Ин-ручей          |
| <b>HT9</b><br>Shaochong 少冲 | <b>M-HT09</b><br><b>F-HT09</b> | Мизинец, радиальнее дистальной фаланги, 0,1 цуня от радиального угла ногтевого ложа                                          | Сердцебиение, лихорадка; в традиции — неотложная точка | Цзин-колодец      |

## ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ


От мизинца (SI1) по задне-медиальной поверхности руки, через лопатку и шею к козелку уха (SI19).

ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО  
ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ


13:00–15:00 (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- SI1 — Цзин-колодец
- SI2 — Ин-ручей
- SI3 — Шу-поток; точка-ключ Ду-май
- SI4 — Юань
- SI5 — Цзин-река
- SI6 — Си-щель
- SI7 — Ло
- SI8 — Хэ-море



Вид сзади



Голова, латеральная проекция

| Код ВОЗ / название       | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                     | Традиционные показания                                        | Категория / метки           |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SI1</b><br>Shaoze 少泽  | <b>M-SI01</b><br><b>F-SI01</b> | Мизинец, локтевой дистальной фаланги, 0,1 цуня от локтевого угла ногтевого ложа<br>♂ —<br>♀ Трад. — недостаток лактации    | Головная боль, боль в горле; в традиции — недостаток лактации | Цзин-колодец                |
| <b>SI2</b><br>Qianggu 前谷 | <b>M-SI02</b><br><b>F-SI02</b> | Мизинец, в углублении дистальнее локтевой стороны 5-го пястно-фалангового сустава, на границе ладонной и тыльной кожи      | Онемение пальцев, лихорадка                                   | Ин-ручей                    |
| <b>SI3</b><br>Houxi 后溪   | <b>M-SI03</b><br><b>F-SI03</b> | Тыл кисти, в углублении проксимальнее локтевой стороны 5-го пястно-фалангового сустава, на границе ладонной и тыльной кожи | Скованность и боль в шее и спине, головная боль               | Шу-поток; точка-ключ Ду-май |
| <b>SI4</b><br>Wangu 腕骨   | <b>M-SI04</b><br><b>F-SI04</b> | Задне-медиальная сторона запястья, в углублении между основанием 5-й пястной кости и трёхгранной костью, на границе кожи   | Боль в запястье, лихорадка                                    | Юань                        |
| <b>SI5</b><br>Yanggu 阳谷  | <b>M-SI05</b><br><b>F-SI05</b> | Задне-медиальная сторона запястья, в углублении между трёхгранной костью и шиловидным отростком локтевой кости             | Боль в запястье, шум в ушах                                   | Цзин-река                   |

| Код ВОЗ / название                     | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                        | Традиционные показания                         | Категория / метки |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>SI6</b><br>Yanglao 养老               | <b>M-SI06</b><br><b>F-SI06</b> | Задне-медиальная поверхность предплечья, в углублении радиальное головки локтевой кости, 1 цунь проксимальнее тыльной складки запястья                        | Ослабление зрения (трад.), боль в плече и руке | Си-щель           |
| <b>SI7</b><br>Zhizheng 支正              | <b>M-SI07</b><br><b>F-SI07</b> | Задне-медиальная поверхность предплечья, между медиальным краем локтевой кости и локтевым сгибателем запястья, 5 цуней проксимальнее тыльной складки запястья | Скованность шеи, боль в локте                  | Ло                |
| <b>SI8</b><br>Xiaohai 小海               | <b>M-SI08</b><br><b>F-SI08</b> | Задне-медиальная сторона локтя, в углублении между локтевым отростком и медиальным надмыщелком плечевой кости                                                 | Боль в локте, онемение 4–5 пальцев             | Хэ-море<br>!      |
| <b>SI9</b><br><u>Jianzhen</u> 肩贞       | <b>M-SI09</b><br><b>F-SI09</b> | Плечевой пояс, позади плечевого сустава, 1 цунь выше задней подмышечной складки                                                                               | Боль в лопатке и плече                         | TrP               |
| <b>SI10</b><br><u>Naoshu</u> 臑俞        | <b>M-SI10</b><br><b>F-SI10</b> | Плечевой пояс, прямо над задней подмышечной складкой, в углублении под остью лопатки                                                                          | Боль в плече                                   | TrP               |
| <b>SI11</b><br><u>Tianzong</u> 天宗      | <b>M-SI11</b><br><b>F-SI11</b> | Область лопатки, в углублении на границе верхней и средней трети линии от середины ости лопатки к нижнему углу лопатки                                        | Боль в лопатке, боль в молочной железе (трад.) | TrP               |
| <b>SI12</b><br><u>Bingfeng</u> 秉风      | <b>M-SI12</b><br><b>F-SI12</b> | Область лопатки, в надостной ямке, над серединой ости лопатки                                                                                                 | Боль в лопатке и плече                         | TrP               |
| <b>SI13</b><br><u>Quyuan</u> 曲垣        | <b>M-SI13</b><br><b>F-SI13</b> | Область лопатки, в углублении над медиальным концом ости лопатки                                                                                              | Боль и скованность в лопатке                   | TrP               |
| <b>SI14</b><br><u>Jianwaishu</u> 肩外俞   | <b>M-SI14</b><br><b>F-SI14</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th1, 3 цуня латеральнее задней срединной линии (ЗСЛ)                                           | Боль в плече и спине, скованность шеи          | TrP !             |
| <b>SI15</b><br><u>Jianzhongshu</u> 肩中俞 | <b>M-SI15</b><br><b>F-SI15</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка C7, 2 цуня латеральнее ЗСЛ                                                                     | Кашель, боль в плече и спине                   | TrP !             |
| <b>SI16</b><br>Tianchuang 天窗           | <b>M-SI16</b><br><b>F-SI16</b> | Переднебоковая область шеи, у заднего края ГКС, на уровне верхнего края щитовидного хряща                                                                     | Шум в ушах, боль в горле, скованность шеи      |                   |
| <b>SI17</b><br>Tianrong 天容             | <b>M-SI17</b><br><b>F-SI17</b> | Переднебоковая область шеи, позади угла нижней челюсти, в углублении впереди от ГКС                                                                           | Боль в горле, отёк шеи                         | !                 |
| <b>SI18</b><br>Quanliao 颧髎             | <b>M-SI18</b><br><b>F-SI18</b> | Лицо, прямо под наружным углом глаза, в углублении под скуловой костью                                                                                        | Лицевая боль, тик век, зубная боль             |                   |
| <b>SI19</b><br>Tinggong 听宫             | <b>M-SI19</b><br><b>F-SI19</b> | Лицо, в углублении между передним краем козелка и задним краем мышечного отростка нижней челюсти                                                              | Шум в ушах, тугоухость, боль в ухе             |                   |

## ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ


От внутреннего угла глаза (BL1) через голову, по двум линиям спины, задней поверхности ноги к мизинцу стопы (BL67).

ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО  
ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ


15:00–17:00 (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- BL11 — Точка-собиратель костей
- BL13 — Бэй-шу лёгких
- BL14 — Бэй-шу перикарда
- BL15 — Бэй-шу сердца
- BL17 — Точка-собиратель крови
- BL18 — Бэй-шу печени
- BL19 — Бэй-шу желчного пузыря
- BL20 — Бэй-шу селезёнки
- BL21 — Бэй-шу желудка
- BL22 — Бэй-шу тройного обогревателя
- BL23 — Бэй-шу почек
- BL25 — Бэй-шу толстой кишки
- BL27 — Бэй-шу тонкой кишки
- BL28 — Бэй-шу мочевого пузыря
- BL39 — Нижняя хэ-точка тройного обогревателя
- BL40 — Хэ-море; нижняя хэ-точка мочевого пузыря
- BL58 — Ло
- BL59 — Си-щель Ян-цяо
- BL60 — Цзин-река
- BL62 — Точка-ключ Ян-цяо
- BL63 — Си-щель
- BL64 — Юань
- BL65 — Шу-поток
- BL66 — Ин-ручей
- BL67 — Цзин-колодец



Голова, латеральная проекция



Вид сзади

| Код ВОЗ / название        | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                 | Традиционные показания                | Категория / метки |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>BL1</b><br>Jingming 睛明 | <b>M-BL01</b><br><b>F-BL01</b> | Лицо, в углублении медиальнее и выше внутреннего угла глаза                            | Покраснение и боль глаз, слезотечение | !                 |
| <b>BL2</b><br>Cuanzhu 攒竹  | <b>M-BL02</b><br><b>F-BL02</b> | Голова, в углублении у медиального конца брови                                         | Головная боль, боль в глазах          |                   |
| <b>BL3</b><br>Meichong 眉冲 | <b>M-BL03</b><br><b>F-BL03</b> | Голова, прямо над медиальным концом брови, 0,5 цуня выше передней линии роста волос    | Головная боль, заложенность носа      |                   |
| <b>BL4</b><br>Qucha 曲差    | <b>M-BL04</b><br><b>F-BL04</b> | Голова, 0,5 цуня выше передней линии роста волос, 1,5 цуня латеральнее срединной линии | Головная боль, заложенность носа      |                   |

| Код ВОЗ / название               | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                                  | Традиционные показания                            | Категория / метки                   |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BL5</b><br>Wuchu 五处           | <b>M-BL05</b><br><b>F-BL05</b> | Голова, 1 цунь выше передней линии роста волос, 1,5 цуня латеральнее срединной линии                                    | Головная боль, головокружение                     |                                     |
| <b>BL6</b><br>Chengguang 承光      | <b>M-BL06</b><br><b>F-BL06</b> | Голова, 2,5 цуня выше передней линии роста волос, 1,5 цуня латеральнее срединной линии                                  | Головная боль, головокружение                     |                                     |
| <b>BL7</b><br>Tongtian 通天        | <b>M-BL07</b><br><b>F-BL07</b> | Голова, 4 цуня выше передней линии роста волос, 1,5 цуня латеральнее срединной линии                                    | Головная боль, заложенность носа                  |                                     |
| <b>BL8</b><br>Luoque 络却          | <b>M-BL08</b><br><b>F-BL08</b> | Голова, 5,5 цуня выше передней линии роста волос, 1,5 цуня латеральнее срединной линии                                  | Головокружение, шум в ушах                        |                                     |
| <b>BL9</b><br>Yuzhen 玉枕          | <b>M-BL09</b><br><b>F-BL09</b> | Голова, на уровне верхнего края наружного затылочного выступа, 1,3 цуня латеральнее ЗСЛ                                 | Головная боль, боль в глазах                      |                                     |
| <b>BL10</b><br><u>Tianzhu</u> 天柱 | <b>M-BL10</b><br><b>F-BL10</b> | Задняя область шеи, на уровне верхнего края остистого отростка C2, в углублении у латерального края трапецевидной мышцы | Скованность шеи, головная боль, заложенность носа | <b>TrP</b>                          |
| <b>BL11</b><br>Dazhu 大杼          | <b>M-BL11</b><br><b>F-BL11</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th1, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                            | Кашель, лихорадка, скованность шеи                | Точка-собиратель костей<br><b>!</b> |
| <b>BL12</b><br>Fengmen 风门        | <b>M-BL12</b><br><b>F-BL12</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th2, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                            | Простуда, кашель, скованность шеи                 | <b>!</b>                            |
| <b>BL13</b><br>Feishu 肺俞         | <b>M-BL13</b><br><b>F-BL13</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th3, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                            | Кашель, одышка                                    | Бэй-шу лёгких<br><b>!</b>           |
| <b>BL14</b><br>Jueyinshu 厥阴俞     | <b>M-BL14</b><br><b>F-BL14</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th4, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                            | Сердцебиение, кашель, боль в груди                | Бэй-шу перикарда<br><b>!</b>        |
| <b>BL15</b><br>Xinshu 心俞         | <b>M-BL15</b><br><b>F-BL15</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th5, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                            | Сердцебиение, бессонница, тревога (трад.)         | Бэй-шу сердца<br><b>!</b>           |
| <b>BL16</b><br>Dushu 督俞          | <b>M-BL16</b><br><b>F-BL16</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th6, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                            | Боль в сердце и животе (трад.)                    | <b>!</b>                            |
| <b>BL17</b><br>Geshu 膈俞          | <b>M-BL17</b><br><b>F-BL17</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th7, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                            | Икота, рвота, кровотечения (трад.)                | Точка-собиратель крови<br><b>!</b>  |
| <b>BL18</b><br>Ganshu 肝俞         | <b>M-BL18</b><br><b>F-BL18</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th9, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                            | Боль в подреберье, болезни глаз (трад.)           | Бэй-шу печени<br><b>!</b>           |
| <b>BL19</b><br>Danshu 胆俞         | <b>M-BL19</b><br><b>F-BL19</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th10, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                           | Горечь во рту, боль в подреберье                  | Бэй-шу желчного пузыря<br><b>!</b>  |

| Код ВОЗ / название              | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                          | Традиционные показания                                        | Категория / метки            |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>BL20</b><br>Pishu 脾俞         | <b>M-BL20</b><br><b>F-BL20</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th11, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                                                   | Вздутие, диарея, отёки                                        | Бэй-шу селезёнки<br>!        |
| <b>BL21</b><br>Weishu 胃俞        | <b>M-BL21</b><br><b>F-BL21</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th12, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                                                   | Боль в эпигастрии, рвота                                      | Бэй-шу желудка<br>!          |
| <b>BL22</b><br>Sanjiaoshu 三焦俞   | <b>M-BL22</b><br><b>F-BL22</b> | Поясничная область, на уровне нижнего края остистого отростка L1, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                                                      | Отёки, затруднённое мочеиспускание, вздутие                   | Бэй-шу тройного обогревателя |
| <b>BL23</b><br>Shenshu 肾俞       | <b>M-BL23</b><br><b>F-BL23</b> | Поясничная область, на уровне нижнего края остистого отростка L2, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                                                      | Боль в пояснице, урогенитальные нарушения, шум в ушах (трад.) | Бэй-шу почек                 |
| <b>BL24</b><br>Qihaihu 气海俞      | <b>M-BL24</b><br><b>F-BL24</b> | Поясничная область, на уровне нижнего края остистого отростка L3, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                                                      | Боль в пояснице, дисменорея (трад.)                           |                              |
| <b>BL25</b><br>Dachangshu 大肠俞   | <b>M-BL25</b><br><b>F-BL25</b> | Поясничная область, на уровне нижнего края остистого отростка L4, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                                                      | Боль в пояснице, запор, диарея                                | Бэй-шу толстой кишки         |
| <b>BL26</b><br>Guanyuanshu 关元俞  | <b>M-BL26</b><br><b>F-BL26</b> | Поясничная область, на уровне нижнего края остистого отростка L5, 1,5 цуня латеральнее ЗСЛ                                                      | Боль в пояснице, диарея                                       |                              |
| <b>BL27</b><br>Xiaochangshu 小肠俞 | <b>M-BL27</b><br><b>F-BL27</b> | Крестцовая область, на уровне 1-го заднего крестцового отверстия, 1,5 цуня латеральнее срединного крестцового гребня                            | Боль в пояснично-крестцовой области, урогенитальные нарушения | Бэй-шу тонкой кишки<br>Б     |
| <b>BL28</b><br>Pangguangshu 膀胱俞 | <b>M-BL28</b><br><b>F-BL28</b> | Крестцовая область, на уровне 2-го заднего крестцового отверстия, 1,5 цуня латеральнее срединного крестцового гребня                            | Задержка мочи, недержание мочи, боль в крестце                | Бэй-шу мочевого пузыря<br>Б  |
| <b>BL29</b><br>Zhonglüshu 中膂俞   | <b>M-BL29</b><br><b>F-BL29</b> | Крестцовая область, на уровне 3-го заднего крестцового отверстия, 1,5 цуня латеральнее срединного крестцового гребня                            | Боль в пояснице и крестце, диарея                             | Б                            |
| <b>BL30</b><br>Baihuanshu 白环俞   | <b>M-BL30</b><br><b>F-BL30</b> | Крестцовая область, на уровне 4-го заднего крестцового отверстия, 1,5 цуня латеральнее срединного крестцового гребня                            | Боль в пояснице и крестце; в традиции — бели                  | Б                            |
| <b>BL31</b><br>Shangliao 上髎     | <b>M-BL31</b><br><b>F-BL31</b> | Крестцовая область, в 1-м заднем крестцовом отверстии                                                                                           | Нарушения менструального цикла (трад.), боль в пояснице       | Б                            |
| <b>BL32</b><br>Ciliao 次髎        | <b>M-BL32</b><br><b>F-BL32</b> | Крестцовая область, во 2-м заднем крестцовом отверстии<br>♂ Трад. — урогенитальные нарушения<br>♀ Трад. — дисменорея; избегать при беременности | Дисменорея (трад.), боль в пояснице, урогенитальные нарушения | Б                            |
| <b>BL33</b><br>Zhongliao 中髎     | <b>M-BL33</b><br><b>F-BL33</b> | Крестцовая область, в 3-м заднем крестцовом отверстии<br>♂ —<br>♀ РКИ (JAMA 2017) — стрессовое недержание мочи у женщин                         | Урогенитальные нарушения, боль в пояснице                     | Б                            |

| Код ВОЗ / название         | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                  | Традиционные показания                                    | Категория / метки                                    |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>BL34</b><br>Xialiao 下髎  | <b>M-BL34</b><br><b>F-BL34</b> | Крестцовая область, в 4-м заднем крестцовом отверстии                                                   | Боль внизу живота, боль в крестце                         | <b>Б</b>                                             |
| <b>BL35</b><br>Huiyang 会阳  | <b>M-BL35</b><br><b>F-BL35</b> | Ягодичная область, 0,5 цуня латеральнее верхушки копчика                                                | Геморрой, диарея; урогенитальные нарушения (трад.)        |                                                      |
| <b>BL36</b><br>Chengfu 承扶  | <b>M-BL36</b><br><b>F-BL36</b> | Ягодичная область, в середине ягодичной складки                                                         | Боль в пояснице, ягодице и бедре; геморрой                | <b>!</b>                                             |
| <b>BL37</b><br>Yinmen 殷门   | <b>M-BL37</b><br><b>F-BL37</b> | Задняя поверхность бедра, между двуглавой и полусухожильной мышцами, 6 цуней ниже ягодичной складки     | Боль в пояснице и бедре                                   | <b>!</b>                                             |
| <b>BL38</b><br>Fuxi 浮郤     | <b>M-BL38</b><br><b>F-BL38</b> | Задняя сторона колена, чуть медиальнее сухожилия двуглавой мышцы бедра, 1 цунь выше подколенной складки | Онемение ягодицы и бедра, контрактура подколенной области |                                                      |
| <b>BL39</b><br>Weiyang 委阳  | <b>M-BL39</b><br><b>F-BL39</b> | Задне-латеральная сторона колена, на подколенной складке, медиальнее сухожилия двуглавой мышцы бедра    | Задержка мочи, скованность поясницы                       | Нижняя хэ-точка тройного обогревателя                |
| <b>BL40</b><br>Weizhong 委中 | <b>M-BL40</b><br><b>F-BL40</b> | Задняя сторона колена, в середине подколенной складки                                                   | Боль в пояснице, боль в колене, рвота и диарея (трад.)    | Хэ-море; нижняя хэ-точка мочевого пузыря<br><b>!</b> |
| <b>BL41</b><br>Fufen 附分    | <b>M-BL41</b><br><b>F-BL41</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th2, 3 цуня латеральнее ЗСЛ              | Скованность плеча, спины и шеи                            | <b>!</b>                                             |
| <b>BL42</b><br>Pohu 魄户     | <b>M-BL42</b><br><b>F-BL42</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th3, 3 цуня латеральнее ЗСЛ              | Кашель, одышка, скованность шеи                           | <b>!</b>                                             |
| <b>BL43</b><br>Gaohuang 膏肓 | <b>M-BL43</b><br><b>F-BL43</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th4, 3 цуня латеральнее ЗСЛ              | Хронический кашель, истощение (трад.)                     | <b>!</b>                                             |
| <b>BL44</b><br>Shentang 神堂 | <b>M-BL44</b><br><b>F-BL44</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th5, 3 цуня латеральнее ЗСЛ              | Кашель, боль в груди                                      | <b>!</b>                                             |
| <b>BL45</b><br>Yixi 臆腧     | <b>M-BL45</b><br><b>F-BL45</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th6, 3 цуня латеральнее ЗСЛ              | Кашель, боль в плече и спине                              | <b>!</b>                                             |
| <b>BL46</b><br>Geguan 膈关   | <b>M-BL46</b><br><b>F-BL46</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th7, 3 цуня латеральнее ЗСЛ              | Икота, рвота, скованность спины                           | <b>!</b>                                             |
| <b>BL47</b><br>Hunmen 魂门   | <b>M-BL47</b><br><b>F-BL47</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th9, 3 цуня латеральнее ЗСЛ              | Боль в груди и подреберье, рвота                          | <b>!</b>                                             |
| <b>BL48</b><br>Yanggang 阳纲 | <b>M-BL48</b><br><b>F-BL48</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th10, 3 цуня латеральнее ЗСЛ             | Диарея, боль в животе                                     | <b>!</b>                                             |
| <b>BL49</b><br>Yishe 意舍    | <b>M-BL49</b><br><b>F-BL49</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th11, 3 цуня латеральнее ЗСЛ             | Вздутие, рвота                                            | <b>!</b>                                             |

| Код ВОЗ / название                 | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                          | Традиционные показания                                  | Категория / метки |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>BL50</b><br>Weicang 胃仓          | <b>M-BL50</b><br><b>F-BL50</b> | Верхняя часть спины, на уровне нижнего края остистого отростка Th12, 3 цуня латеральнее ЗСЛ                                                                                     | Вздутие, боль в эпигастрии                              | !                 |
| <b>BL51</b><br>Huangmen 育门         | <b>M-BL51</b><br><b>F-BL51</b> | Поясничная область, на уровне нижнего края остистого отростка L1, 3 цуня латеральнее ЗСЛ                                                                                        | Боль в эпигастрии, запор                                |                   |
| <b>BL52</b><br><u>Zhishi</u> 志室    | <b>M-BL52</b><br><b>F-BL52</b> | Поясничная область, на уровне нижнего края остистого отростка L2, 3 цуня латеральнее ЗСЛ                                                                                        | Боль в пояснице, урогенитальные нарушения (трад.)       | TrP               |
| <b>BL53</b><br>Baohuang 胞育         | <b>M-BL53</b><br><b>F-BL53</b> | Ягодичная область, на уровне 2-го заднего крестцового отверстия, 3 цуня латеральнее срединного крестцового гребня                                                               | Вздутие, задержка мочи, боль в пояснице                 | Б                 |
| <b>BL54</b><br><u>Zhibian</u> 秩边   | <b>M-BL54</b><br><b>F-BL54</b> | Ягодичная область, на уровне 4-го заднего крестцового отверстия, 3 цуня латеральнее срединного крестцового гребня                                                               | Боль в пояснице и ноге, геморрой                        | TrP !             |
| <b>BL55</b><br>Heyang 合阳           | <b>M-BL55</b><br><b>F-BL55</b> | Задняя поверхность голени, между латеральной и медиальной головками икроножной мышцы, 2 цуня ниже подколенной складки                                                           | Боль в пояснице и ноге                                  |                   |
| <b>BL56</b><br>Chengjin 承筋         | <b>M-BL56</b><br><b>F-BL56</b> | Задняя поверхность голени, между двумя брюшками икроножной мышцы, 5 цуней ниже подколенной складки                                                                              | Судороги икроножных мышц, геморрой                      |                   |
| <b>BL57</b><br><u>Chengshan</u> 承山 | <b>M-BL57</b><br><b>F-BL57</b> | Задняя поверхность голени, в месте соединения ахиллова сухожилия с двумя брюшками икроножной мышцы                                                                              | Судороги и боль в голени, геморрой, запор               | TrP               |
| <b>BL58</b><br>Feiyang 飞扬          | <b>M-BL58</b><br><b>F-BL58</b> | Задне-латеральная поверхность голени, между нижним краем латеральной головки икроножной мышцы и ахилловым сухожилием, 7 цуней выше выступа латеральной лодыжки                  | Головная боль, боль в пояснице, слабость ног            | Ло                |
| <b>BL59</b><br>Fuyang 跗阳           | <b>M-BL59</b><br><b>F-BL59</b> | Задне-латеральная поверхность голени, между малоберцовой костью и ахилловым сухожилием, 3 цуня выше выступа латеральной лодыжки                                                 | Тяжесть в голове, боль в пояснице и лодыжке             | Си-щель Ян-цяо    |
| <b>BL60</b><br>Kunlun 昆仑           | <b>M-BL60</b><br><b>F-BL60</b> | Задне-латеральная сторона голеностопа, в углублении между выступом латеральной лодыжки и ахилловым сухожилием<br><br>♂ —<br>♀ Избегать при беременности (классическая традиция) | Головная боль, скованность шеи, боль в пояснице и пятке | Цзин-река<br>Б    |
| <b>BL61</b><br>Pucan 仆参            | <b>M-BL61</b><br><b>F-BL61</b> | Латеральная сторона стопы, дистальнее BL60, латеральнее пяточной кости, на границе тыльной и подошвенной кожи                                                                   | Боль в пятке, слабость ног                              |                   |
| <b>BL62</b><br>Shenmai 申脉          | <b>M-BL62</b><br><b>F-BL62</b> | Латеральная сторона стопы, прямо под выступом латеральной лодыжки, в углублении между нижним краем латеральной лодыжки и пяточной костью                                        | Головная боль, бессонница (трад.), боль в пояснице      | Точка-ключ Ян-цяо |
| <b>BL63</b><br>Jinmen 金門           | <b>M-BL63</b><br><b>F-BL63</b> | Тыл стопы, дистальнее переднего края латеральной лодыжки, позади бугристости 5-й плюсневой кости, в углублении у нижнего края кубовидной кости                                  | Боль в стопе и лодыжке, головная боль                   | Си-щель           |

| Код ВОЗ / название          | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                          | Традиционные показания                                                                                | Категория / метки        |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BL64</b><br>Jinggu 京骨    | <b>M-BL64</b><br><b>F-BL64</b> | Латеральная сторона стопы, дистальнее бугристости 5-й плюсневой кости, на границе тыльной и подошвенной кожи                                                                    | Головная боль, скованность шеи, боль в пояснице                                                       | Юань                     |
| <b>BL65</b><br>Shugu 束骨     | <b>M-BL65</b><br><b>F-BL65</b> | Латеральная сторона стопы, в углублении проксимальнее 5-го плюснефалангового сустава, на границе тыльной и подошвенной кожи                                                     | Головная боль, скованность шеи                                                                        | Шу-поток                 |
| <b>BL66</b><br>Zutonggu 足通谷 | <b>M-BL66</b><br><b>F-BL66</b> | Мизинец стопы, в углублении дистальнее и латеральнее 5-го плюснефалангового сустава, на границе тыльной и подошвенной кожи                                                      | Головная боль, скованность шеи                                                                        | Ин-ручей                 |
| <b>BL67</b><br>Zhiyin 至阴    | <b>M-BL67</b><br><b>F-BL67</b> | Мизинец стопы, латеральнее дистальной фаланги, 0,1 цуня от латерального угла ногтевого ложа<br><br>♂ —<br>♀ Прижигание при тазовом предлежании — только под наблюдением акушера | Головная боль, заложенность носа; прижигание при тазовом предлежании плода (см. раздел доказательств) | Цзин-колодец<br><b>Б</b> |

### ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ


От подошвы (KI1) по медиальной лодыжке и задне-медиальной поверхности ноги, по животу и груди к ключице (KI27).

### ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ

17:00–19:00 (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- KI1 — Цзин-колодец
- KI2 — Ин-ручей
- KI3 — Шу-поток / Юань
- KI4 — Ло
- KI5 — Си-щель
- KI6 — Точка-ключ Инь-цзяо
- KI7 — Цзин-река
- KI8 — Си-щель Инь-цзяо
- KI9 — Си-щель Инь-вэй
- KI10 — Хэ-море



Вид спереди

| Код ВОЗ / название        | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                   | Традиционные показания                                                  | Категория / метки |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KI1</b><br>Yongquan 涌泉 | <b>M-KI01</b><br><b>F-KI01</b> | Подошва, в самом глубоком углублении при сгибании пальцев стопы                                                                                          | Головокружение, потеря сознания (трад. неотложная точка), жар в стопах  | Цзин-колодец      |
| <b>KI2</b><br>Rangu 然谷    | <b>M-KI02</b><br><b>F-KI02</b> | Медиальная сторона стопы, ниже бугристости ладьевидной кости, на границе тыльной и подошвенной кожи                                                      | Нарушения менструального цикла (трад.), зуд половых органов, отёк стопы | Ин-ручей          |
| <b>KI3</b><br>Taixi 太溪    | <b>M-KI03</b><br><b>F-KI03</b> | Задне-медиальная сторона голеностопа, в углублении между выступом медиальной лодыжки и ахилловым сухожилием                                              | Боль в горле, шум в ушах, бессонница, боль в пояснице (трад.)           | Шу-поток / Юань   |
| <b>KI4</b><br>Dazhong 大钟  | <b>M-KI04</b><br><b>F-KI04</b> | Медиальная сторона стопы, задне-нижнее медиальной лодыжки, над пяточной костью, в углублении кпереди от медиального края прикрепления ахиллова сухожилия | Кровохарканье, боль в пятке, задержка мочи                              | Ло                |
| <b>KI5</b><br>Shuiquan 水泉 | <b>M-KI05</b><br><b>F-KI05</b> | Медиальная сторона стопы, 1 цунь ниже KI3, в углублении кпереди от пяточного бугра<br>♂ —<br>♀ Трад. — аменорея, дисменорея                              | Аменорея, дисменорея (трад.), затруднённое мочеиспускание               | Си-щель           |

| Код ВОЗ / название          | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                           | Традиционные показания                                        | Категория / метки  |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>KI6</b><br>Zhaozhai 照海   | <b>M-KI06</b><br><b>F-KI06</b> | Медиальная сторона стопы, 1 цунь ниже выступа медиальной лодыжки, в углублении под медиальной лодыжкой                           | Бессонница, сухость в горле, нерегулярные менструации (трад.) | Точка-ключ Инь-цяо |
| <b>KI7</b><br>Fuliu 复溜      | <b>M-KI07</b><br><b>F-KI07</b> | Задне-медиальная поверхность голени, кпереди от ахиллова сухожилия, 2 цуня выше выступа медиальной лодыжки                       | Отёки, ночная потливость, отсутствие потоотделения (трад.)    | Цзин-река          |
| <b>KI8</b><br>Jiaoxin 交信    | <b>M-KI08</b><br><b>F-KI08</b> | Медиальная поверхность голени, в углублении позади медиального края большеберцовой кости, 2 цуня выше выступа медиальной лодыжки | Нерегулярные менструации (трад.), диарея                      | Си-щель Инь-цяо    |
| <b>KI9</b><br>Zhubin 筑宾     | <b>M-KI09</b><br><b>F-KI09</b> | Задне-медиальная поверхность голени, между камбаловидной мышцей и ахилловым сухожилием, 5 цуней выше выступа медиальной лодыжки  | Беспокойство, боль в голени                                   | Си-щель Инь-вэй    |
| <b>KI10</b><br>Yingu 阴谷     | <b>M-KI10</b><br><b>F-KI10</b> | Задне-медиальная сторона колена, чуть латеральнее сухожилия полусухожильной мышцы, на подколенной складке                        | Боль в колене, урогенитальные нарушения (трад.)               | Хэ-море            |
| <b>KI11</b><br>Henggu 横骨    | <b>M-KI11</b><br><b>F-KI11</b> | Нижняя часть живота, 5 цуней ниже центра пупка, 0,5 цуня латеральнее ПСЛ                                                         | Боль внизу живота, затруднённое мочеиспускание                | <b>Б</b>           |
| <b>KI12</b><br>Dahe 大赫      | <b>M-KI12</b><br><b>F-KI12</b> | Нижняя часть живота, 4 цуня ниже центра пупка, 0,5 цуня латеральнее ПСЛ                                                          | Урогенитальные нарушения (трад.)                              | <b>Б</b>           |
| <b>KI13</b><br>Qixue 气穴     | <b>M-KI13</b><br><b>F-KI13</b> | Нижняя часть живота, 3 цуня ниже центра пупка, 0,5 цуня латеральнее ПСЛ                                                          | Нерегулярные менструации, диарея (трад.)                      | <b>Б</b>           |
| <b>KI14</b><br>Siman 四满     | <b>M-KI14</b><br><b>F-KI14</b> | Нижняя часть живота, 2 цуня ниже центра пупка, 0,5 цуня латеральнее ПСЛ                                                          | Боль внизу живота, отёки                                      | <b>Б</b>           |
| <b>KI15</b><br>Zhongzhu 中注  | <b>M-KI15</b><br><b>F-KI15</b> | Нижняя часть живота, 1 цунь ниже центра пупка, 0,5 цуня латеральнее ПСЛ                                                          | Запор, боль в животе                                          | <b>Б</b>           |
| <b>KI16</b><br>Huangshu 育俞  | <b>M-KI16</b><br><b>F-KI16</b> | Середина живота, 0,5 цуня латеральнее центра пупка                                                                               | Боль в животе, запор, диарея                                  |                    |
| <b>KI17</b><br>Shangqu 商曲   | <b>M-KI17</b><br><b>F-KI17</b> | Верхняя часть живота, 2 цуня выше центра пупка, 0,5 цуня латеральнее ПСЛ                                                         | Боль в животе, запор                                          |                    |
| <b>KI18</b><br>Shiguan 石关   | <b>M-KI18</b><br><b>F-KI18</b> | Верхняя часть живота, 3 цуня выше центра пупка, 0,5 цуня латеральнее ПСЛ                                                         | Рвота, боль в животе                                          |                    |
| <b>KI19</b><br>Yindu 阴都     | <b>M-KI19</b><br><b>F-KI19</b> | Верхняя часть живота, 4 цуня выше центра пупка, 0,5 цуня латеральнее ПСЛ                                                         | Вздутие, боль в животе                                        |                    |
| <b>KI20</b><br>Futonggu 腹通谷 | <b>M-KI20</b><br><b>F-KI20</b> | Верхняя часть живота, 5 цуней выше центра пупка, 0,5 цуня латеральнее ПСЛ                                                        | Вздутие, рвота                                                |                    |
| <b>KI21</b><br>Youmen 幽门    | <b>M-KI21</b><br><b>F-KI21</b> | Верхняя часть живота, 6 цуней выше центра пупка, 0,5 цуня латеральнее ПСЛ                                                        | Боль в животе, рвота, диарея                                  | <b>!</b>           |
| <b>KI22</b><br>Bulang 步廊    | <b>M-KI22</b><br><b>F-KI22</b> | Передняя грудная стенка, в 5-м межреберье, 2 цуня латеральнее ПСЛ                                                                | Кашель, одышка, распирание в груди                            | <b>!</b>           |
| <b>KI23</b><br>Shenfeng 神封  | <b>M-KI23</b><br><b>F-KI23</b> | Передняя грудная стенка, в 4-м межреберье, 2 цуня латеральнее ПСЛ                                                                | Кашель, распирание в груди; в традиции — мастит               | <b>!</b>           |
|                             |                                | ♂ —<br>♀ Трад. — мастит                                                                                                          |                                                               |                    |

| Код ВОЗ / название         | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                    | Традиционные показания       | Категория / метки |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>KI24</b><br>Lingxu 灵墟   | <b>M-KI24</b><br><b>F-KI24</b> | Передняя грудная стенка, в 3-м межреберье, 2 цуня латеральнее ПСЛ         | Кашель, боль в груди         | !                 |
| <b>KI25</b><br>Shencang 神藏 | <b>M-KI25</b><br><b>F-KI25</b> | Передняя грудная стенка, во 2-м межреберье, 2 цуня латеральнее ПСЛ        | Кашель, одышка, боль в груди | !                 |
| <b>KI26</b><br>Yuzhong 膻中  | <b>M-KI26</b><br><b>F-KI26</b> | Передняя грудная стенка, в 1-м межреберье, 2 цуня латеральнее ПСЛ         | Кашель, распирание в груди   | !                 |
| <b>KI27</b><br>Shufu 俞府    | <b>M-KI27</b><br><b>F-KI27</b> | Передняя грудная стенка, под нижним краем ключицы, 2 цуня латеральнее ПСЛ | Кашель, одышка, боль в груди | !                 |

## ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ

От груди (PC1) по середине передней поверхности руки к кончику среднего пальца (PC9).

## ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ

19:00–21:00 (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- PC3 — Хэ-море
- PC4 — Си-щель
- PC5 — Цзин-река
- PC6 — Ло; точка-ключ Инь-вэй
- PC7 — Шу-поток / Юань
- PC8 — Ин-ручей
- PC9 — Цзин-колодец



Вид спереди

| Код ВОЗ / название        | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                           | Традиционные показания                     | Категория / метки |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>PC1</b><br>Tianchi 天池  | <b>M-PC01</b><br><b>F-PC01</b> | Передняя грудная стенка, в 4-м межреберье, 5 цуней латеральнее ПСЛ<br>♂ Ориентир: 1 цунь латеральнее соска<br>♀ Ориентир: 4-е межреберье, 5 цуней от ПСЛ (сосок не используется) | Кашель, боль в груди; в традиции — мастит  | !                 |
| <b>PC2</b><br>Tianquan 天泉 | <b>M-PC02</b><br><b>F-PC02</b> | Передняя поверхность плеча, между длинной и короткой головками двуглавой мышцы, 2 цуня ниже передней подмышечной складки                                                         | Боль в сердце (трад.), боль в руке         |                   |
| <b>PC3</b><br>Quze 曲泽     | <b>M-PC03</b><br><b>F-PC03</b> | Передняя сторона локтя, на локтевой складке, в углублении медиальнее сухожилия двуглавой мышцы плеча                                                                             | Боль в сердце (трад.), рвота, боль в локте | Хэ-море           |
| <b>PC4</b><br>Ximen 郗门    | <b>M-PC04</b><br><b>F-PC04</b> | Передняя поверхность предплечья, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья, 5 цуней проксимальнее ладонной складки запястья                         | Боль в сердце, сердцебиение (трад.)        | Си-щель           |
| <b>PC5</b><br>Jianshi 间使  | <b>M-PC05</b><br><b>F-PC05</b> | Передняя поверхность предплечья, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья, 3 цуня проксимальнее ладонной складки запястья                          | Сердцебиение, рвота (трад.)                | Цзин-река         |

| Код ВОЗ / название          | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                  | Традиционные показания                                                   | Категория / метки                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PC6</b><br>Neiguan 内关    | <b>M-PC06</b><br><b>F-PC06</b> | Передняя поверхность предплечья, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья, 2 цуня проксимальнее ладонной складки запястья | Тошнота и рвота (наиболее изученное показание), сердцебиение, бессонница | Ло; точка-ключ<br>Инь-вэй<br> |
| <b>PC7</b><br>Daling 大陵     | <b>M-PC07</b><br><b>F-PC07</b> | Передняя сторона запястья, между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя запястья, на ладонной складке запястья                         | Боль в сердце (трад.), рвота, боль в запястье                            | Шу-поток / Юань<br>           |
| <b>PC8</b><br>Laogong 劳宫    | <b>M-PC08</b><br><b>F-PC08</b> | Ладонь, в углублении между 2-й и 3-й пястными костями, проксимальнее пястно-фаланговых суставов                                                         | Язвы во рту (трад.), беспокойство                                        | Ин-ручей                                                                                                         |
| <b>PC9</b><br>Zhongchong 中冲 | <b>M-PC09</b><br><b>F-PC09</b> | Средний палец, в центре кончика пальца                                                                                                                  | Потеря сознания (трад. неотложная точка), лихорадка                      | Цзин-колодец                                                                                                     |

**ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ**


От безымянного пальца (TE1) по середине задней поверхности руки, через плечо и шею вокруг уха к концу брови (TE23).

**ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО  
ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ**


21:00–23:00 (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА**

- TE1 — Цзин-колодец
- TE2 — Ин-ручей
- TE3 — Шу-поток
- TE4 — Юань
- TE5 — Ло; точка-ключ Ян-вэй
- TE6 — Цзин-река
- TE7 — Си-щель
- TE10 — Хэ-море



Вид сзади



Голова, латеральная проекция

| Код ВОЗ / название         | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                           | Традиционные показания                  | Категория / метки     |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>TE1</b><br>Guanchong 关冲 | <b>M-TE01</b><br><b>F-TE01</b> | Безымянный палец, локтевое дистальной фаланги, 0,1 цуня от локтевого угла ногтевого ложа                                                         | Головная боль, боль в горле, лихорадка  | Цзин-колодец          |
| <b>TE2</b><br>Yemen 液门     | <b>M-TE02</b><br><b>F-TE02</b> | Тыл кисти, в углублении выше края перепонки между 4-м и 5-м пальцами, на границе тыльной и ладонной кожи                                         | Головная боль, боль в горле, тугоухость | Ин-ручей              |
| <b>TE3</b><br>Zhongzhu 中渚  | <b>M-TE03</b><br><b>F-TE03</b> | Тыл кисти, между 4-й и 5-й пястными костями, в углублении проксимальнее 4-го пястно-фалангового сустава                                          | Шум в ушах, тугоухость, головная боль   | Шу-поток              |
| <b>TE4</b><br>Yangchi 阳池   | <b>M-TE04</b><br><b>F-TE04</b> | Задняя сторона запястья, в углублении локтевое сухожилия разгибателя пальцев, на тыльной складке запястья                                        | Боль в запястье, жажда (трад.)          | Юань                  |
| <b>TE5</b><br>Waiguan 外关   | <b>M-TE05</b><br><b>F-TE05</b> | Задняя поверхность предплечья, посередине межкостного промежутка между локтевой и лучевой костями, 2 цуня проксимальнее тыльной складки запястья | Головная боль, шум в ушах, боль в руке  | Ло; точка-ключ Ян-вэй |
| <b>TE6</b><br>Zhigou 支沟    | <b>M-TE06</b><br><b>F-TE06</b> | Задняя поверхность предплечья, посередине межкостного промежутка, 3 цуня проксимальнее тыльной складки запястья                                  | Запор, боль в боку (трад.)              | Цзин-река             |

| Код ВОЗ / название                | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                | Традиционные показания                           | Категория / метки |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TE7</b><br>Huizong 会宗          | <b>M-TE07</b><br><b>F-TE07</b> | Задняя поверхность предплечья, радиальное края локтевой кости, 3 цуня проксимальнее тыльной складки запястья                          | Тугоухость, боль в руке                          | Си-щель           |
| <b>TE8</b><br>Sanyangluo 三阳络      | <b>M-TE08</b><br><b>F-TE08</b> | Задняя поверхность предплечья, посередине межкостного промежутка, 4 цуня проксимальнее тыльной складки запястья                       | Тугоухость, внезапная потеря голоса, боль в руке |                   |
| <b>TE9</b><br>Sidu 四渎             | <b>M-TE09</b><br><b>F-TE09</b> | Задняя поверхность предплечья, посередине межкостного промежутка, 5 цуней дистальнее верхушки локтевого отростка                      | Тугоухость, зубная боль, боль в предплечье       |                   |
| <b>TE10</b><br>Tianjing 天井        | <b>M-TE10</b><br><b>F-TE10</b> | Задняя сторона локтя, в углублении 1 цунь проксимальнее верхушки локтевого отростка                                                   | Мигрень, боль в локте                            | Хэ-море           |
| <b>TE11</b><br>Qinglengyuan 清冷渊   | <b>M-TE11</b><br><b>F-TE11</b> | Задняя поверхность плеча, на линии от верхушки локтевого отростка к углу акромиона, 2 цуня проксимальнее верхушки локтевого отростка  | Боль в плече и руке                              |                   |
| <b>TE12</b><br>Xiaoluo 消冻         | <b>M-TE12</b><br><b>F-TE12</b> | Задняя поверхность плеча, на линии от верхушки локтевого отростка к углу акромиона, 5 цуней проксимальнее верхушки локтевого отростка | Головная боль, скованность шеи, боль в плече     |                   |
| <b>TE13</b><br>Naohui 臑会          | <b>M-TE13</b><br><b>F-TE13</b> | Задняя поверхность плеча, у задне-нижнего края дельтовидной мышцы, 3 цуня ниже угла акромиона                                         | Боль в плече и руке, зоб (трад.)                 |                   |
| <b>TE14</b><br><u>Jianliao</u> 肩髃 | <b>M-TE14</b><br><b>F-TE14</b> | Плечевой пояс, в углублении между углом акромиона и большим бугорком плечевой кости                                                   | Боль и ограничение движений в плече              | TrP               |
| <b>TE15</b><br><u>Tianliao</u> 天髃 | <b>M-TE15</b><br><b>F-TE15</b> | Область лопатки, в углублении над верхним углом лопатки                                                                               | Боль в плече и шее                               | TrP !             |
| <b>TE16</b><br>Tianyou 天膺         | <b>M-TE16</b><br><b>F-TE16</b> | Переднебоковая область шеи, на уровне угла нижней челюсти, в углублении позади ГКС                                                    | Головная боль, скованность шеи, тугоухость       |                   |
| <b>TE17</b><br>Yifeng 翳风          | <b>M-TE17</b><br><b>F-TE17</b> | Переднебоковая область шеи, позади мочки уха, в углублении кпереди от нижнего конца сосцевидного отростка                             | Шум в ушах, тугоухость, лицевой парез            |                   |
| <b>TE18</b><br>Chimai 瘕脉          | <b>M-TE18</b><br><b>F-TE18</b> | Голова, в центре сосцевидного отростка, на границе верхних двух третей и нижней трети кривой линии от TE17 к TE20                     | Головная боль, шум в ушах                        |                   |
| <b>TE19</b><br>Luxi 颅息            | <b>M-TE19</b><br><b>F-TE19</b> | Голова, на границе верхней трети и нижних двух третей кривой линии от TE17 к TE20                                                     | Головная боль, шум в ушах                        |                   |
| <b>TE20</b><br>Jiaosun 角孙         | <b>M-TE20</b><br><b>F-TE20</b> | Голова, прямо над верхушкой ушной раковины                                                                                            | Отёк десны, боль в ухе                           |                   |
| <b>TE21</b><br>Ermen 耳门           | <b>M-TE21</b><br><b>F-TE21</b> | Лицо, в углублении между надкозелковой вырезкой и мыщелковым отростком нижней челюсти                                                 | Шум в ушах, тугоухость, зубная боль              |                   |
| <b>TE22</b><br>Erheliao 耳和髎       | <b>M-TE22</b><br><b>F-TE22</b> | Голова, у заднего края височной линии роста волос, кпереди от корня ушной раковины, позади поверхностной височной артерии             | Головная боль, шум в ушах                        | !                 |

| Код ВОЗ / название           | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                          | Традиционные показания                   | Категория / метки |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>TE23</b><br>Sizhukong 丝竹空 | <b>M-TE23</b><br><b>F-TE23</b> | Голова, в углублении у латерального конца брови | Головная боль, покраснение глаз, тик век |                   |

## ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ


От наружного угла глаза (GB1) зигзагом по боковой поверхности головы, по боковой поверхности туловища и ноги к 4-му пальцу стопы (GB44).

ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО  
ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ


23:00–01:00 (концепция цзы-у лю-чжу;  
научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- GB24 — Мю желчного пузыря
- GB25 — Мю почек
- GB34 — Хэ-море; нижняя хэ-точка желчного пузыря; точка-собираатель сухожилий
- GB35 — Си-щель Ян-вэй
- GB36 — Си-щель
- GB37 — Ло
- GB38 — Цзин-река
- GB39 — Точка-собираатель костного мозга
- GB40 — Юань
- GB41 — Шу-поток; точка-ключ Дай-май
- GB43 — Ин-ручей
- GB44 — Цзин-колодец



Голова, латеральная проекция



Латеральная проекция

| Код ВОЗ / название           | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                 | Традиционные показания                 | Категория / метки |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>GB1</b><br>Tongziliao 瞳子膠 | <b>M-GB01</b><br><b>F-GB01</b> | Голова, в углублении 0,5 цуня латеральнее наружного угла глаза                                                                         | Головная боль, покраснение и боль глаз |                   |
| <b>GB2</b><br>Tinghui 听会     | <b>M-GB02</b><br><b>F-GB02</b> | Лицо, в углублении между межкозелковой вырезкой и мыщелковым отростком нижней челюсти                                                  | Шум в ушах, тугоухость, боль в ВНЧС    |                   |
| <b>GB3</b><br>Shangguan 上关   | <b>M-GB03</b><br><b>F-GB03</b> | Голова, в углублении над серединой верхнего края скуловой дуги                                                                         | Шум в ушах, зубная боль                |                   |
| <b>GB4</b><br>Hanyan 颌厌      | <b>M-GB04</b><br><b>F-GB04</b> | Голова, на границе верхней четверти и нижних трёх четвертей кривой линии от ST8 к GB7                                                  | Мигрень, головокружение                |                   |
| <b>GB5</b><br>Xuanlu 悬颅      | <b>M-GB05</b><br><b>F-GB05</b> | Голова, в середине кривой линии от ST8 к GB7                                                                                           | Мигрень, боль в наружном углу глаза    |                   |
| <b>GB6</b><br>Xuanli 悬厘      | <b>M-GB06</b><br><b>F-GB06</b> | Голова, на границе верхних трёх четвертей и нижней четверти кривой линии от ST8 к GB7                                                  | Мигрень, боль в наружном углу глаза    |                   |
| <b>GB7</b><br>Qubin 曲鬓       | <b>M-GB07</b><br><b>F-GB07</b> | Голова, на пересечении вертикальной линии заднего края височной линии роста волос и горизонтальной линии через верхушку ушной раковины | Головная боль, отёк щеки               |                   |

| Код ВОЗ / название                | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                                            | Традиционные показания                                               | Категория / метки |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GB8</b><br><u>Shuaigu</u> 率谷   | <b>M-GB08</b><br><b>F-GB08</b> | Голова, прямо над вершущей ушной раковины, 1,5 цуня выше височной линии роста волос                                                                                                               | Мигрень, головокружение                                              | TrP               |
| <b>GB9</b><br>Tianchong 天冲        | <b>M-GB09</b><br><b>F-GB09</b> | Голова, прямо над задним краем ушной раковины, 2 цуня выше линии роста волос                                                                                                                      | Головная боль, отёк десны                                            |                   |
| <b>GB10</b><br>Fubai 浮白           | <b>M-GB10</b><br><b>F-GB10</b> | Голова, позади и выше сосцевидного отростка, на границе верхней и средней третей кривой линии от GB9 к GB12                                                                                       | Головная боль, шум в ушах                                            |                   |
| <b>GB11</b><br>Touqiaoyin 头窍阴     | <b>M-GB11</b><br><b>F-GB11</b> | Голова, позади и выше сосцевидного отростка, на границе средней и нижней третей кривой линии от GB9 к GB12                                                                                        | Головная боль, шум в ушах, боль в ухе                                |                   |
| <b>GB12</b><br>Wangu 完骨           | <b>M-GB12</b><br><b>F-GB12</b> | Переднебоковая область шеи, в углублении позади и ниже сосцевидного отростка                                                                                                                      | Головная боль, скованность шеи, бессонница (трад.)                   |                   |
| <b>GB13</b><br>Benshen 本神         | <b>M-GB13</b><br><b>F-GB13</b> | Голова, 0,5 цуня выше передней линии роста волос, 3 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                                          | Головная боль, головокружение, судороги (трад.)                      |                   |
| <b>GB14</b><br>Yangbai 阳白         | <b>M-GB14</b><br><b>F-GB14</b> | Голова, 1 цунь выше брови, прямо над центром зрачка                                                                                                                                               | Лобная головная боль, птоз, парез лица                               |                   |
| <b>GB15</b><br>Toulinqi 头临泣       | <b>M-GB15</b><br><b>F-GB15</b> | Голова, 0,5 цуня выше передней линии роста волос, прямо над центром зрачка                                                                                                                        | Головная боль, заложенность носа, слезотечение                       |                   |
| <b>GB16</b><br>Muchuang 目窗        | <b>M-GB16</b><br><b>F-GB16</b> | Голова, 1,5 цуня выше передней линии роста волос, прямо над центром зрачка                                                                                                                        | Головная боль, покраснение глаз                                      |                   |
| <b>GB17</b><br>Zhengying 正营       | <b>M-GB17</b><br><b>F-GB17</b> | Голова, 2,5 цуня выше передней линии роста волос, прямо над центром зрачка                                                                                                                        | Головная боль, головокружение                                        |                   |
| <b>GB18</b><br>Chengling 承灵       | <b>M-GB18</b><br><b>F-GB18</b> | Голова, 4 цуня выше передней линии роста волос, прямо над центром зрачка                                                                                                                          | Головная боль, заложенность носа                                     |                   |
| <b>GB19</b><br>Naokong 脑空         | <b>M-GB19</b><br><b>F-GB19</b> | Голова, на уровне верхнего края наружного затылочного выступа, прямо над GB20                                                                                                                     | Головная боль, скованность шеи                                       |                   |
| <b>GB20</b><br><u>Fengchi</u> 风池  | <b>M-GB20</b><br><b>F-GB20</b> | Задняя область шеи, ниже затылочной кости, в углублении между началами ГКС и трапециевидной мышцы                                                                                                 | Головная боль, головокружение, скованность шеи, простуда (трад.)     | TrP !             |
| <b>GB21</b><br><u>Jianjing</u> 肩井 | <b>M-GB21</b><br><b>F-GB21</b> | Задняя область шеи, в середине линии между остистым отростком C7 и латеральным концом акромиона<br><br>♂ Трад. — боль в шее и плече<br>♀ Трад. — затруднённая лактация; избегать при беременности | Боль и скованность в шее и плече; в традиции — затруднённая лактация | TrP Б !           |
| <b>GB22</b><br>Yuanye 渊腋          | <b>M-GB22</b><br><b>F-GB22</b> | Боковая грудная стенка, в 4-м межреберье, на средней подмышечной линии                                                                                                                            | Распирание в груди, боль в подмышечной области                       | !                 |
| <b>GB23</b><br>Zhejin 辄筋          | <b>M-GB23</b><br><b>F-GB23</b> | Боковая грудная стенка, в 4-м межреберье, 1 цунь впереди от средней подмышечной линии                                                                                                             | Распирание в груди, одышка                                           | !                 |

| Код ВОЗ / название                     | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                     | Традиционные показания                                             | Категория / метки                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>GB24</b><br>Riyue 日月                | <b>M-GB24</b><br><b>F-GB24</b> | Передняя грудная стенка, в 7-м межреберье, 4 цуня латеральнее ПСЛ                                                                                                          | Боль в подреберье, рвота, желтуха (трад.)                          | Мю желчного пузыря<br>!                                                     |
| <b>GB25</b><br>Jingmen 京门              | <b>M-GB25</b><br><b>F-GB25</b> | Боковая стенка живота, ниже свободного конца 12-го ребра                                                                                                                   | Боль в пояснице и боку, отёки, урчание в животе                    | Мю почек<br>!                                                               |
| <b>GB26</b><br>Daimai 带脉               | <b>M-GB26</b><br><b>F-GB26</b> | Боковая стенка живота, ниже свободного конца 11-го ребра, на уровне центра пупка<br><br>♂ —<br>♀ Трад. — нарушения цикла, бели                                             | Нерегулярные менструации, бели (трад.), боль в пояснице            |                                                                             |
| <b>GB27</b><br>Wushu 五枢                | <b>M-GB27</b><br><b>F-GB27</b> | Нижняя часть живота, 3 цуня ниже центра пупка, медиальнее ПВПО                                                                                                             | Боль внизу живота, бели (трад.)                                    |                                                                             |
| <b>GB28</b><br>Weidao 维道               | <b>M-GB28</b><br><b>F-GB28</b> | Нижняя часть живота, 0,5 цуня медиальнее и ниже GB27                                                                                                                       | Боль внизу живота, опущение матки (трад.)                          |                                                                             |
| <b>GB29</b><br><u>Juliao</u> 居髃        | <b>M-GB29</b><br><b>F-GB29</b> | Ягодичная область, в середине линии между ПВПО и вершиной большого вертела                                                                                                 | Боль в пояснице и бедре                                            | TrP                                                                         |
| <b>GB30</b><br><u>Huantiao</u> 环跳      | <b>M-GB30</b><br><b>F-GB30</b> | Ягодичная область, на границе латеральной трети и медиальных двух третей линии от вершины большого вертела к крестцовой щели                                               | Боль в пояснице и ноге, ишиалгия                                   | TrP !                                                                       |
| <b>GB31</b><br><u>Fengshi</u> 风市       | <b>M-GB31</b><br><b>F-GB31</b> | Латеральная поверхность бедра, в углублении позади подвздошно-большеберцового тракта, где кончик среднего пальца касается бедра при стоянии с опущенными руками            | Боль и онемение ноги, зуд (трад.)                                  | TrP                                                                         |
| <b>GB32</b><br>Zhongdu 中渎              | <b>M-GB32</b><br><b>F-GB32</b> | Латеральная поверхность бедра, позади подвздошно-большеберцового тракта, 7 цуней выше подколенной складки                                                                  | Онемение и слабость ноги                                           |                                                                             |
| <b>GB33</b><br>Xiyangguan 膝阳关          | <b>M-GB33</b><br><b>F-GB33</b> | Латеральная сторона колена, в углублении между сухожилием двуглавой мышцы бедра и подвздошно-большеберцовым трактом, проксимальнее латерального надмыщелка бедренной кости | Боль и отёк колена                                                 |                                                                             |
| <b>GB34</b><br><u>Yanglingquan</u> 阳陵泉 | <b>M-GB34</b><br><b>F-GB34</b> | Латеральная поверхность голени, в углублении кпереди и дистальнее головки малоберцовой кости                                                                               | Боль в колене, судороги и слабость ноги, боль в подреберье (трад.) | Хэ-море; нижняя хэ-точка желчного пузыря; точка-собиратель сухожилий<br>TrP |
| <b>GB35</b><br>Yangjiao 阳交             | <b>M-GB35</b><br><b>F-GB35</b> | Латеральная поверхность голени, позади малоберцовой кости, 7 цуней выше выступа латеральной лодыжки                                                                        | Боль в колене и голени, распирание в груди                         | Си-щель Ян-вэй                                                              |
| <b>GB36</b><br>Waiqiu 外丘               | <b>M-GB36</b><br><b>F-GB36</b> | Латеральная поверхность голени, кпереди от малоберцовой кости, 7 цуней выше выступа латеральной лодыжки                                                                    | Боль в шее, груди и голени                                         | Си-щель                                                                     |
| <b>GB37</b><br>Guangming 光明            | <b>M-GB37</b><br><b>F-GB37</b> | Латеральная поверхность голени, кпереди от малоберцовой кости, 5 цуней выше выступа латеральной лодыжки                                                                    | Боль в глазах, ослабление зрения (трад.)                           | Ло                                                                          |

| Код ВОЗ / название           | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                             | Традиционные показания                                | Категория / метки               |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>GB38</b><br>Yangfu 阳辅     | <b>M-GB38</b><br><b>F-GB38</b> | Латеральная поверхность голени, кпереди от малоберцовой кости, 4 цуня выше выступа латеральной лодыжки                                             | Мигрень, боль в боку и голени                         | Цзин-река                       |
| <b>GB39</b><br>Xuanzhong 悬钟  | <b>M-GB39</b><br><b>F-GB39</b> | Латеральная поверхность голени, кпереди от малоберцовой кости, 3 цуня выше выступа латеральной лодыжки                                             | Скованность шеи, боль в ноге                          | Точка-собираетел костного мозга |
| <b>GB40</b><br>Qiuxu 丘墟      | <b>M-GB40</b><br><b>F-GB40</b> | Передне-латеральная сторона голеностопа, в углублении латеральнее сухожилия длинного разгибателя пальцев, кпереди и дистальнее латеральной лодыжки | Боль в голеностопе, боль в боку                       | Юань                            |
| <b>GB41</b><br>Zulinqi 足临泣   | <b>M-GB41</b><br><b>F-GB41</b> | Тыл стопы, дистальнее соединения оснований 4-й и 5-й плюсневых костей, в углублении латеральнее сухожилия разгибателя мизинца                      | Мигрень, боль в стопе, боль в молочной железе (трад.) | Шу-поток; точка-ключ Дай-май    |
| <b>GB42</b><br>Diwuhui 地五会   | <b>M-GB42</b><br><b>F-GB42</b> | Тыл стопы, между 4-й и 5-й плюсневыми костями, в углублении проксимальнее 4-го плюснефалангового сустава                                           | Покраснение глаз, отёк тыла стопы                     |                                 |
| <b>GB43</b><br>Xiayi 侠溪      | <b>M-GB43</b><br><b>F-GB43</b> | Тыл стопы, между 4-м и 5-м пальцами, проксимальнее края перепонки, на границе тыльной и подошвенной кожи                                           | Головная боль, головокружение, шум в ушах             | Ин-ручей                        |
| <b>GB44</b><br>Zuqiaoyin 足窍阴 | <b>M-GB44</b><br><b>F-GB44</b> | 4-й палец стопы, латеральнее дистальной фаланги, 0,1 цуня от латерального угла ногтевого ложа                                                      | Мигрень, покраснение глаз, лихорадка                  | Цзин-колодец                    |

## ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ


От большого пальца стопы (LR1) по медиальной поверхности ноги, через пах к 6-му межреберью (LR14).

## ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ

01:00–03:00 (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- LR1 — Цзин-колодец
- LR2 — Ин-ручей
- LR3 — Шу-поток / Юань
- LR4 — Цзин-река
- LR5 — Ло
- LR6 — Си-щель
- LR8 — Хэ-море
- LR13 — Мю селезёнки; точка-собираатель плотных органов
- LR14 — Мю печени



Вид спереди

| Код ВОЗ / название         | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                    | Традиционные показания                                                             | Категория / метки |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>LR1</b><br>Dadun 大敦     | <b>M-LR01</b><br><b>F-LR01</b> | Большой палец стопы, латеральное дистальной фаланги, 0,1 цуня от латерального угла ногтевого ложа<br><br>♂ Трад. — грыжа, боль в яичке<br>♀ Трад. — маточные кровотечения | Маточные кровотечения, грыжа (трад.)                                               | Цзин-колодец      |
| <b>LR2</b><br>Xingjian 行间  | <b>M-LR02</b><br><b>F-LR02</b> | Тыл стопы, между 1-м и 2-м пальцами, проксимальнее края перепонки, на границе тыльной и подошвенной кожи                                                                  | Головная боль, покраснение глаз, раздражительность (трад.)                         | Ин-ручей          |
| <b>LR3</b><br>Taichong 太冲  | <b>M-LR03</b><br><b>F-LR03</b> | Тыл стопы, между 1-й и 2-й плюсневными костями, в углублении дистальнее соединения их оснований, над пульсацией тыльной артерии стопы                                     | Головная боль, головокружение, раздражительность, нерегулярные менструации (трад.) | Шу-поток / Юань   |
| <b>LR4</b><br>Zhongfeng 中封 | <b>M-LR04</b><br><b>F-LR04</b> | Передне-медиальная сторона голеностопа, медиальнее сухожилия передней большеберцовой мышцы, в углублении кпереди от медиальной лодыжки                                    | Боль в лодыжке, грыжа (трад.)                                                      | Цзин-река         |
| <b>LR5</b><br>Ligou 蠡沟     | <b>M-LR05</b><br><b>F-LR05</b> | Передне-медиальная поверхность голени, в центре медиальной поверхности большеберцовой кости, 5 цуней выше выступа медиальной лодыжки                                      | Зуд половых органов, нерегулярные менструации (трад.)                              | Ло                |

| Код ВОЗ / название         | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                        | Традиционные показания                           | Категория / метки                                   |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>LR6</b><br>Zhongdu 中都   | <b>M-LR06</b><br><b>F-LR06</b> | Передне-медиальная поверхность голени, в центре медиальной поверхности большеберцовой кости, 7 цуней выше выступа медиальной лодыжки          | Боль внизу живота, маточные кровотечения (трад.) | Си-щель                                             |
| <b>LR7</b><br>Xiguan 膝关    | <b>M-LR07</b><br><b>F-LR07</b> | Медиальная поверхность голени, ниже медиального мыщелка большеберцовой кости, 1 цунь позади SP9                                               | Боль в колене                                    |                                                     |
| <b>LR8</b><br>Ququan 曲泉    | <b>M-LR08</b><br><b>F-LR08</b> | Медиальная сторона колена, в углублении медиальнее сухожилий полусухожильной и полуперепончатой мышц, у медиального конца подколенной складки | Боль в колене, урогенитальные нарушения (трад.)  | Хэ-море                                             |
| <b>LR9</b><br>Yinbao 阴包    | <b>M-LR09</b><br><b>F-LR09</b> | Медиальная поверхность бедра, между тонкой и портняжной мышцами, 4 цуня выше основания надколенника                                           | Нерегулярные менструации, задержка мочи (трад.)  |                                                     |
| <b>LR10</b><br>Zuwuli 足五里  | <b>M-LR10</b><br><b>F-LR10</b> | Медиальная поверхность бедра, 3 цуня дистальнее ST30, над пульсацией артерии                                                                  | Боль внизу живота, задержка мочи                 | !                                                   |
| <b>LR11</b><br>Yinlian 阴廉  | <b>M-LR11</b><br><b>F-LR11</b> | Медиальная поверхность бедра, 2 цуня дистальнее ST30                                                                                          | Нерегулярные менструации (трад.), боль в бедре   | !                                                   |
| <b>LR12</b><br>Jimai 急脉    | <b>M-LR12</b><br><b>F-LR12</b> | Паховая область, на уровне верхнего края лобкового симфиза, 2,5 цуня латеральнее ПСЛ                                                          | Боль внизу живота, грыжа (трад.)                 | !                                                   |
| <b>LR13</b><br>Zhangmen 章门 | <b>M-LR13</b><br><b>F-LR13</b> | Боковая стенка живота, ниже свободного конца 11-го ребра                                                                                      | Вздутие, боль в подреберье, диарея               | Мю селезёнки; точка-собиратель плотных органов<br>! |
| <b>LR14</b><br>Qimen 期门    | <b>M-LR14</b><br><b>F-LR14</b> | Передняя грудная стенка, в 6-м межреберье, 4 цуня латеральнее ПСЛ                                                                             | Боль в подреберье, распирающие в груди, рвота    | Мю печени<br>!                                      |

**ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ**


От промежности (GV1) по задней срединной линии через макушку к верхней десне (GV28).

**ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО  
ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ**


— (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА**

- GV1 — Ло



Вид сзади



Голова, латеральная проекция

| Код ВОЗ / название            | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                    | Традиционные показания                            | Категория / метки |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GV1</b><br>Changqiang 长强   | <b>M-GV01</b><br><b>F-GV01</b> | Промежность, ниже копчика, посередине между верхушкой копчика и заднепроходным отверстием | Геморрой, диарея, боль в копчике                  | Ло                |
| <b>GV2</b><br>Yaoshu 腰俞       | <b>M-GV02</b><br><b>F-GV02</b> | Крестцовая область, в крестцовой щели, на ЗСЛ                                             | Боль в пояснице, нерегулярные менструации (трад.) | <b>Б</b>          |
| <b>GV3</b><br>Yaoyangguan 腰阳关 | <b>M-GV03</b><br><b>F-GV03</b> | Поясничная область, в углублении ниже остистого отростка L4, на ЗСЛ                       | Боль в пояснице, слабость ног                     | <b>Б</b>          |
| <b>GV4</b><br>Mingmen 命门      | <b>M-GV04</b><br><b>F-GV04</b> | Поясничная область, в углублении ниже остистого отростка L2, на ЗСЛ                       | Боль в пояснице, урогенитальные нарушения (трад.) | <b>Б</b>          |
| <b>GV5</b><br>Xuanshu 悬枢      | <b>M-GV05</b><br><b>F-GV05</b> | Поясничная область, в углублении ниже остистого отростка L1, на ЗСЛ                       | Скованность поясницы, диарея                      |                   |
| <b>GV6</b><br>Jizhong 脊中      | <b>M-GV06</b><br><b>F-GV06</b> | Верхняя часть спины, в углублении ниже остистого отростка Th11, на ЗСЛ                    | Диарея, боль в спине                              |                   |
| <b>GV7</b><br>Zhongshu 中枢     | <b>M-GV07</b><br><b>F-GV07</b> | Верхняя часть спины, в углублении ниже остистого отростка Th10, на ЗСЛ                    | Боль в спине, боль в эпигастрии                   |                   |
| <b>GV8</b><br>Jinsuo 筋缩       | <b>M-GV08</b><br><b>F-GV08</b> | Верхняя часть спины, в углублении ниже остистого отростка Th9, на ЗСЛ                     | Скованность спины, судороги (трад.)               |                   |

| Код ВОЗ / название          | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                | Традиционные показания                                                              | Категория / метки |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>GV9</b><br>Zhiyang 至阳    | <b>M-GV09</b><br><b>F-GV09</b> | Верхняя часть спины, в углублении ниже остистого отростка Th7, на ЗСЛ                                 | Желтуха (трад.), кашель, боль в спине                                               |                   |
| <b>GV10</b><br>Lingtai 灵台   | <b>M-GV10</b><br><b>F-GV10</b> | Верхняя часть спины, в углублении ниже остистого отростка Th6, на ЗСЛ                                 | Кашель, боль в спине                                                                |                   |
| <b>GV11</b><br>Shendao 神道   | <b>M-GV11</b><br><b>F-GV11</b> | Верхняя часть спины, в углублении ниже остистого отростка Th5, на ЗСЛ                                 | Сердцебиение, тревога (трад.), боль в спине                                         |                   |
| <b>GV12</b><br>Shenzhu 身柱   | <b>M-GV12</b><br><b>F-GV12</b> | Верхняя часть спины, в углублении ниже остистого отростка Th3, на ЗСЛ                                 | Кашель, лихорадка, скованность спины                                                |                   |
| <b>GV13</b><br>Taodao 陶道    | <b>M-GV13</b><br><b>F-GV13</b> | Верхняя часть спины, в углублении ниже остистого отростка Th1, на ЗСЛ                                 | Лихорадка, скованность шеи                                                          |                   |
| <b>GV14</b><br>Dazhui 大椎    | <b>M-GV14</b><br><b>F-GV14</b> | Задняя область шеи, в углублении ниже остистого отростка C7, на ЗСЛ                                   | Лихорадка, скованность шеи, кашель                                                  |                   |
| <b>GV15</b><br>Yamen 哑门     | <b>M-GV15</b><br><b>F-GV15</b> | Задняя область шеи, в углублении выше остистого отростка C2, на ЗСЛ                                   | Потеря голоса, скованность шеи (трад.)                                              | !                 |
| <b>GV16</b><br>Fengfu 风府    | <b>M-GV16</b><br><b>F-GV16</b> | Задняя область шеи, прямо под наружным затылочным выступом, в углублении между трапецевидными мышцами | Головная боль, головокружение, скованность шеи                                      | !                 |
| <b>GV17</b><br>Naohu 脑户     | <b>M-GV17</b><br><b>F-GV17</b> | Голова, в углублении над наружным затылочным выступом                                                 | Головная боль, головокружение                                                       |                   |
| <b>GV18</b><br>Qiangjian 强间 | <b>M-GV18</b><br><b>F-GV18</b> | Голова, 4 цуня выше задней линии роста волос, на ЗСЛ                                                  | Головная боль, скованность шеи                                                      |                   |
| <b>GV19</b><br>Houding 后顶   | <b>M-GV19</b><br><b>F-GV19</b> | Голова, 5,5 цуня выше задней линии роста волос, на ЗСЛ                                                | Головная боль, головокружение                                                       |                   |
| <b>GV20</b><br>Baihui 百会    | <b>M-GV20</b><br><b>F-GV20</b> | Голова, 5 цуней выше передней линии роста волос, на срединной линии                                   | Головная боль, головокружение, пролапс (трад.)                                      |                   |
| <b>GV21</b><br>Qianding 前顶  | <b>M-GV21</b><br><b>F-GV21</b> | Голова, 3,5 цуня выше передней линии роста волос, на срединной линии                                  | Головная боль, головокружение                                                       |                   |
| <b>GV22</b><br>Xinhui 囟会    | <b>M-GV22</b><br><b>F-GV22</b> | Голова, 2 цуня выше передней линии роста волос, на срединной линии                                    | Головная боль, заложенность носа; у младенцев с незаросшим родничком не применяется | !                 |
| <b>GV23</b><br>Shangxing 上星 | <b>M-GV23</b><br><b>F-GV23</b> | Голова, 1 цунь выше передней линии роста волос, на срединной линии                                    | Головная боль, носовое кровотечение, заложенность носа                              |                   |
| <b>GV24</b><br>Shenting 神庭  | <b>M-GV24</b><br><b>F-GV24</b> | Голова, 0,5 цуня выше передней линии роста волос, на срединной линии                                  | Головная боль, бессонница, беспокойство (трад.)                                     |                   |
| <b>GV25</b><br>Suliao 素髎    | <b>M-GV25</b><br><b>F-GV25</b> | Лицо, на кончике носа                                                                                 | Заложенность носа; в традиции — неотложная точка                                    |                   |
| <b>GV26</b><br>Shuigou 水沟   | <b>M-GV26</b><br><b>F-GV26</b> | Лицо, на границе верхней трети и средней трети носогубного желобка                                    | Потеря сознания (трад. неотложная точка), острая боль в пояснице                    |                   |

| Код ВОЗ / название        | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                   | Традиционные показания      | Категория / метки |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>GV27</b><br>Duiduan 兑端 | <b>M-GV27</b><br><b>F-GV27</b> | Лицо, в середине бугорка верхней губы                                    | Боль и отёк десны           |                   |
| <b>GV28</b><br>Yinjiao 龈交 | <b>M-GV28</b><br><b>F-GV28</b> | Внутри верхней губы, на соединении уздечки верхней губы с верхней десной | Боль и кровоточивость десны |                   |

## ХОД НАРУЖНОЙ ВЕТВИ


От промежности (CV1) по передней срединной линии к подбородочно-губной борозде (CV24).

## ВРЕМЯ «МАКСИМУМА» ПО ТРАДИЦИОННЫМ ЧАСАМ ОРГАНОВ

— (концепция цзы-у лю-чжу; научно не подтверждена — см. раздел 10.6)

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КАНАЛА

- CV3 — Мю мочевого пузыря
- CV4 — Мю тонкой кишки
- CV5 — Мю тройного обогревателя
- CV12 — Мю желудка; точка-собираатель полых органов
- CV14 — Мю сердца
- CV15 — Ло
- CV17 — Мю перикарда; точка-собираатель ци



Вид спереди

| Код ВОЗ / название        | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                                                                                                              | Традиционные показания                                        | Категория / метки              |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>CV1</b><br>Huiyin 会阴   | <b>M-CV01</b><br><b>F-CV01</b> | Промежность. ♂: посередине между задним краем мошонки и заднепроходным отверстием. ♀: посередине между задней спайкой больших половых губ и заднепроходным отверстием<br><br>♂ ♂ ориентир — задний край мошонки<br>♀ ♀ ориентир — задняя спайка больших половых губ | Урогенитальные нарушения, геморрой; в традиции — утопление    | <b>Б</b>                       |
| <b>CV2</b><br>Qugu 曲骨     | <b>M-CV02</b><br><b>F-CV02</b> | Нижняя часть живота, над верхним краем лобкового симфиза, на ПСЛ                                                                                                                                                                                                    | Задержка мочи, урогенитальные нарушения                       | <b>Б</b>                       |
| <b>CV3</b><br>Zhongji 中极  | <b>M-CV03</b><br><b>F-CV03</b> | Нижняя часть живота, 4 цуня ниже центра пупка, на ПСЛ<br><br>♂ Трад. — урогенитальные нарушения<br>♀ Трад. — нарушения цикла; избегать при беременности                                                                                                             | Задержка мочи, энурез, нарушения менструального цикла (трад.) | Мю мочевого пузыря<br><b>Б</b> |
| <b>CV4</b><br>Guanyuan 关元 | <b>M-CV04</b><br><b>F-CV04</b> | Нижняя часть живота, 3 цуня ниже центра пупка, на ПСЛ<br><br>♂ Трад. — урогенитальные нарушения<br>♀ Трад. — нарушения цикла; избегать при беременности                                                                                                             | Урогенитальные нарушения, диарея, истощение (трад.)           | Мю тонкой кишки<br><b>Б</b>    |

| Код ВОЗ / название          | Условный код ♂ / ♀             | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                           | Традиционные показания                                                                               | Категория / метки                             |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>CV5</b><br>Shimen 石门     | <b>M-CV05</b><br><b>F-CV05</b> | Нижняя часть живота, 2 цуня ниже центра пупка, на ПСЛ<br><br>♂ —<br>♀ Классический запрет иглоукалывания у женщин (Чжэньцзю цзян цзин); доказательных данных нет | Боль в животе, диарея, отёки; в классических текстах — запрет иглоукалывания у женщин (см. раздел 9) | Мю тройного обогревателя<br><b>Б</b>          |
| <b>CV6</b><br>Qihai 气海      | <b>M-CV06</b><br><b>F-CV06</b> | Нижняя часть живота, 1,5 цуня ниже центра пупка, на ПСЛ                                                                                                          | Боль в животе, истощение (трад.), урогенитальные нарушения                                           | <b>Б</b>                                      |
| <b>CV7</b><br>Yinjiao 阴交    | <b>M-CV07</b><br><b>F-CV07</b> | Нижняя часть живота, 1 цунь ниже центра пупка, на ПСЛ                                                                                                            | Боль вокруг пупка, нерегулярные менструации (трад.)                                                  | <b>Б</b>                                      |
| <b>CV8</b><br>Shenque 神阙    | <b>M-CV08</b><br><b>F-CV08</b> | Живот, в центре пупка                                                                                                                                            | Диарея, боль в животе; иглоукалывание не проводится (традиционно — только прижигание)                |                                               |
| <b>CV9</b><br>Shuifen 水分    | <b>M-CV09</b><br><b>F-CV09</b> | Верхняя часть живота, 1 цунь выше центра пупка, на ПСЛ                                                                                                           | Отёки, урчание в животе                                                                              |                                               |
| <b>CV10</b><br>Xiawan 下脘    | <b>M-CV10</b><br><b>F-CV10</b> | Верхняя часть живота, 2 цуня выше центра пупка, на ПСЛ                                                                                                           | Боль в эпигастрии, вздутие                                                                           |                                               |
| <b>CV11</b><br>Jianli 建里    | <b>M-CV11</b><br><b>F-CV11</b> | Верхняя часть живота, 3 цуня выше центра пупка, на ПСЛ                                                                                                           | Боль в эпигастрии, рвота                                                                             |                                               |
| <b>CV12</b><br>Zhongwan 中脘  | <b>M-CV12</b><br><b>F-CV12</b> | Верхняя часть живота, 4 цуня выше центра пупка, на ПСЛ                                                                                                           | Боль в эпигастрии, рвота, вздутие                                                                    | Мю желудка; точка-собираТЕЛЬ полых органов    |
| <b>CV13</b><br>Shangwan 上脘  | <b>M-CV13</b><br><b>F-CV13</b> | Верхняя часть живота, 5 цуней выше центра пупка, на ПСЛ                                                                                                          | Боль в эпигастрии, рвота                                                                             |                                               |
| <b>CV14</b><br>Juque 巨阙     | <b>M-CV14</b><br><b>F-CV14</b> | Верхняя часть живота, 6 цуней выше центра пупка, на ПСЛ                                                                                                          | Боль в груди, рвота, беспокойство (трад.)                                                            | Мю сердца<br><b>!</b>                         |
| <b>CV15</b><br>Jiuwei 鸠尾    | <b>M-CV15</b><br><b>F-CV15</b> | Верхняя часть живота, 1 цунь ниже грудино-мечевидного соединения, на ПСЛ                                                                                         | Боль в груди, икота                                                                                  | Ло<br><b>!</b>                                |
| <b>CV16</b><br>Zhongting 中庭 | <b>M-CV16</b><br><b>F-CV16</b> | Передняя грудная стенка, в середине грудино-мечевидного соединения, на ПСЛ                                                                                       | Распирание в груди, рвота                                                                            |                                               |
| <b>CV17</b><br>Danzhong 膻中  | <b>M-CV17</b><br><b>F-CV17</b> | Передняя грудная стенка, на уровне 4-го межреберья, на ПСЛ<br><br>♂ —<br>♀ Трад. — недостаток лактации                                                           | Боль и стеснение в груди, одышка; в традиции — недостаток лактации                                   | Мю перикарда; точка-собираТЕЛЬ ци<br><b>!</b> |
| <b>CV18</b><br>Yutang 玉堂    | <b>M-CV18</b><br><b>F-CV18</b> | Передняя грудная стенка, на уровне 3-го межреберья, на ПСЛ                                                                                                       | Кашель, боль в груди                                                                                 |                                               |
| <b>CV19</b><br>Zigong 紫宫    | <b>M-CV19</b><br><b>F-CV19</b> | Передняя грудная стенка, на уровне 2-го межреберья, на ПСЛ                                                                                                       | Кашель, боль в груди                                                                                 |                                               |
| <b>CV20</b><br>Huagai 华盖    | <b>M-CV20</b><br><b>F-CV20</b> | Передняя грудная стенка, на уровне 1-го межреберья, на ПСЛ                                                                                                       | Кашель, одышка, боль в груди                                                                         |                                               |
| <b>CV21</b><br>Xuanji 璇玑    | <b>M-CV21</b><br><b>F-CV21</b> | Передняя грудная стенка, 1 цунь ниже надгрудинной ямки, на ПСЛ                                                                                                   | Кашель, боль в горле                                                                                 |                                               |

| Код ВОЗ / название           | Условный код<br>♂ / ♀          | Локализация (WHO 2008)                                            | Традиционные показания                                 | Категория / метки                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CV22</b><br>Tiantu 天突     | <b>M-CV22</b><br><b>F-CV22</b> | Передняя область шеи, в центре надгрудинной ямки, на ПСЛ          | Кашель, боль в горле, осиплость                        |  |
| <b>CV23</b><br>Lianquan 廉泉   | <b>M-CV23</b><br><b>F-CV23</b> | Передняя область шеи, над верхним краем подъязычной кости, на ПСЛ | Отёк под языком, нарушение речи, затруднённое глотание |                                                                                     |
| <b>CV24</b><br>Chengjiang 承浆 | <b>M-CV24</b><br><b>F-CV24</b> | Лицо, в углублении в центре подбородочно-губной борозды           | Лицевой парез, зубная боль, слюнотечение               |                                                                                     |

# 7 Внеканальные (экстра-) точки

Экстра-точки (经外奇穴) не входят в 14 каналов, но имеют стандартные названия и локализации (номенклатура ВОЗ 1991, WHO 2008). Ниже — выборка наиболее употребимых. Точка Иньтан (EX-HN3) в ряде современных стандартов перенесена в заднесрединный канал (GV29), в международной литературе встречаются оба обозначения.

| Код ВОЗ / название       | Условный код ♂ / ♀   | Локализация (WHO 2008)                                                                                                                                                                 | Традиционные показания                                      | Категория / метки |
|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| EX-HN1<br>Sishencong 四神聪 | M-EXHN01<br>F-EXHN01 | Голова, 4 точки: по 1 цуню кпереди, кзади и латеральнее GV20                                                                                                                           | Головная боль, головокружение, бессонница (трад.)           |                   |
| EX-HN3<br>Yintang 印堂     | M-EXHN03<br>F-EXHN03 | Голова, в углублении посередине между медиальными концами бровей (в ряде стандартов — GV29)                                                                                            | Головная боль, заложенность носа, бессонница (трад.)        |                   |
| EX-HN4<br>Yuyao 鱼腰       | M-EXHN04<br>F-EXHN04 | Голова, прямо над зрачком, в центре брови                                                                                                                                              | Боль в надбровье, птоз                                      |                   |
| EX-HN5<br>Taiyang 太阳     | M-EXHN05<br>F-EXHN05 | Голова, в углублении примерно на 1 цунь кзади от середины между латеральным концом брови и наружным углом глаза                                                                        | Головная боль, боль в глазах                                | TrP               |
| EX-HN7<br>Qiuhou 球后      | M-EXHN07<br>F-EXHN07 | Лицо, на границе латеральной четверти и медиальных трёх четвертей нижнего края глазницы                                                                                                | Болезни глаз (трад.)                                        | !                 |
| EX-HN14<br>Yiming 翳明     | M-EXHN14<br>F-EXHN14 | Шея, 1 цунь кзади от TE17                                                                                                                                                              | Болезни глаз, шум в ушах, бессонница (трад.)                |                   |
| EX-CA1<br>Zigong 子宫      | M-EXCA01<br>F-EXCA01 | Нижняя часть живота, 4 цуня ниже центра пупка, 3 цуня латеральнее ПСЛ<br><div>♂ Не применяется (анатомически — зона над маткой у женщин)<br/>♀ Трад. — опущение матки, бесплодие</div> | Опущение матки, нерегулярные менструации, бесплодие (трад.) | Б                 |
| EX-B1<br>Dingchuan 定喘    | M-EXB01<br>F-EXB01   | Верхняя часть спины, 0,5 цуня латеральнее нижнего края остистого отростка C7                                                                                                           | Одышка, кашель                                              |                   |
| EX-B2<br>Jiaji 夹脊        | M-EXB02<br>F-EXB02   | Спина, 17 пар точек: 0,5 цуня латеральнее нижних краёв остистых отростков Th1–L5                                                                                                       | Боль в спине; сегментарные нарушения                        | !                 |
| EX-B7<br>Yaoyan 腰眼       | M-EXB07<br>F-EXB07   | Поясничная область, в углублении ~3,5 цуня латеральнее нижнего края остистого отростка L4                                                                                              | Боль в пояснице                                             |                   |
| EX-UE9<br>Baxie 八邪       | M-EXUE09<br>F-EXUE09 | Тыл кисти, 8 точек: между пальцами, проксимальнее краёв перепонок, на границе тыльной и ладонной кожи                                                                                  | Онемение пальцев, отёк тыла кисти                           |                   |
| EX-UE10<br>Sifeng 四缝     | M-EXUE10<br>F-EXUE10 | Ладонная сторона 2–5-го пальцев, 8 точек: в центре проксимальных межфаланговых складок                                                                                                 | Нарушения пищеварения у детей (трад.)                       |                   |
| EX-UE11<br>Shixuan 十宣    | M-EXUE11<br>F-EXUE11 | Кончики 10 пальцев кисти, 0,1 цуня от свободного края ногтя                                                                                                                            | Лихорадка, потеря сознания (трад. неотложные точки)         |                   |
| EX-LE2<br>Heding 鹤顶      | M-EXLE02<br>F-EXLE02 | Колено, в углублении над серединой основания надколенника                                                                                                                              | Боль в колене                                               |                   |

| Код ВОЗ / название          | Условный код<br>♂ / ♀              | Локализация (WHO 2008)                                                                           | Традиционные показания                  | Категория / метки |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>EX-LE5</b><br>Xiyao 膝眼   | <b>M-EXLE05</b><br><b>F-EXLE05</b> | Колено, 4 точки: в углублениях медиальнее и латеральнее связки надколенника (латеральная = ST35) | Боль в колене                           |                   |
| <b>EX-LE6</b><br>Dannang 胆囊 | <b>M-EXLE06</b><br><b>F-EXLE06</b> | Голень, 2 цуня ниже GB34                                                                         | Боль в подреберье (трад.)               |                   |
| <b>EX-LE7</b><br>Lanwei 阑尾  | <b>M-EXLE07</b><br><b>F-EXLE07</b> | Голень, 2 цуня ниже ST36                                                                         | Боль в животе (трад.)                   |                   |
| <b>EX-LE10</b><br>Bafeng 八风 | <b>M-EXLE10</b><br><b>F-EXLE10</b> | Тыл стопы, 8 точек: между пальцами, проксимальнее краёв перепонки                                | Онемение пальцев стопы, отёк тыла стопы |                   |

## 8 Миофасциальные триггерные точки и акупунктура

**Краткий вывод.** Миофасциальная триггерная точка (TrP) — гипервозбудимый участок в тугом тяжё скелетной мышцы, болезненный при давлении и способный давать отражённую боль (Travell & Simons). Ряд классических точек акупунктуры анатомически совпадает с типичными TrP. Насколько велико это совпадение, спорно, поэтому метка TrP в издании означает совпадение анатомической локализации, а не тождество понятий.

### АРГУМЕНТЫ ЗА СООТВЕТСТВИЕ

- Melzack, Stillwell, Fox (*Pain*, 1977): около 71 % соответствия между триггерными точками и точками акупунктуры, применяемыми при боли.
- Dorsher (2008): по оценке автора, анатомическое совпадение большинства классических TrP с точками акупунктуры составляет около 92 %, совпадение по клиническим показаниям — около 79 %.

### КРИТИКА

- Birch (2003) оспорил методологию Melzack и соавт.: сравнивались понятия разной природы (TrP выявляются пальпацией у конкретного пациента, точки акупунктуры — фиксированные локализации).
- Надёжность пальпаторной диагностики TrP между разными исследователями ограничена.
- Dry needling (иглоукалывание триггерных точек) развивалось как самостоятельный метод западной мануальной медицины.

### 8.1. Точки, отмеченные как триггерные (33)

В таблицах каналов эти точки подчёркнуты двойной линией. Выбраны точки, где расположение над брюшком конкретной мышцы очевидно из анатомии и совпадает с классическими зонами TrP: верхняя трапецевидная мышца (GB21), подостная (SI11), надостная (SI12), дельтовидная (LI15, LI14), разгибатели запястья (LI10, LI11), первая тыльная межкостная и приводящая большого пальца (LI4), жевательная (ST6, ST7), подзатылочные мышцы и ременная мышца головы (GB20, BL10), передняя большеберцовая (ST36, ST37), длинная малоберцовая (GB34), икроножная (BL57), ягодичные и грушевидная (GB30, BL54), напрягатель широкой фасции (GB29), латеральная широкая (GB31, ST32), медиальная широкая (SP10), квадратная мышца поясницы (BL52), мышца, поднимающая лопатку (SI14, TE15) и др.

LI1 Zhongfu

LI4 Hegu

LI10 Shousanli

LI11 Quchi

LI14 Binao

LI15 Jianyu

ST6 Jiache

ST7 Xiaguan

ST32 Futu

ST36 Zusanli

ST37 Shangjuxu

SP10 Xuehai

SI9 Jianzhen

SI10 Naoshu

SI11 Tianzong

SI12 Bingfeng

SI13 Quyuan

SI14 Jianwaishu

SI15 Jianzhongshu

BL10 Tianzhu

BL52 Zhishi

BL54 Zhibian

BL57 Chengshan

TE14 Jianliao

TE15 Tianliao

GB8 Shuaigu

GB20 Fengchi

GB21 Jianjing

GB29 Juliao

GB30 Huantiao

GB31 Fengshi

GB34 Yanglingquan

EX-HN5 Taiyang

### ПРАКТИЧЕСКИ

Список не исчерпывающий: при миофасциальном синдроме TrP находят пальпаторно у конкретного пациента, а не по таблице. Метка помогает связать две терминологии при чтении литературы.

## 9 Мужское и женское тело

**Краткий вывод.** Классические локализации 361 точки одинаковы для мужчин и женщин: пропорциональный цунь масштабируется индивидуально. Половые различия касаются четырёх областей: (1) анатомических ориентиров промежности и груди; (2) беременности; (3) традиционных «мужских» и «женских» показаний; (4) данных исследований по полоспецифическим состояниям. Этим и объясняются условные коды M-/F-.

### 9.1. Точки с задокументированными половыми различиями

| ВОЗ  | Код ♂ / ♀        | ♂ мужское тело                        | ♀ женское тело                                                                             |
|------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CV1  | M-CV01<br>F-CV01 | ♂ ориентир — задний край мошонки      | ♀ ориентир — задняя спайка больших половых губ                                             |
| ST17 | M-ST17<br>F-ST17 | Ориентир положения ЗСЛ/сосковой линии | У женщин положение соска варьируется — отсчёт по межреберьям и 4 цуням от ПСЛ              |
| ST18 | M-ST18<br>F-ST18 | —                                     | Лежит у основания молочной железы; trad. — лактация                                        |
| PC1  | M-PC01<br>F-PC01 | Ориентир: 1 цунь латеральнее соска    | Ориентир: 4-е межреберье, 5 цуней от ПСЛ (сосок не используется)                           |
| SP18 | M-SP18<br>F-SP18 | —                                     | Trad. — лактация; ткань молочной железы над межреберьем                                    |
| KI23 | M-KI23<br>F-KI23 | —                                     | Trad. — мастит                                                                             |
| CV17 | M-CV17<br>F-CV17 | —                                     | Trad. — недостаток лактации                                                                |
| SI1  | M-SI01<br>F-SI01 | —                                     | Trad. — недостаток лактации                                                                |
| GB21 | M-GB21<br>F-GB21 | Trad. — боль в шее и плече            | Trad. — затруднённая лактация; избегать при беременности                                   |
| SP6  | M-SP06<br>F-SP06 | Trad. — урогенитальные нарушения      | Trad. — дисменорея, нерегулярные менструации; избегать при беременности                    |
| LI4  | M-LI04<br>F-LI04 | —                                     | Избегать при беременности (классическая традиция)                                          |
| BL60 | M-BL60<br>F-BL60 | —                                     | Избегать при беременности (классическая традиция)                                          |
| BL67 | M-BL67<br>F-BL67 | —                                     | Прижигание при тазовом предлежании — только под наблюдением акушера                        |
| CV5  | M-CV05<br>F-CV05 | —                                     | Классический запрет иглоукалывания у женщин (Чжэньцзю цзяи цзин); доказательных данных нет |
| BL32 | M-BL32<br>F-BL32 | Trad. — урогенитальные нарушения      | Trad. — дисменорея; избегать при беременности                                              |
| BL33 | M-BL33<br>F-BL33 | —                                     | РКИ (JAMA 2017) — стрессовое недержание мочи у женщин                                      |
| LR1  | M-LR01<br>F-LR01 | Trad. — грыжа, боль в яичке           | Trad. — маточные кровотечения                                                              |

| ВОЗ           | Код ♂ / ♀            | ♂ мужское тело                                           | ♀ женское тело                                     |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SP1</b>    | M-SP01<br>F-SP01     | —                                                        | Трад. — маточные кровотечения                      |
| <b>ST29</b>   | M-ST29<br>F-ST29     | Трад. — паховая грыжа                                    | Трад. — аменорея, дисменорея                       |
| <b>EX-CA1</b> | M-EXCA01<br>F-EXCA01 | Не применяется (анатомически — зона над маткой у женщин) | Трад. — опущение матки, бесплодие                  |
| <b>GB26</b>   | M-GB26<br>F-GB26     | —                                                        | Трад. — нарушения цикла, бели                      |
| <b>KI5</b>    | M-KI05<br>F-KI05     | —                                                        | Трад. — аменорея, дисменорея                       |
| <b>CV4</b>    | M-CV04<br>F-CV04     | Трад. — урогенитальные нарушения                         | Трад. — нарушения цикла; избегать при беременности |
| <b>CV3</b>    | M-CV03<br>F-CV03     | Трад. — урогенитальные нарушения                         | Трад. — нарушения цикла; избегать при беременности |

## 9.2. Беременность

### ТРАДИЦИОННО ЗАПРЕЩЁННЫЕ ИЛИ «ОСТОРОЖНЫЕ» ТОЧКИ

Классическая литература запрещает при беременности прежде всего **LI4**, **SP6**, **BL60**, **BL67**, **GB21**, а также точки нижней части живота и пояснично-крестцовой области (особенно во II–III триместре). В издании они помечены **Б**: LI4, ST25, ST26, ST27, ST28, ST29, ST30, SP6, SP13, SP14, BL27, BL28, BL29, BL30, BL31, BL32, BL33, BL34, BL53, BL60, BL67, KI11, KI12, KI13, KI14, KI15, GB21, GV2, GV3, GV4, CV1, CV2, CV3, CV4, CV5, CV6, CV7.

**Что известно научно.** Строгих данных о том, что иглоукалывание этих точек вызывает прерывание беременности, мало. В систематических обзорах серьёзные нежелательные явления при акупунктуре у беременных редки. Тем не менее осторожность — принятый стандарт профессиональной практики.

## 9.3. Классические запреты, связанные с полом

**CV5 (Shimen, «каменная дверь»):** в «Чжэньцзю цзяи цзин» и последующих текстах указано, что иглоукалывание этой точки у женщин может вызвать бесплодие. Это традиционное положение, исторически важное, но подтверждающих его научных данных нет.

## 9.4. Боль и отклик на лечение: половые различия

Распространённость многих хронических болевых синдромов у женщин выше, а в экспериментальных условиях женщины в среднем демонстрируют более низкие болевые пороги. Показаны и половые различия в нейроиммунных механизмах боли (обзор Mogil, *Nat Rev Neurosci*, 2012). Устойчивых данных о клинически значимой разнице в эффективности акупунктуры между мужчинами и женщинами нет: большинство РКИ не рассчитаны на такой анализ.

## 9.5. РКИ по полоспецифическим состояниям

## ♂ МУЖЧИНЫ

- **Хронический простатит / синдром хронической тазовой боли.** Sun Y. et al., *JAMA*, 2021 (n = 440): 20 сеансов акупунктуры за 8 недель улучшили индекс симптомов NIH-CPSI по сравнению с фиктивной процедурой; эффект сохранялся к 24-й неделе.
- **Мужское бесплодие (параметры спермы).** Систематические обзоры: данные малочисленны и низкого качества, вывод об эффективности сделать нельзя.


## ♀ ЖЕНЩИНЫ

- **Стрессовое недержание мочи.** Liu Z. et al., *JAMA*, 2017 (n = 504): электроакупунктура в пояснично-крестцовой области (BL33, BL35) уменьшила подтекание мочи по сравнению с фиктивной процедурой.
- **СПКЯ (синдром поликистозных яичников), бесплодие.** Wu X.K. et al., *JAMA*, 2017 (PCOSAct, n = 1000): активная акупунктура не повысила частоту живорождений по сравнению с фиктивной.
- **ЭКО.** Smith C.A. et al., *JAMA*, 2018 (n = 848): живорождения 18,3 % против 17,8 % при фиктивной процедуре, различий нет.
- **Приливы в менопаузе.** Результаты противоречивы: Avis N.E. et al. (2016) — снижение частоты по сравнению с отсутствием лечения; Ee C. et al., *Ann Intern Med*, 2016 — нет превосходства над фиктивной процедурой.
- **Тазовое предлежание плода (прижигание BL67).** Обзор Cochrane (Coyle, Smith, Peat, 2023): данные ограничены и низкого качества.
- **Первичная дисменорея.** Обзор Cochrane (Smith C.A. et al., 2016): данные низкого и очень низкого качества.

# 10 Эндокринология и циркадные ритмы

**Краткий вывод.** Секрецию большинства гормонов определяют центральные «часы» — супрахиазматическое ядро (СХЯ) гипоталамуса, цикл «сон — бодрствование» и приём пищи. У мужчин основной ритм репродуктивной оси — суточный (утренний пик тестостерона), у женщин на суточные ритмы накладывается ~28-дневный менструальный цикл. Традиционные «часы органов» ТКМ — отдельная концепция, научных подтверждений у неё нет (10.6).

## 10.1. Молекулярные и системные основы




| Показатель                  | Пол | Ключевые факты                                                                  |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| Пролактин                   | ♂♀  | рост после засыпания, максимум во 2-й половине ночи; уровень выше у ♀           |
| ТТГ                         | ♂♀  | вечерний подъём, максимум около начала сна; сон его ограничивает                |
| Тестостерон ♂               | ♂   | пик утром, минимум вечером; амплитуда снижается с возрастом → забор крови утром |
| Лептин                      | ♂♀  | ночной максимум; у ♀ концентрации выше при сопоставимой массе жира              |
| Температура тела            | ♂♀  | минимум ~2 ч до обычного пробуждения; у ♀ в лютеиновую фазу +0,3–0,5 °С         |
| Чувствительность к инсулину | ♂♀  | выше утром, ниже вечером/ночью                                                  |

### 10.3. Половые различия циркадной системы

| Параметр                             | ♂ Мужчины                                                                   | ♀ Женщины                                                                                                       | Источник                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Собственный период циркадных часов   | 24,19 ± 0,2 ч; период короче 24 ч — у 14 %                                  | 24,09 ± 0,2 ч; период короче 24 ч — у 35 %                                                                      | Duffy J.F. et al., <i>PNAS</i> , 2011 (n = 157) |
| Фаза ритмов мелатонина и температуры | Более поздняя                                                               | Более ранняя при одинаковом режиме сна; чаще «утренний» хронотип                                                | Duffy 2011; Cain S.W. et al., 2010              |
| Амплитуда мелатонина                 | Ниже                                                                        | Выше                                                                                                            | Cain S.W. et al., <i>J Biol Rhythms</i> , 2010  |
| Гормон роста                         | Преобладает крупный импульс в начале сна                                    | Секреция более равномерна, базальный уровень и частота импульсов выше                                           | Классические данные нейроэндокринологии         |
| Репродуктивная ось                   | Суточный ритм тестостерона; импульсы ЛГ примерно каждые 1,5–2 ч             | Менструальный цикл; частота импульсов ЛГ меняется по фазам (в лютеиновую фазу реже, под действием прогестерона) | Учебники эндокринологии                         |
| Влияние недосыпа                     | 1 неделя сна по 5 ч снижала дневной тестостерон у молодых мужчин на 10–15 % | Нарушения сна и сменная работа связаны с нарушениями менструального цикла                                       | Leproult & Van Cauter, <i>JAMA</i> , 2011       |

### 10.4. ♂ Мужская эндокринология: суточный ритм тестостерона




#### КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

- Ось ГнРГ → ЛГ/ФСГ → клетки Лейдига (тестостерон) и Сертоли (сперматогенез).
- Пик тестостерона утром, минимум вечером; рост уровня связан с ночным сном.
- С возрастом суточная амплитуда сглаживается, общий уровень постепенно снижается.
- Полный цикл сперматогенеза занимает около 2–2,5 месяцев: эффект любого вмешательства на параметры спермы оценивают не раньше этого срока.

#### ПРАКТИКА АНАЛИЗОВ

- Тестостерон — утренний забор натощак, при низком результате — повторить (рекомендации Endocrine Society, 2018).
- Сменная работа и недосып — поправка при интерпретации.

## 10.5. ♀ Женская эндокринология: менструальный цикл



### ФАЗЫ И ГОРМОНЫ

- **Фолликулярная фаза:** рост ФСГ в начале цикла, выбор доминантного фолликула, нарастание эстрадиола.
- **Овуляция:** пик ЛГ; овуляция примерно через 24–36 ч после начала подъема ЛГ.
- **Лютеиновая фаза:** желтое тело секретирует прогестерон (пик в середине фазы); базальная температура выше на  $\sim 0,3-0,5$  °C.
- Нормальная длина цикла у взрослых — около 24–38 дней (FIGO).

### ЦИРКАДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- В лютеиновую фазу повышается температура тела и уменьшается её суточная амплитуда; у части женщин ухудшается субъективное качество сна (Baker & Driver, 2007; Shechter & Boivin, 2010).
- Беременность: прогрессивный рост кортизола, в том числе за счёт плацентарного КРГ.
- Менопауза (в среднем около 51 года): вазомоторные симптомы и нарушения сна встречаются часто.
- Практика: ФСГ, ЛГ и эстрадиол — на 2–5-й день цикла; прогестерон для подтверждения овуляции — примерно за 7 дней до ожидаемой менструации.

## 10.6. Традиционные «часы органов» (子午流注, цзы-у лю-чжу)



### ТРАДИЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Сутки делятся на 12 двухчасовых интервалов («ши-чэнь»). В каждом, по традиции, «максимально активен» один канал: LU 03–05, LI 05–07, ST 07–09, SP 09–11, HT 11–13, SI 13–15, BL 15–17, KI 17–19, PC 19–21, TE 21–23, GB 23–01, LR 01–03. На этом строится хронотерапия цзы-у лю-чжу — выбор точек по времени суток.

### НАУЧНАЯ ОЦЕНКА

Прямых доказательств того, что органы или каналы имеют «пиковую активность» в эти интервалы, нет. Совпадения с реальной хронобиологией (утренний пик кортизола, ночная работа печени) носят общий характер и не подтверждают схему. Клинические исследования хронотерапии цзы-у лю-чжу немногочисленны и в основном низкого методологического качества.

### НЕ ПУТАТЬ

Реальная хронобиология (10.1–10.5) — экспериментально подтверждённая наука. «Часы органов» — традиционная модель. В издании они разнесены по разным блокам.

## 10.7. Акупунктура и эндокринная система: что известно

| Область               | Данные                                                                                                                                                   | Уровень                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ось НРА, стресс       | На животных электроакупунктура модулирует ось НРА и вегетативные рефлексы (в т. ч. Liu 2021, <i>Nature</i> ). У людей данные малочисленны и неоднородны. | Эксперимент                  |
| ♀ СПКЯ, овуляция      | PCOSAct (JAMA 2017): нет преимущества перед фиктивной процедурой по живорождениям.                                                                       | РКИ, отрицательный результат |
| ♀ ЭКО                 | JAMA 2018: нет различий по живорождениям.                                                                                                                | РКИ, отрицательный результат |
| ♀ Приливы (менопауза) | Противоречивые данные: лучше отсутствия лечения, но не лучше фиктивной процедуры (Ee 2016).                                                              | РКИ, неоднозначно            |
| ♂ Сперматогенез       | Мелкие исследования низкого качества.                                                                                                                    | Недостаточно                 |

| Область                   | Данные                                                                           | Уровень      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Сон и мелатонин           | Небольшие исследования; убедительных данных о сдвиге циркадной фазы нет.         | Недостаточно |
| Сахарный диабет, ожирение | Мелкие и неоднородные исследования; акупунктура не заменяет стандартную терапию. | Недостаточно |

### ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ЦИРКАДНАЯ ГИГИЕНА ( ♂ И ♀ )

- Яркий свет утром, приглушённый тёплый свет вечером; регулярное время подъёма.
- Основные приёмы пищи — в светлое время суток: утром чувствительность к инсулину выше.
- Ночная сменная работа отнесена IARC (2019) к группе 2A (вероятно канцерогенно) — повод для профилактики у работников смен.
- Время забора крови на гормоны учитывает суточный ритм (тестостерон и кортизол — утром, для скрининга синдрома Кушинга — поздневечерний кортизол слюны).

# 11 Современные методики

| Методика                 | Суть                                                                                                                            | Замечания                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ручная акупунктура       | Введение тонких стерильных игл; манипуляции (вращение, поднимание-опускание) до ощущения «дэ-ци» (распирание, ломота, тяжесть). | Одноразовые стерильные иглы; стандарт ISO 17218.                                              |
| Электроакупунктура       | Импульсный ток между парами игл; частота влияет на нейрохимию (см. раздел 3.1).                                                 | Противопоказана при кардиостимуляторе; не проводить ток через грудную клетку.                 |
| Скальповая акупунктура   | Стимуляция линий и зон волосистой части головы. Стандарт линий опубликован ВОЗ (1991).                                          | Применяется в неврологической реабилитации; качество доказательств неоднородно.               |
| Аурикулярная акупунктура | Точки ушной раковины. Стандарт КНР — GB/T 13734-2008.                                                                           | Протокол NADA используется в наркологии как вспомогательный метод; доказательства ограничены. |
| Прижигание (моксибустия) | Тепловое воздействие полынью (Artemisia argyi).                                                                                 | Риск ожогов; дым.                                                                             |
| Лазерная акупунктура     | Низкоинтенсивное лазерное излучение без прокола кожи.                                                                           | Защита глаз; данные неоднородны.                                                              |
| Dry needling             | Иглоукалывание миофасциальных триггерных точек (раздел 8).                                                                      | Концептуально западный метод; анатомически пересекается с акупунктурой.                       |
| Акупрессура              | Надавливание на точки без игл (в т. ч. браслеты на PC6).                                                                        | Безопасна для самопомощи; эффект PC6 при тошноте изучен лучше других.                         |

# 12 Доказательная база

**Краткий вывод.** Лучше всего подтверждены умеренное облегчение хронической скелетно-мышечной боли и головной боли, а также эффект стимуляции РС6 при послеоперационной тошноте. Для большинства эндокринных и репродуктивных показаний крупные РКИ дали отрицательный или неоднозначный результат.

| Состояние                                                        | Ключевые данные                                                                                                                                                                                                           | Итог                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Хроническая боль (спина, шея, остеоартроз, головная боль, плечо) | Метаанализ индивидуальных данных пациентов (Vickers et al., <i>J Pain</i> , 2018): 39 РКИ, ~20 800 пациентов. Акупунктура лучше фиктивной процедуры и отсутствия лечения, эффект в основном сохраняется через 12 месяцев. | Умеренный эффект           |
| Хроническая первичная боль                                       | NICE NG193 (2021): акупунктуру можно рассмотреть как вариант лечения.                                                                                                                                                     | Руководство: «рассмотреть» |
| Боль в нижней части спины                                        | NICE NG59 (2016): акупунктуру не предлагать.                                                                                                                                                                              | Руководства расходятся     |
| Профилактика мигрени, головная боль напряжения                   | Обзоры Cochrane (Linde et al., 2016): снижение частоты приступов; при мигрени сопоставимо с медикаментозной профилактикой.                                                                                                | Умеренный эффект           |
| Послеоперационная тошнота и рвота                                | Обзор Cochrane (Lee A. et al., 2015): стимуляция РС6 снижает тошноту и рвоту по сравнению с фиктивной процедурой.                                                                                                         | Подтверждено               |
| Стрессовое недержание мочи ♀                                     | JAMA 2017, n = 504.                                                                                                                                                                                                       | Положительное РКИ          |
| ХП/СХТБ ♂                                                        | JAMA 2021, n = 440.                                                                                                                                                                                                       | Положительное РКИ          |
| СПКЯ, ЭКО ♀                                                      | JAMA 2017, JAMA 2018.                                                                                                                                                                                                     | Отрицательные РКИ          |
| Приливы ♀                                                        | Противоречивые РКИ.                                                                                                                                                                                                       | Неоднозначно               |

## SWOT-АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ АКУПУНКТУРЫ

### Сильные стороны

- Низкий риск при квалифицированном выполнении
- Доказанный умеренный эффект при ряде болевых синдромов и тошноте
- Международная стандартизация точек

### Слабые стороны

- Малая разница с фиктивной процедурой во многих РКИ
- Сложность ослепления исследований
- Теория каналов не подтверждена

### Возможности

- Нейроанатомические исследования механизмов
- Встраивание в мультимодальную терапию боли
- Немедикаментозная альтернатива опиоидам в части случаев

### Угрозы

- Подмена диагностики и лечения серьёзных заболеваний
- Необоснованные заявления («лечит бесплодие, диабет»)
- Неквалифицированные практики, инфекционные осложнения

## 13 Безопасность и противопоказания

По крупному проспективному исследованию в Германии (Witt C.M. et al., 2009; ~229 000 пациентов) хотя бы одно нежелательное явление отметили около 8,6 % пациентов, в основном лёгкие (кровоподтёк, боль в месте укола); серьёзные осложнения крайне редки.

### СЕРЬЁЗНЫЕ, НО РЕДКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

- **Пневмоторакс** — самое частое серьёзное осложнение. Зоны риска: точки груди, надключичной области и спины (GB21, ST12–ST16, KI22–KI27, SP17–SP21, BL11–BL21, BL41–BL50 и др.; метка **И**).
- Инфекции при нарушении стерильности.
- Повреждение сосудов и нервов (ST9, SP11, HT1, PC6–PC7, GB30).
- Ранения в области глаза (BL1, ST1, EX–HN7) и продолговатого мозга (GV15, GV16, GB20) при ошибочной технике.
- Перелом иглы, обморок (вазовагальная реакция).

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСТОРОЖНОСТЬ

- Нарушения свёртываемости, приём антикоагулянтов — оценка риска.
- Кардиостимулятор и имплантированные устройства — электроакупунктура противопоказана.
- Беременность — избегать точек с меткой **Б**.
- Инфекция или повреждение кожи в зоне точки.
- Незаросший родничок у младенцев (GV22).
- Острые и неотложные состояния — сначала медицинская помощь.
- Не колоть: ST17 (сосок), CV8 (пупок, традиционно).

### АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ (ДЛЯ ПАЦИЕНТА)

Есть диагноз от врача?



Нет → сначала обследование



Да → есть ли показание с доказательной базой (боль, тошнота)?



Да → сертифицированный специалист, стерильные иглы, 6–8 сеансов с оценкой эффекта



Нет эффекта → прекратить; не заменять стандартное лечение

# 14 Источники

1. World Health Organization. *WHO Standard Acupuncture Point Locations in the Western Pacific Region*. Manila: WHO WPRO; 2008.
2. World Health Organization. *A Proposed Standard International Acupuncture Nomenclature*. Geneva: WHO; 1991.
3. GB/T 12346-2021. Nomenclature and location of meridian points (национальный стандарт КНР).
4. GB/T 13734-2008. Nomenclature and location of auricular points (национальный стандарт КНР).
5. Deadman P., Al-Khafaji M., Baker K. *A Manual of Acupuncture*. Journal of Chinese Medicine Publications; 2-е изд.
6. Simons D.G., Travell J.G., Simons L.S. *Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual*. 2nd ed. Williams & Wilkins; 1999.
7. Melzack R., Stillwell D.M., Fox E.J. Trigger points and acupuncture points for pain: correlations and implications. *Pain*. 1977;3:3–23.
8. Birch S. Trigger point-acupuncture point correlations revisited. *J Altern Complement Med*. 2003;9(1):91–103.
9. Dorsher P.T. Myofascial referred-pain data provide physiologic evidence of acupuncture meridians. *J Pain*. 2009 (и Dorsher P.T., *J Altern Complement Med*, 2008).
10. Vickers A.J. et al. Acupuncture for chronic pain: update of an individual patient data meta-analysis. *J Pain*. 2018;19(5):455–474.
11. Liu S. et al. A neuroanatomical basis for electroacupuncture to drive the vagal-adrenal axis. *Nature*. 2021;598:641–645.
12. Goldman N. et al. Adenosine A1 receptors mediate local anti-nociceptive effects of acupuncture. *Nat Neurosci*. 2010;13:883–888.
13. Han J.S. Acupuncture: neuropeptide release produced by electrical stimulation of different frequencies. *Trends Neurosci*. 2003;26(1):17–22.
14. Lee A., Chan S.K., Fan L.T. Stimulation of the wrist acupuncture point PC6 for preventing postoperative nausea and vomiting. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015.
15. Linde K. et al. Acupuncture for the prevention of episodic migraine; ...tension-type headache. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016.
16. Wu X.K. et al. Effect of acupuncture and clomiphene in Chinese women with PCOS (PCOSAct). *JAMA*. 2017;317(24):2502–2514.
17. Smith C.A. et al. Effect of acupuncture vs sham acupuncture on live births among women undergoing IVF. *JAMA*. 2018;319(19):1990–1998.
18. Liu Z. et al. Effect of electroacupuncture on urinary leakage among women with stress urinary incontinence. *JAMA*. 2017;317(24):2493–2501.
19. Sun Y. et al. Efficacy of acupuncture for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. *JAMA*. 2021;326(9):826–836.
20. Ee C. et al. Acupuncture for menopausal hot flashes: a randomized trial. *Ann Intern Med*. 2016;164(3):146–154.
21. Avis N.E. et al. Acupuncture in Menopause (AIM) study. *Menopause*. 2016;23(6):626–637.
22. Coyle M.E., Smith C.A., Peat B. Cephalic version by moxibustion for breech presentation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2023; (5):CD003928.
23. Smith C.A. et al. Acupuncture for dysmenorrhoea. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016.
24. Duffy J.F. et al. Sex difference in the near-24-hour intrinsic period of the human circadian timing system. *PNAS*. 2011;108(Suppl 3):15602–15608.
25. Cain S.W. et al. Sex differences in phase angle of entrainment and melatonin amplitude in humans. *J Biol Rhythms*. 2010;25(4):288–296.
26. Leproult R., Van Cauter E. Effect of 1 week of sleep restriction on testosterone levels in young healthy men. *JAMA*. 2011;305(21):2173–2174.
27. Baker F.C., Driver H.S. Circadian rhythms, sleep, and the menstrual cycle. *Sleep Med*. 2007;8(6):613–622.
28. Shechter A., Boivin D.B. Sleep, hormones, and circadian rhythms throughout the menstrual cycle in healthy women and women with PMDD. *Int J Endocrinol*. 2010.
29. Bhasin S. et al. Testosterone therapy in men with hypogonadism: an Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab*. 2018;103(5):1715–1744.
30. Mogil J.S. Sex differences in pain and pain inhibition. *Nat Rev Neurosci*. 2012;13:859–866.
31. Witt C.M. et al. Safety of acupuncture: results of a prospective observational study with 229,230 patients. *Forsch Komplementmed*. 2009;16(2):91–97.
32. IARC Monographs Vol. 124: Night Shift Work. Lyon: IARC; 2020 (оценка 2019).
33. NICE. NG193: Chronic pain (primary and secondary) in over 16s. 2021. NG59: Low back pain and sciatica in over 16s. 2016.
34. Munro M.G. et al. FIGO ovulatory disorders / abnormal uterine bleeding classification systems. *Int J Gynaecol Obstet*. 2018.
35. UNESCO. Acupuncture and moxibustion of traditional Chinese medicine. Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, 2010.

## ИТОГОВОЕ РЕЗЮМЕ

- 361 классическая точка 14 каналов приведена с кодами ВОЗ и условными кодами **M-/F-**. Анатомически точки у мужчин и женщин совпадают; различаются ориентиры (CV1, грудь), правила для беременных и ряд традиционных показаний.
- **Точки-триггеры** отмечены двойным подчёркиванием. Совпадение с миофасциальными триггерами анатомическое, а не концептуальное.
- Хронобиология (мелатонин, кортизол, тестостерон, менструальный цикл) — научно обоснованная область. «Часы органов» ТКМ — традиционная модель без подтверждения.
- Практическая рекомендация: рассматривать акупунктуру как вспомогательный метод при хронической боли и тошноте, у квалифицированного специалиста; не применять её вместо диагностики и лечения эндокринных и репродуктивных нарушений.