

## 从一道常规的极值点偏移问题说起

### 问题呈现

这是一道极值点偏移问题：

已知函数  $f(x) = \frac{e^x}{x}$ ，若  $f(x_1) = f(x_2)$  ( $x_1 \neq x_2$ )，求证： $x_1 + x_2 > 2$ 。

极值点偏移是导数大题中的常客，在 2010 年天津卷、2013 年湖南卷、2016 年全国 I 卷和 2021 年新高考 I 卷都有出现。昨天在给同学解答这题的过程中，发现了很多有意思的地方，比如：

- (1) 不是所有人都理解“极值点偏移”的含义；
- (2) 极值点偏移问题的解法有相对固定的“套路”，但针对具体的题目，又颇具“变数”；
- (3) 在实际操作过程中，有很多小技巧可以简化过程。

下面我打算对以上问题展开讨论。

### 问题探究

#### 一、什么是“极值点偏移”

一般地，若连续函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  有定义，且在区间  $(a, b)$  内有唯一的极值点  $x_0$ ，对任意的  $x_1, x_2 \in (a, b)$ ，当  $f(x_1) = f(x_2)$  时，有  $\frac{x_1+x_2}{2} \neq x_0$ ，则称函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  上的极值点偏移。

特别地，若  $\frac{x_1+x_2}{2} > x_0$ ，则称  $f(x)$  极值点左偏；若  $\frac{x_1+x_2}{2} < x_0$ ，则称  $f(x)$  极值点右偏。

为了更直观地理解，可以观察下面两张函数图象：




Fig.1 极值点左偏




Fig.2 极值点右偏

观察图象，我们发现极值点偏移的两个几何意义：

- (1) 极值点在函数值相等的两自变量中点之左（或右）；
- (2) 函数  $f(x)$  在区间  $(a, b)$  上极值点  $x_0$  两侧函数值相等处的变化率大小总是一侧更大，即图象在极值点的一侧相较另一侧更“陡”。极值点总是朝变化率大的一侧偏移。

#### 二、极值点偏移的性质

从以上几何意义中我们至少可以得到函数极值点偏移的两条性质：

- (1)  $\frac{x_1+x_2}{2} > x_0$ （或  $< x_0$ ）
- (2) 若  $f(x_1) = f(x_2)$ ，有  $f'(x_1) > f'(x_2)$ （或  $f'(x_1) < f'(x_2)$ ）恒成立



### 三、极值点偏移的证明

上述极值点偏移的性质(1),就是试题中常常要求证的命题。由于图象不能用于标准的证明过程(事实上,命题的过程常常是先画图的),所以需要另辟蹊径。下面以文首的题为例,介绍极值点偏移问题的两种常见做法。

原题:

已知函数  $f(x) = \frac{e^x}{x}$ , 若  $f(x_1) = f(x_2)$  ( $x_1 \neq x_2$ ), 求证:  $x_1 + x_2 > 2$ .

#### 【方法一】构造差函数

对  $f(x)$  求导得

$$f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

易知

$f(x)$  在  $(-\infty, 0)$ ,  $(0, 1)$  上单调递减, 在  $(1, +\infty)$  上单调递增

作出  $f(x)$  的大致图象




Fig.3  $f(x) = \frac{e^x}{x}$  的图象

由图,不妨设  $0 < x_1 < 1 < x_2$ . 要证  $x_1 + x_2 > 2$ , 只要证

$$x_2 > 2 - x_1$$

因为  $x_2, 2 - x_1 \in (1, +\infty)$ , 而  $f(x)$  在  $(1, +\infty)$  上单调递增, 所以只要证

$$f(x_2) > f(2 - x_1)$$

又因为  $f(x_1) = f(x_2)$ , 所以只要证

$$f(x_1) > f(2 - x_1)$$

令  $g(x) = f(x) - f(2 - x)$  ( $0 < x < 1$ ), 则

$$g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} - \frac{e^{2-x}(x-1)}{(2-x)^2} = (x-1) \frac{[e^x(2-x) - ex][e^x(2-x) + ex]}{e^x x^2 (2-x)^2} < 0$$

所以  $g(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递减, 所以

$$g(x) > g(1) = f(1) - f(1) = 0$$

所以

$$f(x_1) > f(2 - x_1)$$

于是原命题得证.

注意: 这里对  $e^x(2-x) - ex$  的符号还需求导说明, 此处省略。

从中我们可以得到解决极值点偏移问题的一般思路:

#### 1 通过求导得到函数的单调性, 确定 $x_1, x_2$ 的范围

对  $f(x)$  求导得


$$f'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$$

易知

$f(x)$  在  $(-\infty, 0)$ ,  $(0, 1)$  上单调递减, 在  $(1, +\infty)$  上单调递增



作出 $f(x)$ 的大致图象



由图，不妨设  $0 < x_1 < 1 < x_2$ .

注意：

- (1) 关注函数的定义域；
- (2) 主要研究 $x_1, x_2$ 与函数的渐近线、极值点以及无穷的关系。

## 2 利用分析法，将待证双变量不等式转化为单变量不等式

### 2.1 利用不等式的性质将待证不等式中的双变量分离到不等号两边

要证 $x_1 + x_2 > 2$ ，只要证

$$x_2 > 2 - x_1$$

### 2.2 利用函数的单调性及不等式两边的范围，将自变量的比较转化为函数值的比较

因为 $x_2, 2 - x_1 \in (1, +\infty)$ ，而 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，所以只要证

$$f(x_2) > f(2 - x_1)$$

注意：

函数的单调性与自变量的大小关系不要搞反。

### 2.3 利用条件 $f(x_1) = f(x_2)$ ，将双变量问题转化为单变量问题

又因为 $f(x_1) = f(x_2)$ ，所以只要证

$$f(x_1) > f(2 - x_1)$$

## 3 构造差函数，证明单变量不等式

### 3.1 构造差函数

$$\text{令 } g(x) = f(x) - f(2 - x) (0 < x < 1)$$

注意：

- (1) 此处一定要写明定义域；
- (2) 不宜将 $g(x)$ 的表达式“表达”出来，这是在自讨苦吃！

### 3.2 对差函数求导，整理，判断符号，得到差函数的单调性

$$g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2} - \frac{e^{2-x}(x-1)}{(2-x)^2} = (x-1) \frac{[e^x(2-x) - ex][e^x(2-x) + ex]}{e^x x^2 (2-x)^2} < 0$$

所以 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减。

注意：

- (1) 不宜将 $g(x)$ 的解析式写出来以后再求导，可以用复合函数求导公式，除非嫌考试时间太多；



(2) 我们的目标仅仅是判断导函数的符号，不要迷失在字母的海洋中！

### 3.3 利用差函数的单调性证明单变量不等式，从而原命题得证

$$g(x) > g(1) = f(1) - f(1) = 0$$

所以

$$f(x_1) > f(2 - x_1)$$

于是原命题得证.

上述过程以及一些注意点，概括起来，再现如下：

#### 1 通过求导得到函数的单调性，确定 $x_1, x_2$ 的范围（铺垫）

注意：

(1) 关注函数的定义域；

(2) 主要研究 $x_1, x_2$ 与函数的渐近线、极值点以及无穷的关系。

#### 2 利用分析法，将待证双变量不等式转化为单变量不等式（易错）

2.1 利用不等式的性质将待证不等式中的双变量分离到不等号两边

2.2 利用函数的单调性及不等式两边的范围，将自变量的比较转化为函数值的比较

注意：

函数的单调性与自变量的大小关系不要搞反。

2.3 利用条件 $f(x_1) = f(x_2)$ ，将双变量问题转化为单变量问题

#### 3 构造差函数，证明单变量不等式（易错，难点）

##### 3.1 构造差函数

注意：

(1) 此处一定要写明定义域；

(2) 不宜将差函数的表达式“表达”出来，这是在自讨苦吃！

##### 3.2 对差函数求导，整理，判断符号，得到差函数的单调性

注意：

(1) 不宜将差函数的解析式写出来以后再求导，可以用复合函数求导公式，除非嫌考试时间太多；

(2) 我们的目标仅仅是判断导函数的符号，不要迷失在字母的海洋中！

##### 3.3 利用差函数的单调性证明单变量不等式，从而原命题得证

上面的过程行云流水，但是在实际给同学解答的过程中，我原本的做法与之有细微的差异。然而正是这一细微的差异，导致解答过程出现了很大的不同。

起手的求导和确定 $x_1, x_2$ 的范围都和上述过程相同，但是从分析法开始，出现了不同。

由图，不妨设  $0 < x_1 < 1 < x_2$ 。要证  $x_1 + x_2 > 2$ ，只要证

$$x_1 > 2 - x_2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

因为  $x_1, 2 - x_2 \in (0, 1)$ ，而  $f(x)$  在  $(0, 1)$  上单调递减，所以只要证

$$f(x_1) < f(2 - x_2) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

又因为  $f(x_1) = f(x_2)$ ，所以只要证

$$f(x_2) < f(2 - x_2)$$

令  $g(x) = f(x) - f(2 - x) (x > 1)$ ，则

$$g'(x) = (x - 1) \frac{[e^x(2 - x) - ex][e^x(2 - x) + ex]}{e^x x^2 (2 - x)^2}$$

这里我选择将 $x_2$ 移向不等式右边，却导致 $g'(x)$ 的符号难以直接判断，而其中 $e^x(2 - x) + ex$ 部分的阻碍最大（事实上其他部分为负）。而实际上，当 $x > 2$ 时， $g(x) > 0$ ，并非我们想



要的结果，但是命题肯定是成立的，那么问题出在哪里呢？

回过头看过程，我发现，由①至②的转化是有问题的，导致错误的点就在， $2 - x_2$ 的范围并不一定是 $(0,1)$ ，也有可能是非正值，也就是 $x_2 \geq 2$ 。这该怎么办呢？对待不同的情况，我们可以分类讨论。事实上，当 $x_2 \geq 2$ 时，原命题 $x_1 + x_2 > 2$ 显然成立。所以我们只要在命题转化之前加一步分类讨论，其他过程就和我们的第一种做法一样了。

构造差函数思路并不难，混分很容易，只是差函数的求导和符号判断是最让人头疼的，权当锻炼计算能力吧！

### 【方法二】差值/比值消元（换元消元）

设 $f(x_1) = f(x_2) = a$ ，则

$$\begin{cases} \frac{e^{x_1}}{x_1} = a \\ \frac{e^{x_2}}{x_2} = a \end{cases}$$

两式作比得 $\frac{x_2}{x_1} = e^{x_2 - x_1}$ （设为 $t > 1$ ），则

$$e^{(t-1)x_1} = t$$

解得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\ln t}{t-1} \\ x_2 = \frac{t \ln t}{t-1} \end{cases}$$

要证 $x_1 + x_2 > 2$ ，即要证

$$\frac{(t+1) \ln t}{t-1} > 2$$

亦即证

$$g(t) = \frac{2(t-1)}{t+1} - \ln t < 0$$

对 $g(t)$ 求导得

$$g'(t) = \frac{-(t-1)^2}{t(t+1)^2} < 0$$

所以 $g(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减，所以

$$g(t) < g(1) = 0$$

于是原命题得证。

从中我们提炼出换元消元法的一般过程：

#### 1 将自变量代入方程得到方程组

设 $f(x_1) = f(x_2) = a$ ，则

$$\begin{cases} \frac{e^{x_1}}{x_1} = a \\ \frac{e^{x_2}}{x_2} = a \end{cases}$$

#### 2 将双变量用单变量（双变量的比值或差值）表示

##### 2.1 对方程变形，消去参数

两式作比得 $\frac{x_2}{x_1} = e^{x_2 - x_1}$ （设为 $t > 1$ ）

注意：任何换元都莫忘新元的取值范围！



注意：

- (1) 换元时要写取值范围；
- (2) 为降低因符号问题致错的几率，建议比值换元时以大比小，差值换元时以大减小。

### 2.2 将双变量的比值或差值换元为 $t$ ，用 $t$ 表示 $x_1, x_2$

解得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\ln t}{t-1} \\ x_2 = \frac{t \ln t}{t-1} \end{cases}$$

### 3 将用 $t$ 表示的双变量代入待证不等式，用导数方法求证

要证 $x_1 + x_2 > 2$ ，即要证

$$\frac{(t+1)\ln t}{t-1} > 2$$

亦即证

$$g(t) = \frac{2(t-1)}{t+1} - \ln t < 0$$

对 $g(t)$ 求导得

$$g'(t) = \frac{-(t-1)^2}{t(t+1)^2} < 0$$

所以 $g(t)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减，所以

$$g(t) < g(1) = 0$$

于是原命题得证。

指对函数处理技巧：  
对数单身狗，指数找基友

常用不等式：  
 $\ln x > \frac{2(x-1)}{(x+1)} (x > 1)$   
 $\ln x < \frac{2(x-1)}{(x+1)} (0 < x < 1)$

注意：

- (1) 此处有很多地方要运用不等式的性质，注意不等号是否要变向；
- (2) 需要用到指对函数相关的处理技巧，注意灵活运用；
- (3) 会用到很多的常见不等式，注意积累掌握。

归纳如下：

- 1 将自变量代入方程得到方程组
- 2 将双变量用单变量（双变量的比值或差值）表示

### 2.1 对方程变形，通常消去参数

注意：

- (1) 换元时要写取值范围；
- (2) 为降低因符号问题致错的几率，建议比值换元时以大比小，差值换元时以大减小。

### 2.2 将双变量的比值或差值换元为 $t$ ，用 $t$ 表示 $x_1, x_2$

### 3 将用 $t$ 表示的双变量代入待证不等式，用导数方法求证

注意：

- (1) 此处有很多地方要运用不等式的性质，注意不等号是否要变向；
- (2) 需要用到指对函数相关的处理技巧（如“对数单身狗，指数找基友”等），注意灵活运用（尽量避免使用洛必达法则；洛必达法则也可以用分类讨论代替）；
- (3) 会用到很多的常见不等式，注意积累掌握（虽然自己也还没掌握）。

当然，我们也可以用差值消元来完成：



设  $f(x_1) = f(x_2) = a$ , 则

$$\begin{cases} \frac{e^{x_1}}{x_1} = a \\ \frac{e^{x_2}}{x_2} = a \end{cases}$$

两式作比得  $\frac{x_2}{x_1} = e^{x_2-x_1}$  (设  $x_2 - x_1 = t > 0$ ), 则

$$\frac{x_1+t}{x_1} = e^t$$

解得

$$\begin{cases} x_1 = \frac{t}{e^t-1} \\ x_2 = \frac{te^t}{e^t-1} \end{cases}$$

要证  $x_1 + x_2 > 2$ , 即要证

$$\frac{(e^t+1)t}{e^t-1} > 2$$

亦即证

$$g(t) = (t-2)e^t + (t+2) > 0$$

对  $g(t)$  求导得

$$g'(t) = (t-1)e^t + 1 > (t-1)(t+1) + 1 = t^2 > 0$$

所以  $g(t)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增, 所以

$$g(t) > g(0) = 0$$

于是原命题得证.

常用不等式:

$$e^t > t + 1 \quad (t \neq 0)$$

#### 四、总结

对比不同的方法会发现, 一道题的做法千千万, 但是难易程度有别; 即使采用同一种做法, 中间过程的一点细微差别, 也会影响后续步骤的难易。这需要我们仔细对比不同的做法, 细心探究不同做法产生不同效果背后的原因, 多从做过的题, 尤其是错误中积累经验、吸取教训, 从而做到少走弯路。

我们应当崇尚一题多解, 既是对一类题型方法的积累, 产生做一道题会一类题的效果, 也是对思维的开拓, 对多方面知识点的回顾。

做题的过程中要注重观察和积累。对于多次出现的知识点要注意总结归纳。

数学是讲求严谨的, 应试考试中的解答题非常考验这一点。换元时新元的取值范围、函数的定义域, 这些不仅是对知识点的考察, 也是对做事严谨性的考察。数学教会我们, 既要顾全大局, 又要注重细节。

最后, 互帮互助是一个重要的过程, 是一个互利共赢的过程。我们需要在小组里、班级里、学校里甚至学校之间形成这种良好风气, 而不是一味地看重竞争, 闭门造车, 甚至互相排挤, 这样才能取得共同的进步。

2022 年 06 月 15 日