

Comedores de Pipoca

Imagine que temos uma lista de N inteiros representando a quantidade de pipocas em N sacos dispostos lado a lado. Esses sacos serão consumidos por uma equipe composta por C competidores, em uma competição onde cada competidor pode consumir, no máximo, K pipocas.

Cada competidor deve comer uma sequência contígua de sacos, e cada saco deve ser consumido integralmente por um único competidor.

Regras da competição:

- Os sacos devem ser consumidos na ordem, da esquerda para a direita, sem deixar nenhum para trás;
- Cada competidor deve consumir uma **sequência contígua** de sacos;
- Nenhum saco pode ser dividido entre dois competidores;
- Cada competidor pode consumir no máximo K pipocas no total.

O total de pipocas comidas pela equipe deve ser armazenada na variável resp.

Exemplo de entrada:

- $N = 5$, $C = 3$, $K = 13$

	0	1	2	3	4
L	5	8	3	10	7

Distribuição entre os competidores:

- Competidor 1: sacos 0 e 1 ($5 + 8 = 13$ pipocas)
- Competidor 2: sacos 2 e 3 ($3 + 10 = 13$ pipocas)
- Competidor 3: saco 4 (7 pipocas)

O total de pipocas consumidas pela equipe será 33.

Exemplo de entrada:

- $N = 5$, $C = 3$, $K = 12$

	0	1	2	3	4
L	5	8	3	10	7

Distribuição entre os competidores:

- Competidor 1: sacos 0 ($5 = 5$ pipocas)
- Competidor 2: sacos 1 e 2 ($8 + 3 = 11$ pipocas)
- Competidor 3: saco 3 (10 pipocas)

O total de pipocas consumidas pela equipe será 26.