

Comedores de Pipoca 2

Imagine que temos uma lista de N inteiros representando a quantidade de pipocas em N sacos dispostos lado a lado. Esses sacos serão consumidos por uma equipe composta por C competidores, em uma competição onde cada competidor pode consumir, no máximo, K pipocas.

Cada competidor deve comer uma sequência contígua de sacos, e cada saco deve ser consumido integralmente por um único competidor.

Regras da competição:

- Os sacos devem ser consumidos na ordem, da esquerda para a direita, sem deixar nenhum para trás;
- Cada competidor deve consumir uma **sequência contígua** de sacos;
- Nenhum saco pode ser dividido entre dois competidores;
- Cada competidor pode consumir no máximo K pipocas no total.

Por exemplo,

- Se $N = 5$, $C = 3$, $K = 13$

	0	1	2	3	4
L	5	8	3	10	7

Distribuição entre os competidores:

- Competidor 1: sacos 0 e 1 ($5 + 8 = 13$ pipocas)
- Competidor 2: sacos 2 e 3 ($3 + 10 = 13$ pipocas)
- Competidor 3: saco 4 (7 pipocas)

Os três competidores conseguem comer as pipocas de todos os sacos.

- Se $N = 5$, $C = 3$, $K = 12$

	0	1	2	3	4
L	5	8	3	10	7

Distribuição entre os competidores:

- Competidor 1: sacos 0 (5 = 5 pipocas)
- Competidor 2: sacos 1 e 2 ($8 + 3 = 11$ pipocas)
- Competidor 3: saco 3 (10 pipocas)

O último saco de pipoca não consegue ser distribuído.

Dado o vetor de inteiros positivos L de tamanho N e o número de competidores C , encontre o menor valor K para que os C competidores comam todas as pipocas de todos os sacos.

Encontre um intervalo de valor mínimo de K e um valor máximo K faça uma busca binária nesse intervalo.