MirrorOPD 核心推导

目标教师、内层拟合与参数性质

从镜像子问题、优势信号到加权教师与目标 J

正文与八组技术附录

MirrorOPD Research Notes

2026 年 10 月 15 日

阅读约定

本文从每轮外层的 Mirror Descent 子问题出发，依次定义冻结信号 f 与 advantage，求出加权教师 m 的显式表达式，再反推产生该镜像方向的教师目标 J。前三章完成这条推导；第四章介绍 inner 如何拟合已经确定的 m，第五、六章分析参数性质与有限拟合。附录对每项独立结论先陈述命题与条件，再给完整证明。

镜像下降（Mirror Descent，MD）在概率空间通过局部线性目标与 Bregman 正则定义更新。本文沿用来源中的 MDPO、BPO、PMD-Part、PMD-Mean 名称，依次表示镜像目标优化、中心化残差回归、完整最优性方程回归和均值近似回归；第 4 章给出它们的精确定义。

精确分布更新、总体拟合目标、有限样本估计和神经网络参数更新是四个层次。定理在哪一层成立，就在哪一层表述。完整词表求和消除条件动作积分误差，仍保留前缀覆盖与模型表示误差。本文的解析结论不直接给出任务正确率排序。

记号	固定含义
$T, q_k, p_{k,n}$	教师、第 k 轮冻结锚点、第 n 步内层学生
m_k	该轮由最优化问题定义的目标教师
κ, η	目标形状、教师插值权重；正文取 $0 \le \kappa \le 1$, $0 < \eta < 1$
$\alpha_{\mathrm{opt}}, \tau$	参数优化器学习率、固定 $J_{\kappa,\eta}$ 后另选的镜像步长
$F_k, J_{\kappa,\eta}, L_k$	重心目标、教师目标、内层拟合损失
$f, A = f/\eta, K_T$	冻结信号、标准化教师信号、冻结教师中心
$\mathcal{A}_k = C_q A$	本轮零条件均值的 advantage；$g_k = -\mathcal{A}_k$
$C_q h = h - \mathbb{E}_q h$	按同一前缀的锚点分布中心化
$d_k, \widehat{d}_k$	总体、经验前缀访问测度
K_{head}, M, N	头部动作数、同前缀辅助动作数、内层步数

所有对数均为自然对数。$\mathrm{TV}(P,Q) = \frac{1}{2}\sum_a |P_a - Q_a|$；平方 Hellinger 距离固定为 $H^2(P,Q) = \sum_a (\sqrt{P_a} - \sqrt{Q_a})^2$，不带 $1/2$。向量方差表示协方差矩阵的迹。正文省略前缀条件时，所有分布仍条件于同一个前缀。

附录按数学依赖组织：A 给出测度和基础工具；B 完整识别教师目标；C 处理内层投影和优化；D 分析形状与矩；E 处理积分信息与估计；F 将中心估计接回拟合；G 分析外层误差与序列边界；H 比较 TOP-D 的目标教师。短阅读版与完整稿使用同一份正文源码。

目录

第一章 Mirror Descent 与冻结监督 **1**
1.1 每轮外层的镜像下降问题 1
1.2 信号 f 与 advantage 1

第二章 加权教师的显式解 **2**
2.1 从镜像子问题到 Gibbs 分布 2
2.2 代入信号得到归一化幂均值 2
2.3 代表形状与归一化 3

第三章 从教师信号反推出目标 J **4**
3.1 目标梯度需要满足的关系 4
3.2 积分构造与严格凸性 4
3.3 下降保证与 J 的端点 5
3.4 加权散度重心的等价解释 5

第四章 固定目标教师的内层拟合 **6**
4.1 最优性方程与四种损失 6
4.2 精确梯度与采样测度 6
4.3 接入前缀与外层同步 7

第五章 形状与插值强度的性质 **8**
5.1 路径、覆盖与局部速度 8
5.2 监督尾部与方差阈值 8
5.3 平方根点的作用与限制 8

第六章 有限拟合与外层进展 **10**
6.1 从本轮拟合到教师接近度 10
6.2 拟合误差证书 10
6.3 有效保证的条件 10

附录 A 测度、归一化与基础工具 **11**
A.1 变长轨迹如何诱导条件目标 11
A.2 积分微分与支持条件 12
A.3 散度规范化与局部二阶项 12
A.4 中心化坐标与归一化恢复 13
A.5 从对数误差到概率距离 13

附录 B 重心、教师目标与镜像下降 **15**
B.1 密度比矩、散度与几何重加权 15
B.2 加权重心、两个端点与多教师形式 15
B.3 逆向构造的唯一性与通用信号 16
B.4 完整的下降与收敛推导 17
B.5 端点、JS 与曲率插值 18
B.6 统一有界性与教师中心 19

B.7 固定幂散度的镜像步与小步流 19

附录 C 内层投影与优化几何 **21**
C.1 统一坐标中的四种目标 21
C.2 Mean 的完整约束解 21
C.3 精确曲率与唯一驻点 22
C.4 受限表示改变投影 23
C.5 自由 logits 的收敛与理想路径 24
C.6 共享参数、拟合形状与条件 SGD 25
C.7 与条件 OPD 基线的关系 26
C.8 标量步长能改变的部分 26
C.9 小步一致性与 BPO 的分布度量 28
C.10 对角预条件与成对随机梯度 28
C.11 到目标教师与原教师的两种进展 29
C.12 固定动作池的经验目标与更新 30
C.13 冻结信号下大步长的两种极限 30
C.14 优化器状态与步长诊断 30

附录 D 形状、概率路径与监督矩 **32**
D.1 覆盖界与目标半径 32
D.2 精确目标同时改善凸生成散度 32
D.3 教师中心的性质 33
D.4 固定强度的矩界与小步阈值 34
D.5 误差相关方差与锐常数 35
D.6 绝对最坏方差的不同最优点 35
D.7 平方根流、局部速率与噪声可求和性 36
D.8 固定 Fisher 速度下的比较 37
D.9 平方根目标与平方根拟合的联合界 37
D.10 小 KL 与标准化不能替代矩分析 38

附录 E 信息访问与条件积分估计 **39**
E.1 四个积分对象与可观测信息 39
E.2 粗粒化、下界与不可识别性 39
E.3 精确积分加残差抽样 40
E.4 头尾估计器作为统一定理的实例 41
E.5 提案变化、分层采样与正向 KL 43
E.6 数值估计与反传的独立核验 43
E.7 配分函数估计与可控展开 45
E.8 截断、归一化与尾部匹配的差别 46
E.9 异分布采样与自动微分语义 47

附录 F 条件中心与有限样本拟合 **48**
F.1 中心估计代入损失后的对象 48
F.2 无中心样本方差与 U-统计量 48
F.3 教师中心的有符号与非负估计 50
F.4 有界包络与头尾区间 51

F.5 中心误差、baseline 与更新场 . . . 52
F.6 平方根包络的定量收益 . . . 53
F.7 增加精确头部时的实际方差 . . . 54
F.8 Part 与 Mean 的常数误差 . . . 54

附录 G 外层动力学、扰动与序列边界 **55**
G.1 幂均值的 escort 轨迹 . . . 55
G.2 几何端点的完整稳定区间 . . . 56
G.3 Mean 的单轮界与精确外层 . . . 57
G.4 Mean 的三次项与边界率 . . . 58
G.5 有限 inner 的误差接口 . . . 59
G.6 输出扰动、噪声与同步 . . . 61
G.7 共享参数的自然梯度投影 . . . 62
G.8 条件更新与完整序列 . . . 62
G.9 旧锚点与前缀测度漂移 . . . 63
G.10 有偏拟合与误差衰减速度 . . . 64
G.11 局部收缩率与全局边界 . . . 65

附录 H TOP-D 目标教师的退化与性质 **66**
H.1 参数对应与精确可达性 . . . 66
H.2 监督信号、中心与教师目标 . . . 66
H.3 覆盖与散度收缩 . . . 67
H.4 有限拟合的误差累积 . . . 68
H.5 方差定理的尺度对应 . . . 68
H.6 比较结论的作用范围 . . . 69

来源对应与复现 **70**

参考文献 **72**

第一章 Mirror Descent 与冻结监督

1.1 每轮外层的镜像下降问题

固定一个前缀，有限词表上的教师 T 与本轮学生锚点 $q = q_k$ 严格为正且归一化。令 Δ 为概率单纯形，取形状参数 $\kappa \in [0,1]$、镜像步长 $\eta \in (0,1)$。这一轮先在分布空间求解

$$\boxed{m_k = \arg\min_{p\in\Delta} \left\{ \langle g_k, p - q_k\rangle + \frac{1}{\eta}\,\mathrm{KL}(p\|q_k) \right\}.} \tag{1.1}$$

这是负熵几何下的镜像下降（Mirror Descent，MD）子问题。g_k 是整轮冻结的梯度代表；下面通过教师信号指定它，再于第 3 章推导产生这个梯度的教师目标 J。

负熵势为 $\Phi(p) = \sum_a p_a \log p_a$。其 Bregman 散度逐项展开为

$$D_\Phi(p,q) = \Phi(p) - \Phi(q) - \langle \nabla\Phi(q), p - q\rangle \tag{1.2}$$

$$= \sum_a p_a \log(p_a/q_a) - \sum_a (p_a - q_a) = \mathrm{KL}(p\|q). \tag{1.3}$$

因此式 (1.1) 的第二项来自负熵镜像几何。κ 将进入 g_k 的教师信号；η 同时出现在信号族与镜像正则中。它们都不同于后面参数优化器的学习率。

1.2 信号 f 与 advantage

记冻结的教师–锚点概率比与对数比为

$$\rho_a = T_a/q_a, \qquad r_a = \log \rho_a. \tag{1.4}$$

对给定的 κ, η，定义冻结信号

$$f_{\kappa,\eta}(r) = \begin{cases} \kappa^{-1}\log(1 - \eta + \eta e^{\kappa r}), & \kappa > 0, \\ \eta r, & \kappa = 0, \end{cases} \qquad f_a = f_{\kappa,\eta}(r_a). \tag{1.5}$$

这个定义指定了要学习的方向。镜像下降子问题规定更新几何，本身不唯一决定教师信号的形式。

为了明确步长尺度，再定义标准化信号 $A_{\kappa,\eta}$、冻结中心 K_T，以及按锚点中心化的优势信号（advantage）$\mathcal{A}_k$：

$$A_{\kappa,\eta}(x) = \frac{f_{\kappa,\eta}(\log x)}{\eta}, \qquad x > 0, \tag{1.6}$$

$$K_T(q,T) = -\mathbb{E}_q A_{\kappa,\eta}(T/q), \tag{1.7}$$

$$\mathcal{A}_k(a) = A_{\kappa,\eta}(T_a/q_a) + K_T = \frac{f_a - \mathbb{E}_q f}{\eta}. \tag{1.8}$$

于是 $\mathbb{E}_q \mathcal{A}_k = 0$。本文的 advantage 是固定前缀上的中心化教师信号；此处不额外引入序列价值函数。$f, A, \mathcal{A}_k, K_T$ 均由本轮冻结的 q_k, T 计算，内层不随当前学生改变。

现在令 $g_k = -\mathcal{A}_k$。去掉与候选 p 无关的常数，镜像子问题等价于

$$\boxed{m_k = \arg\max_{p\in\Delta} \left\{ \mathbb{E}_p \mathcal{A}_k - \frac{1}{\eta}\,\mathrm{KL}(p\|q_k) \right\}.} \tag{1.9}$$

代入 $\mathcal{A}_k = (f - \mathbb{E}_q f)/\eta$，得到另一个完全等价的形式：

$$m_k = \arg\min_{p\in\Delta} \frac{1}{\eta}\left\{ \mathrm{KL}(p\|q_k) - \mathbb{E}_p f \right\}. \tag{1.10}$$

因为 $\mathbb{E}_q f$ 与动作、候选分布都无关，中心化只改变目标值的常数。下一章从这个最优化问题求出 m_k 的归一化表达式。

第二章 加权教师的显式解

2.1 从镜像子问题到 Gibbs 分布

定理 2.1 (镜像子问题的唯一目标教师)

给定有限词表上的正锚点 q、有限冻结信号 f 和 $\eta>0$，式 (1.10) 的唯一解为

$$m_a=\frac{q_a e^{f_a}}{Z},\qquad Z=\sum_b q_b e^{f_b},\qquad \log(m_a/q_a)=f_a-\log Z. \tag{2.1}$$

若 $\mathcal{A}=(f-\mathbb{E}_q f)/\eta$，则同一分布也写成

$$m_a=\frac{q_a e^{\eta\mathcal{A}_a}}{Z_{\mathcal{A}}},\qquad Z_{\mathcal{A}}=e^{-\mathbb{E}_q f}Z. \tag{2.2}$$

对任意 $p\in\Delta$，镜像损失具有精确分解

$$\frac{\mathrm{KL}(p\|q)-\mathbb{E}_p f}{\eta}=\frac{\mathrm{KL}(p\|m)-\log Z}{\eta}. \tag{2.3}$$

♡

证明 对概率归一化加入乘子 ν，内点一阶条件为

$$\frac{\log(p_a/q_a)+1-f_a}{\eta}+\nu=0. \tag{2.4}$$

因此 $p_a=q_a e^{f_a}e^{-1-\eta\nu}$。求和等于一，便得到式 (2.1)。再利用

$$\log(p_a/m_a)=\log(p_a/q_a)-f_a+\log Z, \tag{2.5}$$

按 p 求和，即得式 (2.3)。KL 非负且仅在两分布相等时为零，所以该内点解也是闭单纯形上的唯一全局解。

中心化后，$e^{\eta\mathcal{A}_a}=e^{f_a-\mathbb{E}_q f}$。分子与配分函数同乘 $e^{-\mathbb{E}_q f}$，因此归一化分布不变。

2.2 代入信号得到归一化幂均值

将第一章定义的 $f_{\kappa,\eta}$ 代入。对 $\kappa>0$，

$$q_a e^{f_a}=q_a\left[1-\eta+\eta(T_a/q_a)^{\kappa}\right]^{1/\kappa} \tag{2.6}$$

$$=\left[(1-\eta)q_a^{\kappa}+\eta T_a^{\kappa}\right]^{1/\kappa}. \tag{2.7}$$

因此每轮要拟合的加权教师是

$$\boxed{m_{\kappa,\eta}(a;q,T)=\frac{\left[(1-\eta)q_a^{\kappa}+\eta T_a^{\kappa}\right]^{1/\kappa}}{\sum_b\left[(1-\eta)q_b^{\kappa}+\eta T_b^{\kappa}\right]^{1/\kappa}}.} \tag{2.8}$$

记分子为 h_a，则 $Z=\sum_a h_a$。这一步从镜像最优性条件推出显式目标；m 在整轮内层中冻结，实际学生 $p_{k,n}$ 用有限次更新逼近它。

在几何端点 $\kappa=0$，直接代入 $f_a=\eta\log(T_a/q_a)$，得到

$$m_{0,\eta}(a)=\frac{q_a^{1-\eta}T_a^{\eta}}{\sum_b q_b^{1-\eta}T_b^{\eta}}. \tag{2.9}$$

它也是式 (2.8) 的连续极限：对固定正分布，$q_a^{\kappa}=1+\kappa\log q_a+O(\kappa^2)$，同样展开 T_a^{κ}，再对加权和取对数、除以 κ，得到 $(1-\eta)\log q_a+\eta\log T_a+O(\kappa)$。

2.3 代表形状与归一化

$$
\begin{aligned}
m_{0,\eta} &\propto q^{1-\eta} T^{\eta}, \\
m_{1/2,\eta}(a) &= \frac{[(1-\eta)\sqrt{q_a} + \eta\sqrt{T_a}]^2}{(1-\eta)^2 + \eta^2 + 2\eta(1-\eta)\sum_b \sqrt{q_b T_b}}, \\
m_{1,\eta} &= (1-\eta)q + \eta T.
\end{aligned}
\tag{2.10}
$$

几何端点在 log-odds 坐标中作加权；平方根点先加权平方根概率再归一化；算术端点直接加权概率，且 $Z = 1$。所有形状在 $\eta \downarrow 0$ 时回到 q，在 $\eta \uparrow 1$ 时到达 T。

至此，镜像子问题、教师信号、advantage 和加权教师都有了明确表达式。下一章保留同一个信号，推导一个以 T 为最优点的教师目标 $J_{\kappa,\eta}$，说明该镜像步究竟下降什么函数。

第三章 从教师信号反推出目标 J

3.1 目标梯度需要满足的关系

第一章用 $g_k=-\mathcal{A}_k$ 指定了镜像方向。由于 $\mathcal{A}_k=A_{\kappa,\eta}(T/q_k)+K_T$，这个向量与 $-A_{\kappa,\eta}(T/q_k)$ 只相差公共常数。对任意可行概率差 $p-q_k$，常数项的内积为零。因此寻找教师目标时，只需满足

$$\partial_{p_a} J_{\kappa,\eta}(p;T)=-A_{\kappa,\eta}(T_a/p_a). \tag{3.1}$$

现在的 p 是定义全局条件目标的变量；它与只在本轮取值的锚点 q_k 分开。目标一旦由 κ,η,T 确定，就不再依赖本轮锚点。

3.2 积分构造与严格凸性

在可分离的散度形式中寻找

$$J_{\kappa,\eta}(p;T)=\sum_a p_a\omega_{\kappa,\eta}(T_a/p_a). \tag{3.2}$$

令 $x=T_a/p_a$，链式法则给出

$$\partial_{p_a}[p_a\omega(x)]=\omega(x)-x\omega'(x). \tag{3.3}$$

所以所需生成函数满足 $\omega-x\omega'=-A$，等价于 $(\omega/x)'=A(x)/x^2$。选取规范化条件 $\omega(1)=0$，积分得到

$$\boxed{\omega_{\kappa,\eta}(x)=x\int_1^x\frac{A_{\kappa,\eta}(u)}{u^2}\,du,\qquad J_{\kappa,\eta}(p;T)=\sum_a p_a\omega_{\kappa,\eta}(T_a/p_a).} \tag{3.4}$$

定理 3.1 (该镜像步对应的教师目标)

对固定 $\kappa\in[0,1]$、$0<\eta<1$ 和正教师 T，式 (3.4) 的生成函数满足 $\omega(1)=\omega'(1)=0$、$\omega''(x)>0$。目标 J 非负、在正单纯形上的唯一最优点为 T，并满足式 (3.1)。第一章的镜像子问题因而等价于

$$m_k=\arg\min_{p\in\Delta}\left\{\langle\nabla J_{\kappa,\eta}(q_k;T),p-q_k\rangle+\eta^{-1}\,\mathrm{KL}(p\|q_k)\right\}, \tag{3.5}$$

其精确解就是第二章的 $m_{\kappa,\eta}$。♡

证明 对积分式求导：

$$\omega'(x)=\int_1^x A(u)u^{-2}\,du+A(x)/x, \tag{3.6}$$

$$\omega(x)-x\omega'(x)=-A(x), \tag{3.7}$$

$$\omega''(x)=\frac{A'(x)}{x}=\frac{x^{\kappa-2}}{1-\eta+\eta x^{\kappa}}>0. \tag{3.8}$$

在 $\kappa=0$ 时最后一式取 x^{-2}。$A(1)=0$ 给出 $\omega'(1)=0$。严格凸性使 ω 在一处唯一取最小值零，所以正权重和 J 仅在每个 $T_a/p_a=1$ 时为零。透视函数的 Hessian 对角元为 $x_aA'(x_a)/p_a>0$，故 J 也严格凸。

梯度由第二个等式与链式法则得到。在 q_k 处，

$$g_k=-\mathcal{A}_k=\nabla J(q_k;T)-K_T\mathbf{1}. \tag{3.9}$$

两梯度代表与 $p-q_k$ 的内积相同，因此产生同一个镜像问题；其解已由定理 2.1 求出。

3.3 下降保证与 J 的端点

令 $\Phi(p)=\sum_a p_a\log p_a$、$x_a=T_a/p_a$。由上述 Hessian，

$$\nabla^2 J(p;T)=\operatorname{diag}\left(\frac{1}{p_a}\frac{x_a^\kappa}{1-\eta+\eta x_a^\kappa}\right)\preceq \eta^{-1}\nabla^2\Phi(p). \tag{3.10}$$

沿线段积分并使用镜像最优性条件，得到

$$J(q;T)-J(m;T)\geq \eta^{-1}\,\mathrm{KL}(q\|m). \tag{3.11}$$

对同一条件分布反复精确刷新锚点，进一步有

$$J(q_K;T)\leq \frac{\mathrm{KL}(T\|q_0)}{\eta K}. \tag{3.12}$$

完整下降、三点恒等式和收敛证明见附录 B。

这组教师目标在端点满足

$$J_{0,\eta}(p;T)=\mathrm{KL}(p\|T), \tag{3.13}$$

$$\lim_{\eta\downarrow 0} J_{\kappa,\eta}(p;T)=D_\kappa(T\|p), \tag{3.14}$$

$$J_{1,\eta}(p;T)=\frac{\mathrm{JS}_\eta(p,T)}{\eta(1-\eta)},\qquad \lim_{\eta\uparrow 1} J_{\kappa,\eta}(p;T)=\mathrm{KL}(p\|T). \tag{3.15}$$

这里 $\mathrm{JS}_\eta(p,T)=(1-\eta)\,\mathrm{KL}(p\|M_p)+\eta\,\mathrm{KL}(T\|M_p)$，$M_p=(1-\eta)p+\eta T$。每个固定 κ,η 定义一个 J；改变 η 一般也改变目标。若在同一个 J 上单独调整镜像步长，应另用 τ，保留信号 $A_{\kappa,\eta}$ 并更新 $p^+\propto qe^{\tau A_{\kappa,\eta}(T/q)}$。

3.4 加权散度重心的等价解释

已经由镜像问题得到的 m，还具有一个用于误差分析的重心解释。定义幂散度[1]

$$D_\kappa(P\|Q)=\frac{1-\sum_a P_a^\kappa Q_a^{1-\kappa}}{\kappa(1-\kappa)},\quad D_0(P\|Q)=\mathrm{KL}(Q\|P),\quad D_1(P\|Q)=\mathrm{KL}(P\|Q). \tag{3.16}$$

该归一化幂均值也是加权散度问题的唯一解[2]：

$$m=\arg\min_{p\in\Delta} F_k(p),\qquad F_k(p)=(1-\eta)D_\kappa(q_k\|p)+\eta D_\kappa(T\|p). \tag{3.17}$$

其超额损失为

$$F_k(p)-F_k(m)=Z^\kappa D_\kappa(m\|p),\qquad 0<\kappa<1. \tag{3.18}$$

两个端点分别为 $\mathrm{KL}(p\|m)$ 与 $\mathrm{KL}(m\|p)$。完整定理及证明见附录 B。F_k 的最优点是本轮 m_k，$J_{\kappa,\eta}$ 的最优点是原教师 T；后面的 inner 损失用于将参数化学生拟合到已经确定的 m_k。

[1] Andrzej Cichocki and Shun-ichi Amari. “Families of Alpha- Beta- and Gamma- Divergences: Flexible and Robust Measures of Similarities”. In: *Entropy* 12.6 (2010), pp. 1532–1568. DOI: 10.3390/e12061532.

[2] Shun-ichi Amari. “Integration of Stochastic Models by Minimizing Alpha-Divergence”. In: *Neural Computation* 19.10 (2007), pp. 2780–2796. DOI: 10.1162/neco.2007.19.10.2780.

第四章 固定目标教师的内层拟合

4.1 最优性方程与四种损失

前三章已从镜像子问题得到信号、advantage、目标教师 m 及其教师目标 J。内层固定 q, T, m 与 $f = \eta A(T/q)$，只优化当前学生 $p = p_\theta$。记

$$U_a = \log(p_a/q_a), \qquad G = C_q f = \eta \mathcal{A}_k, \qquad K_S = \mathrm{KL}(q\|p) = -\mathbb{E}_q U, \qquad K_T = -\mathbb{E}_q A. \tag{4.1}$$

目标教师满足 $U^\star = f - \log Z$。将该方程转成可训练目标，有以下四种方式：

$$L_{\mathrm{MDPO}}(p) = \frac{1}{\eta}\{\mathrm{KL}(p\|q) - \mathbb{E}_p f\} = \frac{1}{\eta}\,\mathrm{KL}(p\|m) - \frac{\log Z}{\eta}, \tag{4.2}$$

$$L_{\mathrm{Part}}(p) = \frac{1}{2}\mathbb{E}_q(U - f + \log Z)^2, \tag{4.3}$$

$$L_{\mathrm{BPO}}(p) = \frac{1}{2\eta}\mathbb{E}_q[C_q(U - f)]^2 = \frac{1}{2\eta}\,\mathrm{Var}_q \log(p/m), \tag{4.4}$$

$$L_{\mathrm{Mean}}(p) = \frac{1}{2}\mathbb{E}_q(U - G)^2. \tag{4.5}$$

MDPO 保留原镜像子问题；Part 回归完整的对数比方程；BPO 回归中心化后的方程；Mean 用 $\mathbb{E}_q f$ 近似 $\log Z$。Mean 的定义与 PMD-mean 原始分析一致，整体损失尺度在此统一[1]。

命题 4.1 (共同目标与 Mean 的偏离)

在完整支持、精确期望和可实现的分布类中，MDPO、Part、BPO 的唯一最优分布均为 m。若 f 非恒定，Mean 的最优分布一般不等于 m。

证明 MDPO 的结论由式 (4.2) 的 KL 分解给出。Part 的零损失要求 $\log(p/m) = 0$。BPO 的零损失要求 $\log(p/m)$ 在全部动作上为常数，归一化再强制常数为零。

Mean 满足约束 $\mathbb{E}_q e^U = 1$，其拉格朗日一阶条件是

$$U_a - G_a + \lambda e^{U_a} = 0. \tag{4.6}$$

Gibbs 解满足 $U_a = G_a - \Delta$，其中 $\Delta = \log \mathbb{E}_q e^G > 0$。代入后要求 $\lambda e^{G_a - \Delta} = \Delta$ 对所有 a 成立；非恒定 G 使其不可能。Mean 的存在唯一性及 Lambert-W 解见附录 C。

Mean 与 BPO 的差异还可精确写成

$$L_{\mathrm{Mean}} = \eta L_{\mathrm{BPO}} + \frac{1}{2}K_S^2. \tag{4.7}$$

因为 $U - G = C_q(U - f) - K_S$，而第一项的 q 均值为零，平方交叉项消失。额外的 $K_S^2/2$ 改变最优分布与梯度；它不能当成不影响优化的常数。

4.2 精确梯度与采样测度

令 $\psi_a = \nabla_\theta \log p_\theta(a)$、$\bar{\psi}_q = \mathbb{E}_q \psi$，则 $\mathbb{E}_p \psi = 0$，但 $\bar{\psi}_q$ 通常不为零。定义

$$R_P = U - f + \log Z, \quad R_M = U - G, \quad R_B = C_q(U - f) = U + K_S - \eta \mathcal{A}_k = U + K_S - \eta(A + K_T). \tag{4.8}$$

[1] Zhenghao Xu et al. *Approximation of Log-Partition Function in Policy Mirror Descent Induces Implicit Regularization for LLM Post-Training*. 2026. arXiv: 2602.05933v1.

直接求导得到

$$\nabla L_{\mathrm{Part}} = \mathbb{E}_q[R_P\psi], \qquad \nabla L_{\mathrm{Mean}} = \mathbb{E}_q[R_M\psi], \tag{4.9}$$

$$\nabla L_{\mathrm{BPO}} = \eta^{-1}\mathbb{E}_q[R_B(\psi - \bar{\psi}_q)] = \eta^{-1}\mathbb{E}_q[R_B\psi], \tag{4.10}$$

$$\nabla L_{\mathrm{MDPO}} = \eta^{-1}\mathbb{E}_p[(U-f)\psi] = \eta^{-1}\mathbb{E}_q[(p/q)(U-f)\psi]. \tag{4.11}$$

BPO 第二个等号使用 $\mathbb{E}_q R_B = 0$；MDPO 删除常数项使用 $\mathbb{E}_p\psi = 0$。这两次抵消发生在不同测度下。

完整词表求和时，可直接对真实损失求导。使用解析 score 形式时，把整个系数停止梯度，再乘以 $\log p_\theta(a)$，实现上述向量。这个代理标量的数值不等于真实损失。Part、Mean、BPO 的动作测度是 q，MDPO 的动作测度是 p；从 q 采样 MDPO 时需乘 p/q。

在 $p = q$ 处，BPO 和 MDPO 的梯度相同，Part、Mean 的梯度等于它们的 η 倍。离开锚点后，损失的度量、中心与测度不同，不能用起点相等推断整个轨迹相等。

4.3 接入前缀与外层同步

恢复条件变量 s，内层实际优化

$$\mathcal{L}_k(\theta) = \mathbb{E}_{s\sim d_k} L_k(p_\theta(\cdot \mid s)). \tag{4.12}$$

d_k 在本轮冻结；有限 rollout 用经验测度 $\widehat{d}_k$ 代替。教师信号 f, K_T 整轮冻结，学生中心 K_S 随每次参数更新重算。每个前缀的一条实际动作观测，不等于该前缀全部动作的期望；辅助动作抽样与新增完整回复是两种不同操作。

Algorithm 1 固定前缀的 MirrorOPD

Semantics: 根据条件目标重构；动作期望使用完整词表

Require: teacher T, initial student θ_0, $\kappa \in [0,1]$, $0 < \eta < 1$, finite budgets K, N

for $k = 0, \dots, K-1$ **do**
  $q_k \leftarrow p_{\theta_k}$; freeze q_k
  sample prompts and one response per prompt from q_k with full action support
  form $\widehat{d}_k$ from valid response tokens, including EOS
  if the batch has no valid response tokens **then**
    terminate with an invalid-batch error
  end if
  cache frozen $f_k = \mathrm{stopgrad}(\eta A_{\kappa,\eta}(T/q_k))$ and required teacher integrals
  $\theta_{k,0} \leftarrow \theta_k$
  for $n = 0, \dots, N-1$ **do**
    recompute $p_{\theta_{k,n}}$ and all student-dependent integrals
    $g_{k,n} \leftarrow \nabla_\theta \mathbb{E}_{\widehat{d}_k} L_k(p_{\theta_{k,n}})$
    $\theta_{k,n+1} \leftarrow \theta_{k,n} - \alpha_{k,n} g_{k,n}$
  end for
  $\theta_{k+1} \leftarrow \theta_{k,N}$; discard the old rollout for the next outer
end for
return θ_K

算法以普通梯度下降明确更新语义。替换为其他优化器时，目标定义保持不变，数值轨迹需另行分析。共享参数可能无法同时表示所有 $m_k(\cdot \mid s)$；此时三种具有相同自由分布解的方法，也可能具有不同的受限投影。

第五章 形状与插值强度的性质

5.1 路径、覆盖与局部速度

固定 q, T 时，η 从零增加到一，把目标教师从锚点移向教师。对固定 κ，任意凸生成散度 $D_\varphi(m_{\kappa,\eta}\|q)$ 随 η 非减；不同 κ 下，相同 η 不代表相同距离。其交点证明见附录 D。

正形状有一个分布无关的覆盖保证：

$$m_a \geq (1-\eta)^{1/\kappa} q_a + \eta^{1/\kappa} T_a, \qquad 0 < \kappa \leq 1. \tag{5.1}$$

证明使用 $h_a \leq (1-\eta)q_a + \eta T_a$，故 $Z \leq 1$；以及 $(x+y)^{1/\kappa} \geq x^{1/\kappa} + y^{1/\kappa}$。于是 $m_a = h_a/Z \geq h_a$ 给出下界。几何端点没有统一的正教师覆盖系数。

对固定严格正分布，小步展开为

$$m_a = q_a + \eta v_{\kappa,a} + O(\eta^2), \qquad v_{\kappa,a} = \frac{q_a}{\kappa}\left[(T_a/q_a)^\kappa - \mathbb{E}_q(T/q)^\kappa\right]. \tag{5.2}$$

$\kappa = 0$ 时取连续极限 $v_{0,a} = q_a C_q \log(T_a/q_a)$。这是 $D_\kappa(T\|q)$ 在 Fisher 度量下的负自然梯度。形状改变高维方向，不能通常由一个学习率缩放替代。

5.2 监督尾部与方差阈值

当 $\kappa > 0, \eta < 1$ 时，

$$A_{\kappa,\eta}(x) \geq -c_{\kappa,\eta}, \qquad c_{\kappa,\eta} = -\frac{\log(1-\eta)}{\kappa\eta}. \tag{5.3}$$

正尾部仍无逐点统一上界，但在 q 下利用 $\mathbb{E}_q(T/q) = 1$ 可以控制矩。令 $V_{\kappa,\eta} = \mathrm{Var}_q\, A_{\kappa,\eta}(T/q)$。对每个固定正 $\eta < 1$ 和 $\kappa > 0$，V 在所有有限正概率分布上有统一有限上界。

更强的小步问题需要另一个结论：

$$\sup_{q,T} V_{\kappa,\eta} = \Theta_\kappa\left(\eta^{\min\{2,1/\kappa\}-2}\right), \qquad \eta \downarrow 0, \quad \kappa > 0. \tag{5.4}$$

所以保持统一小步方差有界的区间为 $0 < \kappa \leq 1/2$。几何端点对任意固定正 η 都没有分布无关界。这里上确界允许分布随 η 改变；固定一对正分布时，每种形状的小步极限都有限。

对 $0 < \kappa \leq 1/2$，还有误差相关界

$$V_{\kappa,\eta} \leq \frac{D_\kappa(T\|q)}{\kappa(1-\eta)^2} \leq \frac{K_T}{\kappa(1-\kappa)(1-\eta)^2}. \tag{5.5}$$

若 score 范数统一不超过 S，中心化教师梯度的协方差迹不超过 $S^2 V$。标量监督方差与完整参数梯度方差由这个额外条件连接；精确均值中心本身不保证 score 梯度的方差最小。

5.3 平方根点的作用与限制

令 $a = \sum_v \sqrt{q_v T_v}$、$w = 1 - \eta$。平方根目标满足

$$\sqrt{m} = \frac{w\sqrt{q} + \eta\sqrt{T}}{\sqrt{Z}}, \qquad Z = w^2 + \eta^2 + 2w\eta a. \tag{5.6}$$

因为 $Z \leq 1$，

$$\sum_v \sqrt{m_v T_v} = \frac{wa + \eta}{\sqrt{Z}} \geq wa + \eta, \quad H^2(m,T) \leq (1-\eta)H^2(q,T). \tag{5.7}$$

这是精确分布更新的全局收缩。所有形状在固定正教师附近却共享

$$m_{\kappa,\eta}(T + \delta, T) = T + (1-\eta)\delta + O(\|\delta\|^2). \tag{5.8}$$

因此平方根的全局 Hellinger 保证不代表更好的局部一阶概率收缩率。

平方根点唯一最小化小步监督方差相对于自身教师散度的最坏比值；若改为最小化绝对最坏方差，最优形状约为 0.441928。两种准则的推导在附录 D。固定 q, η 时，BPO 的独立 logits Hessian 为

$$\nabla_z^2 L_{\mathrm{BPO}} = \eta^{-1}[\mathrm{diag}(q) - qq^\top], \tag{5.9}$$

其中不含 κ。形状改变目标和初始残差，不能由此宣称改善该二次问题的条件数。

第六章 有限拟合与外层进展

6.1 从本轮拟合到教师接近度

定理 6.1 (重心进展恒等式)

对任意候选 p，令 $c_\kappa = Z^\kappa$，端点 $\kappa = 0, 1$ 取 $c_\kappa = 1$，则

$$\eta[D_\kappa(T\|q) - D_\kappa(T\|p)] = (1-\eta)D_\kappa(q\|p) + c_\kappa[D_\kappa(m\|q) - D_\kappa(m\|p)]. \tag{6.1}$$

因此 $D_\kappa(m\|p) \le D_\kappa(m\|q)$ 是教师散度非增的充分条件。精确更新 $p = m$ 在 $q \neq T$ 时严格改善。

证明 重心定义给出 $F(q) = \eta D_\kappa(T\|q)$。另一方面，式 (3.18) 及其端点给出 $F(q) - F(p) = c_\kappa[D_\kappa(m\|q) - D_\kappa(m\|p)]$。代入 $F(p)$ 并移项得到恒等式。条件成立时右侧两项非负。若 $p = m$ 且 $q \neq T$，则 $m \neq q$，右侧第一项严格为正。

精确幂均值更新还有更强性质：它同时降低所有凸生成的教师 f-散度。证明使用概率比的共同交点，见附录 D。有限 inner 降低某个拟合损失却不足以自动继承这一性质。

6.2 拟合误差证书

MDPO 的超额损失 δ 精确对应 $\mathrm{KL}(p\|m) = \eta\delta$，由 Pinsker 不等式得到 $\mathrm{TV}(p, m) \le \sqrt{\eta\delta/2}$。BPO 控制的是按 q 加权的对数比方差。若另有 $q_a \ge q_{\min} > 0$，则

$$d_H(p, m) := \operatorname{osc}_a \log(p_a/m_a) \le 2\sqrt{\eta L_{\mathrm{BPO}}/q_{\min}}, \quad \mathrm{TV}(p, m) \le \tanh[d_H(p, m)/4]. \tag{6.2}$$

最小锚点概率极小时，这个证书可能很弱；推导与锐 TV 界见附录 A、附录 G。

这种限制确实会发生。取

$$q = (0.4999995, 0.4999995, 10^{-6}), \quad T = (0.8, 0.199999, 10^{-6}), \quad \kappa = \tfrac{1}{2}, \quad \eta = 0.3, \tag{6.3}$$

并令 $p \propto m \exp(0, 0, 12)$。直接求和得到

$$L_{\mathrm{BPO}}(q) \simeq 0.062277, \quad L_{\mathrm{BPO}}(p) \simeq 0.000240, \quad \mathrm{KL}(q\|T) \simeq 0.223145, \quad \mathrm{KL}(p\|T) \simeq 1.654219. \tag{6.4}$$

稀有动作的对数误差在 q 下权重很小，却可以改变归一化后的学生质量。因此需要区分 loss 下降与目标教师拟合证书。

6.3 有效保证的条件

从 q 出发，使用精确锚点 Fisher 预条件的 BPO 产生理想路径

$$p_\xi \propto q \exp(\xi f), \qquad 0 \le \xi \le 1. \tag{6.5}$$

沿这条路径，所有凸生成的教师散度非增。该结论依赖路径、完整期望与自由 logits；普通神经网络优化器不自动位于这条路径上，证明见附录 C。

固定教师的精确外层收敛，允许通过输出误差递推扩展到近似拟合。应先由内层损失、中心误差和表示限制建立输出误差，再分析多轮累积；梯度估计的方差不能直接替代输出误差。

最后，正文的目标是固定前缀测度下的条件目标。完整序列 KL 使用随策略变化的访问权重；条件 KL 逐前缀下降，也可能同时让学生更频繁进入误差较大的分支。序列反例、后缀价值修正和同步边界见附录 G。TOP-D 的目标教师由算术端点精确恢复，其收缩与方差性质见附录 H。

附录 A 测度、归一化与基础工具

A.1 变长轨迹如何诱导条件目标

设提示 $x \sim \mathcal{D}$，锚点 q 生成轨迹，回复长度 H 包含 EOS，不包含提示与 padding。预算终止时保留已生成动作。假设 $0 < \mathbb{E}H < \infty$，定义

$$d_q(B) = \frac{\mathbb{E}_q \sum_{t\geq 1} \mathbf{1}\{t \leq H,\ s_t \in B\}}{\mathbb{E}_q H}. \tag{A.1}$$

命题 A.1 (访问测度的条件分解)

在上述停止规则及 $0 < \mathbb{E}_q H < \infty$ 下，总体前缀–动作测度为 $d_q(s)q(a \mid s)$。对满足 $\mathbb{E}_q \sum_{t\leq H} |h(s_t, a_t)| < \infty$ 的函数，

$$\mathbb{E}_q \sum_{t\leq H} h(s_t, a_t) = \mathbb{E}_q H\ \mathbb{E}_{d_q,q} h. \tag{A.2}$$

证明 这里 s_t 是抽取第 t 个动作之前的历史。存活事件 $\{t \leq H\}$ 关于这段历史可测。对于绝对可积的 h，塔式期望给出

$$\mathbb{E}_q \sum_{t\geq 1} \mathbf{1}\{t \leq H\} h(s_t, a_t) = \mathbb{E}_q \sum_{t\geq 1} \mathbf{1}\{t \leq H\} \sum_a q(a \mid s_t) h(s_t, a) \tag{A.3}$$

$$= \mathbb{E}_q H\ \mathbb{E}_{s\sim d_q, a\sim q(\cdot|s)} h(s, a). \tag{A.4}$$

第一步交换求和与期望由非负性或绝对可积性保证。因此总体前缀–动作测度是 $d_q q$。

命题 A.2 (全局 token 比率估计的一致性)

独立同分布轨迹具有有限正平均长度及可积的轨迹总损失时，全局 token 均值 $\widehat{I}_B = (\sum_{i,t\leq H_i} h_{it})/(\sum_i H_i)$ 几乎处处收敛到 $\mathbb{E}_{d_q,q} h$。该结论不要求轨迹内 token 独立，也不保证有限样本无偏。

证明 对 B 条独立轨迹，全局 token 均值为

$$\widehat{I}_B = \frac{\sum_{i=1}^{B} \sum_{t=1}^{H_i} h(s_{it}, a_{it})}{\sum_{i=1}^{B} H_i}. \tag{A.5}$$

分子分母除以 B，分别由大数定律趋于对应期望；分母极限严格为正，所以比值一致收敛到 $\mathbb{E}_{d_q,q} h$。有限 B 时随机分母一般产生比率估计偏差。同一轨迹内的 token 相关，置信区间不能把全部 token 当成独立样本。

命题 A.3 (逐序列长度权重改变动作分布)

存在有限长度生成过程，使按每条轨迹的 $1/H$ 加权后，同一前缀下的动作分布不同于生成策略。因此逐序列均值不能一般替代 $d_q q$ 下的 token 目标。

证明 逐序列先除以 H_i 会改变测度。取初始两动作各以 $1/2$ 发生，动作一立即终止，动作二随后再生成一个确定 EOS。按 $1/H$ 加权后，初始两动作质量为 $1/2, 1/4$，条件概率成为 $2/3, 1/3$。这个权重依赖当前与未来动作，不能移出条件期望。

命题 A.4 (微批次梯度累加不变性)

固定有效 token 总数 $\mathsf{T} > 0$，微批次构成有效位置的不交划分。若每批使用总分母 T，并在全部梯度累加后进行裁剪和更新，则所得梯度等于全 batch 目标的梯度。

证明 固定 batch 后，总有效 token 数 T 不依赖内层参数。若微批次互不相交，使用 $L_m = \mathsf{T}^{-1} \sum_{i\in\mathcal{B}_m} \ell_i$，则

$$\sum_m \nabla L_m = \mathsf{T}^{-1} \sum_i \nabla \ell_i. \tag{A.6}$$

每个微批次各自取均值时，需再乘 $|\mathcal{B}_m|/\mathsf{T}$。裁剪和优化器更新放在梯度累加以后，才保留这条线性恒等式。

A.2 积分微分与支持条件

默认有限词表上的概率严格为正。若允许零概率，$\mathrm{KL}(P\|Q)$ 有限至少要求 $P \ll Q$；重要性抽样则需要提案覆盖非零被积贡献。两项支持要求由不同对象决定。

引理 A.1 (score 恒等式与积分微分)

有限词表上，若 $p_\theta > 0$ 归一化且 p_θ, h_θ 可微，则

$$\mathbb{E}_p \psi = 0, \qquad \nabla_\theta \mathbb{E}_p h_\theta = \mathbb{E}_p(\nabla_\theta h_\theta + h_\theta \psi). \tag{A.7}$$

若积分权重 q 冻结，则 $\nabla_\theta \mathbb{E}_q h_\theta = \mathbb{E}_q \nabla_\theta h_\theta$。

证明 令 p_θ 可微，$\psi_a = \nabla_\theta \log p_\theta(a)$。归一化给出

$$\mathbb{E}_p \psi = \sum_a \nabla p_\theta(a) = 0. \tag{A.8}$$

对参数依赖函数 h_θ，

$$\nabla_\theta \mathbb{E}_{p_\theta} h_\theta = \mathbb{E}_p[\nabla_\theta h_\theta + h_\theta \psi]. \tag{A.9}$$

固定采样索引的自动微分只产生第一项。冻结测度 q 下则有 $\nabla \mathbb{E}_q h_\theta = \mathbb{E}_q \nabla h_\theta$，且 $\mathbb{E}_q \psi$ 一般不为零。有限词表使逐项微分合法；连续空间需另行提供可交换微分与积分的支配条件。

A.3 散度规范化与局部二阶项

命题 A.5 (幂散度的生成函数与对偶)

对 $0 < \kappa < 1$，幂散度的规范化生成函数为

$$g_\kappa(x) = \frac{\kappa x + 1 - \kappa - x^\kappa}{\kappa(1-\kappa)}. \tag{A.10}$$

其曲率为 $x^{\kappa-2}$；连续端点为 $g_0 = x - 1 - \log x$、$g_1 = x \log x - x + 1$。交换分布时 $D_\kappa(P\|Q) = D_{1-\kappa}(Q\|P)$，且 $D_{1/2} = 2H^2$。

证明 对凸函数 g，定义 $D_g(P\|Q) = \sum_a Q_a g(P_a/Q_a)$。加入线性项 $b(x-1)$ 不改变散度。采用 $g(1) = g'(1) = 0$ 的规范化后，

$$g_\kappa(x) = \frac{\kappa x + 1 - \kappa - x^\kappa}{\kappa(1-\kappa)}, \qquad g_\kappa''(x) = x^{\kappa-2}. \tag{A.11}$$

$g_0(x) = x - 1 - \log x$、$g_1(x) = x \log x - x + 1$ 由洛必达法则得到。对偶关系由逐点恒等式 $x g_{1-\kappa}(1/x) = g_\kappa(x)$ 给出：

$$D_\kappa(P\|Q) = D_{1-\kappa}(Q\|P). \tag{A.12}$$

在 $\kappa = 1/2$，$D_{1/2}(P\|Q) = 4(1 - \sum \sqrt{PQ}) = 2H^2(P,Q)$。

命题 A.6 (规范化散度的 Fisher 二阶项)

设 $Q > 0$ 固定，g 在一附近三阶连续可微，$g(1) = g'(1) = 0, g''(1) = 1$。若 $\sum_a \delta_a = 0$ 且 $\max_a |\delta_a/Q_a| \to 0$，则

$$D_g(Q + \delta\|Q) = \tfrac{1}{2} \sum_a \delta_a^2/Q_a + O\left(\sum_a |\delta_a|^3/Q_a^2\right). \tag{A.13}$$

证明 若 g 在一附近三阶可微，$g''(1)=1$，并且 $P=Q+\delta$、$\sum_a \delta_a=0$、$\max_a|\delta_a/Q_a|\to 0$，则

$$D_g(Q+\delta\|Q)=\frac{1}{2}\sum_a\frac{\delta_a^2}{Q_a}+O\left(\sum_a\frac{|\delta_a|^3}{Q_a^2}\right). \tag{A.14}$$

证明是对 $g(1+\delta_a/Q_a)$ 逐项 Taylor 展开；常数和一次项消失，余项乘以 Q_a 后求和。这个共同 Fisher 二阶尺度不表示不同散度在远处相等。

A.4 中心化坐标与归一化恢复

命题 A.7 (中心化误差与概率分布的双射)

固定正分布 q,m。映射 $p\mapsto e=C_q\log(p/m)$ 将正单纯形双射到 $\{e:\mathbb{E}_q e=0\}$，逆映射为

$$p_a=m_a\exp[e_a-\log\mathbb{E}_m e^e]. \tag{A.15}$$

证明 固定 $q,m>0$。定义 $e=C_q\log(p/m)$，则 $\mathbb{E}_q e=0$。写 $\log(p/m)=e+c$，归一化给出 $e^c\mathbb{E}_m e^e=1$，故

$$p_a=m_a e^{e_a-\Lambda(e)},\qquad \Lambda(e)=\log\mathbb{E}_m e^e. \tag{A.16}$$

反过来，任何 $\mathbb{E}_q e=0$ 的有限向量经该式得到正分布，并恢复原 e。因此归一化分布与 q 中心化坐标一一对应。$\Lambda(e)$ 可以为负，因为中心化使用 q，配分函数使用 m。

欧氏中心坐标 $P_\perp v$ 使用 $P_\perp=I-\mathbf{1}\mathbf{1}^\top/|\mathcal{V}|$，而 $C_q v$ 使用 q。两者相差常数，代表同一个归一化自由度；它们的欧氏范数及所在子空间不能直接混用。

A.5 从对数误差到概率距离

引理 A.2 (加权误差控制跨度)

若 $q_i,q_j>0$，则

$$(v_i-v_j)^2\le(q_i^{-1}+q_j^{-1})\mathbb{E}_q v^2. \tag{A.17}$$

特别地，若 $q_a\ge q_{\min}>0$，则 $(\operatorname{osc} v)^2\le 2\mathbb{E}_q v^2/q_{\min}$。

证明 将差写为 $(\sqrt{q_i}v_i,\sqrt{q_j}v_j)\cdot(q_i^{-1/2},-q_j^{-1/2})$，应用 Cauchy–Schwarz，再把两个加权平方放大为全部平方和。选择最大与最小动作即得跨度界。

定理 A.1 (Hilbert 距离到 TV 的锐界)

对正概率分布，

$$\mathrm{TV}(p,q)\le\tanh\left(\frac{\operatorname{osc}\log(p/q)}{4}\right). \tag{A.18}$$

任意给定正跨度都有二元分布取等。

证明 令 $L=p/q$、$l=\min L$、$u=\max L$、$h=u/l=e^\delta$。$\mathbb{E}_q L=1$ 保证 $l\le 1\le u$。凸函数 $|L-1|$ 不超过端点连线，所以

$$\mathrm{TV}(p,q)\le\frac{(u-1)(1-l)}{u-l}=\frac{h+1-hl-l^{-1}}{h-1}\le\frac{\sqrt{h}-1}{\sqrt{h}+1}. \tag{A.19}$$

最后一步使用 $hl+l^{-1}\ge 2\sqrt{h}$。取 L 的两值为 $e^{\delta/2},e^{-\delta/2}$，在 q 下的概率为 $1/(1+e^{\delta/2})$ 和 $e^{\delta/2}/(1+e^{\delta/2})$。它们满足均值一，且弦线及算术–几何均值不等式同时取等。

定理 A.2 (Pinsker 不等式)

对有限词表上的正概率分布，$\mathrm{TV}(p,q) \le \sqrt{\mathrm{KL}(p\|q)/2}$。♡

证明 另一个常用界是 Pinsker 不等式 $\mathrm{TV}(p,q) \le \sqrt{\mathrm{KL}(p\|q)/2}$。为给出常数，取 $B = \{a : p_a \ge q_a\}$，则 $p(B) - q(B) = \mathrm{TV}(p,q)$。log-sum 不等式把 KL 下界为二元 KL。固定 $v = q(B)$，函数

$$b(u) = u\log(u/v) + (1-u)\log[(1-u)/(1-v)] \tag{A.20}$$

满足 $b(v) = b'(v) = 0$、$b''(u) = 1/[u(1-u)] \ge 4$。在 v, u 之间积分两次，得到 $b(u) \ge 2(u-v)^2$。非平凡正支持情形中 $0 < v < 1$；距离为零时直接成立。

附录 B 重心、教师目标与镜像下降

B.1 密度比矩、散度与几何重加权

命题 B.1 (密度比矩与幂散度梯度)

设 $T>0$ 固定，$p_\theta>0$ 可微，$\rho=T/p$、$g(u)=\mathbb{E}_p\rho^u$。则 $g(0)=g(1)=1$，$g''\geq 0$，端点斜率为 $g'(0)=-\mathrm{KL}(p\|T)$、$g'(1)=\mathrm{KL}(T\|p)$。对 $0<\kappa\leq 1$，

$$-\nabla_\theta D_\kappa(T\|p)=\kappa^{-1}\mathbb{E}_p[\rho^\kappa\psi]=\kappa^{-1}g(\kappa)\mathbb{E}_{\pi_\kappa}\psi,\quad \pi_\kappa\propto T^\kappa p^{1-\kappa}. \tag{B.1}$$

当 $\kappa\downarrow 0$ 时，该方向趋于 $\mathbb{E}_p[\log(T/p)\psi]$。

证明 固定教师 T，当前学生 $p=p_\theta$，令 $\rho=T/p$，定义 $g(u)=\mathbb{E}_p\rho^u=\sum_a T_a^u p_a^{1-u}$。有限正支持下可逐项求导：

$$g(0)=g(1)=1,\quad g'(u)=\mathbb{E}_p[\rho^u\log\rho],\quad g''(u)=\mathbb{E}_p[\rho^u\log^2\rho]\geq 0. \tag{B.2}$$

两个端点斜率为 $g'(0)=-\mathrm{KL}(p\|T)$、$g'(1)=\mathrm{KL}(T\|p)$。因此 $D_\kappa(T\|p)=[1-g(\kappa)]/[\kappa(1-\kappa)]$ 在两个端点连续恢复对应 KL；严格凸性或 Hölder 给 $g(\kappa)<1$，除非 $p=T$。

对学生参数求导，T 冻结，概率项 $p_a^{1-\kappa}$ 的导数为 $(1-\kappa)p_a^{1-\kappa}\psi_a$。所以

$$-\nabla_\theta D_\kappa(T\|p)=\frac{1}{\kappa}\mathbb{E}_p[\rho^\kappa\psi]=\mathbb{E}_p\left[\frac{\rho^\kappa-1}{\kappa}\psi\right]. \tag{B.3}$$

第二式使用 $\mathbb{E}_p\psi=0$。$\kappa\downarrow 0$ 给逆向 KL 的 log-ratio 方向；$\kappa=1$ 给 $\mathbb{E}_T\psi$。令 $\pi_\kappa\propto T^\kappa p^{1-\kappa}$，相同梯度也写成 $g(\kappa)\mathbb{E}_{\pi_\kappa}\psi/\kappa$。这个几何重加权测度随当前学生变化，解释每次冻结测度后的局部最大似然方向。

在 $\kappa\downarrow 0$，$\pi_\kappa=p[1+\kappa C_p\log(T/p)]+O(\kappa^2)$，所以 $\mathbb{E}_{\pi_\kappa}\psi$ 的零阶项为零，一阶项与外部 $1/\kappa$ 抵消。这里的 π_κ 是梯度积分的测度，通常不等于重心问题的 $m_{\kappa,\eta}$；后者还包含独立的插值参数 η。

B.2 加权重心、两个端点与多教师形式

定理 B.1 (镜像教师的幂散度重心解释)

固定正分布 q,T，$0<\kappa<1$、$0<\eta<1$，令 m 为式 (2.8) 的镜像目标教师，$Z=\sum_a[(1-\eta)q_a^\kappa+\eta T_a^\kappa]^{1/\kappa}$。则它唯一最小化

$$F(p)=(1-\eta)D_\kappa(q\|p)+\eta D_\kappa(T\|p), \tag{B.4}$$

并且对任意 $p\in\Delta$，

$$F(p)-F(m)=Z^\kappa D_\kappa(m\|p). \tag{B.5}$$

证明 令 $S_a=(1-\eta)q_a^\kappa+\eta T_a^\kappa$。展开散度定义，

$$F(p)=\frac{1-\sum_a S_a p_a^{1-\kappa}}{\kappa(1-\kappa)}. \tag{B.6}$$

内点的一阶条件为 $-S_a p_a^{-\kappa}/\kappa+\nu=0$，归一化后给出 $p_a=S_a^{1/\kappa}/Z=m_a$。为核对边界与全局唯一性，利用 $S_a=Z^\kappa m_a^\kappa$，得到

$$F(p)=\frac{1-Z^\kappa}{\kappa(1-\kappa)}+Z^\kappa\frac{1-\sum_a m_a^\kappa p_a^{1-\kappa}}{\kappa(1-\kappa)}. \tag{B.7}$$

Hölder 不等式使第二项非负，并且正 m 下只有 $p=m$ 取零。因此该内点是闭单纯形上的唯一全局解，减去其目标值即得超额损失恒等式。

命题 B.2 (KL 两端的重心误差分解)

固定 $q, T > 0$ 和 $0 < \eta < 1$，令 $F_\kappa(p) = (1-\eta)D_\kappa(q\|p) + \eta D_\kappa(T\|p)$。几何与算术目标分别唯一最小化 F_0, F_1，并有

$$F_0(p) - F_0(m_{0,\eta}) = \mathrm{KL}(p\|m_{0,\eta}), \qquad F_1(p) - F_1(m_{1,\eta}) = \mathrm{KL}(m_{1,\eta}\|p). \tag{B.8}$$

证明 对 $\kappa = 0$，令 $Z_0 = \sum_a q_a^{1-\eta} T_a^\eta$。展开各对数可得

$$(1-\eta)\,\mathrm{KL}(p\|q) + \eta\,\mathrm{KL}(p\|T) = \mathrm{KL}(p\|m_{0,\eta}) - \log Z_0. \tag{B.9}$$

对 $\kappa = 1$，$m = (1-\eta)q + \eta T$，因此

$$(1-\eta)\,\mathrm{KL}(q\|p) + \eta\,\mathrm{KL}(T\|p) \tag{B.10}$$

$$= \mathrm{KL}(m\|p) + (1-\eta)\,\mathrm{KL}(q\|m) + \eta\,\mathrm{KL}(T\|m). \tag{B.11}$$

两式既确定最优分布，也确定有限误差应使用哪个 KL 方向。

定理 B.2 (多教师幂均值重心)

给定有限个正分布 $T^{(j)}$、非负权重 w_j 且 $\sum_j w_j = 1$，$0 < \kappa < 1$。令 $S_a = \sum_j w_j (T_a^{(j)})^\kappa$、$Z = \sum_a S_a^{1/\kappa}$，则加权散度和的唯一最优点为 $m_a = S_a^{1/\kappa}/Z$，其超额损失为 $Z^\kappa D_\kappa(m\|p)$。几何与算术端点按连续延拓成立。

证明 对任意有限个正分布 $T^{(j)}$ 与非负权重 w_j、$\sum_j w_j = 1$，令 $S_a = \sum_j w_j (T_a^{(j)})^\kappa$。加权目标等于 $[1 - \sum_a S_a p_a^{1-\kappa}]/[\kappa(1-\kappa)]$；将上一定理的同一分解用于这个 S，得到

$$m_a = \frac{S_a^{1/\kappa}}{\sum_b S_b^{1/\kappa}}, \qquad \sum_j w_j D_\kappa(T^{(j)}\|p) - \sum_j w_j D_\kappa(T^{(j)}\|m) = Z^\kappa D_\kappa(m\|p). \tag{B.12}$$

几何端点取 $m \propto \prod_j (T^{(j)})^{w_j}$，算术端点取加权概率和。锚点可作为一个分布加入。多教师重心并不意味着每个教师距离都下降；各教师目标可能冲突。

命题 B.3 (可实现重心处的参数曲率)

设 $0 < \kappa < 1$，参数化模型二次可微且在 $\theta_\star$ 实现重心 m。若 $B_\theta = \partial p_\theta/\partial\theta$，则

$$\nabla_\theta^2 F(p_\theta)|_{\theta_\star} = Z^\kappa B_{\theta_\star}^\top \operatorname{diag}(1/m) B_{\theta_\star}. \tag{B.13}$$

该等式只断言可实现最优点的曲率。

证明 对 $0 < \kappa < 1$，重心目标在最优点的概率 Hessian 为 $Z^\kappa \operatorname{diag}(1/m)$。若参数化模型恰好实现 m，令概率 Jacobian 为 $B_\theta = \partial p/\partial\theta$，则

$$\nabla_\theta^2 F(p_\theta)\big|_{p=m} = Z^\kappa B_\theta^\top \operatorname{diag}(1/m) B_\theta. \tag{B.14}$$

链式法则的另一项为 $\sum_a (\partial F/\partial p_a)\nabla_\theta^2 p_a$；最优点的概率梯度是常数向量，该项由 $\sum_a p_a = 1$ 消失。离开可实现最优点时不能删除这项。

B.3 逆向构造的唯一性与通用信号

命题 B.4 (逆向积分的唯一性)

设 A 连续且 $A(1) = 0$。要求透视目标 $D_\omega(T\|p)$ 的正正交象限梯度为 $-A(T/p)$，并取 $\omega(1) = 0$，则唯一生成函数为 $\omega(x) = x\int_1^x A(u)u^{-2}\,du$；它同时满足 $\omega'(1) = 0$。

证明 若要求 $D_\omega(T\|p)$ 的逐坐标梯度是 $-A(T/p)$，透视函数求导强制 $\omega - x\omega' = -A$。于是

$$(\omega(x)/x)' = A(x)/x^2. \tag{B.15}$$

加上 $\omega(1)=0$ 唯一确定正文积分式；$A(1)=0$ 再保证 $\omega'(1)=0$。若只指定单纯形上的梯度，允许添加不改变散度的线性规范项；这里的规范化消除了该自由度。

命题 B.5 (通用单调信号的镜像目标)

设 $S\in C^1(0,\infty)$、$S(1)=0, S'>0$。定义 $\omega_S(x)=x\int_1^x S(u)u^{-2}\,du$，则 $J_S=D_{\omega_S}(T\|p)$ 严格凸，$\nabla_p J_S=-S(T/p)$，步长 τ 的熵镜像解为 $p^+\propto qe^{\tau S(T/q)}$。若 $L_S=\sup_x xS'(x)<\infty$，则 J_S 关于负熵为 L_S 相对光滑。

证明 更一般，若 $S(1)=0$、$S'(x)>0$，定义

$$\omega_S(x)=x\int_1^x S(u)u^{-2}\,du,\qquad J_S(p;T)=D_{\omega_S}(T\|p). \tag{B.16}$$

则 $\omega_S''=S'/x>0$、$\nabla_p J_S=-S(T/p)$，熵镜像步为 $p^+\propto qe^{\tau S(T/q)}$。若 $L_S=\sup_{x>0}xS'(x)<\infty$，则

$$\nabla_p^2 J_S=\operatorname{diag}[x_aS'(x_a)/p_a]\preceq L_S\nabla^2\Phi. \tag{B.17}$$

这证明相对光滑性。它本身不保证统一方差、可估计中心或有限神经网络拟合。

B.4 完整的下降与收敛推导

定理 B.3 (教师目标的下降、末步界与收敛)

固定 $T>0,\kappa\in[0,1],0<\eta<1$，令 $J=J_{\kappa,\eta}$。对 $0<\tau\le\eta$ 的精确熵镜像步，

$$J(q)-J(p^+)\ge\tau^{-1}\,\mathrm{KL}(q\|p^+)+(\tau^{-1}-\eta^{-1})\,\mathrm{KL}(p^+\|q), \tag{B.18}$$

$$\tau J(p^+)\le\mathrm{KL}(T\|q)-\mathrm{KL}(T\|p^+). \tag{B.19}$$

若每轮刷新锚点且 $0<\tau_k\le\eta$，则 $J(q_K)\le\mathrm{KL}(T\|q_0)/\sum_{k<K}\tau_k$。当 $\sum_k\tau_k=\infty$ 时，$q_K\to T$。

证明 固定 κ,η,T，记 $J=J_{\kappa,\eta}$，另取 $0<\tau\le\eta$。p^+ 最小化 $\langle\nabla J(q),p-q\rangle+\mathrm{KL}(p\|q)/\tau$。一阶条件与概率差作内积，得

$$\langle\nabla J(q),p^+-q\rangle=-\tau^{-1}[\mathrm{KL}(p^+\|q)+\mathrm{KL}(q\|p^+)]. \tag{B.20}$$

将它代入相对光滑式：

$$J(q)-J(p^+)\ge\tau^{-1}\,\mathrm{KL}(q\|p^+)+(\tau^{-1}-\eta^{-1})\,\mathrm{KL}(p^+\|q). \tag{B.21}$$

凸性给出 $J(q)\le\langle\nabla J(q),q-T\rangle$，因为 $J(T)=0$。因此

$$J(p^+)\le\langle\nabla J(q),p^+-T\rangle+\eta^{-1}\,\mathrm{KL}(p^+\|q) \tag{B.22}$$

$$=\tau^{-1}[\mathrm{KL}(T\|q)-\mathrm{KL}(T\|p^+)]-(\tau^{-1}-\eta^{-1})\,\mathrm{KL}(p^+\|q). \tag{B.23}$$

第二行可直接核对：最优性条件使梯度与 $-\tau^{-1}\log(p^+/q)$ 相差常数，常数与 p^+-T 的内积为零；展开三个 KL 即得到该式。

每步重新计算信号并刷新 $q_{k+1}=p^+(q_k)$，对式 (B.23) 求和：

$$\sum_{k=0}^{K-1}\tau_kJ(q_{k+1})\le\mathrm{KL}(T\|q_0). \tag{B.24}$$

由式 (B.21)，$J(q_K)\le J(q_{k+1})$，故

$$J(q_K)\le\frac{\mathrm{KL}(T\|q_0)}{\sum_{k<K}\tau_k}. \tag{B.25}$$

固定正 τ 或 $\sum_k\tau_k=\infty$ 时目标趋于零。对 $\kappa=0$，KL 的连续延拓与唯一零点给出 $q_k\to T$。对 $\kappa>0$，还需排除边界极限。令

$$d_\infty=\int_1^\infty A(u)u^{-2}\,du. \tag{B.26}$$

$0 < A(u) \le (\log u)/\eta$ 在 $u > 1$ 上成立，故 $0 < d_\infty \le 1/\eta$。若某坐标 $p_a \to 0$，则 $p_a\omega(T_a/p_a) \to T_a d_\infty > 0$。因此目标趋零的序列不可能在边界聚集；内点零点唯一为 T，结合有限单纯形紧性得到整个序列收敛。

上述求和要求同一个 J。逐轮改变 η 或 κ 时，不能直接把各轮不同函数的下降式望远镜相消。固定前缀测度的正加权和保留推导；策略变化引起的访问测度刷新另见附录 G。

B.5 端点、JS 与曲率插值

命题 B.6 (教师目标的连续端点)

对固定正概率分布 p, T，有

$$J_{0,\eta}(p;T) = \mathrm{KL}(p\|T), \quad \lim_{\eta\downarrow 0} J_{\kappa,\eta} = D_\kappa(T\|p), \quad \lim_{\eta\uparrow 1} J_{\kappa,\eta} = \mathrm{KL}(p\|T). \tag{B.27}$$

证明 在固定正 x 的紧积分区间上，

$$A_{0,\eta}(x) = \log x, \qquad \lim_{\eta\downarrow 0} A_{\kappa,\eta}(x) = \frac{x^\kappa - 1}{\kappa}, \qquad \lim_{\eta\uparrow 1} A_{\kappa,\eta}(x) = \log x. \tag{B.28}$$

分母在紧区间内有统一正下界，故可在 ω 的有限积分中取极限。对应二阶导数及在一处的两项规范化条件唯一确定生成函数，得到正文的三个 J 端点。其中 $(x^\kappa - 1)/\kappa$ 在 $\kappa = 0$ 按连续极限 $\log x$ 理解。

命题 B.7 (JS 端点与曲率插值)

设 $0 < \eta < 1$，$M_p = (1-\eta)p + \eta T$。则

$$J_{1,\eta}(p;T) = \frac{(1-\eta)\,\mathrm{KL}(p\|M_p) + \eta\,\mathrm{KL}(T\|M_p)}{\eta(1-\eta)}. \tag{B.29}$$

一般形状满足 $1/\omega''_{\kappa,\eta} = (1-\eta)/g''_\kappa + \eta/g''_0$。固定 $\kappa > 0$ 时，不同 η 的规范化目标一般不互为整体常数倍。

证明 对 $\kappa = 1$，令 $b = 1-\eta$、$B = b + \eta x$。分部积分给出

$$\omega_{1,\eta}(x) = -\eta^{-1}\log B + x\int_1^x \frac{du}{u(b+\eta u)} \tag{B.30}$$

$$= \frac{x\log x}{b} - \left(\eta^{-1} + \frac{x}{b}\right)\log B = \frac{\eta x\log x - B\log B}{\eta b}. \tag{B.31}$$

代入 $x = T_a/p_a$ 并求和，记 $M_p = bp + \eta T$：

$$J_{1,\eta}(p;T) = \frac{\eta\,\mathrm{KL}(T\|p) - \mathrm{KL}(M_p\|p)}{\eta b} \tag{B.32}$$

$$= \frac{b\,\mathrm{KL}(p\|M_p) + \eta\,\mathrm{KL}(T\|M_p)}{\eta b} = \frac{\mathrm{JS}_\eta(p,T)}{\eta(1-\eta)}. \tag{B.33}$$

第二个等号由 $M_p = bp + \eta T$ 展开对数得到。一般 κ 的曲率满足

$$\frac{1}{\omega''_{\kappa,\eta}(x)} = (1-\eta)x^{2-\kappa} + \eta x^2 = \frac{1-\eta}{g''_\kappa(x)} + \frac{\eta}{g''_0(x)}. \tag{B.34}$$

因此这里插值的是生成函数曲率的倒数，通常不是两个散度的线性组合。各生成函数均有 $\omega''(1) = 1$，故不同 η 的目标也不能一般通过整体缩放互相替代。

B.6 统一有界性与教师中心

定理 B.4 (教师目标的锐统一上界)

设 $0<\kappa\le 1, 0<\eta<1$，$c=-\log(1-\eta)/(\kappa\eta)$、$d_\infty=\int_1^\infty A(u)u^{-2}\,du$。则 $0<d_\infty\le 1/\eta$，并且对所有正分布 p,T，$0\le J(p;T)\le c+d_\infty$。在至少二动作的分布类上，该上界是锐上确界。

证明 当 $\kappa>0,\eta<1$，令 $c=-\log(1-\eta)/(\kappa\eta)$。由 $A(x)\to -c$ 当 $x\downarrow 0$，可得

$$\lim_{x\downarrow 0}\omega(x)=c,\qquad \lim_{x\to\infty}\omega(x)/x=d_\infty. \tag{B.35}$$

第一式把积分拆为 $[x,b]$ 与 $[b,1]$：选小 b 使 $|A(u)+c|\le\epsilon$，前段误差不超过 $\epsilon x(1/x-1/b)$，后段乘 x 趋零。凸函数导数不超过无穷远渐近斜率，所以 $\omega(x)\le c+d_\infty x$。于是

$$0\le J(p;T)\le c+d_\infty. \tag{B.36}$$

取 $p=(\epsilon,1-\epsilon)$、$T=(1-\epsilon,\epsilon)$，两坐标分别趋于 d_∞, c，证明这是锐上确界。

命题 B.8 (教师中心与教师目标的比较)

设 $\kappa\in[0,1], 0<\eta<1$，$\phi(x)=x-1-A_{\kappa,\eta}(x)$。则 $K_T(q,T)=D_\phi(T\|q)$，且

$$(1-\kappa)J(q;T)\le K_T(q,T)\le J(q;T). \tag{B.37}$$

作为候选分布的函数，中心的坐标梯度为 $-A(x_a)+x_a^\kappa/(1-\eta+\eta x_a^\kappa)-1$，其中 $x_a=T_a/p_a$；它一般不同于 ∇J。

证明 教师中心有生成函数 $\phi(x)=x-1-A(x)$，因为 $\mathbb{E}_q(T/q-1)=0$：

$$K_T=D_\phi(T\|q). \tag{B.38}$$

计算得

$$\frac{\phi''(x)}{\omega''(x)}=1-\frac{\kappa(1-\eta)}{1-\eta+\eta x^\kappa}\in[1-\kappa,1]. \tag{B.39}$$

两生成函数在一处的值和一阶导数均为零。对二阶导数差积分两次，可知 $\phi-(1-\kappa)\omega$ 与 $\omega-\phi$ 均非负。因此

$$(1-\kappa)J(q;T)\le K_T\le J(q;T). \tag{B.40}$$

中心作为当前分布函数时，梯度为

$$\partial_{p_a}K_T(p,T)=-A(x_a)+\frac{x_a^\kappa}{1-\eta+\eta x_a^\kappa}-1. \tag{B.41}$$

额外项一般随动作变化，所以中心不是教师目标 J 的替代梯度。

B.7 固定幂散度的镜像步与小步流

命题 B.9 (固定幂散度的镜像步与自然梯度流)

固定正教师，$0<\kappa\le 1$。对固定 $D_\kappa(T\|p)$ 做熵镜像下降得到 $\widetilde{m}_a\propto q_a\exp\{\tau[(T_a/q_a)^\kappa-1]/\kappa\}$。幂均值目标在小步极限的速度为

$$v_{\kappa,a}=\frac{q_a}{\kappa}[(T_a/q_a)^\kappa-\mathbb{E}_q(T/q)^\kappa], \tag{B.42}$$

它是 Fisher 度量下的负自然梯度，且沿 $\dot q=v_\kappa$ 有 $\frac{d}{dt}D_\kappa(T\|q)=-\mathrm{Var}_q[(T/q)^\kappa]/\kappa^2$。几何端点取连续极限。

证明 若直接固定目标 $D_\kappa(T\|p)$，可取概率梯度代表 $(1-(T/p)^\kappa)/\kappa$。其步长 τ 的熵镜像解是

$$\widetilde{m}_a\propto q_a\exp\left[\frac{\tau}{\kappa}\left((T_a/q_a)^\kappa-1\right)\right]. \tag{B.43}$$

它与幂均值目标仅一阶一致。对后者展开 $h_a = q_a[1 + \eta(\rho_a^\kappa - 1)/\kappa + O(\eta^2)]$，除以其总和得到式 (5.2)。在 Fisher 内积 $\langle v, w\rangle_q = \sum_a v_a w_a / q_a$ 下，任意切向量 w 满足

$$\langle v_\kappa, w\rangle_q = -\sum_a w_a \, \partial_{q_a} D_\kappa(T\|q), \tag{B.44}$$

因为 $\sum_a w_a = 0$ 消去常数。连续流 $\dot q = v_\kappa$ 因而有

$$\frac{d}{dt} D_\kappa(T\|q) = -\|v_\kappa\|_q^2 = -\frac{\mathrm{Var}_q(\rho^\kappa)}{\kappa^2}. \tag{B.45}$$

这些展开固定正分布，余项不对任意极端密度比统一。

附录 C 内层投影与优化几何

C.1 统一坐标中的四种目标

命题 C.1 (四种内层损失的统一分解)

固定 $m \propto qe^f$，令 $e = C_q \log(p/m)$、$\Lambda = \log \mathbb{E}_m e^e$、$\Delta = \mathrm{KL}(q\|m)$。四种总体损失满足

$$L_{\mathrm{Part}} = \tfrac{1}{2}\mathbb{E}_q e^2 + \tfrac{1}{2}\Lambda^2, \qquad \eta L_{\mathrm{BPO}} = \tfrac{1}{2}\mathbb{E}_q e^2, \tag{C.1}$$

$$L_{\mathrm{Mean}} = \tfrac{1}{2}\mathbb{E}_q e^2 + \tfrac{1}{2}(\Lambda+\Delta)^2, \qquad L_{\mathrm{MDPO}} = \eta^{-1}[\mathrm{KL}(p\|m) - \log Z]. \tag{C.2}$$

因而 $L_{\mathrm{Part}} - \eta L_{\mathrm{BPO}} = (\Delta - K_S)^2/2$，$L_{\mathrm{Mean}} - \eta L_{\mathrm{BPO}} = K_S^2/2$。

证明 固定 q, m, f，其中 $m \propto qe^f$。令 $G = C_q f$、$\Delta = \log Z - \mathbb{E}_q f = \mathrm{KL}(q\|m)$，采用附录 A 的 $e = C_q \log(p/m)$ 与 $\Lambda(e) = \log \mathbb{E}_m e^e$。则

$$U = G - \Delta + e - \Lambda(e), \qquad K_S = \Delta + \Lambda(e). \tag{C.3}$$

代入四种损失：

$$R_P = e - \Lambda, \qquad R_B = e, \qquad R_M = e - \Lambda - \Delta, \tag{C.4}$$

$$L_{\mathrm{Part}} = \tfrac{1}{2}\mathbb{E}_q e^2 + \tfrac{1}{2}\Lambda^2, \tag{C.5}$$

$$\eta L_{\mathrm{BPO}} = \tfrac{1}{2}\mathbb{E}_q e^2, \tag{C.6}$$

$$L_{\mathrm{Mean}} = \tfrac{1}{2}\mathbb{E}_q e^2 + \tfrac{1}{2}(\Lambda+\Delta)^2, \tag{C.7}$$

$$L_{\mathrm{MDPO}} = \eta^{-1}\,\mathrm{KL}(p(e)\|m) - \eta^{-1}\log Z. \tag{C.8}$$

三个平方分解使用 $\mathbb{E}_q e = 0$，没有忽略任何均值项。它们也给出

$$L_{\mathrm{Part}} = \eta L_{\mathrm{BPO}} + \tfrac{1}{2}(\Delta - K_S)^2, \quad L_{\mathrm{Mean}} = \eta L_{\mathrm{BPO}} + \tfrac{1}{2}K_S^2. \tag{C.9}$$

求导后，额外项分别为 $(K_S - \Delta)\nabla K_S$ 与 $K_S \nabla K_S$。在锚点 $K_S = 0$ 且 $\nabla K_S = 0$，这些差异暂时消失。

C.2 Mean 的完整约束解

引理 C.1 (Mean 的归一化 KKT 候选)

设 $q > 0$、$\mathbb{E}_q G = 0$。Mean 的约束为 $\mathbb{E}_q e^U = 1$。若归一化乘子 $\lambda \geq 0$，其 KKT 方程唯一确定各坐标

$$U_a - G_a + \lambda e^{U_a} = 0, \qquad U_a = G_a - W_0(\lambda e^{G_a}). \tag{C.10}$$

证明 Mean 优化 $\frac{1}{2}\mathbb{E}_q(U-G)^2$，约束为 $\mathbb{E}_q e^U = 1$。取拉格朗日函数

$$\mathscr{L}(U, \lambda) = \tfrac{1}{2}\mathbb{E}_q(U-G)^2 + \lambda(\mathbb{E}_q e^U - 1). \tag{C.11}$$

逐坐标一阶条件给出 $U_a - G_a + \lambda e^{U_a} = 0$。当 $\lambda \geq 0$ 时，解为

$$U_a = G_a - W_0(\lambda e^{G_a}), \tag{C.12}$$

其中 $W_0(x)e^{W_0(x)} = x$，取非负实主支。

定理 C.1 (Mean 全局解存在且唯一)

函数

$$\Psi(\lambda) = \sum_a q_a \exp[G_a - W_0(\lambda e^{G_a})] \tag{C.13}$$

在 $\lambda \geq 0$ 连续、严格递减，$\Psi(0) = \mathbb{E}_q e^G \geq 1$ 且 $\Psi(\lambda) \to 0$。故存在唯一 $\lambda \geq 0$ 使 $\Psi(\lambda) = 1$；由式 (C.12) 构造的分布是唯一全局最优解 p^{M}。此外

$$\lambda = \mathrm{KL}(q \| p^{\mathrm{M}}). \tag{C.14}$$

证明 W_0 在非负轴连续严格递增，所以每个求和项严格递减。Jensen 给出起点界，有限项分别趋零给出无穷远极限。若 G 非恒定，Jensen 严格，故根 $\lambda > 0$；若 $G = 0$，根为零。

固定这个乘子，$\nabla_U^2 \mathscr{L} = \mathrm{diag}[q_a(1 + \lambda e^{U_a})] \succ 0$，所以构造点唯一最小化整个欧氏空间上的 $\mathscr{L}$。在所有可行 U 上，乘子项为零；构造点又可行，所以它唯一最小化原目标。这一论证不需要指数等式约束集合凸。对 KKT 取 q 均值，$\mathbb{E}_q G = 0$、$\mathbb{E}_q e^U = 1$ 给出 $\mathbb{E}_q U + \lambda = 0$，即所述 KL 恒等式。

命题 C.2 (Mean 的混合正则变分解释)

固定由 Mean 全局解确定的 $\lambda = \mathrm{KL}(q \| p^{\mathrm{M}})$。同一 p^{M} 唯一最大化

$$\mathbb{E}_p f - \mathrm{KL}(p \| q) - \frac{\lambda}{2} \chi^2(p \| q). \tag{C.15}$$

该命题断言最优分布相同，不断言两损失的梯度处处相同。

证明 这个最优分布还唯一最大化

$$\mathbb{E}_p f - \mathrm{KL}(p \| q) - \frac{\lambda}{2} \chi^2(p \| q). \tag{C.16}$$

证明是其概率梯度为 $f - U - 1 - \lambda(p/q - 1)$，在 Mean 解处由 KKT 化为动作无关常数；Hessian 为 $-\mathrm{diag}(1/p + \lambda/q) \prec 0$。这里 λ 由 Mean 解决定，并非预先独立选择的正则系数。

命题 C.3 (Mean 超额损失的精确分解)

设 p^{M} 是精确 Mean 解，λ 是其归一化乘子。对任意正分布 p，

$$L_{\mathrm{Mean}}(p) - L_{\mathrm{Mean}}(p^{\mathrm{M}}) = \tfrac{1}{2} \mathbb{E}_q \log^2(p/p^{\mathrm{M}}) + \lambda \, \mathrm{KL}(p^{\mathrm{M}} \| p). \tag{C.17}$$

证明 对任意正分布 p，还有精确超额损失分解

$$L_{\mathrm{Mean}}(p) - L_{\mathrm{Mean}}(p^{\mathrm{M}}) = \tfrac{1}{2} \mathbb{E}_q \log^2(p/p^{\mathrm{M}}) + \lambda \, \mathrm{KL}(p^{\mathrm{M}} \| p). \tag{C.18}$$

令 $v = U - U^\star$，平方展开的交叉项为 $\mathbb{E}_q v(U^\star - G)$。KKT 将它变成 $-\lambda \mathbb{E}_{p^{\mathrm{M}}} v = \lambda \, \mathrm{KL}(p^{\mathrm{M}} \| p)$，即得结论。

C.3 精确曲率与唯一驻点

命题 C.4 (平方回归曲率及锚点差异)

固定 q, m, f，以独立 logits 表示当前 p，$Q_p = \mathrm{diag}(p) - pp^\top$。Part 或 Mean 的残差记为 R，则

$$\nabla_z^2 \tfrac{1}{2} \mathbb{E}_q R^2 = \mathbb{E}_q[(\mathbf{e}_a - p)(\mathbf{e}_a - p)^\top] - (\mathbb{E}_q R) Q_p. \tag{C.19}$$

在 $p = q$ 处，Mean、Part、BPO 的 Hessian 分别为 $Q_q, (1 - \Delta) Q_q, Q_q/\eta$，其中 $\Delta = \mathrm{KL}(q \| m)$。

证明 以独立 logits z 表示 p，令 $Q_p = \mathrm{diag}(p) - pp^\top$，以 $\mathbf{e}_a$ 表示第 a 个坐标基向量，与中心化误差 e 区分。于是

$$\nabla_z \log p_a = \mathbf{e}_a - p, \qquad \nabla_z^2 \log p_a = -Q_p. \tag{C.20}$$

对 Part 或 Mean 的残差 R，

$$\nabla_z \tfrac{1}{2} \mathbb{E}_q R^2 = q \odot R - (\mathbb{E}_q R) p, \qquad \nabla_z^2 \tfrac{1}{2} \mathbb{E}_q R^2 = \mathbb{E}_q[(\mathbf{e}_a - p)(\mathbf{e}_a - p)^\top] - (\mathbb{E}_q R) Q_p. \tag{C.21}$$

在锚点，Mean 残差均值为零、Part 为 Δ，故

$$\nabla_z^2 L_{\mathrm{Mean}}|_q = Q_q, \quad \nabla_z^2 L_{\mathrm{Part}}|_q = (1 - \Delta) Q_q, \quad \nabla_z^2 L_{\mathrm{BPO}} = Q_q/\eta. \tag{C.22}$$

例如 $q=(1/2,1/2)$、$f=(2,-2)$，则 $\Delta=\log\cosh 2>1$，Part 在全部非常数方向有负曲率。

定理 C.2 (Part 的唯一内部驻点)

若 $q,m>0$，则 Part 在独立有限 logits 参数化中的唯一概率内部驻点是 $p=m$。该结论允许 Part 在其他位置具有负曲率。

证明 Part 仍只有一个有限内部驻点。记 $R=\log(p/m)$、$c=\mathbb{E}_q R$，驻点条件为 $q_a R_a=cp_a$。若 $c>0$，每个 $R_a>0$，于是每个 $p_a>m_a$，与归一化矛盾；若 $c<0$，同理每个 $p_a<m_a$ 也矛盾。故 $c=0$，正 q 强制 $R=0$。内部驻点唯一不等于任意优化器全局收敛。

命题 C.5 (MDPO 的精确方向 Hessian)

固定正目标 m，沿任意 logit 方向 v，令 $p_t\propto pe^{tv}$、$h=\log(p/m)$。则

$$\frac{d^2}{dt^2}\,\mathrm{KL}(p_t\|m)\big|_0=\mathrm{Var}_p\, v+\mathrm{Cov}_p\big(h,(v-\mathbb{E}_p v)^2\big)\,. \tag{C.23}$$

MDPO 损失的对应导数为右侧除以 η；在 $p=m$ 时协方差项为零。

证明 MDPO 的完整二阶方向导数也可以写出，无需以未定义的残差项代替。固定 logit 方向 v，沿 $p_t\propto pe^{tv}$，令 $h=\log(p/m)$、$\bar v=\mathbb{E}_p v$。指数倾斜的微分恒等式为 $\frac{d}{dt}\mathbb{E}_{p_t}u=\mathrm{Cov}_{p_t}(u,v)$，若 u 依赖 t 再加 $\mathbb{E}_{p_t}\dot u$。因此

$$\frac{d}{dt}\,\mathrm{KL}(p_t\|m)\big|_0=\mathrm{Cov}_p(h,v), \tag{C.24}$$

$$\frac{d^2}{dt^2}\,\mathrm{KL}(p_t\|m)\big|_0=\mathrm{Var}_p(v)+\mathrm{Cov}_p\big(h,(v-\bar v)^2\big). \tag{C.25}$$

第二式中 $\dot h=v-\bar v$ 产生方差项；对协方差中的分布求导产生中心三阶混合矩。MDPO 的 Hessian 再除以 η。当 $p=m$ 时第二项为零；一般位置不能删除它。

推论 C.1 (中心化坐标中的回归曲率)

设 $e=C_q\log(p/m)$、$\Lambda=\log\mathbb{E}_m e^e$，对 $\mathbb{E}_q v=0$ 的方向有

$$\nabla^2 L_{\mathrm{Part}}[v,v]=\mathbb{E}_q v^2+\Lambda\,\mathrm{Var}_p\, v+(\mathbb{E}_p v)^2, \tag{C.26}$$

$$\nabla^2 L_{\mathrm{Mean}}[v,v]=\mathbb{E}_q v^2+(\Lambda+\Delta)\,\mathrm{Var}_p\, v+(\mathbb{E}_p v)^2. \tag{C.27}$$

证明 在 $\mathbb{E}_q e=0$ 的坐标中，对 $\mathbb{E}_q v=0$ 的方向，

$$\nabla^2 L_{\mathrm{Part}}[v,v]=\mathbb{E}_q v^2+\Lambda\,\mathrm{Var}_p\, v+(\mathbb{E}_p v)^2, \tag{C.28}$$

$$\nabla^2 L_{\mathrm{Mean}}[v,v]=\mathbb{E}_q v^2+(\Lambda+\Delta)\,\mathrm{Var}_p\, v+(\mathbb{E}_p v)^2. \tag{C.29}$$

这是对 $\Lambda'=\mathbb{E}_p v$、$\Lambda''=\mathrm{Var}_p\, v$ 使用乘积法则的结果。

C.4 受限表示改变投影

命题 C.6 (受限表示下 Part 与 BPO 可分离)

存在完整正支持的三动作锚点、目标及一维共享 logit 学生族，使 BPO 的唯一最优点不是 Part 的驻点。

证明 取 $q=(1/3,1/3,1/3)$、$m=(0.1,0.7,0.2)$、$\eta=1$，学生族为 $p(z)=\mathrm{softmax}(z,0,0)$。令 $a=\log 0.1, b=\log 0.7, c=\log 0.2$。BPO 为 $\frac{1}{2}\mathrm{Var}_q(z-a,-b,-c)$，导数为 $\frac{2}{9}[z-a+(b+c)/2]$，故最优 $z_B=a-(b+c)/2$。

令 $u(z)=\mathbb{E}_q\log[p(z)/m]=z/3-\log(e^z+2)-(a+b+c)/3$，则 $L_{\mathrm{Part}}=L_{\mathrm{BPO}}+u^2/2$，所以

$$L'_{\mathrm{Part}}(z_B)=u(z_B)[1/3-p_1(z_B)]\simeq 0.03543884\neq 0. \tag{C.30}$$

两个目标在同一受限学生族中具有不同最优点。

命题 C.7 (跨前缀共享参数下 MDPO 与 BPO 可分离)

存在两个等权前缀及一个共享相对 logit 参数，使 BPO 的最优参数不满足 MDPO 的驻点方程。

证明 BPO 与 MDPO 也可分离。取两个等权前缀，锚点第一动作概率分别为 $0.8, 0.2$，共享相对 logit 位移 θ；目标相对位移取 $g_1 = 1, g_2 = 3$。BPO 的权重均为 0.16，故 $\theta_B = 2$。MDPO 的驻点方程为

$$\sum_{i=1}^{2} p_{\theta,i}(1 - p_{\theta,i})(\theta - g_i) = 0. \tag{C.31}$$

在 $\theta = 2$，第一项权重约为 0.0316，第二项约为 0.2278，和非零。该方程是必要驻点条件，不把任意根直接称为唯一全局解。

C.5 自由 logits 的收敛与理想路径

定理 C.3 (BPO 二次结构与梯度下降的稳定区间)

固定 $q, m > 0$，独立 logits 中

$$L_{\mathrm{BPO}} = \frac{(z - \log m)^\top Q_q (z - \log m)}{2\eta}, \quad \nabla_z L_{\mathrm{BPO}} = \eta^{-1} Q_q (z - \log m). \tag{C.32}$$

在 $\mathbf{1}^\perp$ 上，$q_{\min} I \preceq Q_q \preceq I/2$。常步长梯度下降对所有有限初值收敛，当且仅当 $0 < \alpha_{\mathrm{opt}} < 2\eta/\lambda_{\max}(Q_q)$。

证明 令 $h = z - \log m$。中心化消去 softmax 配分函数，得到

$$L_{\mathrm{BPO}} = \frac{h^\top Q_q h}{2\eta}, \quad \nabla_z L_{\mathrm{BPO}} = \frac{Q_q h}{\eta}. \tag{C.33}$$

Q_q 的零空间为常数方向。在欧氏子空间 $\mathbf{1}^\perp$ 上，

$$q_{\min}\|v\|^2 \le v^\top Q_q v \le \tfrac{1}{2}\|v\|^2. \tag{C.34}$$

下界由 $\mathrm{Var}_q\, v = \min_c \sum_a q_a (v_a - c)^2 \ge q_{\min} \min_c \sum_a (v_a - c)^2$ 得到。上界由方差不超过分量范围平方的 $1/4$，以及 $(v_i - v_j)^2 \le 2\|v\|^2$ 得到。

普通梯度下降的每个非零谱方向乘以 $1 - \alpha_{\mathrm{opt}}\lambda_i/\eta$。对全部初值收敛的充要条件是

$$0 < \alpha_{\mathrm{opt}} < 2\eta/\lambda_{\max}(Q_q). \tag{C.35}$$

其中 $\alpha_{\mathrm{opt}} < 4\eta$ 是统一充分条件。

命题 C.8 (两种 Fisher 预条件步的相同概率轨迹)

完整词表、独立 logits 下，MDPO 使用当前 $Q_p^\dagger$，BPO 使用冻结 $Q_q^\dagger$，均产生 $p^+ \propto p^{1-\gamma} m^\gamma$，其中 $\gamma = \alpha_{\mathrm{opt}}/\eta$。从 $p_0 = q$ 出发，若 $0 < \gamma_j \le 1$，则

$$p_n \propto q e^{\xi_n f}, \quad \xi_n = 1 - \prod_{j<n}(1 - \gamma_j), \quad L_{\mathrm{BPO}}(p_n) = (1 - \xi_n)^2 L_{\mathrm{BPO}}(q). \tag{C.36}$$

证明 MDPO 的 logit 梯度为 $Q_p(z - \log m)/\eta$。正支持下 $Q_p^\dagger Q_p = P_\perp$；BPO 使用 $Q_q^\dagger$ 也得到同一投影。因此两种对应的精确自然梯度步都满足

$$P_\perp h^+ = (1 - \gamma) P_\perp h, \quad p^+ \propto p^{1-\gamma} m^\gamma, \qquad \gamma = \alpha_{\mathrm{opt}}/\eta. \tag{C.37}$$

BPO 的 Fisher 冻结在 q，MDPO 的 Fisher 来自当前 p。从 $p_0 = q$ 出发，若 $0 < \gamma_j \le 1$，

$$p_n \propto q e^{\xi_n f}, \qquad \xi_n = 1 - \prod_{j<n}(1 - \gamma_j), \qquad L_{\mathrm{BPO}}(p_n) = (1 - \xi_n)^2 L_{\mathrm{BPO}}(q). \tag{C.38}$$

定理 C.4 (理想内层路径的教师散度进展)

对所有凸 φ、$\varphi(1)=0$，沿 $p_\xi \propto q e^{\xi f}$、$0 \le \xi \le 1$，$D_\varphi(p_\xi \| T)$ 非增。

♡

证明 令 $r=\log(T/q)$。$f(r)$ 递增且

$$f'(r)=\frac{\eta e^{\kappa r}}{1-\eta+\eta e^{\kappa r}} \le 1 \tag{C.39}$$

(几何端点为 η)。因此 $u_\xi(r)=p_\xi/T=e^{-r+\xi f(r)}/Z_\xi$ 非增。可微凸 φ 的导数递增，故 $\varphi'(u_\xi(r))$ 非增。微分归一化密度：

$$\frac{d}{d\xi}D_\varphi(p_\xi\|T)=\mathrm{Cov}_{p_\xi}(\varphi'(u_\xi),f) \tag{C.40}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{a,b}p_{\xi,a}p_{\xi,b}[\varphi'(u_{\xi,a})-\varphi'(u_{\xi,b})](f_a-f_b)\le 0. \tag{C.41}$$

每个乘积非正。有限正支持使所有 $u_{\xi,a}$ 位于紧正区间；对任意有限凸函数用光滑凸函数一致逼近，取极限保留非增结论。

C.6 共享参数、拟合形状与条件 SGD

命题 C.9 (共享参数的复合 Hessian)

若 z_θ 二次可微，$B_\theta=\partial z/\partial\theta$、$h=z-\log m$，则

$$\nabla_\theta^2 L_{\mathrm{BPO}}=\eta^{-1}\left[B_\theta^\top Q_q B_\theta+\sum_a (Q_q h)_a \nabla_\theta^2 z_a\right]. \tag{C.42}$$

所以固定的 logit Hessian 不保证参数空间目标凸。

♠

证明 链式法则先给 $\nabla_\theta L=B_\theta^\top \nabla_z L$。对第 i,j 个参数再求导，

$$\partial_j\partial_i L=\sum_{a,b}(\partial_i z_a)(\partial_{z_b}\partial_{z_a}L)(\partial_j z_b)+\sum_a(\partial_{z_a}L)\partial_j\partial_i z_a. \tag{C.43}$$

代入 $\nabla_z L=Q_q h/\eta$ 与 $\nabla_z^2 L=Q_q/\eta$，得到

$$\nabla_\theta^2 L_{\mathrm{BPO}}=\eta^{-1}\left[B_\theta^\top Q_q B_\theta+\sum_a (Q_q h)_a \nabla_\theta^2 z_a\right]. \tag{C.44}$$

这里 $B_\theta=\partial z/\partial\theta$，即使冻结 Q_q，两项仍可变化。自由 logit 的凸性不自动传到参数空间。

命题 C.10 (拟合形状与残差二阶矩)

固定目标 m。若从当前 p 采样，$x=m/p$、$a_\beta=\mathbb{E}_p x^\beta$，则 $g_\beta=(a_\beta-x^\beta)\psi/\beta$ 对 $\nabla_\theta D_\beta(m\|p)$ 无偏。若 $0<\beta\le 1/2$ 且 $\|\psi\|\le S$，有 $\mathbb{E}_p\|g_\beta\|^2\le S^2 D_\beta/\beta$。精确 BPO 的锚点采样梯度则满足 $\mathbb{E}_q\|R_B\psi/\eta\|^2\le(2S^2/\eta)L_{\mathrm{BPO}}$。

♠

证明 也可固定目标 $m_{\kappa,\eta}$ 后另选拟合形状 β，优化 $D_\beta(m\|p)$。从当前学生采样，令 $x=m/p$、$a_\beta=\mathbb{E}_p x^\beta$，则

$$g_\beta(a)=\frac{a_\beta-x_a^\beta}{\beta}\psi_a,\qquad \mathbb{E}_p g_\beta=\nabla_\theta D_\beta(m\|p). \tag{C.45}$$

对 $0<\beta\le 1/2$、$\|\psi_a\|\le S$，附录 D 的矩不等式给出 $\mathbb{E}_p\|g_\beta\|^2\le S^2 D_\beta(m\|p)/\beta$。$\beta$ 控制拟合，κ 控制目标，不能混为一个最优形状判断。BPO 本身也满足

$$\mathbb{E}_q\|R_B\psi/\eta\|^2\le(2S^2/\eta)L_{\mathrm{BPO}}. \tag{C.46}$$

定理 C.5 (误差相关噪声下的条件 SGD 收敛)

假设所有更新线段上 L 为 L_{sm} 光滑，满足 $\|\nabla L\|^2 \geq 2\mu(L-L_\star)$，且随机梯度条件无偏、$\mathbb{E}[\|g\|^2 \mid \theta] \leq CL$。若 $0 < \alpha \leq \min\{1/\mu, 2\mu/(L_{\mathrm{sm}}C)\}$，则

$$\mathbb{E}(L_N - L_\star) \leq (1-\mu\alpha)^N (L_0 - L_\star) + \frac{L_{\mathrm{sm}} C \alpha L_\star}{2\mu}[1-(1-\mu\alpha)^N]. \tag{C.47}$$

♡

证明 设 L 在所有更新线段上为 L_{sm} 光滑，满足 PL 条件 $\|\nabla L\|^2 \geq 2\mu(L-L_\star)$，随机梯度条件无偏且 $\mathbb{E}[\|g\|^2 \mid \theta] \leq CL$。对 $0 < \alpha \leq \min\{1/\mu, 2\mu/(L_{\mathrm{sm}}C)\}$，光滑性给出

$$\mathbb{E}[L(\theta - \alpha g) \mid \theta] \leq L - \alpha\|\nabla L\|^2 + \tfrac{1}{2}L_{\mathrm{sm}}\alpha^2 CL \tag{C.48}$$

$$\leq L_\star + (1-\mu\alpha)(L-L_\star) + \tfrac{1}{2}L_{\mathrm{sm}}C\alpha^2 L_\star. \tag{C.49}$$

取全期望并展开几何递推，得到

$$\mathbb{E}(L_N - L_\star) \leq (1-\mu\alpha)^N (L_0 - L_\star) + \frac{L_{\mathrm{sm}} C \alpha L_\star}{2\mu}[1-(1-\mu\alpha)^N]. \tag{C.50}$$

这是明确假设下的 SGD 结论。模型可实现时 $L_\star = 0$，该上界没有固定采样噪声底；数据复用、中心近似或其他优化器需要重新核对假设。

C.7 与条件 OPD 基线的关系

命题 C.11 (几何镜像目标与条件 OPD 的关系)

取 $\kappa = 0$，$f = \eta\log(T/q)$。则

$$L_{\mathrm{MDPO}} = \mathrm{KL}(p\|T) + (\eta^{-1}-1)\,\mathrm{KL}(p\|q). \tag{C.51}$$

因此 $\eta = 1$ 时 MDPO 等于条件 OPD 目标。固定 q, T 并令 $\eta \to \infty$ 时，其极限为冻结信号目标 $-\mathbb{E}_p \log(T/q)$，最优分布支持在最高信号动作上。

♠

证明 对当前学生–教师目标 $\mathrm{KL}(p\|T)$，令 $r^{\mathrm{cur}} = \log(T/p)$。其精确梯度及冻结锚点下的表示为

$$\nabla_\theta \mathrm{KL}(p\|T) = -\mathbb{E}_p[r^{\mathrm{cur}}\psi_p] = -\mathbb{E}_q[(p/q)r^{\mathrm{cur}}\psi_p]. \tag{C.52}$$

这个重要性比只改变当前前缀下的动作积分，不改变前缀访问测度。

几何端点取 $f = \eta\log(T/q)$，MDPO 恒等式为

$$L_{\mathrm{MDPO}} = \mathrm{KL}(p\|T) + (\eta^{-1}-1)\,\mathrm{KL}(p\|q). \tag{C.53}$$

因此 $\eta = 1$ 时 MDPO 的总体目标处处等于条件 OPD。BPO 在该点仍使用 $\mathrm{Var}_q \log(p/T)/2$，Mean 还包含学生中心平方，二者只在特定位置与 OPD 有相同梯度或共同目标分布。

对固定几何 reward $r = \log(T/q)$，令 $\eta \to \infty$ 删除镜像正则，MDPO 目标趋于 $-\mathbb{E}_p r$，其最优分布支持在 r 的最大值集合，通常不等于 T。如果保持当前 OPD 目标，则 reward 必须随学生改为 $r^{\mathrm{cur}} = r - U$。两者只在初始化 $p = q$ 处相同。这里的无穷步长讨论仅适用于几何端点，不将正形状的混合权重扩展到概率区间之外。

C.8 标量步长能改变的部分

命题 C.12 (固定方向的最优步长与下降能力)

设 $E(\theta) = e^\top He/2$、$H \succeq 0$、$E > 0$，方向 d 固定。记 $A = \nabla E^\top d$、$B = d^\top H d$。则 $E(\theta - \alpha d) = E - \alpha A + \alpha^2 B/2$。若 $A, B > 0$，最优步长为 A/B，最大相对下降为 $A^2/(2BE) \leq 1$；若 $A \leq 0$，正步长不能下降。

♠

证明 固定二次超额损失 $E=\frac{1}{2}e^\top He$，沿方向 d 更新时，

$$E(\theta-\alpha d)=E-\alpha A+\tfrac{1}{2}\alpha^2 B,\quad A=\nabla E^\top d,\quad B=d^\top Hd. \tag{C.54}$$

若 $A>0, B>0$，最优步长 $\alpha_*=A/B$，最大相对下降为 $\rho_*=A^2/(2BE)\le 1$。最后一个界来自 H 半内积的 Cauchy–Schwarz。达到 $0<\rho\le\rho_*$ 的较小正根为

$$\alpha_\rho=\frac{2\rho E}{A+\sqrt{A^2-2B\rho E}}. \tag{C.55}$$

若 $A\le 0$，任何正步长都不能降低这个二次目标；标量调度无法修复方向错误。

命题 C.13 (谱耗散与精确线搜索的速率)

对固定正谱二次目标的梯度流，以损失谱分量占比为 w_i，有 $-d\log E/dt=2\mathbb{E}_w\lambda$，其导数为 $-4\operatorname{Var}_w\lambda$。若谱位于 $[l,u]$、$l>0$，精确最速下降线搜索满足 $E_{n+1}\le[(u-l)/(u+l)]^2E_n$。

证明 梯度流的谱表达为 $E(t)=\frac{1}{2}\sum_i\lambda_i e_i(0)^2e^{-2\lambda_i t}$。以各项在总损失中的占比为 w_i，求导得

$$-\frac{d}{dt}\log E=2\mathbb{E}_w\lambda,\qquad \frac{d}{dt}\left[-\frac{d}{dt}\log E\right]=-4\operatorname{Var}_w\lambda\le 0. \tag{C.56}$$

快方向先消失，使相对下降率变慢。精确线搜索在谱区间 $[l,u]$ 的最坏收缩因子仍为 $[(u-l)/(u+l)]^2$：由 $\lambda^2\le(l+u)\lambda-lu$，最小化 $\mathbb{E}_w\lambda^2$ 上界所对应的比例可得 $\rho_*\ge 4lu/(l+u)^2$。

命题 C.14 (固定谱下的 Chebyshev 步序)

对固定二次目标，非零谱位于 $0<l<u$。令 $c=(u+l)/2, d=(u-l)/2$，在 N 步使用 $\alpha_j=[c-d\cos((2j-1)\pi/(2N))]^{-1}$，则

$$E_N\le 4\left(\frac{\sqrt{u/l}-1}{\sqrt{u/l}+1}\right)^{2N}E_0. \tag{C.57}$$

该结论允许中间误差放大，要求谱和线性更新固定。

证明 若固定谱端点已知，Chebyshev 步序 $\alpha_j=[c-d\cos((2j-1)\pi/(2N))]^{-1}$，其中 $c=(u+l)/2, d=(u-l)/2$，产生误差多项式 $T_N((c-\lambda)/d)/T_N(c/d)$，故

$$E_N\le 4\left(\frac{\sqrt{u/l}-1}{\sqrt{u/l}+1}\right)^{2N}E_0. \tag{C.58}$$

该恒等式由两侧多项式具有相同根和零点处归一化得到；$|T_N|\le 1$ 在 $[-1,1]$ 上，再用 $T_N(x)=(v^N+v^{-N})/2$ 得到界。$u=l$ 时单步 $\alpha=1/l$ 即可。这个结论需要固定线性几何，且允许中间误差放大。

命题 C.15 (Adam 的常数损失缩放)

在相同原始梯度历史、零初始矩状态下，将全部历史梯度乘以常数 $s>0$，使 Adam 一阶矩乘以 s、二阶矩乘以 s^2。带偏差修正的方向满足

$$\frac{\widehat{m}'}{\sqrt{\widehat{v}'}+\epsilon}=\frac{\widehat{m}}{\sqrt{\widehat{v}}+\epsilon/s}. \tag{C.59}$$

因此常数 loss 缩放通常不同于将学习率乘以 s；时变缩放还会改变矩历史。

证明 记原始梯度历史为 g_t，矩初值为零。缩放后的递推为

$$m'_t=\beta_1 m'_{t-1}+(1-\beta_1)sg_t, \tag{C.60}$$

$$v'_t=\beta_2 v'_{t-1}+(1-\beta_2)s^2g_t^2. \tag{C.61}$$

从零初值归纳得到 $m'_t=sm_t$、$v'_t=s^2v_t$。偏差修正分母只依赖时间与 β_1,β_2，故 $\widehat{m}'_t=s\widehat{m}_t$、$\widehat{v}'_t=s^2\widehat{v}_t$。对更新方向的分子分母同除以正数 s，得到命题中的等式。若 s_t 随时间改变，两个矩分别包含历史 s_j 和 s_j^2 的加权和，不能提出同一个常数。

沿固定优化器方向作三点测量可由 $Q(0), Q(h), Q(2h)$ 恢复二次式的 A, B，但非线性网络中必须用实际目标值验收；一次试探不能重复更新优化器矩状态。

C.9 小步一致性与 BPO 的分布度量

命题 C.16 (Mean 与 Gibbs 的二阶目标一致性)

固定 $q > 0$ 和有限原始信号 r，取本文的指数信号 $f = \eta r$，令 $h = C_q r$、$\sigma^2 = \mathbb{E}_q h^2$。当 $\eta \downarrow 0$ 时，Mean 与 Gibbs 的最优 log-ratio 均满足

$$U_a^\star = \eta h_a - \frac{\eta^2 \sigma^2}{2} + O(\eta^3). \tag{C.62}$$

余项对有限词表一致，故 $\mathrm{TV}(p^{\mathrm{M}}, m) = O(\eta^3)$。这是固定原始信号的小步结论，有限 η 下两个目标仍可分离。

证明 Gibbs 解为 $U^{\mathrm{G}} = \eta h - \log \mathbb{E}_q e^{\eta h}$。由 $\mathbb{E}_q h = 0$，配分函数对数为 $\eta^2\sigma^2/2 + O(\eta^3)$。Mean 的 KKT 为 $U = \eta h - \lambda e^U$，归一化为 $\mathbb{E}_q e^U = 1$。归一化方程在 $(\lambda, \eta) = (0, 0)$ 对 λ 的导数为 -1，隐函数定理保证局部光滑根。设

$$U = \eta u_1 + \eta^2 u_2 + O(\eta^3), \qquad \lambda = \eta l_1 + \eta^2 l_2 + O(\eta^3). \tag{C.63}$$

一阶 KKT 给 $u_1 = h - l_1$，一阶归一化给 $\mathbb{E}_q u_1 = 0$，所以 $l_1 = 0, u_1 = h$。二阶 KKT 给 $u_2 = -l_2$，二阶归一化给 $0 = \mathbb{E}_q(u_2 + u_1^2/2)$，所以 $l_2 = \sigma^2/2$。两解的 U 之差为 $O(\eta^3)$；指数映射在该有限邻域导数有界，乘以 q 后求和即得 TV 阶数。

命题 C.17 (BPO 的第三分布依赖与局部度量)

固定 $\eta > 0$，BPO 一般不能写成仅依赖 (p, m) 的固定生成函数散度 $D_g(p\|m)$。对 $p = m + v$、$\sum_a v_a = 0$，其局部展开为

$$L_{\mathrm{BPO}}(m + v; m, q) = \frac{1}{2\eta}\left[\sum_a q_a \frac{v_a^2}{m_a^2} - \left(\sum_a q_a \frac{v_a}{m_a}\right)^2\right] + O\left(\max_a |v_a/m_a|^3\right). \tag{C.64}$$

只有在 $q = m$ 等特殊条件下，这个二次项恢复目标点上的 Fisher 度量。

证明 二动作下令 $\ell_a = \log(p_a/m_a)$，则 $L_{\mathrm{BPO}} = q_1(1 - q_1)(\ell_1 - \ell_2)^2/(2\eta)$。固定 p, m 且 $\ell_1 \neq \ell_2$，改变 q_1 会改变损失，而固定 $D_g(p\|m)$ 不会改变，故不能一般表示。局部展开对 $\log(1 + v_a/m_a)$ 使用 Taylor 公式，方差的二次首项为 $\mathrm{Var}_q(v/m)$。若 $q = m$，其均值为 $\sum_a v_a = 0$，二次项成为 $\sum_a v_a^2/m_a$。

C.10 对角预条件与成对随机梯度

命题 C.18 (对角预条件恢复同一概率更新)

完整词表的独立 logits 中，令 $D_q = \mathrm{diag}(q)$、$h = z - \log m$。更新

$$z^+ = z - \gamma\eta D_q^{-1} \nabla_z L_{\mathrm{BPO}} \tag{C.65}$$

产生 $p^+ \propto p^{1-\gamma} m^\gamma$。因此它与使用 $Q_q^\dagger$ 的锚点 Fisher 步具有相同概率轨迹，但两个矩阵并不相等。

证明 因为 $Q_q h = q \odot C_q h$，有 $\eta D_q^{-1} \nabla L = C_q h = h - (q^\top h)\mathbf{1}$。所以 $z^+ = (1 - \gamma)z + \gamma \log m + \gamma(q^\top h)\mathbf{1}$。softmax 消去最后的公共常数，得到所述分布。$Q_q^\dagger Q_q h = P_\perp h$ 与 $C_q h$ 也只差常数，故概率更新相同。这个论证不把 q 中心化子空间当作欧氏正交子空间。

定理 C.6 (成对 BPO 的精确矩与自由 logits 收敛)

固定 $q, m > 0$，每步独立重采样 $a, b \sim q$。令 $R = C_q \log(p/m)$，采用

$$\widehat{g} = \frac{(R_a - R_b)(\mathbf{e}_a - \mathbf{e}_b)}{2\eta}. \tag{C.66}$$

则 $\mathbb{E}\widehat{g} = \nabla_z L_{\mathrm{BPO}}$，并且

$$\mathbb{E}\|\widehat{g}\|^2 = \frac{2}{\eta} L_{\mathrm{BPO}}. \tag{C.67}$$

若 SGD 的固定参数步长满足 $0 < \alpha_{\mathrm{opt}} \le \eta q_{\min}$，则

$$\mathbb{E}L_{\mathrm{BPO}}(z_N) \le \left(1 - \frac{\alpha_{\mathrm{opt}} q_{\min}}{\eta}\right)^N L_{\mathrm{BPO}}(z_0). \tag{C.68}$$

该结论要求每步条件独立抽样，不适用于任意固定动作池复用。

证明 无偏性由成对梯度恒等式给出。由于 $\|\mathbf{e}_a - \mathbf{e}_b\|^2 = 2\mathbf{1}_{a \ne b}$，而 $a = b$ 时 residual 差为零，

$$\mathbb{E}\|\widehat{g}\|^2 = \frac{\mathbb{E}(R_a - R_b)^2}{2\eta^2} = \frac{\mathbb{E}_q R^2}{\eta^2} = \frac{2L}{\eta}. \tag{C.69}$$

真实梯度为 $q \odot R/\eta$，故 $\|\nabla L\|^2 \ge 2q_{\min} L/\eta$。使用足够的光滑常数 $1/\eta$，有

$$\mathbb{E}[L(z - \alpha\widehat{g}) \mid z] \le L - \alpha\|\nabla L\|^2 + \frac{\alpha^2}{2\eta}\mathbb{E}\|\widehat{g}\|^2 \le [1 - 2\alpha q_{\min}/\eta + \alpha^2/\eta^2]L. \tag{C.70}$$

由 $\alpha \le \eta q_{\min}$，最后系数不超过 $1 - \alpha q_{\min}/\eta$。逐步取条件期望并递推得到结论。本文损失含 $1/\eta$，所以矩与步长常数均保留这个尺度。

C.11 到目标教师与原教师的两种进展

定理 C.7 (任意冻结目标的全凸散度拟合进展)

固定正 q, m，令 $p_\xi \propto q^{1-\xi} m^\xi$、$0 \le \xi \le 1$。对任何凸生成函数 φ、$\varphi(1) = 0$，$D_\varphi(p_\xi \| m)$ 随 ξ 非增。无需假设 m 来自幂均值族。

证明 令 $r = \log(m/q)$，则 $p_\xi/m = e^{-(1-\xi)r}/Z_\xi$。对可微凸函数，归一化密度求导给

$$\frac{d}{d\xi} D_\varphi(p_\xi \| m) = \mathrm{Cov}_{p_\xi}(\varphi'(p_\xi/m), r). \tag{C.71}$$

对 $\xi < 1$，p_ξ/m 随 r 非增，φ' 非减，故协方差由成对差乘积表示为非正。一般凸函数在有限正区间上用光滑凸函数一致逼近，结论保留。非严格凸函数可含线性段，因此一般只断言非增。

推论 C.2 (一般单调信号的教师散度进展)

设 $S(1) = 0, S' > 0$ 且 $L_S = \sup_{x>0} xS'(x) < \infty$。若 $0 < \tau \le 1/L_S$，则沿 $p_\xi \propto q \exp[\xi\tau S(T/q)]$、$0 \le \xi \le 1$，任意凸生成散度 $D_\varphi(p_\xi \| T)$ 非增。

证明 令 $r = \log(T/q)$、$b(r) = \tau S(e^r)$，有 $0 < b'(r) = \tau e^r S'(e^r) \le 1$。因此 $p_\xi/T \propto e^{-r+\xi b(r)}$ 随 r 非增，$b(r)$ 递增。与上一证明相同的求导给 $\mathrm{Cov}_{p_\xi}(\varphi'(p_\xi/T), b) \le 0$。这个条件同时连接附录 B 中的相对光滑步长和其他教师散度的进展。

C.12 固定动作池的经验目标与更新

命题 C.19 (精确中心也不消除经验梯度差)

固定样本 (s_i, a_i)，每个前缀的总体 BPO residual 均满足 $\mathbb{E}_{q_s} R_s = 0$。令 $\widehat{L} = M^{-1}\sum_i R_i^2/(2\eta)$、$\widehat{g} = M^{-1}\sum_i R_i\psi_i/\eta$、$\bar{\psi}_s = \mathbb{E}_{q_s}\psi$，则

$$\nabla\widehat{L} - \widehat{g} = -\frac{1}{\eta M}\sum_i R_i\bar{\psi}_{s_i}. \tag{C.72}$$

MDPO 的原始重要性加权损失反传与删除常数 score 项后的 PG 估计之差为

$$\frac{1}{\eta M}\sum_i \frac{p_i}{q_i}\psi_i. \tag{C.73}$$

两差在固定参数的正确动作期望下为零，在给定有限样本上不必为零。

证明 BPO 的 $\nabla R_i = \psi_i - \bar{\psi}_{s_i}$，平方求导并取样本平均即得第一式。MDPO 单样本原始被积项为 $e^{U_i}(U_i - f_i)/\eta$。对权重与 U_i 同时求导，得到 $e^{U_i}(U_i - f_i + 1)\psi_i/\eta$，与 PG 形式相减即得第二式。总体抵消分别使用 $\mathbb{E}_q R = 0$ 和 $\mathbb{E}_q[(p/q)\psi] = \mathbb{E}_p\psi = 0$；经验均值没有这些恒等约束。

C.13 冻结信号下大步长的两种极限

命题 C.20 (固定候选梯度极限与充分拟合极限)

固定 $q, T > 0$ 且 $q \neq T$，取几何信号 $f = \eta r$、$r = \log(T/q)$。在固定当前学生 $p > 0$ 下，

$$-\nabla L_{\mathrm{BPO}} \longrightarrow \mathbb{E}_q[(C_q r)\psi_p], \qquad -\eta^{-1}\nabla L_{\mathrm{Mean}} \longrightarrow \mathbb{E}_q[(C_q r)\psi_p]. \tag{C.74}$$

若先对每个有限 η 充分拟合 BPO，再令 $\eta \to \infty$，则其最优分布趋于 q 在 $\arg\max r$ 上的归一化限制；Mean 则趋于 $q_a[C_q r_a]_+/\mathbb{E}_q[C_q r]_+$。

证明 BPO 的下降系数为 $C_q r - C_q U/\eta$；固定 p 时 U 有限，第二项消失。Mean 梯度除以 η 后的下降系数为 $C_q r - U/\eta$，得到同一极限。充分拟合的 BPO 解为 $q_a e^{\eta r_a}/Z$；从指数中减去 $\eta \max r$ 后，非最大动作权重趋零，最大动作的相对 q 权重保留。Mean 的结论由其 Lambert-W 大步长定理给出。充分拟合时 U 随 η 变化，故不能用固定 U 的极限替代。

C.14 优化器状态与步长诊断

命题 C.21 (逆向 KL 的 logit 饱和与标量调度边界)

二动作教师 $T = (1/2, 1/2)$、学生 $p = (1-\epsilon, \epsilon)$ 时，逆向 KL 趋于 $\log 2$，其独立 logit 差梯度却为 $\epsilon(1-\epsilon)\log[(1-\epsilon)/\epsilon] \to 0$。另外，对任意更新场 $\widehat{g}(\theta)$ 和处处有限严格正的标量 $s(\theta)$，$s(\theta)\widehat{g}(\theta)$ 与 $\widehat{g}(\theta)$ 的零点集合相同。

证明 将二动作概率代入 KL 并取极限，得到 $\log 2$。softmax 导数为 $p_1(1-p_1)$，乘以概率目标的两坐标梯度之差 $\log(p_1/p_2)$ 即得所列梯度。第二个结论由非零标量乘法可逆立即得到。因此只调正标量步长不能消除有偏更新场的错误驻点；饱和、小曲率、数据误差与数值分辨率需要分别诊断。

命题 C.22 (固定预条件器动量系统的稳定区间)

考虑单个二次模式，曲率 $\lambda > 0$、固定预条件系数 $p_0 > 0$、动量 $\beta \in [0, 1)$，忽略随时间变化的偏差修正，

更新为 $m_{n+1}=\beta m_n+(1-\beta)\lambda e_n$、$e_{n+1}=e_n-\alpha p_0 m_{n+1}$。该线性系统渐近稳定，当且仅当

$$0<\alpha p_0\lambda<\frac{2(1+\beta)}{1-\beta}. \tag{C.75}$$

证明 状态矩阵的行分别为 $(1-\alpha p_0(1-\beta)\lambda,-\alpha p_0\beta)$ 和 $((1-\beta)\lambda,\beta)$。特征多项式为 $u^2-tu+\beta$，其中 $t=1+\beta-\alpha p_0(1-\beta)\lambda$。若根为共轭复数，其模为 $\sqrt{\beta}<1$；若根为实数，结合根之积 $\beta<1$，两根都在 $(-1,1)$ 等价于多项式在 $1,-1$ 处均正。两个条件分别为 $\alpha p_0(1-\beta)\lambda>0$ 和 $2(1+\beta)-\alpha p_0(1-\beta)\lambda>0$。边界具有单位模根，故不渐近稳定。完整 Adam 的预条件器变化时，不能直接套用这个固定状态模型。

命题 C.23 (损失变换与单模式方向步长)

对连续梯度流，若 $\phi'(E)>0$，优化 $\phi(E)$ 与优化 E 有相同的空间轨迹，时间满足 $d\tau/ds=\phi'(E)$。若单模式 $E=\lambda e^2/2$，当前固定方向为 $d=\operatorname{sign}(e)$，则沿方向最优步长为 $|e|$，达到相对下降 $\rho\in(0,1]$ 的较小步长为

$$\alpha_\rho=(1-\sqrt{1-\rho})\sqrt{2E/\lambda}. \tag{C.76}$$

证明 链式法则给 $\dot\theta=-\phi'(E)\nabla E$，正系数只改变流的时间参数。单模式候选误差为 $e-\alpha\operatorname{sign}(e)$，故损失比为 $(1-\alpha/|e|)^2$；解等于 $1-\rho$ 的较小根即得公式。该方向是矩状态已追随当前梯度时的一种理想化；若方向为 $d\approx ce$，最优步长改为约 $1/c$。因此后期学习率增减不能只由当前 loss 决定。

命题 C.24 (三点函数值恢复方向二次式)

固定方向 d，假设 $Q(\alpha)=Q_0-\alpha A+\alpha^2 B/2$。对任意探测尺度 $h>0$，令 $Q_1=Q(h),Q_2=Q(2h)$，则

$$B=\frac{Q_2-2Q_1+Q_0}{h^2},\qquad A=\frac{Q_0-Q_1}{h}+\frac{h}{2}B. \tag{C.77}$$

证明 分别写出 $Q_1-Q_0=-hA+h^2B/2$ 与 $Q_2-Q_0=-2hA+2h^2B$。第二式减去第一式的两倍消去 A，随后代回得到 A。非线性目标只给局部拟合，接受步长仍需检查真实目标值。

一种低成本反馈规则可用上一步的正 log 下降率 $r_n=\log(E_{n-1}/E_n)$ 调整下一步：

$$\alpha_n=\min\{\alpha_{\max},\alpha_{n-1}\operatorname{clip}(r_{\text{target}}/r_n,1/2,5/4)\}. \tag{C.78}$$

该式只在 $0<E_n<E_{n-1}$ 时使用；没有下降时取步长减半。E 应是减去已核验误差底的超额损失。它定义的是反馈启发式，不提供当前方向曲率的上界。三点方案则固定一次更新后的矩状态及方向，比较零步、探测步和拟合步，必要时作有限次回退；每次试探只评估候选参数，不能重复更新 moments。若有解耦权重衰减，固定方向必须包含该项。计算代价按实际前向、反向与候选安装成本分别记录。

附录 D 形状、概率路径与监督矩

D.1 覆盖界与目标半径

定理 D.1 (正形状的覆盖与刷新后信号范围)

固定正分布 q, T，$0 < \kappa \le 1, 0 < \eta < 1$。幂均值的归一化常数和目标满足

$$(1-\eta)^{1/\kappa} + \eta^{1/\kappa} \le Z \le 1, \qquad m_a \ge (1-\eta)^{1/\kappa} q_a + \eta^{1/\kappa} T_a. \tag{D.1}$$

因此 $\mathrm{KL}(q\|m) \le -\log(1-\eta)/\kappa$、$\mathrm{KL}(T\|m) \le -\log\eta/\kappa$。精确刷新 $q^+ = m$ 后，$-c_{\kappa,\eta} \le A(T_a/q_a^+) \le \log(2-\eta)/(\kappa\eta)$。

证明 对 $0 < \kappa \le 1$，幂均值不等式给 $h_a \le (1-\eta)q_a + \eta T_a$，所以 $Z \le 1$。令 $r = 1/\kappa \ge 1$，非负 x, y 满足 $(x+y)^r \ge x^r + y^r$；例如对固定 x，两侧之差对 y 的导数非负，且在 $y = 0$ 为零。因此

$$(1-\eta)^{1/\kappa} + \eta^{1/\kappa} \le Z \le 1, \qquad m_a \ge (1-\eta)^{1/\kappa} q_a + \eta^{1/\kappa} T_a. \tag{D.2}$$

逐坐标取对数并按相应分布平均，得到

$$\mathrm{KL}(q\|m) \le -\kappa^{-1}\log(1-\eta), \quad \mathrm{KL}(T\|m) \le -\kappa^{-1}\log\eta. \tag{D.3}$$

固定教师的精确刷新 $q^+ = m$ 还给后续概率比 $(T_a/q_a^+)^\kappa \le 1/\eta$，所以下一轮

$$-c_{\kappa,\eta} \le A_{\kappa,\eta}(T_a/q_a^+) \le \frac{\log(2-\eta)}{\kappa\eta}. \tag{D.4}$$

这个双侧界依赖精确刷新产生的覆盖；任意初始锚点只有单侧下界。

命题 D.1 (目标到锚点的半径)

固定 q, T, κ。对任意凸 φ、$\varphi(1) = 0$，$D_\varphi(m_{\kappa,\eta}\|q)$ 随 $\eta \in [0,1]$ 非减。若 $q \ne T$ 且 φ 严格凸，内部严格递增。

证明 取 $0 < \eta_1 < \eta_2 < 1$，令 $\rho = T/q$、$u_i = m_{\eta_i}/q$。u_1 随 ρ 递增，而

$$\frac{m_{\eta_2}}{m_{\eta_1}} = \frac{Z_{\eta_1}}{Z_{\eta_2}} \left(\frac{1-\eta_2+\eta_2\rho^\kappa}{1-\eta_1+\eta_1\rho^\kappa}\right)^{1/\kappa} \tag{D.5}$$

也严格递增：括号对 ρ^κ 的导数为 $(\eta_2-\eta_1)/(1-\eta_1+\eta_1\rho^\kappa)^2 > 0$。几何端点的比值为常数乘 $\rho^{\eta_2-\eta_1}$。该比值在 m_{η_1} 下均值一，故存在交点 $\rho_\star$ 使比值等于一。

记 $u_\star = u_1(\rho_\star)$。低于交点时 $u_2 \le u_1 \le u_\star$，高于交点时 $u_2 \ge u_1 \ge u_\star$。取 $b \in \partial\varphi(u_\star)$，则 $\varphi(u) - bu$ 在 $u_\star$ 两侧向外非减，逐点得到 $\varphi(u_2) - bu_2 \ge \varphi(u_1) - bu_1$。按 q 求和，因两组 u 的均值均为一，线性项抵消。严格凸与不同目标保证至少一项严格；端点由连续性得到。

D.2 精确目标同时改善凸生成散度

定理 D.2 (共同交点的散度进展)

对任意凸 φ、$\varphi(1) = 0$，精确幂均值目标满足

$$D_\varphi(m\|T) \le D_\varphi(q\|T). \tag{D.6}$$

证明 写 $s_a = q_a/T_a$、$m_a = T_a G(s_a)/Z$，其中 $G(s) = [(1-\eta)s^\kappa + \eta]^{1/\kappa}$，几何端点为 $G(s) = s^{1-\eta}$。G 递增，$G(s)/s$ 递减，因为

$$\frac{d}{d\log s}\log[G(s)/s] = -\frac{\eta s^{-\kappa}}{1-\eta+\eta s^{-\kappa}} < 0. \tag{D.7}$$

又有 $Z=\sum_a q_a G(s_a)/s_a$，所以存在 $s_\star$ 使 $G(s_\star)/s_\star=Z$。若 $s_a<s_\star$，则 $s_a\le G(s_a)/Z\le s_\star$；若 $s_a>s_\star$，不等号反向排列。取 φ 在 $s_\star$ 的次梯度 b，函数 $\varphi(s)-bs$ 向 $s_\star$ 移动时非增。逐项比较后按 T 求和，归一化消去线性项，得到结论。

命题 D.2 (精确更新的可逆 Markov 表示)

对固定正分布 q,T 和精确幂均值目标 m，存在行随机矩阵 P，满足 $TP=T$、$qP=m$，且关于 T 详细平衡：$T_aP_{ab}=T_bP_{ba}$。

证明 这个更新还可由保持 T 的可逆 Markov 核表示。令 $\delta_a=m_a-q_a$，正质量接收集合为 L，输出集合为 H，总转移量 $D=\sum_L\delta_a$。若 $D=0$ 取恒等核；否则对 $a\in L,b\in H$，定义

$$w_{ab}=w_{ba}=\frac{\delta_a(-\delta_b)}{D(s_b-s_a)},\qquad P_{ab}=w_{ab}/T_a, \tag{D.8}$$

其余非对角项为零，对角项补足行和。由共同交点，$\delta_a/T_a\le s_\star-s_a$、$(-\delta_b)/T_b\le s_b-s_\star$，故 $\sum_b w_{ab}\le T_a$、$\sum_a w_{ab}\le T_b$，核非负。详细平衡 $T_aP_{ab}=T_bP_{ba}$ 保证 $TP=T$；而接收坐标有 $(qP)_a-q_a=\sum_b w_{ab}(s_b-s_a)=\delta_a$，输出坐标同理，故 $qP=m$。这是数学表示，无需实际构造词表平方大小的矩阵。

D.3 教师中心的性质

命题 D.3 (教师中心的锐统一界)

对 $0<\kappa\le 1, 0<\eta<1$，任意正分布满足

$$0\le K_T(q,T)\le c_{\kappa,\eta}=-\frac{\log(1-\eta)}{\kappa\eta}. \tag{D.9}$$

至少二动作时，该上界可由严格正分布逼近。

证明 写 $\rho=T/q$，则 $A(1)=0$、$A'>0$ 且 $A''\le 0$。Jensen 给出 $\mathbb{E}_qA(\rho)\le A(\mathbb{E}_q\rho)=0$；结合 $A\ge -c$，

$$0\le K_T=-\mathbb{E}_qA\le c_{\kappa,\eta}. \tag{D.10}$$

上界为锐上确界：取 $q=(\epsilon,1-\epsilon)$、$T=(1-\epsilon^2,\epsilon^2)$。常见动作的 $-A\to c$，稀有动作的贡献为 $O(\epsilon|\log\epsilon|)\to 0$。

命题 D.4 (中心对两个参数的单调性)

固定 $q,T>0$，教师中心 K_T 随 κ 非增、随 η 非减，参数范围为 $0<\kappa\le 1, 0<\eta<1$。该结论不对监督方差给出同样排序。

证明 固定概率比时，A 随 κ 非减：函数 $L(u)=\log(1-\eta+\eta e^{u\log\rho})$ 凸且 $L(0)=0$，故 $L(u)/u$ 在 $u>0$ 非减。另一方面，令 $y=1+\eta(\rho^\kappa-1)$，有

$$\partial_\eta A=\frac{1-y^{-1}-\log y}{\kappa\eta^2}\le 0. \tag{D.11}$$

不等式来自 $\log y\ge 1-y^{-1}$。因此 K_T 随 κ 非增，随 η 非减。标量方差没有由此得到同一排序。

命题 D.5 (中心的端点与局部尺度)

固定正分布时，$K_T\to(1-\kappa)D_\kappa(T\|q)$ 当 $\eta\downarrow 0$，而 $\eta\uparrow 1$ 时 $K_T\to\mathrm{KL}(q\|T)$。若全部 $\rho=T/q$ 一致趋近一，则

$$K_T=\tfrac{1}{2}[1-\kappa(1-\eta)]\mathbb{E}_q(\rho-1)^2+O(\mathbb{E}_q|\rho-1|^3). \tag{D.12}$$

证明 固定概率比时，$\log[1+\eta(\rho^\kappa-1)]/\eta\to\rho^\kappa-1$。有限求和可逐项取极限，所以

$$\lim_{\eta\downarrow 0}K_T=\frac{1-\mathbb{E}_q\rho^\kappa}{\kappa}=(1-\kappa)D_\kappa(T\|q), \tag{D.13}$$

$$K_T=\frac{1-\kappa(1-\eta)}{2}\mathbb{E}_q(\rho-1)^2+O(\mathbb{E}_q|\rho-1|^3). \tag{D.14}$$

第一式对 $\kappa=1$ 取零。为证明第二式，直接计算

$$A(1)=0,\qquad A'(1)=1,\qquad A''(1)=\kappa(1-\eta)-1=-c_0. \tag{D.15}$$

在一附近 Taylor 展开为 $A(1+\delta)=\delta-c_0\delta^2/2+O(|\delta|^3)$。按 q 取负期望，一次项由 $\mathbb{E}_q(\rho-1)=0$ 消失，得到局部尺度。$\eta\uparrow 1$ 时逐项 $A(\rho)\to\log\rho$，所以 $K_T\to\mathrm{KL}(q\|T)$；统一有界性不延续到该端点。

D.4 固定强度的矩界与小步阈值

命题 D.6 (固定强度的维数无关二阶矩界)

令 $C_\star=\sup_{u>0}\log^2(1+u)/u<\infty$。对 $0<\kappa\le 1, 0<\eta<1$，未缩放信号 $f=\eta A$ 满足

$$\mathbb{E}_q f^2\le[\log^2(1-\eta)+C_\star\eta]/\kappa^2. \tag{D.16}$$

标准化信号 A 的相应上界为右侧除以 η^2。

证明 定义 $C_\star=\sup_{u>0}\log^2(1+u)/u<\infty$。函数在零与无穷远都趋零，故上确界有限。对 $f=\eta A$，在 $\rho<1$ 上 $|f|\le|\log(1-\eta)|/\kappa$；在 $\rho\ge 1$ 上

$$0\le f\le\kappa^{-1}\log(1+\eta\rho^\kappa),\qquad f^2\le C_\star\eta\rho^\kappa/\kappa^2. \tag{D.17}$$

凹性给出 $\mathbb{E}_q\rho^\kappa\le 1$，所以

$$\mathbb{E}_q f^2\le\frac{\log^2(1-\eta)+C_\star\eta}{\kappa^2}. \tag{D.18}$$

标准化监督 A 的界需再除以 η^2。

定理 D.3 (小步矩阈值)

固定 $r\ge 1$、$0<\kappa\le 1$。在所有有限正概率分布上取上确界，有

$$\sup_{q,T}\mathbb{E}_q|A|^r=\Theta_{\kappa,r}(\eta^{\min\{r,1/\kappa\}-r}),\qquad \sup_{q,T}\mathbb{E}_q|C_qA|^r=\Theta_{\kappa,r}(\eta^{\min\{r,1/\kappa\}-r}) \tag{D.19}$$

当 $\eta\downarrow 0$。$\kappa=0$ 对任何正 η 都没有有限统一矩界。

证明 先估计 f。负区域为 $O_{\kappa,r}(\eta^r)$。若 $r\kappa\le 1$，用 $\log(1+x)\le x$ 和 $\mathbb{E}_q\rho^{r\kappa}\le 1$ 得正区域也是 $O(\eta^r)$。若 $r\kappa>1$，令 $s=1/\kappa<r$。函数 $\log^r(1+x)/x^s$ 在零处按 x^{r-s} 趋零，在无穷处也趋零，故有有限上界 $C_{r,s}$。于是

$$\mathbb{E}_q[|f|^r\mathbf{1}_{\rho\ge 1}]\le\kappa^{-r}C_{r,s}\eta^{1/\kappa}\mathbb{E}_q\rho=O(\eta^{1/\kappa}). \tag{D.20}$$

除以 η^r 得未中心化上界。由 $|X-\mathbb{E}X|^r\le 2^{r-1}(|X|^r+|\mathbb{E}X|^r)$ 及 Jensen，中心化矩不超过 $2^r\mathbb{E}|X|^r$。

当 $r\kappa\le 1$，任意固定不同的二元正分布使 $A\to(\rho^\kappa-1)/\kappa$，其原始与中心化矩均为严格正常数，给出下界。当 $r\kappa>1$，取 $q_1=\eta^{1/\kappa}/2$、$T_1=1/2$。稀有动作有 $A_1=\log(2-\eta)/(\kappa\eta)$，另一动作 $A_2=O(1)$。所以 $q_1|A_1|^r=\Omega(\eta^{1/\kappa-r})$；中心化后的稀有值为 $(1-q_1)(A_1-A_2)$，具有同阶贡献。几何端点取固定非退化 q，令一个教师概率趋零，即使中心化，正质量动作上的对数差也无界。

二阶矩阈值是 $\kappa\le 1/2$，四阶矩阈值是 $\kappa\le 1/4$。固定分布的小步 Taylor 展开不能替代这类允许分布随 η 改变的最坏情形论证。

D.5 误差相关方差与锐常数

定理 D.4 (误差相关的监督方差上界)

若 $0<\kappa\le 1/2, 0<\eta<1$，则

$$V_{\kappa,\eta}\le \frac{1-a_\kappa^2}{\kappa^2(1-\eta)^2},\qquad a_\kappa=\mathbb{E}_q(T/q)^\kappa, \tag{D.21}$$

$$V_{\kappa,\eta}\le \frac{D_\kappa(T\|q)}{\kappa(1-\eta)^2}\le \frac{K_T}{\kappa(1-\kappa)(1-\eta)^2}. \tag{D.22}$$

♡

证明 令 $a_\kappa=\mathbb{E}_q\rho^\kappa$。当 $0<\kappa\le 1/2$，函数 $h(x)=\log(1-\eta+\eta x)/(\kappa\eta)$ 的 Lipschitz 常数不超过 $1/[\kappa(1-\eta)]$。独立同分布 X,X' 满足 $\operatorname{Var}h(X)=\frac12\mathbb{E}[h(X)-h(X')]^2$，故

$$V_{\kappa,\eta}\le \frac{\operatorname{Var}_q(\rho^\kappa)}{\kappa^2(1-\eta)^2}\le \frac{1-a_\kappa^2}{\kappa^2(1-\eta)^2}. \tag{D.23}$$

第二步用 $\mathbb{E}_q\rho^{2\kappa}\le 1$。

为得到与教师误差相关的界，令 $a(u)=\mathbb{E}_q\rho^u$。其二阶导数为 $\mathbb{E}_q[\rho^u\log^2\rho]\ge 0$，所以对 $2\kappa\in[\kappa,1]$，

$$a(2\kappa)\le \frac{1-2\kappa}{1-\kappa}a(\kappa)+\frac{\kappa}{1-\kappa}. \tag{D.24}$$

减去 $a(\kappa)^2$ 并因式分解：

$$\operatorname{Var}_q(\rho^\kappa)\le \frac{(1-a_\kappa)[\kappa+(1-\kappa)a_\kappa]}{1-\kappa}\le \frac{1-a_\kappa}{1-\kappa}. \tag{D.25}$$

代入散度定义得到式 (5.5)。最后一步利用 $\log(1+\eta x)\le \eta x$ 得 $K_T\ge(1-a_\kappa)/\kappa$。

定理 D.5 (相对教师误差的锐小步方差常数)

设 $A_\kappa^0=(\rho^\kappa-1)/\kappa$、$K_T^0=-\mathbb{E}_qA_\kappa^0$。在至少二动作的正分布类中，对 $0<\kappa\le 1/2$，

$$\sup_{q\ne T}\frac{\operatorname{Var}_q A_\kappa^0}{D_\kappa(T\|q)}=\frac{1}{\kappa},\qquad \sup_{q\ne T}\frac{\operatorname{Var}_q A_\kappa^0}{K_T^0}=\frac{1}{\kappa(1-\kappa)}. \tag{D.26}$$

其余形状没有有限统一常数，故两种准则均由 $\kappa=1/2$ 唯一最小化。

♡

证明 在小步极限 $A_\kappa^0=(\rho^\kappa-1)/\kappa$，

$$\sup_{q\ne T}\frac{\operatorname{Var}_q A_\kappa^0}{D_\kappa(T\|q)}=\frac{1}{\kappa},\qquad \sup_{q\ne T}\frac{\operatorname{Var}_q A_\kappa^0}{K_T^0}=\frac{1}{\kappa(1-\kappa)}. \tag{D.27}$$

上界已证。锐性取 $q=(v,1-v)$、$T=(v^2,1-v^2)$，此时 $\rho=(v,1+v)$。当 $v\downarrow 0$，

$$a_\kappa=1-(1-\kappa)v+o(v),\quad \operatorname{Var}_q A_\kappa^0=v/\kappa^2+o(v),\quad D_\kappa=v/\kappa+o(v). \tag{D.28}$$

两比值逼近所列常数。对 $\kappa>1/2$，取 $q=(v,1-v),T=(1/2,1/2)$，方差按 $v^{1-2\kappa}$ 发散；内部幂散度有界，$\kappa=1$ 的 KL 只按 $\log(1/v)$ 增长。$\kappa=0$ 用固定非对称 q 与趋零教师概率，方差按对数平方增长，而 KL 按一次对数增长。故相对准则的唯一最优点为 $\kappa=1/2$。

D.6 绝对最坏方差的不同最优点

定理 D.6 (绝对最坏小步方差及其最优形状)

对 $0<\kappa<1/2$，令 $b=(1-2\kappa)/[2(1-\kappa)]$，则

$$\sup_{q,T}\operatorname{Var}_q A_\kappa^0=\frac{b^{1-2\kappa}(1-b)}{\kappa^2}. \tag{D.29}$$

在 $\kappa=1/2$，上确界为四。该绝对方差准则的唯一最优形状满足 $\log[(1-2\kappa)/(2(1-\kappa))]=-1/\kappa$，数值约为 0.441928。

♡

证明 对 $0<\kappa<1/2$，令 $X=\rho^{\kappa}$、$r=1/\kappa>2$，则 $\mathbb{E}_q X^r=1$。Hölder 给出

$$\mathbb{E}X^2 \le (\mathbb{E}X)^{(r-2)/(r-1)}. \tag{D.30}$$

具体地，将 $X^2=X^{(r-2)/(r-1)}(X^r)^{1/(r-1)}$，取共轭指数 $(r-1)/(r-2)$ 与 $r-1$ 即得。令 $a=\mathbb{E}X$、$\gamma=(1-2\kappa)/(1-\kappa)$，则 $\operatorname{Var}X\le a^{\gamma}-a^2$。最大值处 $a^{2-\gamma}=\gamma/2$，得到

$$\sup_{q,T}\operatorname{Var}A^0_\kappa = C_{\mathrm{vel}}(\kappa)=\frac{b^{1-2\kappa}(1-b)}{\kappa^2},\qquad b=\frac{1-2\kappa}{2(1-\kappa)}. \tag{D.31}$$

取 $q=(b,1-b)$、$T\to(1,0)$，Hölder 与驻点条件同时取等，证明锐性。$\kappa=1/2$ 的上确界为四。对最优 b 使用包络求导，

$$\frac{d}{d\kappa}\log C_{\mathrm{vel}} = -2/\kappa - 2\log b. \tag{D.32}$$

唯一根满足 $\log[(1-2\kappa)/(2(1-\kappa))]=-1/\kappa$。左侧加 $1/\kappa$ 严格递减，端点分别趋于正、负无穷，故根唯一，数值为 $\kappa_\star\simeq 0.441928$。这个准则最小化绝对最坏方差，不等于相对误差准则，也不等于任务表现。

D.7 平方根流、局部速率与噪声可求和性

命题 D.7 (平方根自然梯度流的显式亲和度)

固定正教师，沿 $\kappa=1/2$ 的自然梯度流，令 $a=\sum\sqrt{qT}$。则 $\|v_{1/2}\|_q^2=4(1-a^2)$、$\dot a=1-a^2$。若初值不同于教师，$a(t)=\tanh[t+\operatorname{artanh}a(0)]$，且 $D(0)e^{-2t}\le D_{1/2}(T\|q(t))\le D(0)e^{-t}$。♠

证明 平方根点令 $a=\sum\sqrt{qT}$。小步 Fisher 速度满足 $\|v_{1/2}\|_q^2=4(1-a^2)$，且 $D_{1/2}=4(1-a)$。因此沿连续自然梯度流，

$$\dot a = 1-a^2,\qquad a(t)=\tanh[t+\operatorname{artanh}a(0)] \tag{D.33}$$

对 $q\neq T$ 成立；在 $q=T$ 处流恒定。又有 $\dot D=-(1+a)D$，故 $D(0)e^{-2t}\le D(t)\le D(0)e^{-t}$。离散精确更新的 Hellinger 收缩由正文式 (5.7) 证明。

命题 D.8 (幂均值的二阶展开与共同局部率)

固定正教师、$\kappa\in[0,1],0<\eta<1$。令 $q=T+\epsilon h$、$\sum h=0$、$S_h=\sum h_a^2/T_a$，则

$$m_a = T_a+(1-\eta)\epsilon h_a+\frac{(\kappa-1)(1-\eta)\eta}{2}\epsilon^2\left(h_a^2/T_a - T_aS_h\right)+O(\epsilon^3). \tag{D.34}$$

对固定非零 h 及一处具有正二阶曲率的三阶光滑 f-散度，更新前后教师散度比为 $(1-\eta)^2+O(\epsilon)$。♠

证明 固定 $T>0$，写 $q=T+\epsilon h$、$\sum h=0$、$S_h=\sum h_a^2/T_a$。两次二项式展开并除以归一化常数，得到

$$m_a = T_a+(1-\eta)\epsilon h_a+\frac{(\kappa-1)(1-\eta)\eta}{2}\epsilon^2\left(\frac{h_a^2}{T_a} - T_aS_h\right)+O(\epsilon^3). \tag{D.35}$$

未归一化展开中二阶项为 $(\kappa-1)(1-\eta)\eta\epsilon^2h_a^2/(2T_a)$；其总和正是需要减去的归一化项。几何端点直接展开 $q^{1-\eta}T^{\eta}$ 给出相同结果。任何在一处二阶曲率为正的光滑 f-散度都满足局部比值 $(1-\eta)^2+O(\epsilon)$。

推论 D.1 (精确外层的监督噪声可求和性)

固定教师、$0<\kappa\le 1/2,0<\eta<1$，每轮精确刷新。则

$$\sum_{n=1}^{\infty}V_n \le \frac{\mathrm{KL}(T\|q_0)}{\kappa(1-\kappa)(1-\eta)^2\eta}. \tag{D.36}$$

平方根点还满足 $V_n\le 4(1-\eta)^nH^2(q_0,T)/(1-\eta)^2$。该式控制上界包络，不断言实际方差逐步单调。♡

证明 最后，固定 $0<\kappa\le 1/2, \eta<1$ 并精确刷新，式 (B.40) 与三点求和给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} V_n \le \frac{\mathrm{KL}(T\|q_0)}{\kappa(1-\kappa)(1-\eta)^2\eta}. \tag{D.37}$$

平方根点可用更直接的 Hellinger 界：

$$V_n \le \frac{4H^2(q_n,T)}{(1-\eta)^2} \le \frac{4(1-\eta)^n H^2(q_0,T)}{(1-\eta)^2}. \tag{D.38}$$

上界包络下降，不保证实际方差逐步单调；所有这些结论固定同一前缀、教师和参数。

D.8 固定 Fisher 速度下的比较

命题 D.9 (共同损失下的最陡形状)

固定有限正分布 $q\neq T$，令 $\rho=T/q$、$r=\log\rho$，$w_\kappa=C_q(\rho^\kappa)/\kappa$，并以连续延拓定义 $w_0=C_q r$。向量 $v_\kappa=qw_\kappa$ 是小步目标的切向量。将其按 Fisher 范数 $\|v\|_q^2=\sum_a v_a^2/q_a$ 归一化为 u_κ，则

$$-D\,\mathrm{KL}(q\|T)[u_\kappa] = \frac{\mathbb{E}_q[rw_\kappa]}{\sqrt{\mathbb{E}_q w_\kappa^2}} \le \sqrt{\mathrm{Var}_q\, r}, \tag{D.39}$$

$$-D\,\mathrm{KL}(T\|q)[u_\kappa] = \frac{\mathbb{E}_q[\rho w_\kappa]}{\sqrt{\mathbb{E}_q w_\kappa^2}} \le \sqrt{\mathrm{Var}_q\, \rho}. \tag{D.40}$$

第一项由 $\kappa=0$ 达到，第二项由 $\kappa=1$ 达到；不声称达到者唯一。

证明 切向量满足 $\sum_a v_a=0$。逐坐标微分两个 KL，其负方向导数分别为 $\sum_a r_a v_a$ 与 $\sum_a \rho_a v_a$。代入 $u_\kappa=qw_\kappa/\sqrt{\mathbb{E}_q w_\kappa^2}$ 得等式。由于 $\mathbb{E}_q w_\kappa=0$，分子可分别写成 $\mathbb{E}_q[(C_q r)w_\kappa]$ 和 $\mathbb{E}_q[(C_q\rho)w_\kappa]$。Cauchy–Schwarz 不等式给上界；在两个所述端点，相应中心化向量正比例，故取等。这里统一的是 Fisher 速度和被比较的损失，与统一原始步长、最小化监督方差是不同的比较条件。

D.9 平方根目标与平方根拟合的联合界

命题 D.10 (初始拟合系数的统一二阶矩)

取 $\kappa=1/2$ 的目标 m，$0<\eta\le 1$，并使用平方根散度拟合。在初始点 $p=q$，令 $a=\sum_i\sqrt{q_i T_i}$、$b=\sum_i\sqrt{q_i m_i}$。若归一化拟合系数为 $G_i=2(b-\sqrt{m_i/q_i})/\eta$，则

$$\mathbb{E}_q G^2 = \frac{4(1-a^2)}{Z} \le \frac{4}{(1-\eta)^2+\eta^2} \le 8, \qquad Z=(1-\eta)^2+\eta^2+2\eta(1-\eta)a. \tag{D.41}$$

若 score 范数至多为 S，相应单动作梯度的二阶矩至多为 $8S^2$。

证明 由 $\sqrt{m_i}=[(1-\eta)\sqrt{q_i}+\eta\sqrt{T_i}]/\sqrt{Z}$，有 $b=(1-\eta+\eta a)/\sqrt{Z}$。又 $\mathbb{E}_q(m/q)=1$，所以 $\mathbb{E}_q G^2=4(1-b^2)/\eta^2$。直接相减得到 $Z-(1-\eta+\eta a)^2=\eta^2(1-a^2)$。因 $0<a\le 1$，丢弃 Z 的非负交叉项并用 $(1-\eta)^2+\eta^2\ge 1/2$ 得界。最后逐点使用 $\|G_i\psi_i\|^2\le S^2 G_i^2$。此处拟合形状也是平方根；该系数不是 BPO 的对数残差。

命题 D.11 (有限步最坏方差的小步极限)

设 $0<\kappa\le 1/2$，$V_{\kappa,\eta}(q,T)=\mathrm{Var}_q A_{\kappa,\eta}(T/q)$。以前文的锐常数 $C_{\mathrm{vel}}(\kappa)=\sup_{q,T}\mathrm{Var}_q(\rho^\kappa)/\kappa^2$ 记最坏速度方差，则

$$\sup_{q,T} V_{\kappa,\eta}(q,T) \le \frac{C_{\mathrm{vel}}(\kappa)}{(1-\eta)^2}, \qquad \limsup_{\eta\downarrow 0}\sup_{q,T} V_{\kappa,\eta}(q,T) = C_{\mathrm{vel}}(\kappa). \tag{D.42}$$

固定 q,T 时，平方根端点的极限为 $4(1-a^2)=H^2(q,T)[4-H^2(q,T)]$，其中 $H^2=2-2a$。

证明 将 A 看成 $x=\rho^\kappa$ 的函数，其导数为 $1/[\kappa(1-\eta+\eta x)]\le 1/[\kappa(1-\eta)]$。对独立同分布的 X,X'，恒等

式 $\operatorname{Var} h(X) = \mathbb{E}(h(X) - h(X'))^2/2$ 将 Lipschitz 界转为方差界。固定正分布时逐点 Taylor 展开给 $A_{\kappa,\eta}(\rho) \to (\rho^\kappa - 1)/\kappa$。对任意 $\epsilon > 0$，先选择一个速度方差超过 $C_{\mathrm{vel}} - \epsilon$ 的固定分布对，再令 $\eta \downarrow 0$，得到下极限至少为 $C_{\mathrm{vel}} - \epsilon$；上界给上极限不超过 C_{vel}。最后令 $\epsilon \downarrow 0$。平方根公式由 $\mathbb{E}_q \rho = 1$ 和 $\mathbb{E}_q \sqrt{\rho} = a$ 得到。

D.10 小 KL 与标准化不能替代矩分析

命题 D.12 (KL 趋零而监督方差发散)

存在二元正分布族使 $\mathrm{KL}(q\|T) \to 0$，但 $\operatorname{Var}_q \log(T/q) \to \infty$。也存在 KL 趋零而非负 KL 估计器 $\phi(\rho) = \rho - 1 - \log \rho$ 方差发散的族。

证明 第一族取 $q = (\epsilon, 1-\epsilon)$，$T_1 = \exp(-\epsilon^{-3/4})$、$T_2 = 1 - T_1$。第一坐标的 $r = \log(T/q)$ 为 $-\epsilon^{-3/4} - \log \epsilon$，第二坐标为 $O(\epsilon)$。所以 $-\mathbb{E}_q r \sim \epsilon^{1/4} \to 0$，而二点方差公式给 $\operatorname{Var}_q r = \epsilon(1-\epsilon)(r_1 - r_2)^2 \sim \epsilon^{-1/2}$。对固定正 κ 和 $\eta < 1$，同一族的 $A(\rho_1)$ 趋于有限下界，$A(\rho_2) = O(\epsilon)$，方差为 $O(\epsilon)$。

第二族仍取 $q_1 = \epsilon$，改为 $T_1 = \epsilon^{1/4}$。第一坐标对 KL 的贡献为 $O(\epsilon|\log \epsilon|)$，第二坐标贡献渐近为 $\epsilon^{1/4}$。此时 $\rho_1 = \epsilon^{-3/4}$、$\phi(\rho_1) \sim \epsilon^{-3/4}$，而 $\rho_2 = 1 - O(\epsilon^{1/4})$ 给 $\phi(\rho_2) = O(\epsilon^{1/2})$。同一二点方差公式再次给 $\operatorname{Var}_q \phi \sim \epsilon^{-1/2}$。两族说明，均值散度小不能单独控制单动作估计的二阶矩。

命题 D.13 (二元总体标准化消去信号形状)

设 $q = (v, 1-v)$，$0 < v < 1$，两点信号差 $D = f_1 - f_2 \neq 0$。令 $\sigma^2 = \operatorname{Var}_q f$，取第一 logit 的 score $\psi = (1-v, -v)$。则

$$\operatorname{Var}_q\left[\psi \frac{C_q f}{\sigma}\right] = (1-2v)^2. \tag{D.43}$$

任何严格递增的信号变换均保留逐点标准化值。

证明 有 $C_q f = ((1-v)D, -vD)$、$\sigma = |D|\sqrt{v(1-v)}$。除以 σ 后只剩 $\operatorname{sign}(D)$ 和 v。两个梯度取值之差为 $\operatorname{sign}(D)(1-2v)/\sqrt{v(1-v)}$，乘以二点方差系数 $v(1-v)$ 得结论。严格递增变换保留 D 的符号。本命题使用总体方差、二元动作和单个 logit；多动作、有限组经验标准化或共享参数不由此式涵盖。

附录 E 信息访问与条件积分估计

E.1 四个积分对象与可观测信息

命题 E.1 (双向 KL 的数值与梯度积分)

有限词表上，$P = P_\theta > 0$ 可微且归一化，$Q > 0$ 冻结。令 $\ell = \log(P/Q)$、$\psi = \nabla_\theta \log P$，则

$$\mathrm{KL}(P\|Q) = \mathbb{E}_P \ell, \quad \nabla_\theta \mathrm{KL}(P\|Q) = \mathbb{E}_P(\ell\psi), \quad \nabla_\theta \mathrm{KL}(Q\|P) = -\mathbb{E}_Q \psi. \tag{E.1}$$

证明 本附录局部记当前学生为 $P = P_\theta$、冻结参考为 Q、动作提案为 β；三者职责不同。令 $\ell_a = \log(P_a/Q_a)$、$\psi_a = \nabla_\theta \log P_a$。双向 KL 及其梯度为

$$K = \mathbb{E}_P \ell, \quad g = \mathbb{E}_P[\ell\psi], \qquad K^{\mathrm{F}} = -\mathbb{E}_Q \ell, \quad g^{\mathrm{F}} = -\mathbb{E}_Q \psi. \tag{E.2}$$

g 的求导先产生 $\mathbb{E}_P[(\ell+1)\psi]$，再利用 $\mathbb{E}_P\psi = 0$。参考为锚点时可代入 $Q = q$；BPO 学生中心 $\mathrm{KL}(q\|p)$ 对应这里的正向积分。

完整词表概率允许精确有限求和。头部查询只给出集合 S 上的 Q_a 和尾部总质量；实际动作查询再给出该动作的一项概率。若 S 是教师真正的 Top-K_{head}，未知尾部还满足排名约束 $Q_a \le \min_{b\in S} Q_b$。接口是否确定某个量，应检查它在全部符合这些观测的分布上是否相同。

只保留桶质量时，不能恢复桶内形状。若实际动作落在尾部，其额外概率观测必须计入信息；也不能把一次尾部查询当成全部尾部已知。固定支持集的微分与每步重新选 Top-K 的程序是不同对象，以下推导均冻结分区。

E.2 粗粒化、下界与不可识别性

定理 E.1 (分区链式分解与细化单调性)

设 $\mathcal{C}$ 为固定词表分区，$P, Q > 0$，桶质量与条件分布分别为 P_C, Q_C, P^C, Q^C。则

$$\mathrm{KL}(P\|Q) = \sum_C P_C \log(P_C/Q_C) + \sum_C P_C \,\mathrm{KL}(P^C\|Q^C). \tag{E.3}$$

交换 P, Q 给另一方向；细化分区使粗粒度 KL 非减，完整 singleton 分区恢复完整 KL。

证明 设 $\mathcal{C}$ 为词表分区，定义 $P_C = \sum_{a\in C} P_a$、$Q_C = \sum_{a\in C} Q_a$、$\ell_C = \log(P_C/Q_C)$、$P_a^C = P_a/P_C$、$Q_a^C = Q_a/Q_C$。逐点有

$$\ell_a = \ell_C + \log(P_a^C/Q_a^C). \tag{E.4}$$

乘 P_a，先桶内求和再跨桶求和，得到

$$\mathrm{KL}(P\|Q) = K_{\mathcal{C}} + \sum_C P_C \,\mathrm{KL}(P^C\|Q^C), \qquad K_{\mathcal{C}} = \sum_C P_C \ell_C. \tag{E.5}$$

交换 P, Q 给出正向版本。细化分区时，新旧粗化 KL 的差为每个旧桶内细桶标签 KL 的加权和，故非负。全 singleton 分区恢复完整值。

命题 E.2 (桶质量信息下的 KL 下包络)

固定 $P > 0$ 与各桶正质量 Q_C，仅施加桶质量约束时，$\inf_Q \mathrm{KL}(P\|Q) = \sum_C P_C \log(P_C/Q_C)$，唯一最优补全为 $Q_a = Q_C P_a^C$。交换 KL 方向仍由同一补全达到相应粗粒度下界。加入 Top-K 排名后，该下界不一定仍可达到。

证明 在只知道 Q_C 的信息类上，$K_{\mathcal{C}}$ 是完整 KL 的锐下包络，由 $Q_a = Q_C P_a^C$ 唯一达到；两个方向同时成立。加入真实 Top-K 排名后该构造可能不可行。例如 $P = (0.1, 0.8, 0.1)$，已知 $Q_1 = 0.4, Q_2 + Q_3 = 0.6$ 且动作一是

Top-1；质量约束最优构造给 $Q_2 = 8/15 > 0.4$，违反排名。因此 Tail-aware 仍是下界，但不必是完整信息类上的锐下界。

命题 E.3 (稀疏头部信息不控制完整逆向 KL 上界)

当至少两个尾部概率仍未知时，存在具有相同真实 Top-1 概率和尾部质量的正参考分布族，使对同一个固定 P 的 $\mathrm{KL}(P\|Q)$ 无上界。

证明 相同头部信息也不控制逆向 KL 上界。固定 $P = (0.4, 0.2, 0.4)$ 与 $Q_\epsilon = (0.7, \epsilon, 0.3-\epsilon)$、$0 < \epsilon < 0.15$，Top-1 和尾部质量完全相同，而 $0.2\log(0.2/\epsilon) \to \infty$。该反例依赖至少两个仍未知的尾部坐标。

命题 E.4 (粗粒度 KL 的梯度残差)

固定分区和参考 Q，令 $\ell_C = \log(P_C/Q_C)$、$\bar{\psi}_C = \mathbb{E}_{P^C}\psi$，则

$$\nabla K_{\mathcal{C}} = \sum_C P_C \ell_C \bar{\psi}_C, \tag{E.6}$$

$$g - \nabla K_{\mathcal{C}} = \sum_C P_C \{\mathrm{Cov}_{P^C}(\ell - \ell_C, \psi) + \mathrm{KL}(P^C\|Q^C)\bar{\psi}_C\}. \tag{E.7}$$

标量粗化误差的单调改进不一般推出梯度偏差范数的单调改进。

证明 记 $\bar{\psi}_C = \nabla \log P_C = \mathbb{E}_{P^C}\psi$。对粗化目标求导：

$$\nabla K_{\mathcal{C}} = \sum_C (\ell_C + 1)\nabla P_C = \sum_C P_C \ell_C \bar{\psi}_C, \tag{E.8}$$

$$g - \nabla K_{\mathcal{C}} = \sum_C P_C \{\mathrm{Cov}_{P^C}(\ell - \ell_C, \psi) + \mathrm{KL}(P^C\|Q^C)\bar{\psi}_C\}. \tag{E.9}$$

最后一步对桶内乘积期望分解。标量误差只含条件 KL，梯度误差还依赖 score 相关性；标量下界改善不推出梯度偏差范数单调改善。

E.3 精确积分加残差抽样

定理 E.2 (统一估计与协方差)

设目标 $I_\nu(h) = \sum_a \nu_a h_a$，$h_a$ 可为向量。选择可精确积分的代理 b_a，令 $R_a = h_a - b_a$。若 $\nu_a\|R_a\| > 0$ 时 $\beta_a > 0$，则对 $A \sim \beta$，

$$\widehat{I} = I_\nu(b) + \frac{\nu_A}{\beta_A} R_A \tag{E.10}$$

无偏，且

$$\mathrm{Cov}(\widehat{I}) = \sum_{\beta_a > 0} \frac{\nu_a^2}{\beta_a} R_a R_a^\top - I_\nu(R) I_\nu(R)^\top. \tag{E.11}$$

证明 随机修正的均值为 $\sum_{\beta_a>0} \nu_a R_a = I_\nu(R)$，支持条件使缺失动作贡献为零；与确定积分相加即得目标。随机项外积的期望为式 (E.11) 的求和项，减去均值外积得到协方差。取迹得到向量方差，无偏性使其等于均方误差。M 个条件独立样本的平均协方差除以 M。

命题 E.5 (积分项、权重和支持的统一偏差)

记 $R = h - b$、$\mathcal{D} = \{a : \beta_a > 0\}$。若实际估计器为 $I_\nu(b) + \delta + \widetilde{w}_A R_A$，则其偏差为

$$\delta + \sum_{\mathcal{D}} (\beta_a \widetilde{w}_a - \nu_a) R_a - \sum_{\mathcal{D}^c} \nu_a R_a. \tag{E.12}$$

证明 若确定积分有误差 δ，使用错误权重 $\widetilde{w}$ 或缺失支持 $\mathcal{D}^c$，偏差恰为

$$\delta + \sum_{a\in\mathcal{D}} (\beta_a \widetilde{w}_a - \nu_a) R_a - \sum_{a\notin\mathcal{D}} \nu_a R_a. \tag{E.13}$$

这是对实际期望与目标直接相减的结果。精确覆盖的零残差动作可以没有采样支持；未知残差则不能由有限权重恢复。

命题 E.6 (固定残差下的迹方差最优提案)

固定代理与残差 R，若 $L_R = \sum_a \nu_a \|R_a\| > 0$，则最优提案为 $\beta_a^\star = \nu_a\|R_a\|/L_R$，最小迹方差为 $L_R^2 - \|I_\nu(R)\|^2$。若 $L_R = 0$，目标可确定性精确返回。

证明 固定代理时，迹方差最优提案为

$$\beta_a^\star = \frac{\nu_a\|R_a\|}{\sum_b \nu_b\|R_b\|}, \quad V_{\min} = \left(\sum_a \nu_a\|R_a\|\right)^2 - \|I_\nu(R)\|^2. \tag{E.14}$$

证明对 $\sum_a [\nu_a\|R_a\|/\sqrt{\beta_a}]\sqrt{\beta_a}$ 用 Cauchy–Schwarz；取比例提案时等号成立。全部残差为零时直接返回确定积分。这个 oracle 提案通常需要未知尾部值，不能仅凭公式称其可实现。

定理 E.3 (多控制的 Gram 最优解)

设 U_j 为二阶可积零均值控制，估计器为 $X - \sum_j c_j U_j$。令 $\Gamma_{ij} = \mathbb{E}\langle U_i, U_j\rangle$、$d_j = \mathbb{E}\langle U_j, X - \mathbb{E}X\rangle$。则全部迹方差最优系数为 $\Gamma^\dagger d + \ker\Gamma$，相对最优值的方差代价为 $(c - \Gamma^\dagger d)^\top \Gamma (c - \Gamma^\dagger d)$。

证明 若有多个已知积分控制 h_j，令 $X = (\nu_A/\beta_A)h_A$、$U_j = (\nu_A/\beta_A)h_{j,A} - I_\nu(h_j)$、$\Gamma_{ij} = \mathbb{E}\langle U_i, U_j\rangle$、$d_j = \mathbb{E}\langle U_j, X - \mathbb{E}X\rangle$。估计器 $X - \sum_j c_j U_j$ 的方差为

$$V_0 - 2c^\top d + c^\top \Gamma c. \tag{E.15}$$

若 $z \in \ker\Gamma$，则 $\sum_j z_j U_j = 0$ 几乎处处，所以 $z^\top d = 0$。因此 $d \in \operatorname{range}\Gamma$，最优系数为 $\Gamma^\dagger d + \ker\Gamma$，超额方差为 $(c - \Gamma^\dagger d)^\top \Gamma (c - \Gamma^\dagger d)$。这最小化协方差迹，不一般同时最小化每个方向。

E.4 头尾估计器作为统一定理的实例

命题 E.7 (三种确定性头部目标及其偏差)

固定非空头尾分区，令 $H = \sum_S P_a \ell_a$、$l = \log(\tau_P/\tau_Q)$、$B = \tau_P \operatorname{KL}(P^{\text{tail}}\|Q^{\text{tail}})$。完整逆向 KL 为 $H + \tau_P l + B$。Truncated 与 Tail-aware 的偏差分别为 $-\tau_P l - B, -B$；Normalized 优化头部条件 KL $H/P_S + \log(Q_S/P_S)$。

证明 令 $\tau_P = P(S^c)$、$\tau_Q = Q(S^c)$、$J_A = \mathbf{1}\{A \notin S\}$，并定义

$$H = \sum_{a\in S} P_a \ell_a, \quad l = \log(\tau_P/\tau_Q), \quad B = \tau_P \operatorname{KL}(P^{\text{tail}}\|Q^{\text{tail}}). \tag{E.16}$$

则 $K = H + \tau_P l + B$。Truncated 返回 H，偏差为 $-\tau_P l - B$；Tail-aware 返回 $H + \tau_P l$，偏差为 $-B$；Normalized 返回

$$K_{\text{norm}} = H/P_S + \log(Q_S/P_S), \tag{E.17}$$

它是头部条件分布的 KL。后者改变积分权重，不能当成只删除尾部项。

命题 E.8 (标量尾部控制族的精确方差)

令 $A \sim P$，控制 c 在抽样前固定。估计器 $\widehat{K}(c) = H + \tau_P c + J_A(\ell_A - c)$ 无偏，且

$$\operatorname{Var}\widehat{K}(c) = \tau_P \operatorname{Var}_{\text{tail}}\ell + P_S\tau_P(\mathbb{E}_{\text{tail}}\ell - c)^2. \tag{E.18}$$

因此最优常数为尾部条件均值；HETS 与桶残差校正分别取 $c = 0, l$。

证明 在 $A \sim P$ 下，标量控制族

$$\widehat{K}(c) = H + \tau_P c + J_A(\ell_A - c) \tag{E.19}$$

无偏。设 $\mu_\ell = \mathbb{E}_{P^{\text{tail}}}\ell$、$V_\ell = \mathrm{Var}_{P^{\text{tail}}}\ell$，全方差公式给出

$$\mathrm{Var}\,\widehat{K}(c) = \tau_P V_\ell + P_S\tau_P(\mu_\ell - c)^2. \tag{E.20}$$

头部精确、尾部采样（Head-Exact Tail-Sampled，HETS）取 $c = 0$，桶残差修正取 $c = l$，oracle 取 $c = \mu_\ell$。残差修正优于 HETS 当且仅当 $|\mu_\ell - l| < |\mu_\ell|$。

命题 E.9 (向量尾部控制族的协方差)

令 $h_g = \sum_S P_a\ell_a\psi_a$、$\mu_g = \mathbb{E}_{\text{tail}}(\ell\psi)$，固定向量 b。则 $\widehat{g}(b) = h_g + \tau_P b + J_A(\ell_A\psi_A - b)$ 对完整梯度无偏，协方差为

$$\tau_P\,\mathrm{Cov}_{\text{tail}}(\ell\psi) + P_S\tau_P(\mu_g - b)(\mu_g - b)^\top. \tag{E.21}$$

证明 对梯度令 $h_g = \sum_S P_a\ell_a\psi_a$、$\mu_g = \mathbb{E}_{P^{\text{tail}}}(\ell\psi)$、$\bar{\psi}_{\text{tail}} = \nabla\log\tau_P$、$b_{\text{TA}} = l\bar{\psi}_{\text{tail}}$。统一向量控制为

$$\widehat{g}(b) = h_g + \tau_P b + J_A(\ell_A\psi_A - b), \tag{E.22}$$

$$\mathrm{Cov}\,\widehat{g}(b) = \tau_P\,\mathrm{Cov}_{\text{tail}}(\ell\psi) + P_S\tau_P(\mu_g - b)(\mu_g - b)^\top. \tag{E.23}$$

HETS 为 $b = 0$，ResOPD 为 $b = b_{\text{TA}}$。常向量只改变头尾事件间的均值差，不改变尾部内部协方差。

命题 E.10 (正交双控制的最优值与排序)

on-policy 抽样下，取 $\chi = l(\psi - \bar{\psi}_{\text{tail}})$。估计器 $\widehat{g}(b,\vartheta) = h_g + \tau_P b + J_A(\ell_A\psi_A - b - \vartheta\chi_A)$ 无偏。若 $V_\chi > 0$，最优值为 $b = \mu_g, \vartheta = D_\chi/V_\chi$，超额方差为

$$P_S\tau_P\|b - \mu_g\|^2 + \tau_P V_\chi(\vartheta - D_\chi/V_\chi)^2. \tag{E.24}$$

其中 $V_\chi = \mathbb{E}_{\text{tail}}\|\chi\|^2$、$D_\chi = \mathbb{E}_{\text{tail}}\langle\ell\psi - \mu_g, \chi\rangle$。SC-TA 优于 ResOPD 当且仅当 $2D_\chi > V_\chi$。

证明 再加入尾部条件零均值方向 $\chi_a = l(\psi_a - \bar{\psi}_{\text{tail}})$，定义

$$\widehat{g}(b,\vartheta) = h_g + \tau_P b + J_A(\ell_A\psi_A - b - \vartheta\chi_A). \tag{E.25}$$

尾部内部与事件控制正交，因为 $\mathbb{E}_{\text{tail}}\chi = 0$。因此最优 $b = \mu_g$，最优 $\vartheta = D_\chi/V_\chi$，其中

$$V_\chi = \mathbb{E}_{\text{tail}}\|\chi\|^2, \qquad D_\chi = \mathbb{E}_{\text{tail}}\langle\ell\psi - \mu_g, \chi\rangle. \tag{E.26}$$

配方给出精确代价

$$V(b,\vartheta) - V_{\min} = P_S\tau_P\|b - \mu_g\|^2 + \tau_P V_\chi(\vartheta - D_\chi/V_\chi)^2. \tag{E.27}$$

$V_\chi = 0$ 时内部控制不起作用。SC-TA 对应 $b = b_{\text{TA}}, \vartheta = 1$；它比 ResOPD 方差小当且仅当 $2D_\chi > V_\chi$。

命题 E.11 (精确头部不保证逐输入降方差)

对向量 integrand u、$I = \mathbb{E}_P u$、$H_u = \sum_S P_a u_a$，有

$$\mathrm{Var}(u_A) - \mathrm{Var}(H_u + J_A u_A) = \sum_S P_a\|u_a\|^2 - 2\langle I, H_u\rangle + \|H_u\|^2. \tag{E.28}$$

右侧可以为负；真实条件期望的 Rao–Blackwell 化则保证方差不增。

证明 即使头部精确，方差也不必比直接抽样小。对任意 integrand u，令 $I = \mathbb{E}_P u$、$H_u = \sum_S P_a u_a$，直接展开二阶矩：

$$\mathrm{Var}(u_A) - \mathrm{Var}(H_u + J_A u_A) = \sum_S P_a\|u_a\|^2 - 2\langle I, H_u\rangle + \|H_u\|^2. \tag{E.29}$$

右侧可负。数值反例 $P = (0.18, 0.819, 0.001)$、$Q = (0.08, 0.67, 0.25)$、$S = \{2\}$（按一开始编号），直接 log-ratio 方差约为 0.088913，HETS 为 0.129131。真实 Rao–Blackwell 化应取条件期望 $\mathbb{E}_P[\ell \mid C] = \ell_C + \mathrm{KL}(P^C\|Q^C)$；只

知道桶质量时缺少第二项。

E.5 提案变化、分层采样与正向 KL

命题 E.12 (一般提案下的最优尾部常控制)

提案 β 覆盖尾部。令 $W=\sum_{S^c}P_a^2/\beta_a$、$U=\sum_{S^c}(P_a^2/\beta_a)h_a$、$T_h=\sum_{S^c}P_ah_a$。若 $W>\tau_P^2$，最优控制为 $(U-\tau_PT_h)/(W-\tau_P^2)$；若等号成立，$\beta=P^{\mathrm{tail}}$，控制逐样本抵消，$M$ 次独立抽样的方差为 $\tau_P^2\,\mathrm{Var}_{\mathrm{tail}}(h)/M$。

证明 从 β 采样时，所有残差改为 $J_A(P_A/\beta_A)(h_A-b)$。二阶矩权重是 P^2/β，所以原有 on-policy 最优控制通常改变。令

$$W=\sum_{S^c}P_a^2/\beta_a,\quad U=\sum_{S^c}(P_a^2/\beta_a)h_a,\quad T_h=\sum_{S^c}P_ah_a, \tag{E.30}$$

展开关于 b 的二次式，最优 $b=(U-\tau_PT_h)/(W-\tau_P^2)$。若 $W=\tau_P^2$，Cauchy–Schwarz 等号要求 $\beta=P^{\mathrm{tail}}$，控制项逐样本抵消。此时直接尾部条件采样的方差为 $\tau_P^2\,\mathrm{Var}_{\mathrm{tail}}(h)/M$，不超过同样本数的 on-policy 头尾估计方差。

命题 E.13 (分层预算的最优分配)

各桶独立采样 M_C 次，$\sigma_C^2=\mathrm{Var}_{P^C}h$。总估计方差为 $\sum_C P_C^2\sigma_C^2/M_C$。在连续预算 $\sum_C M_C=M$、$\sum_C P_C\sigma_C>0$ 下，最优分配为 $M_C\propto P_C\sigma_C$。控制若由数据估计，条件无偏结论还要求控制拟合与评估动作之间满足对应独立性。

证明 更一般，分区内独立采样 M_C 次，方差为 $\sum_C P_C^2\sigma_C^2/M_C$。固定连续预算 $\sum_C M_C=M$，Cauchy–Schwarz 给出最优分配 $M_C\propto P_C\sigma_C$；零方差桶直接返回常值，整数预算需另行取整。控制拟合与评估共用随机动作时，$\mathbb{E}U=0$ 不保证 $\mathbb{E}[c(A)U]=0$；应条件化于独立校准数据，或使用交叉拟合并保留折间相关性。

命题 E.14 (正向 KL 的头尾校正)

令 $H^{\mathrm{F}}=-\sum_S Q_a\ell_a$，则 $K^{\mathrm{F}}=H^{\mathrm{F}}-\tau_Q l+\tau_Q\,\mathrm{KL}(Q^{\mathrm{tail}}\|P^{\mathrm{tail}})$。若 β 覆盖未知 Q 尾部，则 $H^{\mathrm{F}}+\tau_Q c+J_A(Q_A/\beta_A)(-\ell_A-c)$ 无偏。粗粒度正向 KL 的真实梯度为 $-\sum_C Q_C\bar{\psi}_C$。

证明 正向 KL 使用同一积分定理取 $\nu=Q,h=-\ell$ 或 $-\psi$。令 $H^{\mathrm{F}}=-\sum_S Q_a\ell_a$，则

$$K^{\mathrm{F}}=H^{\mathrm{F}}-\tau_Q l+\tau_Q\,\mathrm{KL}(Q^{\mathrm{tail}}\|P^{\mathrm{tail}}), \tag{E.31}$$

无偏标量控制为 $H^{\mathrm{F}}+\tau_Q c+J_A(Q_A/\beta_A)(-\ell_A-c)$。其支持要求覆盖未知的 Q 尾部。直接微分粗化正向 KL 得 $-\sum_C Q_C\bar{\psi}_C$，其中 $\bar{\psi}_C$ 仍是 P^C 下的 score 均值。

E.6 数值估计与反传的独立核验

命题 E.15 (固定样本反传与积分导数)

设 ϕ 可微，$A\sim P_\theta$、$c_A=P_\theta(A)/\,\mathrm{stopgrad}(P_\theta(A))$。固定样本反传满足

$$\nabla\phi(\ell_A)=\phi'(\ell_A)\psi_A,\qquad \nabla[c_A\phi(\ell_A)]=[\phi(\ell_A)+\phi'(\ell_A)]\psi_A. \tag{E.32}$$

第二式的期望为 $\nabla\mathbb{E}_P\phi(\ell)$。因此数值无偏与裸反传梯度无偏是不同条件；下表给出 K1–K4 与 K3^{++} 的逐样本结果。

证明 令 $A\sim P$，$\ell=\ell_A$，并定义 $c_A=P_\theta(A)/\,\mathrm{stopgrad}(P_\theta(A))$。固定动作求导有

$$\nabla\phi(\ell)=\phi'(\ell)\psi,\qquad \nabla[c_A\phi(\ell)]=[\phi(\ell)+\phi'(\ell)]\psi. \tag{E.33}$$

第二式的期望由式 (A.9) 恰好恢复积分导数。数值与反传分类如下，均先讨论无截断的解析对象：

程序	前向值	固定样本反传
K1	ℓ	ψ
K2	$\ell^2/2$	$\ell\psi$
K3	$e^{-\ell}+\ell-1$	$(1-e^{-\ell})\psi$
K4：$c_A\,\mathrm{stopgrad}(\ell)$	ℓ	$\ell\psi$
live K4：$c_A\ell$	ℓ	$(\ell+1)\psi$
K3^{++}：$c_A(e^{-\ell}+\ell-1)$	$e^{-\ell}+\ell-1$	$\ell\psi$

K1、K3 的数值对逆向 KL 无偏，因为 $\mathbb{E}_P e^{-\ell}=1$；K2 一般有偏，其反传却是逆向 KL 的无偏 score 梯度。K3 的裸反传期望是 $-\mathbb{E}_Q\psi$，对应正向 KL。K4 与 K3^{++} 的逐样本反传相同，前向方差不同。Top-K 和相应 score 构造的外部背景见 EMA-PG[1]；这里按明确公式区分命名。

命题 E.16 (K5 的双重无偏性)

完整正支持且 $A\sim P$ 时，$K5=-\mathrm{stopgrad}(e^{-\ell_A})\ell_A+\log P_A-\mathrm{stopgrad}(\log P_A)$ 的前向期望为 $\mathrm{KL}(Q\|P)$，固定样本反传期望为其真实参数梯度。

证明 若需要正向 KL 的数值与 score 反传同时匹配，可取

$$K5=-\mathrm{stopgrad}(e^{-\ell})\ell+\log P_A-\mathrm{stopgrad}(\log P_A). \tag{E.34}$$

其前向为 $-e^{-\ell}\ell$，期望为 K^{F}；反传为 $(1-e^{-\ell})\psi$，期望为 g^{F}。正支持和实际采样测度是这些恒等式的必要条件。

命题 E.17 (确定性头部导数与头尾常数匹配)

固定支持 S，令 $d_S=\nabla P_S$，则

$$\nabla H=h_g+d_S,\quad \nabla K_{\mathrm{TA}}=h_g-ld_S,\quad \nabla K_{\mathrm{norm}}=h_g/P_S-Hd_S/P_S^2. \tag{E.35}$$

对任意固定 v，$h_g+vd_S+J_A(\ell_A+v)\psi_A$ 无偏；只在头部或尾部保留该常数会留下对应的 $\pm d_S$ 偏差。

证明 确定性头部数值的真实导数也应保留概率权重项。令 $d_S=\nabla P_S$，则

$$\nabla H=h_g+d_S,\quad \nabla(H+\tau_P l)=h_g-ld_S,\quad \nabla K_{\mathrm{norm}}=\frac{h_g}{P_S}-\frac{H}{P_S^2}d_S. \tag{E.36}$$

最后一式对商 H/P_S 求导并与 $-\log P_S$ 的导数抵消得到，分母明确为标量 P_S^2。

头尾 score 常数必须匹配：$h_g+vd_S+J_A(\ell_A+v)\psi_A$ 对任意固定 v 无偏，因为 $\mathbb{E}_P J_A\psi_A=-d_S$。只在头部或尾部保留一个常数项，会分别留下 $\pm d_S$ 偏差。

命题 E.18 (固定样本势与非保守更新场)

冻结参考、头部和抽样动作。HETS 与 ResOPD 的场分别是 $H-P_S+J_A\ell_A^2/2$ 和 $K_{\mathrm{TA}}+J_A(\ell_A^2-l^2)/2$ 的普通梯度。SC-TA 的场一般非保守，其交叉偏导差为

$$-J_A[(\partial_i l)\psi_j-(\partial_j l)\psi_i]. \tag{E.37}$$

逐样本的保守性与总体梯度无偏性不相互替代。

证明 可以用 $\mathrm{stopgrad}(F)+L-\mathrm{stopgrad}(L)$ 让前向显示 F、反向使用 L 的导数；这不意味着前向的普通导数就是更新场。HETS 与 ResOPD 的固定样本势分别为

$$H-P_S+\tfrac{1}{2}J_A\ell_A^2,\qquad K_{\mathrm{TA}}+\tfrac{1}{2}J_A(\ell_A^2-l^2). \tag{E.38}$$

SC-TA 的场 $\nabla K_{\mathrm{TA}}+J_A(\ell_A-l)\nabla\ell_A$ 一般非保守，其交叉偏导差是

$$-J_A[(\partial_i l)\psi_j-(\partial_j l)\psi_i]. \tag{E.39}$$

[1] Lunjun Zhang and Jimmy Ba. *EMA Policy Gradient: Taming Reinforcement Learning for LLMs with EMA Anchor and Top-k KL*. 2026. arXiv: 2602.04417v1.

取三动作 softmax、$S=\{1\}, A=2$，$(i,j)=(1,2)$ 时该差为 $P_1P_3/(1-P_1)>0$。总体期望仍可为真实梯度，因为参数依赖采样测度的导数补上了额外项。

E.7 配分函数估计与可控展开

命题 E.19 (对数配分函数的 plug-in 偏差)

若 $\widehat{Z}>0$、$\mathbb{E}\widehat{Z}=Z>0$、$\mathbb{E}|\log\widehat{Z}|<\infty$，则 $\mathbb{E}\log\widehat{Z}\le\log Z$，非退化时严格。这个结论不排除使用其他随机构造无偏估计 $\log Z$。

证明 固定 q, f，$Z=\mathbb{E}_q e^f$。精确头部加尾部样本均值无偏估计 Z，但若 $\widehat{Z}>0$、$\mathbb{E}|\log\widehat{Z}|<\infty$，Jensen 给

$$\mathbb{E}\log\widehat{Z}\le\log Z, \tag{E.40}$$

非退化时严格。这个结论只针对 plug-in，不排除其他信息条件下无偏估计 $\log Z$。例如有限词表完全覆盖事件 E 的概率 $c>0$ 已知时，$\mathbf{1}_E\log Z/c$ 是无偏构造，方差为 $(c^{-1}-1)(\log Z)^2$，但通常成本很高。

定理 E.4 (log-of-mean 的偏差与方差展开)

固定有限正分布与头部，$\widehat{Z}_M$ 为有界独立尾部变量均值加确定头部，具有与 M 无关的正下界。若尾部单样本方差为 V，则

$$\mathbb{E}\log\widehat{Z}_M-\log Z=-V/(2MZ^2)+O(M^{-3/2}), \tag{E.41}$$

$$\operatorname{Var}\log\widehat{Z}_M=V/(MZ^2)+O(M^{-3/2}). \tag{E.42}$$

证明 对固定有限正分布，设 $\widehat{Z}_M$ 是有界独立尾部变量的均值加确定头部，且有与 M 无关的正下界。令 $\epsilon=\widehat{Z}_M-Z$，尾部单样本方差为 V。则

$$\mathbb{E}\epsilon=0,\quad \mathbb{E}\epsilon^2=V/M,\quad \mathbb{E}\epsilon^4=O(M^{-2}),\quad \mathbb{E}|\epsilon|^3=O(M^{-3/2}). \tag{E.43}$$

第四矩展开仅留下四索引相同和两两配对项，分别为 $O(M)$、$O(M^2)$，除以 M^4 得结论；第三绝对矩由 Cauchy–Schwarz 控制。log 的三阶导数在统一正区间有界，因此全区间 Taylor 余项满足 $|R_3|\le C|\epsilon|^3$。取期望得到

$$\mathbb{E}\log\widehat{Z}_M-\log Z=-\frac{V}{2MZ^2}+O(M^{-3/2}). \tag{E.44}$$

方差中线性项贡献 $V/(MZ^2)$，其与二次项的交叉由第三矩控制，二次项平方由第四矩控制，故 $\operatorname{Var}\log\widehat{Z}_M=V/(MZ^2)+O(M^{-3/2})$。

定理 E.5 (累积量截断的可控偏差)

固定有限正分布，令 $\varphi(t)=\log\mathbb{E}_q e^{tr}$。用 $M\ge L$ 个独立样本无偏估计前 L 阶累积量，再构造 $\widehat{L}=\sum_{j=1}^{L}\eta^j\widehat{\kappa}_j/j!$，则

$$\mathbb{E}\widehat{L}-\log Z=-\frac{\eta^{L+1}}{L!}\int_0^1(1-u)^L\varphi^{(L+1)}(u\eta)\,du. \tag{E.45}$$

固定阶数下方差为 $O(M^{-1})$。有限阶公式不要求无限 Taylor 级数收敛。

证明 几何信号 $f=\eta r$ 时可改用累积量展开。令 $\varphi(t)=\log\mathbb{E}_q e^{tr}$，指数倾斜分布为 $q_t\propto qe^{tr}$。逐项微分得 $\varphi^{(j)}(t)$ 为 q_t 下第 j 阶累积量。有限阶 Taylor 公式给出

$$\varphi(\eta)=\sum_{j=1}^{L}\frac{\eta^j}{j!}\varphi^{(j)}(0)+\frac{\eta^{L+1}}{L!}\int_0^1(1-u)^L\varphi^{(L+1)}(u\eta)\,du. \tag{E.46}$$

每阶累积量可按集合分拆 π 写成

$$\kappa_j(r)=\sum_{\pi\in\mathcal{P}_j}(|\pi|-1)!(-1)^{|\pi|-1}\prod_{B\in\pi}\mathbb{E}r^{|B|}. \tag{E.47}$$

用互异样本索引的乘积平均替代每个矩乘积，即得到无偏估计，要求样本数 $M \geq j$。独立性逐项保证均值正确。固定阶有界核的两项乘积只在索引交叠时可能有协方差，交叠概率为 $O(1/M)$，故方差及各阶协方差均为 $O(1/M)$。截断估计的偏差正是上式积分余项的负值；无限级数还需位于收敛半径内。

命题 E.20 (头部配分函数的尾部级数估计)

若确定头部 $Z_H > 0$、尾部贡献 $\tau = \mathbb{E}_q u$ 满足 $\tau/Z_H < 1$，则以互异样本乘积无偏估计 τ^j 所得 L 阶 log 尾部展开，仅保留确定截断偏差，其绝对值不超过 $(\tau/Z_H)^{L+1}/(L+1)$。样本数需 $M \geq L$。

证明 另一种展开从确定头部 $Z_H > 0$ 开始。令 $\tau = \mathbb{E}_q u$ 为尾部贡献，若 $\tau/Z_H < 1$，则

$$\log(Z_H + \tau) = \log Z_H + \sum_{j=1}^{L} \frac{(-1)^{j+1}}{j} (\tau/Z_H)^j + R_{L+1}, \quad |R_{L+1}| \leq \frac{(\tau/Z_H)^{L+1}}{L+1}. \tag{E.48}$$

用互异索引乘积的 U-统计量无偏估计 τ^j，样本数 $M \geq L$，留下可控的确定截断偏差。尾部均值小不自动提供逐样本小上界，实际方差仍要由核的矩计算。

E.8 截断、归一化与尾部匹配的差别

命题 E.21 (截断与 Tail-aware 的平方误差比较)

固定正分布 P, Q 和非空真子集 S，令 $H = \sum_{a \in S} P_a \log(P_a/Q_a)$，$\tau_P = P(S^c)$、$\tau_Q = Q(S^c)$，$M = \tau_P \log(\tau_P/\tau_Q)$、$B = \tau_P \, \mathrm{KL}(P^{S^c} \| Q^{S^c}) \geq 0$。则完整 KL 为 $K = H + M + B$，截断值 H 与 Tail-aware 值 $H + M$ 满足

$$(H - K)^2 - (H + M - K)^2 = M(M + 2B). \tag{E.49}$$

因此 Tail-aware 的下界性质不保证其平方误差小于截断值。

证明 在尾部逐点分解 $\log(P_a/Q_a) = \log(\tau_P/\tau_Q) + \log(P_a^{S^c}/Q_a^{S^c})$，求和得 $K = H + M + B$。两个误差分别为 $-(M + B)$ 和 $-B$，平方相减即得公式。M 可正可负。例如取 $P = (0.4, 0.2, 0.4)$、$Q = (0.2, 0.4, 0.4)$、$S = \{1\}$，有 $M = 0.6 \log(3/4) < 0$、$B = 0.2 \log(2/3) + 0.4 \log(4/3) > 0$，且 $M + 2B < 0$，此时差值为正。再保持头尾质量不变并令一个 Q 尾概率趋零，B 无界增长，最终 $M + 2B > 0$，差值转负。两种排序均可发生。

命题 E.22 (归一化头部 KL 对尾 logit 的不敏感性)

令 $P = \mathrm{softmax}(z)$，Q, S 固定，$P_S = \sum_{a \in S} P_a$。归一化头部 KL $K_{\mathrm{norm}} = \mathrm{KL}(P^S \| Q^S)$ 与截断值 H 满足

$$\frac{\partial K_{\mathrm{norm}}}{\partial z_j} = 0, \qquad \frac{\partial H}{\partial z_j} = -P_j(H + P_S), \qquad j \notin S. \tag{E.50}$$

证明 $P_a^S = e^{z_a} / \sum_{i \in S} e^{z_i}$ 不含尾 logit，故第一式成立。对 $a \in S, j \notin S$，$\partial P_a/\partial z_j = -P_a P_j$、$\partial \log(P_a/Q_a)/\partial z_j = -P_j$。对 H 使用乘积法则并求和得第二式。归一化会消去头部总质量，而截断求和仍通过 softmax 分母依赖尾部。

命题 E.23 (尾形状匹配时的残差梯度噪声)

设 $P^{S^c} = Q^{S^c}$，$\ell = \log(\tau_P/\tau_Q)$，$\psi_a = \nabla \log P_a$、$\bar{\psi}_C = \mathbb{E}_{P^{S^c}} \psi$。前文标量桶残差修正 (取 $c = \ell$) 与 SC-TA 的尾形状残差在此点逐样本为零。ResOPD 的零均值残差为 $J_A \ell(\psi_A - \bar{\psi}_C)$，$A \sim P$，其协方差为

$$\tau_P \ell^2 \, \mathrm{Cov}_{P^{S^c}}(\psi). \tag{E.51}$$

该量可严格为正，即使 Tail-aware 的值和梯度已精确。

证明 尾形状匹配给尾 log-ratio 恒为 ℓ，所以标量桶残差修正的值残差及 SC-TA 的形状残差因子均为零。ResOPD 保留 ℓ 乘中心化尾 score；其尾条件均值为零。对二阶矩按 $J_A = \mathbf{1}\{A \notin S\}$ 条件化，即得协方差。例取 $P =$

$(0.4, 0.2, 0.4)$、$Q = (0.7, 0.1, 0.2)$、$S = \{1\}$。两者尾条件分布均为 $(1/3, 2/3)$，$\tau_P = 3/5$、$\ell = \log 2$。分类 softmax 的 $\psi_a = e_a - P$ 给尾协方差迹 $1 - (1/3)^2 - (2/3)^2 = 4/9$，故残差协方差迹为 $4(\log 2)^2/15 > 0$。

E.9 异分布采样与自动微分语义

命题 E.24 (异分布下的双控制项一般耦合)

令 $A \sim \beta$，β 为正分布，$w = P/\beta$，$J_a = \mathbf{1}\{a \notin S\}$。取尾向量 χ_a 满足 $\sum_{a\notin S} P_a \chi_a = 0$，定义零均值控制项 $U_{0,j} = (J_A w_A - \tau_P) e_j$、$U_1 = J_A w_A \chi_A$。则其 Gram 交叉项为

$$\mathbb{E}_\beta \langle U_{0,j}, U_1 \rangle = \sum_{a\notin S} \frac{P_a^2}{\beta_a} \langle e_j, \chi_a \rangle. \tag{E.52}$$

在 $\beta = P$ 时该项为零，一般 β 下不为零。

证明 $\mathbb{E}_\beta J_A w_A = \tau_P$、$\mathbb{E}_\beta J_A w_A \chi_A = 0$ 保证两个控制项均值为零。展开内积，常数 $-\tau_P$ 对应项因后一等式消去，其余项中的 $\beta_a w_a^2 = P_a^2/\beta_a$ 给所述结果。例如在两点全尾集合上，取 $P = (1/2, 1/2)$、$\beta = (1/4, 3/4)$ 和一维 $\chi = (1, -1)$，交叉项为 $1 - 1/3 = 2/3$。因此两个系数的联合最优值应解完整 Gram 线性系统，不能分别按正交控制项优化。

命题 E.25 (停止梯度的双参数表示)

设样本 a 固定，$S(\theta, \bar\theta, a)$ 对两参数可微。冻结第二参数后在对角线取值的反传场定义为

$$B(\theta, a) = \partial_1 S(\theta, \bar\theta, a)|_{\bar\theta=\theta}. \tag{E.53}$$

而前向数值函数 $s(\theta, a) = S(\theta, \theta, a)$ 的普通导数为

$$\nabla s(\theta, a) = B(\theta, a) + \partial_2 S(\theta, \bar\theta, a)|_{\bar\theta=\theta}. \tag{E.54}$$

若动作分布 P_θ 也随参数变化，则

$$\nabla \mathbb{E}_{P_\theta} s = \mathbb{E}_{P_\theta}[\nabla s + s \nabla \log P_\theta]. \tag{E.55}$$

证明 第一式是复合映射 $\theta \mapsto (\theta, \theta)$ 的链式法则。第二式在有限词表上直接对 $\sum_a P_\theta(a) s(\theta, a)$ 使用乘积法则。这两个额外项分别来自被停止的参数路径和采样测度。因此前向数值相同、固定样本反传相同、总体梯度相同是三个需要分别核对的命题。即使 B 连续，也需满足相应可积条件才能将它称为某个标量目标的梯度。

命题 E.26 (前缀混合下的误差与方差口径)

设前缀 $s \sim d$，估计器 $\widehat{K}$ 的条件偏差为 $c(s) = \mathbb{E}[\widehat{K} \mid s] - K(s)$，条件方差为 $V(s)$。只要二阶矩有限，

$$\mathbb{E}[\widehat{K} - K(s)] = \mathbb{E}_d c(s), \tag{E.56}$$

$$\mathbb{E}[(\widehat{K} - K(s))^2] = \mathbb{E}_d[V(s) + c(s)^2], \tag{E.57}$$

$$\mathrm{Var}(\widehat{K}) = \mathbb{E}_d V(s) + \mathrm{Var}_d(K(s) + c(s)). \tag{E.58}$$

证明 条件化后误差均值为 $c(s)$，其平方均值为 $V(s) + c(s)^2$，对 d 平均得前两式。对估计器本身使用全方差公式得第三式。跨前缀原始数值方差包含真实目标 $K(s)$ 的变化，不能用它替代估计误差的均方值或条件采样方差。

附录 F 条件中心与有限样本拟合

F.1 中心估计代入损失后的对象

固定前缀、锚点和候选参数，记 $h_a = U_a - f_a$、$R = C_q h$、$\psi_a = \nabla \log p_a$。BPO 梯度为 $\eta^{-1}\operatorname{Cov}_q(h, \psi)$。这里中心化是损失定义的一部分；用于 score 估计的额外 baseline 是另一个选择。

命题 F.1 (独立冻结中心的 Mean 梯度)

若 $\widehat{c}_f$ 与主动作 $A \sim q$ 独立，二阶矩有限，分布不依赖学生参数，且 $\mathbb{E}\widehat{c}_f = \mathbb{E}_q f$，则

$$\mathbb{E}[\tfrac{1}{2}(U_A - f_A + \widehat{c}_f)^2] = L_{\text{Mean}} + \tfrac{1}{2}\operatorname{Var}(\widehat{c}_f), \tag{F.1}$$

直接反传梯度的期望等于 ∇L_{Mean}。

证明 对 Mean，设 $\widehat{c}_f$ 与主动作 $A \sim q$ 独立，且其分布不依赖学生参数，$\mathbb{E}\widehat{c}_f = \mathbb{E}_q f$。平方展开给出

$$\mathbb{E}\left[\tfrac{1}{2}(U_A - f_A + \widehat{c}_f)^2\right] = L_{\text{Mean}} + \tfrac{1}{2}\operatorname{Var}(\widehat{c}_f). \tag{F.2}$$

独立零均值误差使交叉项消失，最后一项与学生无关，因此梯度无偏。只知道数值估计无偏而没有独立性时，不能做此抵消。

命题 F.2 (BPO 辅助中心的有限样本修正)

若主动作 A 与 M 个辅助动作独立同分布于 q，$\bar{h}_B = M^{-1}\sum_j h_{B_j}$，则

$$\mathbb{E}(h_A - \bar{h}_B)^2 = (1 + 1/M)\operatorname{Var}_q h. \tag{F.3}$$

乘以 $M/(M+1)$ 后的平方损失除以 2η，对 BPO 损失及其直接反传梯度无偏。留一中心使用 $M-1$ 个辅助动作时修正系数为 $(M-1)/M$。

证明 对 BPO，令主动作 A 和 M 个辅助动作 B_j 独立同分布于 q。记 $\bar{h}_B = M^{-1}\sum_j h_{B_j}$。独立性给出

$$\mathbb{E}(h_A - \bar{h}_B)^2 = (1 + M^{-1})\operatorname{Var}_q h. \tag{F.4}$$

因此 $\frac{M}{M+1}(h_A - \bar{h}_B)^2/(2\eta)$ 对损失和直接反传梯度均无偏。与 Mean 不同，辅助中心含有学生参数，额外方差项的导数不能丢掉。同前缀共 $M \geq 2$ 个动作的留一中心对应倍率 $(M-1)/M$。

F.2 无中心样本方差与 U-统计量

引理 F.1 (BPO 的成对表示)

固定 q，独立动作 $a, b \sim q$ 满足

$$L_{\text{BPO}} = \frac{1}{4\eta}\mathbb{E}(h_a - h_b)^2, \qquad \nabla L_{\text{BPO}} = \frac{1}{2\eta}\mathbb{E}[(h_a - h_b)(\psi_a - \psi_b)]. \tag{F.5}$$

在 softmax 参数化中，差值消去学生配分函数和两个条件中心。

证明 两个独立动作给出

$$L_{\text{BPO}} = \frac{1}{4\eta}\mathbb{E}_{a,b\sim q}(h_a - h_b)^2, \qquad \boldsymbol{G} = \nabla L_{\text{BPO}} = \mathbb{E}_{a,b}\frac{(h_a - h_b)(\psi_a - \psi_b)}{2\eta}. \tag{F.6}$$

逐项展开利用 $\mathbb{E}h_a h_b = (\mathbb{E}h)^2$ 即证。若 $p = \operatorname{softmax}(z)$，$h_a - h_b = z_a - z_b - \log(q_a/q_b) - (f_a - f_b)$，学生配分函数与两个条件中心全部消失。

命题 F.3 (样本方差 BPO 的无偏性)

对 $M \geq 2$ 个独立锚点动作，

$$\widehat{L}_M = \frac{\sum_i (h_i - \bar{h})^2}{2\eta(M-1)}, \qquad \nabla \widehat{L}_M = \frac{\sum_i (h_i - \bar{h})\psi_i}{\eta(M-1)} \tag{F.7}$$

分别无偏估计 BPO 损失与梯度，并等于全部无序样本对核的平均。

证明 对 $M \geq 2$ 个独立动作，定义

$$\widehat{L}_M = \frac{\sum_i (h_i - \bar{h})^2}{2\eta(M-1)}, \qquad \nabla \widehat{L}_M = \frac{\sum_i (h_i - \bar{h})\psi_i}{\eta(M-1)}. \tag{F.8}$$

恒等式 $\sum_{i<j}(h_i - h_j)^2 = M\sum_i (h_i - \bar{h})^2$ 使其等于成对核的 U-统计量平均。每一对的均值正确，故整体无偏；各对相互相关，不能把方差简单除以对数。

定理 F.1 (消去中心的精确方差代价)

令成对梯度核 $H(a,b) = (h_a - h_b)(\psi_a - \psi_b)/(2\eta)$ 的迹方差为 V_2。令精确双中心估计器

$$g_c(a) = \frac{(h_a - \mathbb{E}_q h)(\psi_a - \mathbb{E}_q \psi)}{\eta}, \qquad V_c = \mathrm{Var}_q\, g_c. \tag{F.9}$$

则

$$\mathrm{Var}(\nabla \widehat{L}_M) = \frac{(M-2)V_c + 2V_2}{M(M-1)}, \qquad \mathrm{Var}(\nabla \widehat{L}_M) - \frac{V_c}{M} = \frac{2V_2 - V_c}{M(M-1)} \geq 0. \tag{F.10}$$

证明 对 b 条件积分，展开乘积得到 $\mathbb{E}_b H(a,b) = [g_c(a) + \boldsymbol{G}]/2$。令

$$H_1(a) = \mathbb{E}_b H(a,b) - \boldsymbol{G} = (g_c(a) - \boldsymbol{G})/2, \quad H_2(a,b) = H(a,b) - \boldsymbol{G} - H_1(a) - H_1(b). \tag{F.11}$$

有 $\mathbb{E}H_1 = 0$、$\mathbb{E}[H_2(a,b) \mid a] = \mathbb{E}[H_2(a,b) \mid b] = 0$。因此一阶项与二阶余项正交，两不同配对的二阶余项即使共用一个索引，其协方差也由条件零均值消失。单对核给出 $V_2 = 2\,\mathrm{Var}\, H_1 + \mathrm{Var}\, H_2 = V_c/2 + \mathrm{Var}\, H_2$。

样本平均核的中心化表达为

$$\frac{2}{M}\sum_i H_1(a_i) + \binom{M}{2}^{-1} \sum_{i<j} H_2(a_i, a_j). \tag{F.12}$$

第一项方差为 $4\,\mathrm{Var}\, H_1/M$，第二项为 $\mathrm{Var}\, H_2/\binom{M}{2}$，交叉项为零。代入 $\mathrm{Var}\, H_1 = V_c/4$ 与 $\mathrm{Var}\, H_2 = V_2 - V_c/2$ 并整理，即得公式及非负性。

命题 F.4 (排除重复动作的半正定改进)

先抽 $a \sim q$，再抽 $b \sim q(\cdot \mid b \neq a)$，使用加权核 $H_{\mathrm{nr}} = (1 - q_a)H(a,b)$。则均值仍为 $\boldsymbol{G}$，且

$$\mathrm{Cov}_{q\otimes q}\, H - \mathrm{Cov}_{\mathrm{nr}}\, H_{\mathrm{nr}} = \mathbb{E}_{q\otimes q}[q_a H(a,b) H(a,b)^\top] \succeq 0. \tag{F.13}$$

证明 有序对概率为 $q_a q_b/(1-q_a)$，且 $H(a,a) = 0$。乘以一个 $(1-q_a)$ 后求和恢复独立抽样均值；外积含两个权重，故二阶矩变为 $\mathbb{E}_{q\otimes q}[(1-q_a)HH^\top]$。两个均值相同，协方差之差等于二阶矩之差，每项均为非负权重的外积。正支持且至少二动作保证 $1 - q_a > 0$。

命题 F.5 (成对 BPO 的重要性校正)

若独立动作 $a, b \sim \beta$ 且 β 覆盖 q，则

$$\frac{q_a q_b}{\beta_a \beta_b} \frac{(h_a - h_b)^2}{4\eta} \tag{F.14}$$

对 BPO 损失无偏；冻结比率后，其反传梯度也无偏。权重应作用于成对损失，不能先乘单动作 residual 再平方。

证明 若两个独立动作来自另一个提案 β，成对损失需乘 $(q_a/\beta_a)(q_b/\beta_b)$。先对单动作 residual 乘权重再平方，会产生错误的权重平方。

F.3 教师中心的有符号与非负估计

命题 F.6 (两种无偏教师中心估计及尾部反例)

令 $\phi(x) = x - 1 - A(x)$。独立锚点样本的 $-\overline{A}$ 与 $\overline{\phi}$ 均对 K_T 无偏，后一种逐样本非负。非负性不保证更小方差：存在二元正分布族，使前者的方差趋零而后者发散。

证明 记 $\rho = T/q$、$A = A_{\kappa,\eta}$、$\phi(\rho) = \rho - 1 - A(\rho)$。两个无偏估计为

$$\widehat{K}_- = -M^{-1}\sum_i A(\rho_i), \qquad \widehat{K}_+ = M^{-1}\sum_i \phi(\rho_i), \qquad a_i \overset{\text{iid}}{\sim} q. \tag{F.15}$$

ϕ 凸且在一处值与导数为零，所以第二个逐样本非负。第一种方差为 $V_{\kappa,\eta}/M$。非负不保证更小方差：取 $q = (\epsilon, 1-\epsilon)$、$T = (1/2, 1/2)$，固定正 $\kappa, \eta < 1$。稀有项的 $A = O(\log(1/\epsilon))$，有符号估计方差趋零；$\phi \sim 1/(2\epsilon)$，非负估计方差按 $1/(4\epsilon)$ 发散。

命题 F.7 (中心估计的局部方差阶数)

设 $\rho = 1 + \epsilon u$、$\mathbb{E}_q u = 0$、u 有界，参数 κ, η 固定。令 $c_0 = 1 - \kappa(1-\eta)$，则

$$\operatorname{Var}_q(-A) = \epsilon^2 \mathbb{E}_q u^2 + O(\epsilon^3), \qquad \operatorname{Var}_q \phi = \tfrac{1}{4} c_0^2 \epsilon^4 \operatorname{Var}_q u^2 + O(\epsilon^5). \tag{F.16}$$

证明 局部情况不同。若 $\rho = 1 + \epsilon u$、$\mathbb{E}_q u = 0$ 且 u 有界，令 $c_0 = 1 - \kappa(1-\eta)$，则

$$-A = -\epsilon u + \tfrac{1}{2} c_0 \epsilon^2 u^2 + O(\epsilon^3), \qquad \phi = \tfrac{1}{2} c_0 \epsilon^2 u^2 + O(\epsilon^3). \tag{F.17}$$

两种方差分别为 $\epsilon^2 \mathbb{E}_q u^2 + O(\epsilon^3)$ 与 $\tfrac{1}{4} c_0^2 \epsilon^4 \operatorname{Var}_q u^2 + O(\epsilon^5)$。这需要比率一致接近一，不能只用 KL 小替代。

命题 F.8 (同样本中心化的信号改变与倍率)

同动作使用 $\phi = \rho - 1 - A$ 估计中心时，$A + \phi = \rho - 1$，消去原形状信号。对 M 个独立样本使用共同经验均值时，

$$\mathbb{E}[M^{-1}\sum_i (A_i - \bar{A})\psi_i] = \frac{M-1}{M} \operatorname{Cov}_q(A, \psi). \tag{F.18}$$

证明 同动作估计中心尤其需要核对：若用该动作的 ϕ 补到 A 上，逐样本有 $A + \phi = \rho - 1$，形状变换被完全抵消。若用同一组 M 个样本减去经验均值，

$$\mathbb{E}\left[M^{-1}\sum_i (A_i - \bar{A})\psi_i\right] = \frac{M-1}{M} \operatorname{Cov}_q(A, \psi). \tag{F.19}$$

展开双重和，同索引项 M 个、异索引项 $M(M-1)$ 个，即得到该系数；$M = 1$ 时更新为零。

命题 F.9 (跨前缀中心化的总方差分解)

在冻结前缀测度 d 下，若二阶矩有限，记 $V_s = \operatorname{Var}_{q(\cdot|s)} A_s$，则

$$\operatorname{Var}_{d,q} A = \mathbb{E}_d V_s + \operatorname{Var}_d K_T(s), \qquad \operatorname{Var}_{d,q}(A + K_T) = \mathbb{E}_d V_s. \tag{F.20}$$

因此精确条件中心化只移除跨前缀均值差异，不改变单个前缀的标量条件方差。

证明 固定前缀的精确中心化不改变标量条件方差。跨冻结前缀测度 d，记 $V_s = \operatorname{Var}_{q(\cdot|s)} A_s$，则全方差公式给出 $\operatorname{Var}_{d,q} A = \mathbb{E}_d V_s + \operatorname{Var}_d K_T(s)$，而 $\operatorname{Var}_{d,q}(A + K_T) = \mathbb{E}_d V_s$。中心化移除不同前缀的均值差异；这不直接推出乘以 score 后的参数梯度方差排序。

F.4 有界包络与头尾区间

定理 F.2 (有界非负无偏中心估计)

设 $0<\kappa\le 1, 0<\eta<1$、$c=-\log(1-\eta)/(\kappa\eta)$，取 $\mu_c=(1-1/c)q+T/c$。则 $Z=q_a\phi(\rho_a)/\mu_c(a)$、$a\sim\mu_c$ 满足

$$\mathbb{E}Z=K_T,\quad 0\le Z\le c,\quad \operatorname{Var}Z\le K_T(c-K_T). \tag{F.21}$$

M 次独立平均的偏差概率不超过 $2e^{-2M\epsilon^2/c^2}$。整个分布类上的无偏估计器不能具有小于 c 的统一样本上界。

♡

证明 当 $\kappa>0,\eta<1$，$c=-\log(1-\eta)/(\kappa\eta)>1$，且 $0\le\phi(x)\le x+c-1$。定义

$$\mu_c=(1-1/c)q+T/c,\qquad Z(a)=q_a\phi(\rho_a)/\mu_c(a). \tag{F.22}$$

则 $\mathbb{E}_{\mu_c}Z=K_T$、$0\le Z\le c$。由于 $Z^2\le cZ$，

$$\operatorname{Var}_{\mu_c}Z\le K_T(c-K_T)\le c^2/4. \tag{F.23}$$

独立平均 M 次后方差除以 M，Hoeffding 给 $\Pr(|\widehat{K}-K_T|\ge\epsilon)\le 2e^{-2M\epsilon^2/c^2}$。整个分布类上 K_T 可逼近 c，所以任何无偏估计器的统一样本上界不能低于 c。

命题 F.10 (混合提案的统一范围与输入方差)

取 $\mu_\zeta=(1-\zeta)q+\zeta T$、$0<\zeta<1$。非负中心估计的逐样本统一上确界为 $C_\zeta=\max\{(c-1)/(1-\zeta),1/\zeta\}$，唯一由 $\zeta=1/c$ 最小化。固定输入时的方差是 ζ 的凸函数，其最小点不必等于 $1/c$。

♠

证明 一般混合 $\mu_\zeta=(1-\zeta)q+\zeta T$ 的逐样本上确界为

$$C_\zeta=\max\{(c-1)/(1-\zeta),1/\zeta\}. \tag{F.24}$$

两个值分别由 $\rho\to 0,\infty$ 逼近。使统一范围最小的唯一权重是 $\zeta=1/c$。固定输入的方差则为 $\mathbb{E}_q[\phi(\rho)^2/(1+\zeta(\rho-1))]-K_T^2$，二阶导数为

$$2\mathbb{E}_q\frac{\phi(\rho)^2(\rho-1)^2}{[1+\zeta(\rho-1)]^3}\ge 0. \tag{F.25}$$

所以输入方差最优权重可经一维凸优化得到，但一般不同于最小统一范围权重。

命题 F.11 (头尾质量给出的中心区间)

固定头部 S，令 $\delta=q(S^c)>0,\tau=T(S^c)>0,K_S^T=-\sum_S q_aA(\rho_a)$。则

$$K_S^T-\delta A(\tau/\delta)\le K_T\le K_S^T+\delta c. \tag{F.26}$$

嵌套扩大头部时，下界非减、上界非增；尾部为空时直接取精确头部积分。

♠

证明 保留头部 S，尾部质量为 $\delta=q(S^c)$、$\tau=T(S^c)$。令 $K_S^T=-\sum_S q_aA(\rho_a)$。尾部条件均值 $\mathbb{E}_{q^{\text{tail}}}\rho=\tau/\delta$，由 $-A$ 凸以及 $-A\le c$，

$$K_S^T-\delta A(\tau/\delta)\le K_T\le K_S^T+\delta c. \tag{F.27}$$

扩大嵌套头部时，下界由 Jensen 非减，上界每加入动作减少 $q_a[c+A(\rho_a)]\ge 0$，故非增。尾部为空时直接取精确头部值，不计算零质量比。

定理 F.3 (确定区间内的无偏中心估计)

设头尾区间为 $[L,U]$、$w=U-L$，并能查询及采样所需的条件尾部分布。若 $w>0$，存在尾部提案及随机变量 $Y\in[0,w]$，使

$$\widehat{K}=L+M^{-1}\sum_i Y_i,\quad \mathbb{E}\widehat{K}=K_T,\quad L\le\widehat{K}\le U,\quad \operatorname{Var}\widehat{K}\le(K_T-L)(U-K_T)/M. \tag{F.28}$$

$w=0$ 时直接返回 L。♡

证明 还能构造始终落在区间内的无偏估计。令 $r_0=\tau/\delta$、$H=\sum_S q\phi$，

$$L=H+\delta\phi(r_0),\quad U=H+\tau+(c-1)\delta,\quad w=U-L. \tag{F.29}$$

取凸余项 $g(x)=\phi(x)-\phi(r_0)-\phi'(r_0)(x-r_0)$，令 $u=A'(r_0)>0$、$v=c+A(r_0)-r_0u\ge0$。$v\ge0$ 来自凹函数 A 的切线在零处不低于 $A(0)=-c$。于是 $0\le g(x)\le ux+v$，且

$$\sum_{S^c}q_ag(\rho_a)=K_T-L,\quad u\tau+v\delta=w. \tag{F.30}$$

若 $w>0$，在尾部取 $\nu_a=(uT_a+vq_a)/w$、$Y=q_ag(\rho_a)/\nu_a$，则 $0\le Y\le w$。因此

$$\widehat{K}=L+M^{-1}\sum_i Y_i,\quad \mathbb{E}\widehat{K}=K_T,\quad L\le\widehat{K}\le U,\quad \operatorname{Var}\widehat{K}\le(K_T-L)(U-K_T)/M. \tag{F.31}$$

证明分别由期望相消和 $Y^2\le wY$ 得到。$w=0$ 时直接返回 L。该方案要求能从条件尾部分布采样并查询抽中动作概率；只有头部和尾部总质量时不能恢复未知尾部形状。

F.5 中心误差、baseline 与更新场

命题 F.12 (近似中心的 score 梯度偏差)

固定候选参数，学生、教师中心误差 e_S,e_T 与主动作无关。原始 score 形式的 BPO 梯度偏差为

$$\widehat{g}-g=(e_S/\eta-e_T)\mathbb{E}_q\psi. \tag{F.32}$$

若误差依赖主动作，则应保留误差与 score 的联合期望，不能只使用误差均值。♠

证明 设学生、教师中心误差分别为 $e_S=\widehat{K}_S-K_S$、$e_T=\widehat{K}_T-K_T$。原始 score 形式的梯度误差为

$$\widehat{g}-g=(e_S/\eta-e_T)\mathbb{E}_q\psi. \tag{F.33}$$

在 $p=q$ 时该均值为零，一般内层不为零。若中心与主动作相关，需保留 $\mathbb{E}[e(A)\psi_A]$，不能把误差提出期望。

命题 F.13 (精确学生中心下的教师中心误差)

若学生中心精确、教师误差为冻结常数 e_T，直接反传的平方损失只增加 $\eta e_T^2/2$，梯度不变。使用中心化 score 的单动作估计在 $p=m$ 处仍有方差 $e_T^2\mathbb{E}_q\|\psi-\mathbb{E}_q\psi\|^2$。学生反馈变量 $y=C_qU/\eta-A$ 则满足 $\mathbb{E}_q y=K_T$、$\operatorname{Var}_q y=2L_{\mathrm{BPO}}/\eta$。♠

证明 若学生中心精确、教师误差为冻结常数 e_T，直接微分平方损失时，残差变为 $R-\eta e_T$。由于 $\mathbb{E}_qR=0$，损失仅增加 $\eta e_T^2/2$，梯度不变；对应的 score 应为 $(R/\eta-e_T)(\psi-\mathbb{E}_q\psi)$。在目标点 $p=m$，其采样噪声为

$$e_T^2\mathbb{E}_q\|\psi-\mathbb{E}_q\psi\|^2. \tag{F.34}$$

完整求和精确抵消该噪声，单动作抽样则保留。用学生反馈 $y=C_qU/\eta-A$ 估计同一个教师中心时，$\mathbb{E}_q y=K_T$ 且 $\operatorname{Var}_q y=2L_{\mathrm{BPO}}/\eta$，噪声可随拟合消失。

命题 F.14 (动态中心误差与保守性)

若 e_T 冻结而 $e_S(\theta)$ 可微，近似 score 场与真梯度之差为 $-(e_S/\eta - e_T)\nabla K_S$，其 Jacobian 在 $\nabla e_S, \nabla K_S$ 不平行时一般不对称。直接反传近似平方损失则比该场多出 $\mathbb{E}_q \widehat{R}\nabla\widehat{K}_S/\eta$。

证明 若 e_S 随参数变化，式 (F.33) 的场含 $-(e_S/\eta - e_T)\nabla K_S$。其反对称 Jacobian 一般不为零，因为 ∇e_S 与 ∇K_S 未必平行。直接微分含近似中心的平方损失则多出 $\mathbb{E}_q \widehat{R}\nabla\widehat{K}_S/\eta$，得到另一个保守场。有限中心近似后，两种反传方式需要分别定义。

命题 F.15 (最优 score baseline 与随机中心的条件)

在锚点 $p = q$，若 $\mathbb{E}_q\|\psi\|^2 > 0$，最小化 $(A-b)\psi$ 迹方差的常数为

$$b_\star = \frac{\mathbb{E}_q[A\|\psi\|^2]}{\mathbb{E}_q\|\psi\|^2}, \qquad V_g(b) - V_g(b_\star) = \mathbb{E}_q\|\psi\|^2(b-b_\star)^2. \tag{F.35}$$

独立随机 baseline 相对其均值再增加其方差乘以 score 二阶矩；仅有 baseline 数值无偏而没有独立性，不保证梯度无偏。

证明 在锚点 $p = q$，action-independent baseline b 不改变 $\mathbb{E}_q[(A-b)\psi]$ 的均值。最小迹方差的选择为

$$b_\star = \frac{\mathbb{E}_q[A\|\psi\|^2]}{\mathbb{E}_q\|\psi\|^2}, \quad V_g(b) - V_g(b_\star) = \mathbb{E}_q\|\psi\|^2(b-b_\star)^2. \tag{F.36}$$

这是对加权二次式配方的结果，不一般等于 $\mathbb{E}_q A$。重要性采样估计器改用权重 $(p/q)^2\|\psi_p\|^2$。对普通 BPO 的 q 测度，离开锚点后随意改 baseline 会改变均值，除非保留补偿或使用精确中心化 score。

独立随机 baseline 额外增加其方差乘以相应 score 二阶矩。同样本 baseline 即使数值无偏也可能有偏：取 baseline 等于该动作的信号，整个更新逐样本为零。跨前缀 token 不能替代同前缀独立辅助动作。

F.6 平方根包络的定量收益

命题 F.16 (小步平方根中心的半方差界)

固定 q, T，取 $\kappa = 1/2$ 并令 $\eta \downarrow 0$。此时 $A_0(\rho) = 2(\sqrt{\rho}-1)$，$\phi_0(\rho) = (\sqrt{\rho}-1)^2$，$K = H^2(q,T) = 2 - 2\sum_a \sqrt{q_a T_a}$。包络采样分布趋于 $\mu = (q+T)/2$，其单样本中心估计为

$$Z_0(a) = \frac{2(\sqrt{T_a} - \sqrt{q_a})^2}{T_a + q_a}, \qquad a \sim \mu. \tag{F.37}$$

它满足

$$0 \le Z_0 \le 2, \quad \mathbb{E}_\mu Z_0 = K, \quad \mathrm{Var}_\mu\, Z_0 \le K(2-K) \le \tfrac{1}{2}K(4-K). \tag{F.38}$$

其中 $K(4-K) = \mathrm{Var}_q\, A_0$ 为有符号中心估计的方差。

证明 由 $c = -\log(1-\eta)/(\kappa\eta) \to 2$，前文的 μ_c 趋于 μ。将 $q\phi_0/\mu$ 展开得 Z_0。非负性和 $(\sqrt{T} - \sqrt{q})^2 \le T + q$ 给范围界，按 μ 求和给均值 K。由 $Z_0^2 \le 2Z_0$ 得方差不超过 $2K - K^2$。另外 $\mathbb{E}_q\sqrt{\rho} = a$、$\mathbb{E}_q\rho = 1$ 给 $\mathrm{Var}_q\, A_0 = 4(1-a^2) = K(4-K)$。$0 \le K \le 2$ 上 $2 - K \le (4-K)/2$，故得到半方差界。

推论 F.1 (独立中心后的统一优势方差)

在上述小步极限下，以 $M \ge 1$ 个独立包络样本的均值估计 K，并与主动作 $A \sim q$ 独立，则无偏优势估计满足

$$\mathrm{Var}[A_0(\rho_A) + \widehat{K}] \le K(4-K) + \frac{K(2-K)}{M} \le 4 + \frac{1}{M(M+1)}. \tag{F.39}$$

$M = 1$ 时上界为 $9/2$；使用独立有符号中心时相应统一界为 8。

证明 独立性使方差相加，M 个独立样本的均值方差缩小 M 倍。关于 K 的二次式为 $(4+2/M)K - (1+1/M)K^2$，

在 $K_\star = (2M+1)/(M+1) \in [0,2]$ 达到最大值 $4+1/[M(M+1)]$。有符号中心在 $M=1$ 时则为 $2K(4-K) \le 8$。这里比较的是固定前缀的标量优势，不将其直接等同于参数梯度方差。

F.7 增加精确头部时的实际方差

命题 F.17 (固定包络尾采样的方差单调性)

固定 q, T, κ, η，令 $c = -\log(1-\eta)/(\kappa\eta)$、$u_a = T_a + (c-1)q_a$、$\phi(\rho) = \rho - 1 - A(\rho)$。对头部 S 和非空尾部 $C = S^c$，记 $H_S = \sum_{a\in S} q_a\phi(\rho_a)$、$U_C = \sum_{a\in C} u_a$。取 $A \sim \nu_C$，$\nu_C(a) = u_a/U_C$，则

$$\widehat{K}_S = H_S + U_C \frac{q_A\phi(\rho_A)}{u_A} \tag{F.40}$$

无偏。扩大精确头部时，其实际方差不增加；尾部为空时采用精确总和。

证明 期望中的 u_A 与采样概率消去，得到尾部精确总和，故无偏。将新尾部记为 $C' \subset C$，若非空，令 $p = U_{C'}/U_C$，并在旧尾分布下定义 $Y = U_C q_A\phi(\rho_A)/u_A$。新估计器的随机部分与 pY 在事件 $A \in C'$ 下的条件分布相同。于是

$$\mathrm{Var}(\widehat{K}_{S'}) = p^2\,\mathrm{Var}(Y \mid A \in C') \le p\,\mathrm{Var}(Y \mid A \in C') \le \mathrm{Var}(Y). \tag{F.41}$$

最后一步用事件分割的全方差公式，其余条件方差和条件均值方差都非负。若 $p=0$，新估计精确，方差为零。此结论固定每个动作的包络权重 u_a；前文为收紧确定区间而重新构造的切线包络不自动具有这一方差单调性。

F.8 Part 与 Mean 的常数误差

命题 F.18 (配分函数及信号中心误差的精确梯度偏差)

固定 q, f，令 $\psi_a = \nabla \log p_a$。Part 的残差为 $U_a - f_a + \log Z$，若冻结的 $\widehat{\log Z} = \log Z + \delta_Z$，其平方损失梯度偏差为

$$\nabla\widehat{L}_{\mathrm{Part}} - \nabla L_{\mathrm{Part}} = \delta_Z \mathbb{E}_q\psi. \tag{F.42}$$

Mean 的残差为 $U_a - f_a + \mathbb{E}_q f$，若冻结中心误差为 δ_f，则偏差为 $\delta_f\mathbb{E}_q\psi$。在 $p=q$ 时二者为零。

证明 两个损失均为残差平方的 q 均值除以二。冻结常数不参与求导，残差导数均为 ψ。误差项与原梯度相减，只剩相应常数乘 $\mathbb{E}_q\psi$。在 $p=q$ 时 score 恒等式给 $\mathbb{E}_q\psi = \mathbb{E}_p\psi = 0$。若使用未缩放信号 r 且 $f = \eta r$，其中心误差 δ_r 应先换算为 $\delta_f = \eta\delta_r$。若常数随参数反传或与动作相关，则分别还需保留常数导数或条件交叉项，不能直接套用上述冻结公式。

附录 G 外层动力学、扰动与序列边界

G.1 幂均值的 escort 轨迹

命题 G.1 (escort 坐标中的精确直线轨迹)

设 $0<\kappa\le 1$，$E_\kappa(q)_a=q_a^\kappa/S_\kappa(q)$、$S_\kappa(q)=\sum_a q_a^\kappa$。幂均值更新满足

$$E_\kappa(m)=(1-b)E_\kappa(q)+bE_\kappa(T),\quad b=\frac{\eta S_\kappa(T)}{(1-\eta)S_\kappa(q)+\eta S_\kappa(T)}. \tag{G.1}$$

固定教师的全部精确外层迭代位于初始 escort 分布与教师 escort 分布的同一条直线上。

证明 对 $\kappa>0$，定义 $S_\kappa(q)=\sum_a q_a^\kappa$ 和 escort 分布 $E_\kappa(q)_a=q_a^\kappa/S_\kappa(q)$。它的逆为 $q_a\propto E_\kappa(q)_a^{1/\kappa}$。对幂均值目标取 κ 次幂，公共归一化消去，得

$$E_\kappa(m)=(1-b)E_\kappa(q)+bE_\kappa(T),\quad b=\frac{\eta S_\kappa(T)}{(1-\eta)S_\kappa(q)+\eta S_\kappa(T)}. \tag{G.2}$$

因此固定教师的精确轨迹在 escort 坐标中位于同一条直线：

$$E_\kappa(q_n)-E_\kappa(T)=\prod_{j<n}(1-b_j)[E_\kappa(q_0)-E_\kappa(T)]. \tag{G.3}$$

定理 G.1 (escort 距离收缩与近似输出误差)

固定正教师、有限词表及 $0<\kappa\le 1, 0<\eta<1$。令 $c=(1-\eta)V^{1-\kappa}/[(1-\eta)V^{1-\kappa}+\eta S_\kappa(T)]<1$。令 $d_\kappa(P,Q)=\|E_\kappa(P)-E_\kappa(Q)\|_1$。若 $d_\kappa(q_{n+1},m(q_n,T))\le\epsilon_n$，则

$$d_\kappa(q_n,T)\le c^n d_\kappa(q_0,T)+\sum_{j<n}c^{n-1-j}\epsilon_j. \tag{G.4}$$

若 $\limsup\epsilon_n\le\epsilon_\infty$，稳态距离不超过 $\epsilon_\infty/(1-c)$；精确更新收敛到 T。

证明 词表大小为 V，Jensen 给 $S_\kappa(q)\le V^{1-\kappa}$。令

$$c=\frac{(1-\eta)V^{1-\kappa}}{(1-\eta)V^{1-\kappa}+\eta S_\kappa(T)}<1. \tag{G.5}$$

定义距离

$$d_\kappa(q,T)=\|E_\kappa(q)-E_\kappa(T)\|_1. \tag{G.6}$$

精确更新满足 $d_\kappa(q_{n+1},T)\le c\,d_\kappa(q_n,T)$。设近似输出的误差满足

$$d_\kappa(q_{n+1},m(q_n,T))\le\epsilon_n. \tag{G.7}$$

三角不等式给

$$d_\kappa(q_n,T)\le c^n d_\kappa(q_0,T)+\sum_{j<n}c^{n-1-j}\epsilon_j. \tag{G.8}$$

若 $\limsup\epsilon_n\le\epsilon_\infty$，拆开有限前缀与充分晚的尾和，得到 $\limsup d_\kappa(q_n,T)\le\epsilon_\infty/(1-c)$。这是到固定教师的定向收缩，不声称两任意锚点间有相同收缩常数。

命题 G.2 (自然梯度流的 escort 表达与几何极限)

沿幂散度的自由自然梯度流，

$$\frac{d}{dt}E_\kappa(q)=\frac{S_\kappa(T)}{S_\kappa(q)}[E_\kappa(T)-E_\kappa(q)]. \tag{G.9}$$

因此正时间重参数化后是线性趋近教师的流。固定正 q 时，$\frac{V}{\kappa}(E_\kappa(q)_a-1/V)\to\log q_a-V^{-1}\sum_b\log q_b$。

证明 连续流也有同一轨迹。令 $a_\kappa = \mathbb{E}_q(T/q)^\kappa$，由 $\dot q_a = q_a[(T_a/q_a)^\kappa - a_\kappa]/\kappa$ 得

$$\frac{d}{dt}q_a^\kappa = T_a^\kappa - a_\kappa q_a^\kappa, \qquad \frac{d}{dt}E_\kappa(q) = \frac{S_\kappa(T)}{S_\kappa(q)}[E_\kappa(T) - E_\kappa(q)]. \tag{G.10}$$

重新定义时间 $d\sigma/dt = S_\kappa(T)/S_\kappa(q) > 0$，轨迹即为指数趋近教师的直线。$\kappa \downarrow 0$ 时 escort 本身趋均匀，需要重标度：

$$\frac{V}{\kappa}\left(E_\kappa(q)_a - \frac{1}{V}\right) \longrightarrow \log q_a - \frac{1}{V}\sum_b \log q_b. \tag{G.11}$$

G.2 几何端点的完整稳定区间

这一节允许 $\eta > 0$，但只讨论 $\kappa = 0$ 的几何更新及后面相应的 Mean 更新。正形状的概率插值仍取 $0 < \eta < 1$。

定理 G.2 (几何端点的闭式轨迹与稳定分类)

固定 $T > 0$，几何更新为 $q^+ \propto q^{1-\eta}T^\eta$。同一教师下，Hilbert 距离精确乘以 $|1-\eta|$。变步长轨迹满足

$$q_k(a) \propto T_a e^{\chi_k \log(q_{0,a}/T_a)}, \qquad \chi_k = \prod_{j<k}(1-\eta_j). \tag{G.12}$$

非教师初值收敛当且仅当 $\chi_k \to 0$。常步长在 $0 < \eta < 2$ 收敛，$\eta = 2$ 两周期，$\eta > 2$ 跨度发散。

证明 固定正教师 T，令 $q^+ \propto q^{1-\eta}T^\eta$。归一化常数在动作差中消失，所以

$$d_H(q^+, T) = |1-\eta| d_H(q, T), \qquad d_H(q^+, \widetilde{q}^+) = |1-\eta| d_H(q, \widetilde{q}). \tag{G.13}$$

对变步长，记 $\chi_k = \prod_{j<k}(1-\eta_j)$、$u = \log(q_0/T)$，归纳得到

$$q_k(a) = \frac{T_a e^{\chi_k u_a}}{\sum_b T_b e^{\chi_k u_b}}. \tag{G.14}$$

归纳步骤中上一轮的配分函数仅产生公共乘数，归一化后消去。非教师初值下，收敛当且仅当 $\chi_k \to 0$。常步长 $0 < \eta < 2$ 收敛，$\eta = 1$ 一步到教师，$\eta = 2$ 为两周期，$\eta > 2$ 的跨度发散。

命题 G.3 (几何变步长的充要收敛条件)

若 $\eta_k \in (0, 2)$ 且没有一步等于一，则非教师初值收敛到教师，当且仅当 $\sum_k \eta_k(2-\eta_k) = \infty$。若某一步等于一，此后精确保持教师。

证明 若所有 $\eta_k \in (0,2)$ 且没有一步等于一，令 $a_k = |1-\eta_k| \in (0,1)$。乘积趋零当且仅当 $\sum_k (1-a_k) = \infty$：一边由 $-\log a \geq 1-a$，另一边在 a 接近一时由 $-\log a \leq 2(1-a)$ 得到。再用 $1-a_k \leq 1-a_k^2 \leq 2(1-a_k)$，得到等价判据 $\sum_k \eta_k(2-\eta_k) = \infty$。

命题 G.4 (几何路径的双向 KL 积分)

令 $u = \log(q_0/T)$、$\Psi(\chi) = \log \mathbb{E}_T e^{\chi u}$、$q^{[\chi]} \propto T e^{\chi u}$。则

$$\mathrm{KL}(q^{[\chi]} \| T) = \int_0^\chi s\Psi''(s)\, ds, \tag{G.15}$$

$$\mathrm{KL}(T \| q^{[\chi]}) = \int_0^\chi (\chi - s)\Psi''(s)\, ds, \qquad \Psi''(\chi) = \mathrm{Var}_{q^{[\chi]}} u. \tag{G.16}$$

非教师初值、$0 < \eta < 2$ 且 $\eta \neq 1$ 时，几何迭代的局部 KL 比例为 $(1-\eta)^2$；全局有 $\mathrm{KL}(q_k \| T) \leq \chi_k^2 (\operatorname{osc} u)^2/8$。

证明 定义 $\Psi(\chi) = \log \sum_a T_a e^{\chi u_a}$。有限求和微分给 $\Psi' = \mathbb{E}_{q^{[\chi]}} u$、$\Psi'' = \mathrm{Var}_{q^{[\chi]}} u$。于是

$$\mathrm{KL}(q^{[\chi]} \| T) = \chi\Psi'(\chi) - \Psi(\chi) = \int_0^\chi s\Psi''(s)\, ds, \tag{G.17}$$

$$\mathrm{KL}(T \| q^{[\chi]}) = \Psi(\chi) - \chi\Psi'(0) = \int_0^\chi (\chi - s)\Psi''(s)\, ds. \tag{G.18}$$

正、负半轴上两种 KL 各自随离零距离增加而增加，但跨越两侧的值不能仅由 $|\chi|$ 比较。教师附近有 KL 比例极限 $(1-\eta)^2$；全局只有绝对界 $\mathrm{KL}(q_k\|T)\le\chi_k^2(\operatorname{osc}u)^2/8$，由 $\Psi''\le(\operatorname{osc}u)^2/4$ 积分得到。

命题 G.5 (几何更新的三点恒等式)

几何更新对任意 $\eta>0$ 满足

$$\eta\,\mathrm{KL}(q\|T)=\eta\,\mathrm{KL}(q^+\|T)+(1-\eta)\,\mathrm{KL}(q^+\|q)+\mathrm{KL}(q\|q^+). \tag{G.19}$$

若 $0<\eta\le1$，教师逆向 KL 单步非增，且常步长下 $\sum_k\mathrm{KL}(q_k\|q_{k+1})\le\eta\,\mathrm{KL}(q_0\|T)$。稳定区间内的 $\eta>1$ 不一般保证 KL 单步下降。

证明 由 $q_a^+=q_a^{1-\eta}T_a^\eta/Z$，

$$\log(q_a^+/q_a)=-\eta\log(q_a/T_a)-\log Z, \tag{G.20}$$

$$\log(q_a^+/T_a)=(1-\eta)\log(q_a/T_a)-\log Z. \tag{G.21}$$

第一式在 q 下取负期望，得到 $\mathrm{KL}(q\|q^+)=\eta\,\mathrm{KL}(q\|T)+\log Z$。两式在 q^+ 下取期望并按 $\eta,1-\eta$ 组合，得到 $\eta\,\mathrm{KL}(q^+\|T)+(1-\eta)\,\mathrm{KL}(q^+\|q)=-\log Z$。相加消去配分常数，即得

$$\eta\,\mathrm{KL}(q\|T)=\eta\,\mathrm{KL}(q^+\|T)+(1-\eta)\,\mathrm{KL}(q^+\|q)+\mathrm{KL}(q\|q^+). \tag{G.22}$$

当 $0<\eta\le1$ 时，这给单步 KL 下降及 $\sum_k\mathrm{KL}(q_k\|q_{k+1})\le\eta\,\mathrm{KL}(q_0\|T)$。$\eta>1$ 时不能把跨度稳定性换成每步 KL 下降。例如 $q=(10^{-12},1-10^{-12})$、$T=(0.1,0.9)$、$\eta=1.1$，逆向 KL 从约 0.10536 增至 0.71385。

G.3 Mean 的单轮界与精确外层

本节取 $r=\log(T/q)$、$d=\mathrm{KL}(q\|T)$、$G=\eta(r+d)$。Mean 的 KKT 为

$$\log w_a+\lambda w_a=\eta(r_a+d),\quad w_a=p_a^{\mathrm{M}}/q_a,\quad \mathbb{E}_q w=1,\quad \lambda=\mathrm{KL}(q\|p^{\mathrm{M}}). \tag{G.23}$$

命题 G.6 (Mean 归一化乘子的上下界)

设 $G=\eta C_q\log(T/q)$，精确 Mean 乘子为 λ。令 $A_1=\mathbb{E}_q e^G, A_2=\mathbb{E}_q e^{2G}$，则

$$\frac{A_1(A_1-1)}{A_2}\le\lambda\le\log A_1. \tag{G.24}$$

若 $q=T$，两界均为零；否则 $\lambda>0$。

证明 令 $X=e^G$、$A_1=\mathbb{E}_qX$、$A_2=\mathbb{E}_qX^2$。由 $\lambda=\mathbb{E}_qW_0(\lambda X)$，$W_0$ 的凹性给 $\lambda\le\log A_1$。其凹性可由 $W_0'(x)=e^{-W_0(x)}/(1+W_0(x))$ 再求导看出。

下界使用 $W_0(z)\ge z/(1+z)$：写 $z=we^w$，等价于 $(1-w)e^w\le1$；该函数在 $w\ge0$ 非增。Cauchy–Schwarz 再给

$$\lambda\ge\mathbb{E}_q\frac{\lambda X}{1+\lambda X}\ge\frac{\lambda A_1^2}{A_1+\lambda A_2},\qquad \frac{A_1(A_1-1)}{A_2}\le\lambda\le\log A_1. \tag{G.25}$$

非恒定信号时 $\lambda>0$ 可以约去；恒定信号两边为零。代入 $A_1=e^{\eta d}Z_\eta, A_2=e^{2\eta d}Z_{2\eta}$，得到原稿的 Rényi 归一化界，其中 $Z_\nu=\sum q^{1-\nu}T^\nu$。

命题 G.7 (精确 Mean 的教师 KL 下降)

固定 $q,T>0$，令 $d=\mathrm{KL}(q\|T)$，p^{M} 是信号 $f=\eta\log(T/q)$ 的精确 Mean 解。则

$$\mathrm{KL}(p^{\mathrm{M}}\|T)\le d-(\eta^{-1}-1)\,\mathrm{KL}(p^{\mathrm{M}}\|q)-\frac{\lambda}{2\eta}\chi^2(p^{\mathrm{M}}\|q). \tag{G.26}$$

当 $0<\eta\le1$ 且 $q\ne T$ 时，教师 KL 严格下降。

证明 Mean 最大化式 (C.16)，将它与可行点 q 比较，再除以 η，得到

$$\mathrm{KL}(p^{\mathrm{M}}\|T) \le d - (\eta^{-1}-1)\,\mathrm{KL}(p^{\mathrm{M}}\|q) - \frac{\lambda}{2\eta}\chi^2(p^{\mathrm{M}}\|q). \tag{G.27}$$

当 $0<\eta\le 1, q\neq T$，最后一项严格为正，所以教师 KL 严格下降。

定理 G.3 (Mean 的跨度稳定性)

固定正教师和正初值，逐轮精确 Mean 求解并同步。$0<\eta\le 2$ 时跨度严格下降到零；$0<\eta<2$ 时

$$b_{k+1} \le C_\eta(b_k)b_k, \quad C_\eta(b) = \max\{1-\eta/(1+\eta b), \eta-1\} < 1 \tag{G.28}$$

对 $b>0$ 成立。$\eta>2$ 时教师局部不稳定。

证明 在一轮中固定 λ, d，把 w 看成 r 的函数。隐式求导给 $d\log w/dr = \eta/(1+\lambda w)$。因此相对教师的新 log-ratio $v(r)=\log w(r)-r$ 满足

$$v'(r) = -1 + \eta/(1+\lambda w(r)). \tag{G.29}$$

非教师状态 $\lambda>0$，当 $\eta\le 2$ 时 $-1<v'<1$。在有限 reward 区间上连续，故均值定理给严格跨度收缩。为得到显式系数，归一化保证 $w_{\max}\ge 1$；最大 reward 处 KKT 给

$$\lambda w_{\max} = \eta(r_{\max}+d) - \log w_{\max} \le \eta(r_{\max}-r_{\min}) = \eta b. \tag{G.30}$$

所以导数落在 $[-1+\eta/(1+\eta b), \eta-1)$，绝对值由 $C_\eta(b)$ 控制。该系数随 b 非减，故 $\eta<2$ 时由初始跨度给出统一几何界。

在 $\eta=2$，显式系数只有一。跨度有界蕴含 $T_a e^{-b_0} \le q_a \le T_a e^{b_0}$，迭代位于正单纯形内的紧集。归一化根严格单调且连续，教师附近 $\lambda \le \log \mathbb{E}_q e^G \to 0$，故更新也连续。若跨度极限 $b_\infty>0$，该紧集上远离教师的更新跨度差处处正且连续，有统一正下界，与跨度收敛矛盾。故极限为零。最后，下节线性化为 $(1-\eta)y$，$\eta>2$ 时其模大于一，局部不稳定。

G.4 Mean 的三次项与边界率

定理 G.4 (Mean 的三阶局部展开)

固定正教师和 $\eta>0$。令 $y = C_T\log(q/T)$、$V=\mathbb{E}_T y^2$，则当 $\|y\|_\infty\to 0$，

$$y^+ = (1-\eta)y + \tfrac{1}{2}\eta^3 V y + O(\|y\|_\infty^4). \tag{G.31}$$

$\eta=1$ 时，$V^+ = V^3/4 + O(V^{7/2})$，且非平凡趋近满足 $\mathrm{KL}(p^{\mathrm{M}}\|T)/\mathrm{KL}(q\|T)^3\to 1$。

证明 定义教师中心坐标 $y=C_T\log(q/T)$，$q = Te^y/\mathbb{E}_T e^y$，$V=\mathbb{E}_T y^2$、$\delta=\|y\|_\infty$。固定正教师使 $T_{\min}\delta^2 \le V \le \delta^2$。Taylor 展开给

$$\log \mathbb{E}_T e^y = V/2 + O(\delta^3), \quad \mathbb{E}_q y = V + O(\delta^3), \quad d = V/2 + O(\delta^3). \tag{G.32}$$

此时 $G=\eta(-y+\mathbb{E}_q y)$。归一化方程

$$\Phi(\lambda, y) = \mathbb{E}_q \exp[G - W_0(\lambda e^G)] - 1 = 0 \tag{G.33}$$

在原点对 λ 的导数为 -1，隐函数定理给解析根。展开 $W_0(z) = z + O(z^2)$，

$$0 = \mathbb{E}_q e^G - 1 - \lambda \mathbb{E}_q e^{2G} + O(\lambda^2), \qquad \mathbb{E}_q e^G - 1 = \eta^2 V/2 + O(\delta^3). \tag{G.34}$$

因 $\mathbb{E}_q e^{2G}$ 在邻域内远离零，先得 $\lambda = O(\delta^2)$，再得 $\lambda = \eta^2 V/2 + O(\delta^3)$。

将 KKT 输出按教师中心化：

$$y^+ = (1-\eta)y - C_T W_0(\lambda e^G), \tag{G.35}$$

$$C_T W_0(\lambda e^G) = \lambda C_T e^G + O(\delta^4) = -\eta\lambda y + O(\delta^4). \tag{G.36}$$

故

$$y^+ = (1-\eta)y + \frac{\eta^3}{2}Vy + O(\delta^4). \tag{G.37}$$

$\eta = 1$ 时 $V^+ = V^3/4 + O(V^{7/2})$，两次使用 $\mathrm{KL}(q\|T) = V/2 + O(V^{3/2})$，得到 $\mathrm{KL}(p^{\mathrm{M}}\|T)/\mathrm{KL}(q\|T)^3 \to 1$。

命题 G.8 (Mean 的全局三次跨度界)

对 $\eta = 1$ 的精确 Mean 更新，令 $b = d_H(q, T)$，则

$$d_H(p^{\mathrm{M}}, T) \le \frac{e^b b^2}{8 + e^b b^2}\, b. \tag{G.38}$$

♠

证明 还可给出全局三次跨度上界。$\eta = 1$ 时 $\lambda \le d$、$w_{\max} \le e^b$。令 $F(t) = \log \mathbb{E}_q e^{t(r - \mathbb{E}_q r)}$，有 $F(0) = F'(0) = 0$、$F''(t) \le b^2/4$；两次积分得 $d = F(1) \le b^2/8$。因此

$$b^+ \le \frac{\lambda w_{\max}}{1 + \lambda w_{\max}} b \le \frac{e^b b^2}{8 + e^b b^2} b. \tag{G.39}$$

定理 G.5 (Mean 边界步长的渐近率)

固定正教师，在 $\eta = 2$ 下精确 Mean 同步。若没有有限步到达教师，则 $kV_k \to 1/8$、$k\,\mathrm{KL}(q_k\|T) \to 1/16$；若某步已经到达教师，后续误差为零。

♡

证明 在 $\eta = 2$，式 (G.37) 给 $V^+ = V - 8V^2 + O(V^{5/2})$。若不在有限步精确到达教师，则 $V_k > 0$ 且由全局稳定性 $V_k \to 0$，

$$V_{k+1}^{-1} - V_k^{-1} = 8 + O(\sqrt{V_k}) \to 8. \tag{G.40}$$

累加并除以轮数得 $kV_k \to 1/8$，进而 $k\,\mathrm{KL}(q_k\|T) \to 1/16$。几何更新在相同步长是两周期，Mean 的三次阻尼改变了边界行为。

命题 G.9 (Mean 的固定锚点大步长极限)

固定不同的正分布 q, T，令 $h = C_q \log(T/q)$、$c = \mathbb{E}_q[h]_+ > 0$。当 $\eta \to \infty$ 时，Mean 的归一化乘子满足 $\lambda/\eta \to c$，最优分布满足 $p_a^{\mathrm{M}} \to q_a[h_a]_+/c$。该极限不同于 Gibbs 的最高 reward 支持集极限。

♠

证明 固定锚点令 $\eta \to \infty$ 时，Mean 还有不同于 Gibbs 的极限。令 $h = C_q r$、$c = \mathbb{E}_q[h]_+ > 0$，则 $\lambda/\eta \to c$、$p_a^{\mathrm{M}} \to q_a[h_a]_+/c$。证明如下：最大 $h_a = M > 0$ 处 KKT 与 $p_a/q_a \le 1/q_a$ 给 $\lambda \ge q_a \eta M - q_a \log(1/q_a)$；上界 $\lambda \le \log \mathbb{E}_q e^{\eta h} \le \eta M$。所以 λ/η 有严格正常数界。沿任一收敛子列，$W_0(\lambda e^{\eta h_a})/\eta \to [h_a]_+$，正、零、负三种情形分别使用 $W + \log W = \log\lambda + \eta h_a$、$W_0(\lambda) = O(\log\eta)$、$W_0(z) \le z$。有限求和归一化强制子列极限为 c，从而整个序列收敛。Gibbs 则只保留最高 reward 动作；两个极限不能互换。

G.5 有限 inner 的误差接口

命题 G.10 (四种内层损失到输出误差的接口)

若 $q_a \ge q_{\min} > 0$，Part 或 Mean 对各自正确目标的超额损失 δ 蕴含 $d_H(p, p^\star) \le 2\sqrt{\delta/q_{\min}}$；BPO 蕴含 $d_H(p, m) \le 2\sqrt{\eta L_{\mathrm{BPO}}/q_{\min}}$。MDPO 则有 $\mathrm{KL}(p\|m) = \eta\delta$ 和 $\mathrm{TV}(p, m) \le \sqrt{\eta\delta/2}$，但无额外概率下界时不能控制统一 log-ratio。

♠

证明 由式 (C.18)，Mean 超额损失 δ 控制 $\mathbb{E}_q \log^2(p/p^{\mathrm{M}}) \le 2\delta$；Part 超额损失正好等于该平方项（目标换成 m）。若 $q_a \ge q_{\min}$，附录 A 给

$$d_H(p, p^\star) \le 2\sqrt{\delta/q_{\min}}, \qquad d_H(p, m) \le 2\sqrt{\eta L_{\mathrm{BPO}}/q_{\min}}. \tag{G.41}$$

MDPO 给 $\mathrm{KL}(p\|m)=\eta\delta$ 和 TV 界，但没有统一 log-ratio 界。取 $m=(1-\epsilon,\epsilon)$、$p=(1-\epsilon^2,\epsilon^2)$，KL 趋零，第二坐标的 log-ratio 为 $\log\epsilon\to-\infty$。

命题 G.11 (有限拟合的教师 KL 证书)

固定 $p,m,T>0$，令 $\varepsilon=\mathrm{KL}(p\|m)$、$H=\operatorname{osc}\log(m/T)$。则

$$\mathrm{KL}(p\|T)\le\mathrm{KL}(m\|T)+\varepsilon+H\sqrt{\varepsilon/2}, \tag{G.42}$$

$$\mathrm{KL}(p\|T)\le(1+1/u)\varepsilon+D^{\mathrm{R}}_{1+u}(m\|T),\qquad u>0. \tag{G.43}$$

证明 直接检查教师逆向 KL 时，记 $\varepsilon=\mathrm{KL}(p\|m)$、$\ell=\log(m/T)$、$H=\operatorname{osc}\ell$。恒等式

$$\mathrm{KL}(p\|T)=\varepsilon+\mathrm{KL}(m\|T)+\sum_a(p_a-m_a)\ell_a \tag{G.44}$$

配合区间中点和 Pinsker，得到上界 $\mathrm{KL}(m\|T)+\varepsilon+H\sqrt{\varepsilon/2}$。另一种按概率加权的证书是：对 $u>0$，取 $r_u\propto m^{1+u}T^{-u}$，展开 $\mathrm{KL}(p\|r_u)\ge0$ 得

$$\mathrm{KL}(p\|T)\le(1+1/u)\,\mathrm{KL}(p\|m)+D^{\mathrm{R}}_{1+u}(m\|T). \tag{G.45}$$

可在多个 u 上取最小值；这里只用其精确有限 u 形式作为保证。

命题 G.12 (条件无偏 SGD 的平均梯度范数界)

设损失 L_{sm} 光滑、下界为 $L_\star$，随机梯度条件无偏且方差不超过 σ^2/M。若 $0<\alpha\le1/L_{\mathrm{sm}}$，则

$$\frac{1}{N}\sum_{n<N}\mathbb{E}\|\nabla L(\theta_n)\|^2\le\frac{2(L_0-L_\star)}{\alpha N}+\frac{L_{\mathrm{sm}}\alpha\sigma^2}{M}. \tag{G.46}$$

该界本身不提供分布距离控制。

证明 梯度范数界还需额外条件才能连接到这些输出证书。若随机梯度条件无偏、方差不超过 σ^2/M，且损失 L_{sm} 光滑，SGD 步长 $\alpha\le1/L_{\mathrm{sm}}$ 满足

$$\frac{1}{N}\sum_{n<N}\mathbb{E}\|\nabla L(\theta_n)\|^2\le\frac{2(L_0-L_\star)}{\alpha N}+\frac{L_{\mathrm{sm}}\alpha\sigma^2}{M}. \tag{G.47}$$

证明由光滑性、$\mathbb{E}\|g\|^2=\|\nabla L\|^2+\operatorname{Var}g$，每步下降至少 $\alpha\|\nabla L\|^2/2$，再求和。此式本身不控制超额损失或分布距离。

命题 G.13 (数据复用与平均覆盖的两个限制)

固定候选参数下的估计无偏，不一般蕴含数据依赖迭代参数下的条件无偏。另一方面，$\mathbb{E}_d\delta_s\le\bar\delta$ 不一般控制逐前缀误差；若另有 $d(s)\ge d_{\min}>0$，才可推出 $\delta_s\le\bar\delta/d_{\min}$。

证明 复用数据还会破坏条件无偏前提。例如单个零均值样本 X，样本梯度 $\theta-X$ 在固定 θ 时无偏。从零更新得 $\theta_1=\alpha X$ 后，

$$\mathbb{E}[\theta_1-X\mid\theta_1]=(1-\alpha^{-1})\theta_1\ne\theta_1. \tag{G.48}$$

因此独立动作的估计恒等式不能直接用于数据依赖的反复更新参数。平均前缀误差也不等于逐前缀误差；若另有 $d(s)\ge d_{\min}>0$ 才能由 $\mathbb{E}_d\delta_s\le\bar\delta$ 得 $\delta_s\le\bar\delta/d_{\min}$。

G.6 输出扰动、噪声与同步

定理 G.6 (确定性输出扰动的跨度递推)

令 $b_k = d_H(q_k, T_k)$。几何近似更新 $q_{k+1} \propto q_k^{1-\eta_k} T_k^{\eta_k} e^{e_k}$ 满足

$$b_{k+1} \le |1-\eta_k| b_k + \operatorname{osc} e_k + d_H(T_k, T_{k+1}). \tag{G.49}$$

对 $0 < \eta \le 1$ 的 Mean 更新，若逐坐标输出 log 误差不超过 $\epsilon_k \le \bar{\epsilon} < 1/2$，则 $b_{k+1} \le b_k - \eta b_k/(1+\eta b_k) + 2\epsilon_k$，并有不变上界 $\max\{b_0, 2\bar{\epsilon}/[\eta(1-2\bar{\epsilon})]\}$。

证明 几何端点的近似输出写为 $q_{k+1} \propto q_k^{1-\eta_k} T_k^{\eta_k} e^{e_k}$。取相对 T_{k+1} 的对数并用跨度三角不等式：

$$b_{k+1} \le |1-\eta_k| b_k + \operatorname{osc} e_k + d_H(T_k, T_{k+1}). \tag{G.50}$$

固定 $0 < \eta < 2$ 时，误差按系数 $c = |1-\eta|$ 作几何卷积；有界扰动上限 B 给稳态界 $B/(1-c)$，趋零扰动给收敛。对 Mean 的 $0 < \eta \le 1$，若输出逐坐标 log 误差不超过 ϵ_k，则

$$b_{k+1} \le b_k - \frac{\eta b_k}{1+\eta b_k} + 2\epsilon_k. \tag{G.51}$$

当 $\epsilon_k \le \bar{\epsilon} < 1/2$，映射 $F(b) = b - \eta b/(1+\eta b) + 2\bar{\epsilon}$ 递增，不动点为 $b_\infty = 2\bar{\epsilon}/[\eta(1-2\bar{\epsilon})]$。从 $\max(b_0, b_\infty)$ 起的比较递推单调降到 b_∞，给出不变跨度与稳态上界。

定理 G.7 (几何更新的随机协方差传播)

固定正教师，$y_k = C_T \log(q_k/T)$、$\xi_k = C_T e_k$ 满足精确递推 $y_{k+1} = (1-\eta)y_k + \xi_k$。若初值确定，$\xi_k$ 为二阶可积鞅差且条件协方差为确定 Σ_k，则

$$\operatorname{Cov}(y_K) = \sum_{j<K} (1-\eta)^{2(K-1-j)} \Sigma_j. \tag{G.52}$$

常协方差及 $0 < \eta < 2$ 时，极限为 $\Sigma/[\eta(2-\eta)]$；固定偏置 μ 的均值极限为 μ/η。KL 噪声近似另需小噪声高阶矩条件。

证明 固定教师，定义 $y_k = C_T \log(q_k/T)$、$\xi_k = C_T e_k$，几何更新精确满足

$$y_{k+1} = (1-\eta)y_k + \xi_k. \tag{G.53}$$

若 y_0 确定，ξ_k 关于历史为鞅差且条件协方差为确定矩阵 Σ_k，不同时间交叉项由塔式期望为零，所以

$$\operatorname{Cov}(y_K) = \sum_{j<K} (1-\eta)^{2(K-1-j)} \Sigma_j. \tag{G.54}$$

常协方差时极限为 $\Sigma/[\eta(2-\eta)]$。固定均值误差 μ 给均值极限 μ/η。只有在另有小噪声高阶矩控制时，才能用局部 KL 展开转换成

$$\mathbb{E}\,\mathrm{KL}(q_\infty \| T) = \frac{\mu^\top \operatorname{diag}(T)\mu}{2\eta^2} + \frac{\operatorname{tr}(\operatorname{diag}(T)\Sigma)}{2\eta(2-\eta)} + O(\epsilon^3), \tag{G.55}$$

其中例如高斯误差的均值与标准差同时按 ϵ 缩小即可。若注入的是 reward 误差，输出噪声多乘 η，协方差多乘 η^2；不能混用两种步长依赖。

命题 G.14 (概率 soft sync 的局部稳定性)

固定正教师，几何、幂均值或相应 Mean 精确内层输出后执行概率混合 $q^+ = (1-\zeta)q + \zeta p_{\text{out}}$。其教师中心坐标的一阶系数为 $1-\zeta\eta$；若 $0 < \zeta\eta < 2$，教师局部渐近稳定。该命题不把参数 EMA 视作相同概率映射。

证明 概率 soft sync 定义为 $q^+ = (1-\zeta)q + \zeta p_{\text{out}}$。在教师附近，几何、幂均值与 Mean 的一阶输出均为 $T + (1-\eta)(q-T)$，因此中心坐标变为 $(1-\zeta\eta)y + O(\|y\|^2)$。$0 < \zeta\eta < 2$ 给局部稳定，边界需高阶分析。参数 EMA 通常不是这个概率混合。为给出稳定性的定量步骤，令 $a = |1-\zeta\eta| < 1$。在充分小邻域内，二阶余项范数不超过

$(1-a)\|y\|/2$，故 $\|y^+\| \le (1+a)\|y\|/2$。该邻域不变，反复迭代几何趋零。

命题 G.15 (保持外层速率所需的内层精度)

若内层输出误差不超过 $C\rho_{\text{in}}^{N_k}$，其中 $0<\rho_{\text{in}}<1$，则要保证其不超过 $B\rho_{\text{out}}^{k}$，充分取

$$N_k \ge \max\{0, [\log(C/B) + k\log(1/\rho_{\text{out}})]/\log(1/\rho_{\text{in}})\}. \tag{G.56}$$

Mean 在 $\eta = 1$ 的三次局部率要求输出误差为 $O(b_k^3)$；基于平方损失证书，一个充分条件是超额损失 $O(q_{\min,k} b_k^6)$。

证明 若理想外层收缩因子为 c、内层输出误差 $\le C\rho_{\text{in}}^{N_k}$，希望输出误差 $\le B\rho_{\text{out}}^{k}$，充分条件是

$$N_k \ge \max\left\{0, \frac{\log(C/B) + k\log(1/\rho_{\text{out}})}{\log(1/\rho_{\text{in}})}\right\}. \tag{G.57}$$

内层指数率必须先有独立依据。Mean 在 $\eta = 1$ 的三次局部率需要输出跨度误差 $O(b_k^3)$；若使用损失证书，则充分要求超额损失为 $O(q_{\min,k} b_k^6)$。

G.7 共享参数的自然梯度投影

命题 G.16 (共享参数自然梯度的正交投影)

固定有限前缀和正权重，$B = \partial q_\theta/\partial\theta$、$W = \operatorname{diag}(d_s/q_{\theta,sa})$、$\mathcal{I} = B^\top W B$。若自由负自然梯度为 v，则参数自然梯度流诱导 $\dot q = Pv$，其中 $P = B\mathcal{I}^\dagger B^\top W$ 为 W 正交投影。因此 $\|\dot q\|_W \le \|v\|_W$、$\dot L = -\|Pv\|_W^2 \le 0$。

证明 固定有限前缀及正权重 d_s，令 $B = \partial q_\theta/\partial\theta$、$W = \operatorname{diag}(d_s/q_{\theta,sa})$、$\mathcal{I} = B^\top W B$。逐前缀自由负自然梯度为 v，有 $\nabla_\theta L = -B^\top W v$。参数自然梯度流诱导

$$\dot q = B\mathcal{I}^\dagger B^\top W v = Pv. \tag{G.58}$$

令 $C = W^{1/2}B$，则 $W^{1/2}PW^{-1/2} = C(C^\top C)^\dagger C^\top$ 是欧氏正交投影。因此 $\|\dot q\|_W \le \|v\|_W$、$\dot L = -\|Pv\|_W^2 \le 0$。平方根自由速度不超过二，投影后也不超过二；这控制分布的 Fisher 速度，不控制参数欧氏速度。还可能 $Pv = 0$ 而 $q_\theta \ne T$，故不保证消除表示误差。

G.8 条件更新与完整序列

命题 G.17 (条件改善不保证序列 KL 改善)

对有限自回归序列，KL 等于生成策略访问测度下的条件 KL 之和。即使每个前缀都执行精确幂均值更新、条件教师 KL 均不增加，完整序列逆向 KL 仍可能增加。

证明 固定长度序列分布 $Q(y) = \prod_t q(y_t \mid y_{<t})$，教师序列分布为 T。链式法则给

$$\mathrm{KL}(Q\|\mathsf{T}) = \sum_t \mathbb{E}_{s_t\sim Q}\,\mathrm{KL}(q(\cdot \mid s_t)\|T(\cdot \mid s_t)). \tag{G.59}$$

更新条件策略同时改变访问权重。一个两步反例取根节点 $q_0 = (0.99, 0.01), T_0 = (0.01, 0.99)$；分支 A 中二者均为 $(1/2, 1/2)$；分支 B 中 $q_B = (1-10^{-6}, 10^{-6})$、$T_B = (10^{-30}, 1-10^{-30})$。对全部条件分布同时做 $\eta = 0.1$ 的精确更新，条件双向 KL 均不增加，但序列逆向 KL 由约 5.19399 变为 6.07445（几何）、7.09792（平方根）或 10.44581（算术）。学生进入高误差分支的概率上升。

命题 G.18 (条件化与序列混合的差异)

完整序列算术混合的条件教师权重为 $\eta_s = \eta\mathsf{T}(s)/[(1-\eta)Q(s)+\eta\mathsf{T}(s)]$，一般依赖前缀。完整序列几何混合的条件概率为

$$\mathsf{M}(a \mid s) = q(a \mid s)^{1-\eta}T(a \mid s)^{\eta}Z_\eta(sa)/Z_\eta(s). \tag{G.60}$$

因此两种序列混合一般都不同于逐前缀直接使用固定权重的条件混合。

证明 对完整序列算术混合，先将前缀概率边缘化，再条件化：

$$\mathsf{M}(a \mid s) = \frac{(1-\eta)Q(s)q(a \mid s)+\eta\mathsf{T}(s)T(a \mid s)}{(1-\eta)Q(s)+\eta\mathsf{T}(s)}. \tag{G.61}$$

分别提取两个条件分布的系数，教师权重为

$$\eta_s = \frac{\eta\mathsf{T}(s)}{(1-\eta)Q(s)+\eta\mathsf{T}(s)}. \tag{G.62}$$

所以它一般不同于每个前缀使用固定 η 的条件混合。序列几何混合也含后缀配分因子：

$$\mathsf{M}(a \mid s) = q(a \mid s)^{1-\eta}T(a \mid s)^{\eta}\frac{Z_\eta(sa)}{Z_\eta(s)}, \quad Z_\eta(s) = \sum_z Q(z \mid s)^{1-\eta}\mathsf{T}(z \mid s)^{\eta}. \tag{G.63}$$

具体地，未归一化的前缀 sa 质量等于 $Q(s)^{1-\eta}\mathsf{T}(s)^{\eta}q(a \mid s)^{1-\eta}T(a \mid s)^{\eta}Z_\eta(sa)$；除以前缀 s 的质量，公共前缀因子消去，即得到上式。

命题 G.19 (序列 KL 梯度中的后缀成本)

在有限长度、正支持、可微策略下，固定教师序列分布 T，有

$$\nabla\,\mathrm{KL}(Q\|\mathsf{T}) = \mathbb{E}_Q\sum_t \psi_t \sum_{j\geq t}\log[q(a_j \mid s_j)/T(a_j \mid s_j)]. \tag{G.64}$$

令后缀 KL 为 $V^q(s)$，对应条件负信号包含 $\log(T(a \mid s)/q(a \mid s)) - V^q(sa)$，而不只有即时 log-ratio。

证明 直接对序列 KL 求导，先用 $\nabla \log Q = \sum_t \psi_t$，再用条件 score 均值为零消去过去成本，得到

$$\nabla\,\mathrm{KL}(Q\|\mathsf{T}) = \mathbb{E}_Q\sum_t \psi_t \sum_{j\geq t}\log\frac{q(a_j \mid s_j)}{T(a_j \mid s_j)}. \tag{G.65}$$

记后缀值 $V^q(s) = \mathrm{KL}(Q(\cdot \mid s)\|\mathsf{T}(\cdot \mid s))$，即时负梯度信号应含 $\log(T(a \mid s)/q(a \mid s)) - V^q(sa)$。固定测度的条件目标只保留即时项。若将幂均值问题直接定义在完整有限序列空间，前面的分布定理仍成立，但目标表达、采样和投影成本是另一问题。

G.9 旧锚点与前缀测度漂移

命题 G.20 (旧锚点引起的目标偏移)

固定正教师 T 和几何目标 $m(q) \propto q^{1-\eta}T^{\eta}$，$\eta > 0$。对两个正锚点 q_j, q_k，

$$d_H(m(q_j), m(q_k)) = |1-\eta|d_H(q_j, q_k). \tag{G.66}$$

若输出 p 对旧目标的拟合误差不超过 ϵ，则 $d_H(p, m(q_k)) \leq \epsilon + |1-\eta|d_H(q_j, q_k)$。

证明 两个目标的对数比等于 $(1-\eta)\log(q_j/q_k)$ 加动作无关常数。跨度消去常数，并将标量乘法转换为绝对值，得到等式。再用 Hilbert 距离的三角不等式即得输出界。这里的误差来自目标构造所用锚点的改变；即使精确积分，仍会存在。采样分布与积分分布不一致导致的重要性加权问题需另行处理。

命题 G.21 (前缀测度改变的值与梯度代价)

设 d, d' 为同一前缀空间上的概率测度，标量或向量函数 h 满足 $\sup_s \|h(s)\| \le C$。则

$$\|\mathbb{E}_{d'} h - \mathbb{E}_d h\| \le 2C\,\mathrm{TV}(d', d). \tag{G.67}$$

对于条件目标 J，

$$\mathbb{E}_{d'} J(q', T) - \mathbb{E}_d J(q, T) = \mathbb{E}_d[J(q', T) - J(q, T)] \tag{G.68}$$

$$+ (\mathbb{E}_{d'} - \mathbb{E}_d) J(q', T). \tag{G.69}$$

所以固定前缀测度下的进展，还需覆盖第二项才能推出总体进展。

证明 有限前缀时，对 $\sum_s [d'(s) - d(s)]h(s)$ 用三角不等式，得到 $C\sum_s |d' - d| = 2C\,\mathrm{TV}(d', d)$；一般情形用总变差测度积分。目标差中加减 $\mathbb{E}_d J(q', T)$ 得分解。若 $0 \le J \le C$，标量项可用中心化 $J - C/2$ 将系数收紧为 C。同样的论证适用于梯度，但需要独立的逐前缀梯度范数界；目标值有界本身不提供梯度界。

G.10 有偏拟合与误差衰减速度

命题 G.22 (固定对数偏差产生倾斜稳态)

考虑几何更新 $q_{k+1,a} \propto q_{k,a}^{1-\eta} T_a^{\eta} e^{e_a}$，其中 $T > 0$、e 固定、$0 < \eta < 2$。其极限为

$$q_{\infty,a} = \frac{T_a e^{e_a/\eta}}{\sum_b T_b e^{e_b/\eta}}, \qquad d_H(q_\infty, T) = \frac{\operatorname{osc} e}{\eta}. \tag{G.70}$$

若 $1 < \eta < 2$ 而误差允许逐轮交替，统一输入界 $\limsup d_H(q_k, T) \le \sup_k \operatorname{osc} e_k/(2-\eta)$ 可以达到。

证明 令 $y_k = C_T \log(q_k/T)$，则归一化常数被中心化消去，递推为 $y_{k+1} = (1-\eta)y_k + C_T e$。因 $|1-\eta| < 1$，$y_k = (1-\eta)^k y_0 + [1-(1-\eta)^k] C_T e/\eta$，取极限并归一化得所述稳态和跨度。为验证交替误差的界，取 $e_k = (-1)^{k+1} e$ 和 $y_k = (-1)^k C_T e/(2-\eta)$。直接代入递推，两侧相等，且每步跨度为 $\operatorname{osc} e/(2-\eta)$。任意初值与该特解之差按 $|1-\eta|^k$ 衰减。固定偏差与最坏时变偏差因此有不同稳态常数。

命题 G.23 (几何衰减误差的卷积与同速因子)

设 $b_{k+1} \le c b_k + E_k$，$0 < c < 1$，$0 \le E_k \le B\rho^k$、$0 < \rho < 1$。则

$$b_K \le c^K b_0 + \begin{cases} B(c^K - \rho^K)/(c-\rho), & c \ne \rho, \\ BKc^{K-1}, & c = \rho. \end{cases} \tag{G.71}$$

若 $c = 0$，则直接有 $b_K \le E_{K-1}$，$K \ge 1$。

证明 迭代不等式得 $b_K \le c^K b_0 + B\sum_{j=0}^{K-1} c^{K-1-j}\rho^j$。当 $c \ne \rho$，乘以 $c - \rho$ 后相邻项抵消，得到 $c^K - \rho^K$；当 $c = \rho$，每一项均为 c^{K-1}，共有 K 项。该式解释了误差与精确收缩同速时出现的额外线性因子。

命题 G.24 (Mean 的小噪声局部误差底)

取几何信号、Mean 更新及 $\eta = 1$，令 $b_k = d_H(q_k, T)$。若输出对精确 Mean 解的跨度误差至多为 E，前文局部界写成

$$b_{k+1} \le h(b_k) b_k + E, \qquad h(b) = \frac{e^b b^2}{8 + e^b b^2}. \tag{G.72}$$

若 $b_0 \le 2E$ 且 $h(2E) \le 1/2$，则

$$\sup_k b_k \le 2E, \qquad \limsup_k b_k \le \frac{E}{1 - h(2E)} = E + O(E^3). \tag{G.73}$$

对趋零的局部轨迹，误差 $E_k = o(b_k^3)$ 足以保留精确更新的三次首项。

证明 h 在非负半轴非减。若 $b_k \le 2E$，则 $b_{k+1} \le h(2E)2E + E \le 2E$，归纳得到不变邻域。在此邻域将 $h(b_k)$ 换为固定 $h(2E) < 1$，迭代并取上极限，得到 $E/[1-h(2E)]$。由 $h(2E) = O(E^2)$ 得最后展开。若近似输出与精确输出的 Hilbert 距离为 E_k，三角不等式的两个方向给其到教师距离之差的绝对值至多为 E_k，故 $o(b_k^3)$ 不改变存在的三次首项。以 Mean 超额损失 δ_k 提供残差证书时，$E_k \le 2\sqrt{\delta_k/q_{\min,k}}$，所以 $\delta_k = o(q_{\min,k} b_k^6)$ 是一个充分条件。该条件依赖原有局部轨迹与精确解证书，不声称对任意共享参数更新成立。

G.11 局部收缩率与全局边界

命题 G.25 (几何更新在稳定区间之外的两个极限)

固定 $q_0 \neq T$、$T > 0$、$\eta > 2$，令 $u_a = \log(q_{0,a}/T_a)$，最大与最小值集合分别为 I_+、I_-。精确几何迭代的偶数子列趋于 T 在 I_+ 上的条件分布，奇数子列趋于 T 在 I_- 上的条件分布。此时 $\mathrm{KL}(T\|q_k) \to \infty$，但 $\mathrm{KL}(q_k\|T) \le \log(1/T_{\min})$ 始终有限。

证明 闭式轨迹为 $q_k(a) \propto T_a e^{(1-\eta)^k u_a}$。偶数时指数系数趋正无穷，除以最大指数项后，集合外的指数趋零，集合内的比例仍为 T_a/T_b。奇数时同理保留最小值集合。u 非常数，两个集合均为真子集，因此每个子列都有正教师质量被学生压到零；$-\sum_a T_a \log q_k(a)$ 发散，而 $\sum_a T_a \log T_a$ 固定。反向 KL 则满足 $\sum_a q_a \log q_a - \sum_a q_a \log T_a \le \log(1/T_{\min})$，因为第一项非正。跨度发散与两个方向的 KL 有不同关系。

命题 G.26 (几何逆向 KL 没有统一严格乘法收缩)

固定正二元教师 T 与 $0 < \eta < 1$。不存在仅依赖 T, η 的 $c < 1$，使所有正 q 都满足 $\mathrm{KL}(m(q)\|T) \le c\,\mathrm{KL}(q\|T)$。

证明 取 $q_\epsilon = (1-\epsilon, \epsilon)$。几何目标的第二坐标与第一坐标之比为 $(\epsilon/(1-\epsilon))^{1-\eta}(T_2/T_1)^\eta \to 0$，所以 q_ϵ 与 $m(q_\epsilon)$ 都趋于 $(1,0)$。对固定正教师，逆向 KL 在闭单纯形上连续，约定 $0\log 0 = 0$。两者 KL 均趋于 $\log(1/T_1) > 0$，比值趋一，与任意统一 $c < 1$ 矛盾。该反例不影响教师附近的局部比例 $(1-\eta)^2$，也不影响全局 Hilbert 收缩。

附录 H TOP-D 目标教师的退化与性质

H.1 参数对应与精确可达性

本附录比较 TOP-D 的目标教师及相关分布性质，依据其 v1 第 3.1 节、定理 4.2、4.4 和附录 C.1、C.2[1]。固定同一前缀，TOP-D 的教师混合权重记为 α，教师为 T，构造混合时的学生记为 q。

定理 H.1 (TOP-D 目标教师的精确退化)

固定同一条件分布空间的 $q, T > 0$。取 $\kappa = 1, \eta = \alpha \in (0, 1)$ 时，镜像目标教师精确等于 TOP-D 的算术教师 $(1-\alpha)q + \alpha T$，且 $Z = 1$。该分布唯一最小化加权正向 KL，超额损失为 $\mathrm{KL}(m\|p)$。♡

证明

$$\boxed{\kappa = 1, \qquad \eta = \alpha, \qquad m_{1,\eta} = (1-\eta)q + \eta T.} \tag{H.1}$$

这在目标分布上是精确等式，无需小步近似，也无需对两分布接近作假设。两者必须作用于同一个条件分布空间。

目标教师由正文的算术端点最优化问题产生：

$$m_{1,\eta} = \arg\min_{p \in \Delta} \{(1-\eta)\,\mathrm{KL}(q\|p) + \eta\,\mathrm{KL}(T\|p)\}. \tag{H.2}$$

其概率梯度为 $-[(1-\eta)q_a + \eta T_a]/p_a$。约束乘子使 p_a 与分子成比例；分子总和已经为一，所以 $p = m$。完整误差恒等式是

$$F(p) - F(m) = \mathrm{KL}(m\|p). \tag{H.3}$$

因此镜像解与该重心解都等于 TOP-D 的目标教师。

推论 H.1 (算术教师的总体可达性)

在完整支持、精确期望和目标可实现时，MDPO、Part、BPO 的总体最优分布都等于算术目标教师。Mean 对非恒定信号一般具有不同的最优分布。♡

证明 将上一退化定理的算术 m 代入命题 4.1，MDPO 的 KL gap、Part 的零残差和 BPO 的常数残差条件分别唯一确定 $p = m$。同一命题的 Mean KKT 论证排除非恒定信号下的 Gibbs 解。可达性指总体最优分布；有限参数更新是否到达，应由拟合误差证书判断。

H.2 监督信号、中心与教师目标

命题 H.1 (算术端点的信号、中心与教师目标)

取 $\kappa = 1$，则

$$f = \log(1 - \eta + \eta T/q), \quad A = f/\eta, \quad K_T = \mathrm{KL}(q\|m)/\eta. \tag{H.4}$$

本文反推的教师目标为 $J_{1,\eta}(p;T) = \mathrm{JS}_\eta(p,T)/[\eta(1-\eta)]$，其在 q 处步长为 η 的负熵镜像解等于算术教师。♠

证明 算术端点的配分函数恒为一，故

$$f_{1,\eta} = \log(m/q) = \log(1 - \eta + \eta T/q), \qquad A_{1,\eta} = f_{1,\eta}/\eta, \qquad K_T = \mathrm{KL}(q\|m)/\eta. \tag{H.5}$$

第一项恢复 TOP-D 式 (5) 的未缩放信号。第二项是本文内层归一化使用的信号，比较方差时需保留 $1/\eta^2$。

[1] Zhengpeng Xie et al. *Trust Region Policy Distillation*. 目标教师见第 3.1 节；方差与收缩见定理 4.2、4.4 及附录 C.1、C.2. 2026. arXiv: 2607.04751v1.

本文由逆向积分定义的教师目标在此端点为

$$J_{1,\eta}(p;T)=\frac{(1-\eta)\,\mathrm{KL}(p\|M_p)+\eta\,\mathrm{KL}(T\|M_p)}{\eta(1-\eta)},\qquad M_p=(1-\eta)p+\eta T. \tag{H.6}$$

推导已在附录 B 给出。这里 M_p 随候选学生 p 变化，用于定义同一个教师目标；本轮目标 $m=M_q$ 在内层冻结。对 J 在 q 处执行步长 η 的负熵镜像下降，恰好得到算术目标。这是本文对该目标教师的变分解释，不把它与其他同名目标混用。

H.3 覆盖与散度收缩

命题 H.2 (算术教师的覆盖与信号下界)

设 $m=(1-\eta)q+\eta T$、$0<\eta<1$，则 $m_a\ge(1-\eta)q_a$、$m_a\ge\eta T_a$，并有

$$f\ge\log(1-\eta),\quad \mathrm{KL}(q\|m)\le-\log(1-\eta),\quad \mathrm{KL}(T\|m)\le-\log\eta. \tag{H.7}$$

证明 由算术混合逐坐标有 $m_a\ge(1-\eta)q_a$、$m_a\ge\eta T_a$，因此

$$f_{1,\eta}\ge\log(1-\eta),\quad \mathrm{KL}(q\|m)\le-\log(1-\eta),\quad \mathrm{KL}(T\|m)\le-\log\eta. \tag{H.8}$$

前者控制教师极小概率造成的负监督尾部，后两者控制到两端分布的覆盖代价。

命题 H.3 (算术教师的精确收缩与闭式外层)

固定正教师和 $0<\eta<1$，精确算术更新满足 $\|m-T\|_1=(1-\eta)\|q-T\|_1$。反复更新的闭式为 $q_k=T+(1-\eta)^k(q_0-T)$。

证明 对于精确更新，

$$m-T=(1-\eta)(q-T),\qquad \|m-T\|_1=(1-\eta)\|q-T\|_1. \tag{H.9}$$

反复精确更新的闭式为 $q_k=T+(1-\eta)^k(q_0-T)$。所以原文定理 4.4 所用的算术收缩结构在这个条件分布空间直接恢复。

命题 H.4 (算术端点的凸散度收缩)

对任意凸函数 φ、$\varphi(1)=0$，

$$D_\varphi(m\|T)\le(1-\eta)D_\varphi(q\|T). \tag{H.10}$$

证明 逐坐标有 $m_a/T_a=(1-\eta)q_a/T_a+\eta$。凸性给

$$\varphi(m_a/T_a)\le(1-\eta)\varphi(q_a/T_a)+\eta\varphi(1). \tag{H.11}$$

乘以 T_a 并求和，第二项为零。取 $\varphi(x)=x\log x$、$-\log x$、$(\sqrt{x}-1)^2$、$|x-1|/2$，分别得到两个 KL 方向、平方 Hellinger 和 TV 的界。

式 (H.10) 是算术映射自身的凸性结论。一般幂均值保留所有凸生成散度的非增性，但不自动具有同一个 $(1-\eta)$ 全局因子；平方根点的 Hellinger 因子由它的球面结构另行给出。

H.4 有限拟合的误差累积

定理 H.2 (算术外层的拟合误差累积)

若 $\epsilon_k = \|q_{k+1} - m(q_k, T)\|_1$，则

$$\|q_K - T\|_1 \le (1-\eta)^K \|q_0 - T\|_1 + \sum_{k<K} (1-\eta)^{K-1-k} \epsilon_k. \tag{H.12}$$

若 $\limsup \epsilon_k \le \epsilon_\infty$，则 $\limsup \|q_K - T\|_1 \le \epsilon_\infty/\eta$。固定测度的条件距离平均满足同一界。 ♡

证明 令 $\epsilon_k = \|q_{k+1} - m(q_k, T)\|_1$。三角不等式给

$$\|q_{k+1} - T\|_1 \le (1-\eta)\|q_k - T\|_1 + \epsilon_k. \tag{H.13}$$

归纳展开：

$$\|q_K - T\|_1 \le (1-\eta)^K \|q_0 - T\|_1 + \sum_{k=0}^{K-1} (1-\eta)^{K-1-k} \epsilon_k. \tag{H.14}$$

若 $\limsup \epsilon_k \le \epsilon_\infty$，对任意 $\delta > 0$ 取足够晚的 k_0 使 $\epsilon_k \le \epsilon_\infty + \delta$。有限前缀和趋零，后段几何和不超过 $(\epsilon_\infty + \delta)/\eta$。令 $\delta \downarrow 0$，得到 $\limsup \|q_K - T\|_1 \le \epsilon_\infty/\eta$。这恢复原文误差累积与稳态上界的形式。

固定前缀测度下可以逐条件取平均，再用同一个线性递推。如果用 MDPO 的超额损失 δ_k，Pinsker 给 $\epsilon_k \le \sqrt{2\eta\delta_k}$；若用 BPO，则先应用附录 G 的跨度证书。本文在这里补上的是不同 inner loss 到外层输出误差的接口。

H.5 方差定理的尺度对应

定理 H.3 (算术监督的方差界与小步尺度)

固定 $0 < \eta < 1$，$f = \log(1 - \eta + \eta T/q)$，且 $\|\psi\| \le S$。令 $C_\star = \sup_{u>0} \log^2(1+u)/u$，则

$$\mathrm{Var}_q(f\psi) \le S^2[\log^2(1-\eta) + C_\star \eta]. \tag{H.15}$$

对正分布类取上确界，$\sup \mathrm{Var}_q f = \Theta(\eta)$，而 $A = f/\eta$ 满足 $\sup \mathrm{Var}_q A = \Theta(\eta^{-1})$ 当 $\eta \downarrow 0$。 ♡

证明 TOP-D 定理 4.2 在有限词表和 score 范数不超过 S 的条件下，给未缩放信号的梯度方差上界

$$S^2 |\mathcal{V}| \max\{\log^2(1-\eta), C_\star \eta\}. \tag{H.16}$$

在同一条件下，利用概率归一化可以得到无词表大小因子的界。对 $f = \log(1 - \eta + \eta\rho)$，将 $\rho < 1$ 与 $\rho \ge 1$ 分开：

$$\mathbb{E}_q[f^2 \mathbf{1}_{\rho<1}] \le \log^2(1-\eta), \tag{H.17}$$

$$\mathbb{E}_q[f^2 \mathbf{1}_{\rho\ge1}] \le C_\star \eta \mathbb{E}_q[\rho \mathbf{1}_{\rho\ge1}] \le C_\star \eta. \tag{H.18}$$

其中 $C_\star = \sup_{u>0} \log^2(1+u)/u$，和原文单变量上界使用同一个常数。因此

$$\mathrm{Var}_q(f\psi) \le S^2[\log^2(1-\eta) + C_\star \eta]. \tag{H.19}$$

这个推导控制条件单动作梯度；前缀加权后只要使用同一 score 上界，二阶矩界仍成立。

未缩放信号的最坏二阶矩在 $\eta \downarrow 0$ 时为 $\Theta(\eta)$。上界由前式，下界取 $q_1 = \eta/2, T_1 = 1/2$，稀有动作 $f_1 = \log(2-\eta)$，贡献至少 $\eta \log^2(2-\eta)/2$。对二元分布，中心化方差 $q_1 q_2 (f_1 - f_2)^2$ 也有同阶，因为另一项 $f_2 = O(\eta)$。

所以本文标准化监督满足

$$\sup_{q,T} \mathrm{Var}_q A_{1,\eta} = \Theta(\eta^{-1}). \tag{H.20}$$

这与未缩放信号随小 η 衰减相容：两者相差 η^2。它也说明算术端点虽有固定强度方差界，却不属于统一小步标准化方差有界的 $0 < \kappa \le 1/2$ 区间。

H.6 比较结论的作用范围

对象	精确对应或进一步性质
目标教师	$\kappa = 1, \eta = \alpha$ 时完全一致，$Z = 1$
未缩放信号	$f = \log(1 - \eta + \eta T/q)$ 完全一致
最优化来源	加权正向 KL 重心，超额损失为 $\mathrm{KL}(m\|p)$
教师目标解释	本文的 $J_{1,\eta}$ 是归一化加权 JS，其熵镜像步等于混合教师
精确与近似外层	算术 L_1 收缩、几何误差累积、ϵ_∞/η 稳态界
其他教师散度	凸性给任意凸生成散度的 $(1 - \eta)$ 上界
监督方差	未缩放 f 与标准化 $A = f/\eta$ 分开比较

上述比较针对相同的条件分布空间。若直接在完整序列空间定义算术混合，同一代数也成立；逐 token 固定权重混合一般不等于完整序列混合，不能把两个空间的距离直接认作同一指标。这里保留目标教师与定理层面的对应。

来源对应与复现

本稿将原有书稿、理论笔记、论文稿与散度材料按数学依赖重新组织。正文保持从镜像子问题到信号、加权教师和 J 的主线；估计、优化及扰动的展开证明在附录维护。同一命题的多个版本合并为一份证明，旧稿目录已在内容整理后删除。历史模型实验、任务成绩及配置不纳入本稿。

`source-map.csv` 记录数学来源在固定 Git 版本中的路径、行号、命题标题、文件 SHA-256、Git blob 标识及新稿主题归属。其路径是历史定位信息，不是当前工作区依赖。基线版本为

`8b1e1af7ab8eabece683c6800d7c84a81c93be29`。

可通过 `git show <版本>:<历史路径>` 只读查看对应源码。`coverage-additions.csv` 将补充的二十组数学主题对应到当前稿的具体命题标签；主题数不等于独立定理数。

数学来源	主要内容	本稿归属
散度重构稿	密度比矩、散度端点、score 梯度、几何重加权测度	附录 A、B、D
分章书稿	重心、J、四种 inner、信息访问、中心估计、动力学	正文及附录 A–H
旧书稿	Mean 修订、KL 控制族、同步及误差传播	附录 C、E、F、G
理论专著笔记	成对估计、无重复动作、方差与误差证书	附录 B、D、F、G
论文叙事稿	参数化、曲率、受限投影与有限步论证	正文及附录 C、D、G

这些材料使用的头部集合、采样分布、中心尺度和学习率记号并不总是相同。本文统一记号后重新陈述条件并推导；来源表的主题关联不表示两版公式可以不经换算直接替换。幂散度梯度中的重加权分布 $p(T/p)^\kappa$ 用于积分测度解释，本轮目标教师 $m_{\kappa,\eta}$ 则由最优化问题确定。

附录 C 补充小步一致性、对角预条件、固定样本梯度与优化器状态分析；D 比较 Fisher 速度与矩准则；E 展开头尾估计、异分布控制及反传语义；F 处理包络中心及常数误差；G 给出锚点、访问测度、持续偏差与衰减误差的定量界。TOP-D 的比较保留在附录 H，围绕目标教师的参数退化和相关定理展开。

数学核验的范围

数值核验采用有限词表的确定性求和，对照解析恒等式、自动微分和独立的概率公式。重点包括重心超额损失、J 的梯度与 JS 端点、四种 inner 的梯度和 Hessian、成对估计的协方差、形状端点、TOP-D 算术收缩以及条件与序列的反例。测试入口为 `tests/reference/test_core_monograph.py` 与 `tests/reference/test_core_extensions.py`。

积分目标采用 96 点 Gauss–Legendre 求积与解析梯度对照，主要恒等式容差为 10^{-11} 或 10^{-12}。U-统计量使用三动作词表、$M = 2, 3, 4$ 的全部有序样本组合；无重复抽样直接比较协方差矩阵，检查半正定差值。局部三次率采用逐渐接近教师的固定方向，不以有限差分噪声替代极限系数。

补充检查覆盖 Mean 与 Gibbs 的三阶差、成对 SGD 精确二阶矩和单步期望下降、对角预条件、平方根目标与拟合的联合界、包络中心及嵌套头部的实际方差、尾形状匹配与异分布控制、有限样本梯度差、冻结中心偏差、倾斜稳态、同速误差卷积与动量稳定区间。它们使用完整小词表求和和确定性矩阵计算，不包含历史模型训练或配置。运行环境、通过数量、源码及 PDF 校验和保存于 `validation.json`。

数值测试用于暴露符号、尺度和实现错误；有限实例通过不构成定理证明。理论正文中的结论以相应解析证明和显式条件为依据。测试结果不用于声称共享参数大模型的训练收敛或任务准确率。

在仓库根执行 `make book` 或 `make theory-core` 构建完整稿和正文阅读版；在本目录执行 `make` 等价。构建使用本目录的 `elegantbook.cls`、XeLaTeX、latexmk 与 Biber。模板保留原许可头，删除旧目录不影响构建。正文阅读版由同一主源通过条件装配生成，附录引用保留完整稿的编号。

参考文献

[1] Shun-ichi Amari. “Integration of Stochastic Models by Minimizing Alpha-Divergence”. In: *Neural Computation* 19.10 (2007), pp. 2780–2796. DOI: 10.1162/neco.2007.19.10.2780.

[2] Andrzej Cichocki and Shun-ichi Amari. “Families of Alpha- Beta- and Gamma- Divergences: Flexible and Robust Measures of Similarities”. In: *Entropy* 12.6 (2010), pp. 1532–1568. DOI: 10.3390/e12061532.

[3] Zhengpeng Xie et al. *Trust Region Policy Distillation*. 目标教师见第 3.1 节；方差与收缩见定理 4.2、4.4 及附录 C.1、C.2. 2026. arXiv: 2607.04751v1.

[4] Zhenghao Xu et al. *Approximation of Log-Partition Function in Policy Mirror Descent Induces Implicit Regularization for LLM Post-Training*. 2026. arXiv: 2602.05933v1.

[5] Lunjun Zhang and Jimmy Ba. *EMA Policy Gradient: Taming Reinforcement Learning for LLMs with EMA Anchor and Top-k KL*. 2026. arXiv: 2602.04417v1.