

WRRRA_M 0.11 첫 다섯 입력의 순차 보정

Wonsik Choi · 2026-10-02 · WRRRA Core 1.0 / MCC 2.3.2 · CC BY 4.0

초록

고정된 WRRRA Core 1.0과 MCC 2.3.2 위에서, 우리 우주에 특화된 WRRRA_M의 첫 다섯 물리 입력을 $G \rightarrow H_0 \rightarrow f_{\text{phi}} \rightarrow f_{\text{c}} \rightarrow$ 전자 정지에너지 순서로 보정한다. 각 부분 단계는 아직 주어지지 않은 뒤의 목표를 읽지 않으며, 단계별 산출값과 남은 계수를 공개한다. 0.10의 에너지·압력 계산과 아홉 물리 사례를 유지하고, 주소 지수와 유효 입장률의 재표현 및 추가 산술 입력을 명시한다. 전자 모드 23과 영 절편을 채택하면 질량 단위는 22,217.345682 eV다. 동일 보정값을 만족하는 서로 다른 응답 형태를 계산하여 재현 성과와 식별되지 않은 자유도를 함께 기록한다.

검증 입력

전체 0.10 입력은 해시로 고정한다. G와 전자 에너지는 NIST 2022 CODATA 값을 사용하며, $H_0=67.4$ 는 Planck 2018의 기본 LambdaCDM 보정 기준이다. G의 표준 불확도는 1.5×10^{-15} SI, 전자 에너지는 0.00016 eV, 채택 H_0 기준은 $0.5 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ 다. 물리 구성비 4.93%·26.5%는 계승한 반올림 보정값이며 이번 판에서 공분산을 부여하지 않는다. 후보표의 첫 다섯 행과 MCC의 전자 모드 관계를 출처로 기록한다.

Input	Adopted value	Unit / role
G	6.6743000e-11	$\text{m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
H_0	67.4	$\text{km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$
f_{phi}	0.0493	energy fraction
f_{c}	0.265	energy fraction
$m_{\text{e}} c^2$	510998.95069	eV

$c=299792458 \text{ m/s}$ 는 고정 입력이다. $h=6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 와 $1 \text{ eV}=1.602176634 \times 10^{-19} \text{ J}$ 는 정확한 SI 기준이다. 파섹 환산과 기존 국소 질량·반경·응답 함수 및 $\text{Phi}=\text{Psi}$ 렌즈 조건은 계승한다. 주소 컷오프, 제타 영점 네 개, $K=8$, 위상 간격 0.1, 응답 계수 lambda_{s} , 부피 지수와 전자 모드 정수는 구성 입력이다. 이것들은 다섯 수치에서 새로 도출되지 않는다.

WRRRA 고유 변환

한 번에 한 입력만 추가하는 부분 계산을 실행한다. G는 작용의 SI 정규화와 곡률 응답을 고정한다. 정확한 h와 c를 함께 쓰면 플랑크 길이·시간도 단위 기준으로 계산된다. 뒤의 H0·구성비·전자 에너지를 NaN으로 바뀌도 해당 앞 단계 출력이 같아야 한다.

$$C_G = \frac{c^4}{16\pi G}, B_G = \frac{8\pi G}{c^4}, \ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}, t_P = \ell_P / c. \quad (1)$$

H0를 초의 역수로 환산한 뒤 임계 에너지 밀도를 계산한다. c/H0와 1/H0는 허블 길이·시간 기준이며 실제 우주의 전체 크기나 나이로 확정하지 않는다.

$$H_0 = \frac{H_{0, km/s/Mpc} 10^3}{10^6 p c_m}, u_{crit} = \frac{3 H_0^2 c^2}{8\pi G}. \quad (2)$$

표현형 구성비가 주어지면 숨은 전체 부하를 계산한다. 이어 모이는 부하 f_c를 넣어 D와 배경 R을 분리한다. eta_load는 0.6의 균질 운반자 기준 부하 계수이며 0.10의 주소별 eta_s와 다른 기호다.

$$f_h = 1 - f_\varphi, f_b = 1 - f_\varphi - f_c, u_h = f_h u_{crit}, \eta_{load} = u_h / 2. \quad (3)$$

$$Q_h \equiv \zeta \kappa_h^2 = \frac{16\pi G u_h}{c^4}, L_* = Q_h^{-1/2}, L_0 = L_* \sqrt{W_0}. \quad (4)$$

식별되는 것은 가중 뒤틀림 Q_h다. 강성 zeta와 뒤틀림 kappa_h는 따로 정해지지 않는다. L_star는 계산된 길이 계수이고, W0가 주어지지 않아 L0는 미정이다. 95.07%라는 구성비만으로 우주 길이를 정하지 않는다.

Step	New input	Newly available outputs	Remaining anchors / choices
1	G	action coefficient; SI response	H0, f_phi, f_c, E_e
2	H0	H0 in s ⁻¹ ; critical density	f_phi, f_c, E_e
3	f_phi	hidden density; weighted twist	f_c, E_e
4	f_c	sector energies; a_T, P, q	E_e
5	E_e	mass unit; electron units	structural freedoms remain

0.10의 주소 효과 e_s(n), 정규화 가중치 w_n과 양의 응답 g_s(n)를 그대로 사용한다. 각 eta_s는 기준 주소 상태와 균질 운반자에서 한 번 맞춘 뒤 주소·상태 대조에서는 고정한다. 운반자 연산자는 A_phi=I, A_D=Kc/2, A_R=Kb/2이며 기준 균질 기대값은 모두 1이다.

$$\mu_s = \sum_n w_n e_s(n) g_s(n), \eta_s = \frac{f_s u_{crit}}{\mu_s}, \hat{E}(a) = V_0 \sum_s \eta_s \mu_s a^{v_s} A_s. \quad (5)$$

압력은 같은 에너지 함수의 부피 미분이다. 지수 $\nu_\phi=\nu_D=0$, $\nu_R=3$ 을 유지하므로 D와 표현형은 무압력이고 R은 $P_R=-u_R$ 다. 부하가 비표현형이라는 이유로 에너지나 중력을 지우지 않는다.

$$V=V_0 a^3, E_s=Tr(\rho \hat{E}_s), P_s=-\partial E_s/\partial V=-v_s u_s/3. \quad (6)$$

$$a_T=c H_0 \sqrt{f_c/8}, P_0=-f_b u_{crit}, q_0=(1-3f_b)/2. \quad (7)$$

MCC의 영 절편 질량 가지에서 전자 모드 $n_e=23$ 을 채택한다. 전자 입력은 이 가지의 공통 에너지 단위를 정한다. 보고하는 $\pm 1 \cdot \pm 2 \cdot \pm 3 \cdot \pm 23$ 은 일반 모드 대조이며 다른 입자의 질량 동정이 아니다. 모드 부호는 같은 정지 에너지를 주고, 전하는 기존 필터 장부에서 별도로 유지된다. 모드 수와 영 절편은 추가 구성 선택이다.

$$E_n=\sqrt{E_{off}^2+n^2\mu_E^2}, E_{off}=0, \mu_E=E_e/23, E_e=m_e c^2. \quad (8)$$

같은 총 에너지 연산자를 전자 에너지 단위로 재표현한다. 차원 없는 값에 E_e 를 다시 곱하면 원래 J 장부가 복원된다. 전자의 에너지를 우주 전체 밀도에 별도로 더하지 않는다. 미시 모드의 실제 경계조건과 시계 및 일반 스펙트럼은 0.12에 남긴다.

$$\tilde{E}_e=\hat{E}/E_e, \hat{E}=E_e \tilde{E}_e, m_e=E_e/c^2. \quad (9)$$

주소 alpha와 beta의 재표현

여기서 α_{addr} 는 주소 가중치의 역 지수, β_{eff} 는 홀수 합성수의 유효 입장률이다. 전자기 미세구조상수 α_{EM} 과 구분한다. 0.9의 독립 산술 목표 $D=0.268$ 과 $\phi=0.05$ 를 공개한 추가 입력으로 유지하며, 물리 에너지 목표 $0.265 \cdot 0.0493$ 으로 대체하지 않는다. 짝수 합성수 집합 C_{even} 은 소수 2를 제외한다.

$$w_n(\alpha_{addr})=\frac{n^{-\alpha_{addr}}}{\sum_{j=2}^N j^{-\alpha_{addr}}}, \sum_{n \in C_{even}} w_n=0.268. \quad (10)$$

$$\sum_{n \in C_{odd}} w_n b_n(h)=0.05, \beta_{eff}=\frac{0.05}{\sum_{n \in C_{odd}} w_n}. \quad (11)$$

고정한 위상·필터에서 다시 풀면 $\alpha_{addr}=1.899687695055$, $h=1.447673170353$, $\beta_{eff}=0.865457012414$ 다. α_{addr} 와 h 는 두 산술 목표에 맞춘 두 계수이며 β_{eff} 는 그 뒤의 재표현으로 계산된다. 세 번째 독립 β 입력은 필요하지 않다. 다섯 물리 입력만으로 산술 목표나 α_{EM} 을 정했다는 주장은 하지 않는다.

산출값

Quantity	Calculated value
ucrit J m ⁻³	7.668947767822e-10
u_hidden J m ⁻³	7.290868642868e-10
eta_load J m ⁻³	3.645434321434e-10

Quantity	Calculated value
zeta kappa_h ² m ⁻²	3.028112744666e-52
Length coefficient m	5.746639841098e+25
a_T m s ⁻²	1.191812669106e-10
P Pa	-5.258597484395e-10
q0	-5.285500000000e-01
mu_E eV	2.221734568217e+04

기준 q0는 -0.528550000이며 국소 회전 속도 207.510905127 km/s와 조건부 렌즈 편향 0.535586511 arcsec를 유지한다. 질량 단위는 22217.345682174 eV다. 이 결과는 공개 입력을 통한 현실 기준 재현과 내부 계산으로 판정한다. 새 독립 예측이 완료의 선행조건은 아니다.

남은 자유도는 계산 대조로 표시한다. zeta와 kappa_h를 다음처럼 바꾸어도 Q_h는 같다. 또한 lambda_R=0과 1에서 각각 기준 eta_R를 맞추면 같은 다섯 목표와 같은 기준 q를 얻지만, 보정 뒤 K를 4로 바꾼 결과는 서로 다르다. 따라서 기준의 곱 eta_s mu_s를 맞추는 것과 전체 응답 형태를 정하는 것은 구분된다.

$$\zeta \mapsto r \zeta, \kappa_h \mapsto \kappa_h / \sqrt{r}, \zeta \kappa_h^2 \mapsto Q_h. \quad (12)$$

lambda_R	Reference q	K=4 q after fitting
0.0	-0.528550000	-0.547819855
1.0	-0.528550000	-0.548643149

다섯 입력의 독립성은 출력 (C_G, u_crit, u_h, u_c, mu_E)의 로그 민감도 행렬로 점검한다. 고정한 구성 선택 아래 수치 계수 5가 확인된다. 이는 다섯 보정 앵커의 국소 식별이며 모든 모형 계수의 완전 식별을 뜻하지 않는다.

$$\frac{\partial \log(C_G, u_{crit}, u_h, u_c, \mu_E)}{\partial \log(G, H_0, f_\phi, f_c, E_e)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -f_\phi/(1-f_\phi) & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (13)$$

각 물리 입력을 ±1% 바꾼 열 가지 실행은 구성 민감도 대조이며 관측 신뢰구간이 아니다. 입력을 바꾼 경우에는 해당 물리 목표에 명시적으로 재보정하고, 주소 대조에서는 SI 계수를 고정한다. 전자 입력은 질량 단위를 바꾸지만 거시 밀도·q·회전 속도를 바꾸지 않는다. G 변화는 임계 밀도를 역비례로 바꾸고, H0 변화는 제곱으로 바꾼다.

고정 기준의 균질 팽창 출력은 같은 무압력·배경 에너지 관계를 사용한다. 비가환 운반자의 고정 부피 내부 교환은 총합 0이며, 상태의 양성과 정규화가 유지된다. 주소 입장에 필요한 변환 일과 환경 소유 계정은 0.10의 보존 검사로 계승한다.

$$\frac{H(a)^2}{H_0^2} = (f_\phi + f_c) a^{-3} + f_b, \frac{du}{d \log a} + 3(u + P) = 0. \quad (14)$$

반증조건과 재현

앞 단계가 뒤 목표를 읽거나, 입력 순서가 바뀌거나, 에너지·압력 미분 및 0.10의 현실 기준 재현에 실패하거나, 전자 에너지를 중복 합산하거나, 식별되지 않은 $W0 \cdot \text{zeta} \cdot \text{alpha_EM}$ 을 확정량으로 쓰면 해당 연결을 수정한다. 이번 판의 28개 검사와 계승한 0.10의 32개 검사를 실행한다. 영점·모드 부호, 5점 압력 미분, 로그 민감도, 실제 자유도 대조, 보존과 잘못된 입력 거부를 포함한다.

```
python -m pip install -r calculations/wrra_m_0_11/requirements.txt
python calculations/wrra_m_0_11/run_release.py
```

공개 패키지의 parameters.json는 입력·단위·출처·구성 선택을 포함한다. 순차 보정, 물리 사례, 질량 모드와 입력 변화는 JSON 및 CSV로 제공한다. 결과를 모두 삭제한 새 복사본에서 같은 실행 결과와 한영 원고를 바이트 단위로 대조한다. Word와 PDF는 원고에서 만든 최종 공개 판이며 계산 결과와 수식·표를 대조하고 모든 페이지를 렌더링 검토한다.

Input SHA256 67de28abf0741c406178a2fe4ce07962e69bce827c3196b78e887da3bd0dab13

판정과 후속 범위

0.11은 공개한 다섯 입력의 순차 보정과 남은 자유도 표시를 완료한다. 보정값의 기원, 유일한 우주 해, 무보정 상수 도출은 이 판의 완료 조건이 아니다. 후속 0.12에서 시계·경계조건·스펙트럼, 0.13에서 물리 양자화·관측 뒤 상태·기록, 0.14 이후에서 불확실성·응력·곡률·크기와 중성미자 연결을 계산한다. 모형과 보정을 고정한 뒤 미측정량을 산출하면 그 입력과 반증조건을 붙여 WRRa의 예측으로 기록한다.

참고 자료

Choi Wonsik. WRRa_M 0.10, frozen baseline commit 24707c512c3994f2b19a96d6f257ef7d1249dab3.
<https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/wrra-m-0.1>

Choi Wonsik. Minimal Computation Cosmology 2.3.2, chapter 23, frozen commit 21daec110c0cbeeb228c445d587eac8302e7f767. <https://github.com/Wonsik-Choi-janefather/minimal-computing-cosmology-2.3.2>

Choi Wonsik. WRRa_M_Calibration_Candidates.xlsx, first-sheet reference; source hash in parameters.json.

Planck Collaboration. Planck 2018 results VI, A&A 641 A6 (2020). <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910>

NIST. CODATA 2022 constants table. https://physics.nist.gov/cuu/pdf/wall_2022.pdf