
a
$N = 100$, $\sigma = 0.0$
$N = 100$, $\sigma = 0.2$
$N = 100$, $\sigma = 0.5$
$N = 500$, $\sigma = 0.0$
$N = 500$, $\sigma = 0.2$
$N = 500$, $\sigma = 0.5$
$N = 2000$, $\sigma = 0.0$
$N = 2000$, $\sigma = 0.2$
$N = 2000$, $\sigma = 0.5$
$N = 500$, $\sigma = 0.0$, N_e inferred
$N = 500$, $\sigma = 0.2$, N_e inferred
$N = 500$, $\sigma = 0.5$, N_e inferred
$N = 500$, $\sigma = 0.2$, N_e set to $N/2$
$N = 500$, $\sigma = 0.2$, N_e set to $2N$
F
s
hs
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
coverage of central 90% interval
b
baseline (model-exact)
finite population ($N = 1000$)
zygotes sampled
genotyping error (3%)
Wahlund sample ($p \pm 0.15$)
selfing starts at $t = 0$
linked selection ($s = 0$)
bottleneck, N_e inferred
bottleneck, N_e fixed
s reverses at $T/2$
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
coverage of central 90% interval