

# **Numerieke Modelling en Benadering**

De Wolf Peter  
Vekemans Wout

7 mei 2014

# Inhoudsopgave

Benaderen met veeltermen . . . . .	3
Berekenen van nulpunten van orthogonale veeltermen . . . . .	3
Evalueren van drietermsrecursiebetrekking . . . . .	3

# Lijst van figuren

1	Evaluatie van eerste vijf Cheybchev veeltermen op 200 punten in $[-1,1]$ . . . . .	4
---	---	---

## Benaderen met veeltermen

In dit practicum willen we eerst enkele functies benaderen met behulp van veeltermen door interpolatie. We gebruiken hierto nulpunten van orthogonale veeltermen als interpolatiepunten.

### Berekenen van nulpunten van orthogonale veeltermen

```
1 function x = poly_zeros(n, alpha, beta, lambda);
2
3 %maak diagonaalmatrix met de elementen van alpha
4 alphaMat = diag(alpha);
5
6 %maak matrices met mu en nu elementen op respectievelijk eerste
  boven- en
7 %onderdiagonaal
8 mu=zeros(n-1,1);
9 nu=zeros(n-1,1);
10 for i=1:n-1
11     nu(i) = beta(i+1)/lambda(i+1);
12     mu(i) = 1/lambda(i);
13 end
14 muMat = diag(mu,1);
15 nuMat = diag(nu,-1);
16
17 %maak matrix A
18 A= alphaMat+nuMat+muMat;
19
20 %bereken de eigenwaarden van A en dus de nulpunten van de
  veelterm
21 x=eig(A);
```

Deze functie berekent de nulpunten van de orthogonale veeltermen gebaseerd op de waarden  $\alpha_k$ ,  $\beta_k$ , en  $\lambda_k$  uit de recursiebetrekking voor orthogonale veeltermen (1). Het doet dit door een tridiagonale matrix op te stellen met elementen afgeleid van de coëfficiënten uit die recursiebetrekking. De nulpunten van de veelterm zijn dan gelijk aan de eigenwaarden van die matrix.

$$\phi_0(x) = \lambda_0 ; \phi_1(x) = \lambda_1(x - \alpha_1)\phi_0(x) \quad (1a)$$

$$\phi_k(x) = \lambda_k(x - \alpha_k)\phi_{k-1}(x) - \beta_k\phi_{k-2}(x) \quad (1b)$$


### Evalueren van drietermsrecursiebetrekking

```

1  function M = eval_recursion(x, n, alpha, beta, lambda)
2
3  m = length(x);
4  M=zeros(m,n);
5  for i=1:m %itereer over rijen
6      M(i,1)=lambda(1);
7      M(i,2)=lambda(2)*(x(i)-alpha(1))*M(i,1);
8      for j=3:n %itereer over kolommen
9          M(i,j)=lambda(j)*(x(i)-alpha(j))*M(i,j-1)-beta(j)*M(
10             i,j-2);
11      end
12  end

```

Deze functie evalueert de drietermsrecursiebetrekking in de punten gegeven in de vector  $x$ . Als we deze methode toepassen op de 5 eerste Chebychev veeltermen krijgen we figuur 1. Deze functie is eenvoudig toe te passen omdat Chebychev veeltermen duidelijk voldoen aan vergelijking (1). Dit is makkelijk in te zien als men in de recursiebetrekking volgende waarden invult:  $\lambda_0 = 1$ ,  $\lambda_1 = 1$  en alle andere  $\lambda_k$  gelijk aan 2.  $\alpha_k$  is gelijk aan 0, en  $\beta_k$  is 1.



**Figuur 1:** Evaluatie van eerste vijf Cheybchev veeltermen op 200 punten in  $[-1,1]$