
# Ficha · Reto 1 Infiltración

Prioridad de restauración de suelos — PN Cumbres de Monterrey: porciones de Santiago y Arteaga

## Santiago (dentro del parque)





Superficie en el parque: 515.9 km²

| | | |
|---|---|---|
| Alta: | 165.0 km² | (32.0 %) |
| Media: | 173.0 km² | (33.5 %) |
| Baja: | 177.9 km² | (34.5 %) |

Índice medio (0–1): 0.427
Altitud media: 1810 m
Pendiente media: 25.6°
NDVI medio (2023–24): 0.639

## Arteaga (dentro del parque)




Superficie en el parque: 18.1 km²

| | | |
|---|---|---|
| Alta: | 13.0 km² | (71.9 %) |
| Media: | 5.0 km² | (27.6 %) |
| Baja: | 0.1 km² | (0.5 %) |

Índice medio (0–1): 0.573
Altitud media: 2650 m
Pendiente media: 22.1°
NDVI medio (2023–24): 0.573

Método: índice ponderado de 5 sub-índices normalizados dentro del parque (vegetación/NDVI degradado 25 %, déficit de humedad del suelo 20 %, pendiente 20 %, textura de suelo arena−arcilla 20 %, recurrencia de incendios 15 %), ~100 m. Clases alta/media/baja = terciles calculados sobre Santiago + Arteaga juntos.
Fuentes: CONANP ANP federales (sep. 2026); geoBoundaries MEX ADM2 (World Bank/INEGI 2012); Copernicus DEM GLO-30; MODIS MOD13Q1 v061 (NDVI 2023–24); MODIS MCD64A1 v061 (área quemada 2012–2025); SoilGrids 2.0 (ISRIC); TerraClimate (humedad del suelo 2012–2021).
Limitaciones: según CONANP el parque está solo en Nuevo León; la porción de Arteaga (Coahuila) mide apenas ~18 km² y probablemente es un desajuste de los límites municipales de 2012 (no es el Marco Geoestadístico INEGI vigente). Los pesos son un supuesto experto sin calibrar; TerraClimate (~4 km) y MCD64A1 (500 m) son gruesos; no incluye geología/karst ni lluvia. Prototipo para priorizar; requiere validación en campo.