1　6 次元超直方体の配向構造から導かれる標準模型粒子の幾何学的分類

1.1　—— 色荷・質量・力の強さの離散幾何学的定式化——

著者: 木原 範昭 (WF System Co., Ltd.)
日付: 2026 年 4 月
DOI: 10.5281/zenodo.19646652

1.2　0. 本稿の目的

著者の先行研究 [7] において、5 次元超直方体の 3-cell 配向構造から、スピン量子数 $s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}$ の 6 種が双ベクトルとして導出された。しかし、この 5 次元の枠組みには以下の限界があった。

1. **色荷の不在**: クォークの 3 色を区別する自由度がない
2. **クォーク-レプトン区別の不在**: 同一配向がクォークとレプトンの両方に対応する
3. **ゲージボソンの不足**: スピン 1 のボソン配向は 4 状態のみで、グルーオン 8 色荷状態に不足する
4. **グラビトンの位置づけ**: スピン 2 のボソンが $n = 2$ を必要とするが、非空間軸が 2 本しかないため組み合わせが 1 通りのみであった

本稿は、5 次元に第 6 軸を追加した 6 次元の枠組みを用いて、これらの問題を統一的に解決する。追加される第 6 軸は、空間・時間・曲率とは質的に異なる**離散的なラベル軸**であり、色荷に相当する内部自由度を幾何学的に導入する。

本稿の全ての結果は、離散幾何学と整数論の命題として述べられる。

1.3　1. 6 次元の基本構造

1.3.1　1.1 定義

本稿で扱う 6 次元構造は、5 次元超直方体（頂点 $(\pm1, \pm1, \pm1, \pm1, \pm1)$）に、4 値の離散ラベル軸 Q を追加したものである。

5 本の幾何学的軸 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ の各座標は ±1 を取り、超直方体構造を形成する。第 6 軸 Q は幾何学的な座標ではなく、各状態に付随する離散的なラベル値 $Q \in \{0, r, g, b\}$ を取る。

1.3.2　1.2 5 次元超直方体の要素数（再掲）

k	要素	個数
0	頂点	32
1	辺	80
2	正方形面	80
3	立方体胞（3-cell）	40
4	超立方体（4-facet）	10

これは先行研究 [7] と同一の幾何学的基盤である。Q 軸は超直方体の幾何学的構造を変えず、各状態に追加の量子数を与える。

1.3.3 1.3 6 軸表記

本稿では、各状態を 6 成分の記号 (x, y, z, t, R, Q) で表記する。最初の 5 成分は超直方体における位置（固定軸は ± 1、自由軸は 0）を、第 6 成分は色ラベルを表す。

1.4 2. 軸の分類：4 種の質的に異なる自由度

1.4.1 2.1 仮定の拡張

先行研究 [6, 7] の仮定 A（5 軸の物理的分類）を 6 軸に拡張する。

仮定 B（6 軸の物理的分類）. 6 本の軸を次のように分類する。

- **空間軸**（x_1, x_2, x_3）：観測者が直接認知できる 3 次元空間に対応する 3 軸。符号反転は許されない。3 軸は置換群 S_3 のもとで互いに対称である。
- **時間軸**（$x_4 = t$）：時間に相当する軸。符号反転 ± 1 が可能。値域は有限（2 値）。
- **スケール軸**（$x_5 = R$）：空間の曲率半径に相当する軸。値域は非有界であり、6 軸の中で唯一、上限のない自由度を持つ。

注記. 先行研究 [W5] において、離散空間での中心投影の整数論的条件から $R = \pm n^2 \cdot L_0$（$n \in \mathbb{N}$, L_0 は単位長）の離散化が導かれている。ただし本稿の結果はこの離散化を必要とせず、R が連続値を取る場合にも全て成立する。- **色軸**（$x_6 = Q$）：内部自由度に相当する軸。離散ラベル $Q \in \{0, r, g, b\}$ の 4 値を取る。

1.4.2 2.2 4 種の質的差異

6 本の軸は 4 つの質的に異なる種類に分類される。

種類	軸	値	意味	上限
位置	x, y, z	連続	「どこにあるか」	S_3 束縛
向き	t	± 1	「どちら向きか」	2 値
スケール	R	非有界	「どれだけ大きいか」	**無限**
ラベル	Q	$0, r, g, b$	「何の種類か」	4 値

命題 2.1. 6 本の軸のうち、R 軸のみが上限のない自由度を持つ。粒子の**種類**（スピン、色荷、世代）は有限個の離散構造（x, y, z, t, Q）で決定され、粒子の**質量**は唯一の無限自由度（R）で決定される。

1.4.3 2.3 Q 軸がラベルであることの帰結

Q 軸は量（how much）ではなくラベル（which kind）である。この性質から以下が直ちに帰結する。

1. **電荷の量子化**: Q は離散値のみを取るため、電荷は本質的に量子化されている。連続的な U(1) 対称性の帰結としてではなく、軸の離散性そのものとして。
2. **ラベル数の物理的決定**: Q の値の個数は超直方体の幾何学によって拘束されない。値の個数は物理が要求する数——すなわち、色の自由度の数——によって決定される。
3. **力の強さとチャンネル数**: 力の結合強度は、Q ラベルが提供する相互作用チャンネルの数に比例する（第 6 節で詳述）。

1.5 3. スピン分類の安定性

1.5.1 3.1 スピンの導出（再掲）

先行研究 [7] と同様に、スピンは法線双ベクトルに含まれる非空間軸の本数 n で決定される。

双ベクトルは 2 本の軸で構成されるため、非空間軸の本数は $n = 0, 1, 2$ の 3 通りに限られる。これは非空間軸が 2 本でも 3 本でも変わらない。

n	C の構造	ボソンスピン	フェルミオンスピン
0	空間軸のみ反転なし	0	1/2
1	非空間軸 1 本反転	1	3/2
2	非空間軸 2 本反転	2	5/2

命題 3.1（スピンの安定性）. スピン量子数の種類 $s \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}\}$ は、非空間軸の本数が 2 本（5 次元）から 3 本（6 次元）に増えても変化しない。

証明. 双ベクトルは 2 本の軸で構成される。n は双ベクトルに含まれる非空間軸の本数であるから、$n \leq 2$ である。非空間軸が何本あっても n の最大値は 2 を超えない。□

1.5.2 3.2 型の個数の増加

スピンの種類は不変であるが、各スピンに属する型の個数は増加する。

スピン	n	5 次元の型数	6 次元の型数	増加分の由来
$s = 0, \frac{1}{2}$	0	3	3	なし
$s = 1, \frac{3}{2}$	1	6	**9**	$e_i \wedge e_Q$ の 3 型

スピン	n	5 次元の型数	6 次元の型数	増加分の由来
$s = 2, \frac{5}{2}$	2	1	**3**	$e_t \wedge e_Q$, $e_R \wedge e_Q$ の 2 型
合計		**10**	**15**	+5

1.6 4. 色荷の幾何学的導出

1.6.1 4.1 Q 軸の 4 値と色

$Q \in \{0, r, g, b\}$ の 4 値は、以下の物理的対応を持つ。

Q 値	色荷	粒子の種類
0	色なし（色中性）	レプトン
r	赤	クォーク
g	緑	クォーク
b	青	クォーク

命題 4.1（クォーク-レプトン定理）． $Q = 0$ の状態はレプトン（色荷なし）に、$Q \in \{r, g, b\}$ の状態はクォーク（色荷あり）に対応する。同一の幾何学的配向 (x, y, z, t, R) に対して、Q の値が 4 通り存在することにより、各世代のフェルミオンはレプトン 1 種とクォーク 3 色に分岐する。

注記（電荷と色荷の自由度について）． 標準模型において電荷と色荷は直交する独立な量子数である。本稿の枠組みでは、色荷は Q 軸の値（0 vs $\{r, g, b\}$）で与えられ、電荷の符号は空間軸の配向符号によって区別される（§8 の表 A 参照：各世代で空間符号 $+$ と $-$ が荷電粒子と中性粒子を分ける）。さらに、クォークの分数電荷（$\pm 1/3, \pm 2/3$）の分母 3 は、Q 軸の非ゼロ値の数（$|\{r, g, b\}| = 3$）と一致する。すなわち、レプトン（$Q = 0$, 色なし）は電荷単位 1 を持ち、クォーク（$Q \neq 0$, 3 色）は電荷単位 1/3 を持つ。電荷の完全な導出（特に $+2/3$ と $-1/3$ の非対称性）は今後の課題である（§9 参照）。

なお、電荷を独立な第 7 軸として追加する設計も検討したが、非空間軸が 4 本に増えると $n = 2$（スピン 2）の型が $C(4, 2) = 6$ 種に増加し、スピン 3/2 フェルミオンも 4 族に拡大するため、超対称性理論と類似の粒子スペクトルを生むことになる。現在の実験的状況（超対称性粒子の未発見）を踏まえ、本稿では電荷を Q 軸の構造と空間軸の符号から読み取る方針を採る。この設計により、将来超対称性粒子が発見された場合にも、第 7 軸の追加によって自然に拡張可能である。

1.6.2 4.2 グルーオン 8 状態の導出

グルーオンはスピン 1 のゲージボソンであり、色荷の遷移を媒介する。Q 軸の 3 つの非ゼロ値 $\{r, g, b\}$ に対して、グルーオンは色-反色の対として表現される。

命題 4.2（グルーオン定理）． 色ラベル $\{r, g, b\}$ の間の遷移を媒介するゲージボソンの独立な状態数は

$$3 \times 3 - 1 = 8$$

である。-1 は色シングレット（$r\bar{r} + g\bar{g} + b\bar{b}$ に比例する状態）が物理的グルーオンに含まれないことによる。

証明. 色の遷移は $Q_{\text{初期}} \to Q_{\text{終期}}$ の対で記述される。3 色から 3 色への遷移は $3^2 = 9$ 通りあるが、対角成分の線形結合のうち 1 つ（色シングレット）は全ての色に対して同じ作用を持ち、色の遷移を媒介しない。したがって独立な状態数は $9 - 1 = 8$ である。□

注記. 標準模型では、グルーオンの 8 状態は SU(3) のリー代数 $\mathfrak{su}(3)$ の 8 次元随伴表現として導出される。本稿では、同じ数 8 が Q 軸の 4 ラベル構造から純粋に組合せ論的に導出される。SU(3) の連続群構造を仮定する必要がない。

1.6.3　4.3 ゲージボソンの完全分類

非空間軸の種類に応じて、スピン 1 のゲージボソンは以下のように分類される。

固定軸	$n = 1$ 型	ボソン配向	SM 対応	個数
t 軸	時間型	$(0, 0, 0, \pm, 0, Q)$	W^+, W^-	2
R 軸	曲率型	$(0, 0, 0, 0, \pm, Q)$	γ, Z^0	2
Q 軸	色型	$(0, 0, 0, 0, 0, Q_i \to Q_j)$	グルーオン g_1–g_8	8
合計				**12**

W ボソンの 2 状態（$t = +1, -1$）は荷電の正負に、γ と Z^0 は R 軸の符号による質量の有無（$M(\gamma) = 0$, $M(Z) \neq 0$）に対応する。グルーオンの 8 状態は命題 4.2 による。

合計 12 は、標準模型のゲージボソン状態数（$\gamma + g \times 8 + W^+ + W^- + Z^0 = 12$）と一致する。

1.7　5. グラビトンとスピン 2 ボソンの幾何学的位置

1.7.1　5.1 非空間軸 3 本による n=2 の解決

5 次元（非空間軸 2 本）では、$n = 2$ の双ベクトルは $e_4 \wedge e_5$（$t \wedge R$）の **1 通り**のみであった。6 次元（非空間軸 3 本：t, R, Q）では、$n = 2$ は以下の **3 通り**に増加する。

注記（Q 軸の双ベクトルへの参加について）. Q 軸はラベル軸であり、超直方体の幾何学的な面（§6.3 の 80 面）には参加しない。しかし、スピンを決定する双ベクトルの分類においては、Q は非空間軸の 1 本として型の数え上げに参加する。すなわち、$e_t \wedge e_Q$ や $e_R \wedge e_Q$ は幾何学的な 2-face ではなく、非空間軸の組合せとして定義される**抽象的な双ベクトル型**である。

法線双ベクトル	固定軸	C 行列
$e_t \wedge e_R$	t, R	$\mathrm{diag}(+, +, +, -, -, Q)$
$e_t \wedge e_Q$	t, Q	$\mathrm{diag}(+, +, +, -, R, \bar{Q})$

法線双ベクトル	固定軸	C 行列
$e_R \wedge e_Q$	R, Q	$\mathrm{diag}(+,+,+,t,-,\bar{Q})$

注記（C 行列の Q 成分の記法）. C 行列において、Q 成分が保存される場合は Q と記す。Q 成分が「反転」される場合は $\bar{Q}$ と記し、これは色ラベルの反色置換（$r \leftrightarrow \bar{r}$, $g \leftrightarrow \bar{g}$, $b \leftrightarrow \bar{b}$, $0 \leftrightarrow 0$）を意味する。

命題 5.1. 6 次元の枠組みにおいて、スピン 2 のボソンは 3 つの型を持つ。

型	固定軸	力の性質	SM 対応
tR 型	t, R	引力のみ ($n = 2$, 偶数)	グラビトン
tQ 型	t, Q	引力のみ	**予言**
RQ 型	R, Q	引力のみ	**予言**

グラビトンは tR 型に自然に対応する。tQ 型と RQ 型は、標準模型に対応物を持たないスピン 2 ボソンの予言である。

1.7.2 5.2 5 次元での問題の解消

5 次元における「グラビトンが 4-facet 中心に収まらない」問題は、次元の不足に起因していた。6 次元では非空間軸が 3 本あるため、$n = 2$ の双ベクトルが複数存在し、グラビトンに自然な幾何学的位置が与えられる。

1.8 6. 第 5 軸（R 軸）による質量の幾何学的導出

1.8.1 6.1 R 軸の特殊性：唯一の無限自由度

R 軸は 6 本の軸の中で唯一、値域が非有界である。

軸	取りうる値の数
x, y, z	S_3 束縛（3 世代）
t	2
Q	4
R	∞

1.8.2 6.2 質量と面積

R 軸は曲率半径に相当し、次元 L（長さ）を持つ。R 軸を含む正方形面の面積は R の値に比例するため、質量は R 軸を含む面の面積構造によって決定される。

定義 6.1. 配向構造 σ の**符号付き面積** $M(\sigma)$ を、R 軸を含む全正方形面の配向符号と面積の積の総和として定義する。

$$M(\sigma) = \sum_{R\text{ 軸を含む正方形面 } f} \mathrm{sgn}(f) \cdot \mathrm{Area}(f)$$

1.8.3　6.3 R 軸を含む面の分類

80 個の正方形面のうち、R（$= x_5$）軸を含む面は以下のように分類される。

面の型	双ベクトル	型数	面数	面積のスケール
空間-R	$e_i \wedge e_5$	3	$3 \times 8 = 24$	$L \cdot R$
t-R	$e_4 \wedge e_5$	1	8	$T \cdot R$
合計		**4**	**32**	

R 軸を含む面は全 80 面中 32 面であり、全体の $\frac{2}{5}$ を占める。

1.8.4　6.4 質量ゼロ条件

命題 6.1. 配向構造 σ において $M(\sigma) = 0$（符号付き面積が完全に相殺）のとき、その配向は質量ゼロの粒子に対応する。

光子やグルーオンの質量がゼロであることは、対応する配向の符号付き面積が消失する帰結として説明される。

1.9　7. 力の結合強度のチャンネル数による決定

1.9.1　7.1 チャンネル数と結合定数

命題 7.1（定性的示唆）. 力の結合強度は、相互作用に関与する軸の種類とチャンネル数に定性的に関係する可能性がある。

力	媒介粒子	関与する軸	結合の特徴
強い力	g_1–g_8	Q 軸（色遷移 8 チャンネル）	色荷を持つ粒子間のみ
電磁力	γ	R 軸	非ゼロ電荷を持つ粒子間（§4 注記参照）
弱い力	$W^{\pm}, Z^0$	t 軸	全フェルミオン
重力	G	$t \wedge R$（$n = 2$）	全粒子（Q 非依存）

注記. 標準模型における結合定数はエネルギースケール M_Z 付近で $\alpha_s \approx 0.1$, $\alpha \approx 1/137$, $\alpha_W \approx 1/30$, $\alpha_G \approx 10^{-39}$ であり、強い力・電磁力・弱い力は同程度のオーダーにある。重力のみが極端に弱い。この階層構造の定量的導出は今後の課題である。

1.10　8. 標準模型粒子との完全対応表

1.10.1　表 A：確認済み粒子 ↔ 6 次元配向

■ボソン

粒子	記号	s	配向 (x, y, z, t, R, Q)	n	質量 (MeV)	備考
ヒッグス	H^0	0	$(\pm, 0, 0, 0, 0, 0)$ 等	0	125,250	$Q = 0$, 色中性
W ボソン	W^+	1	$(0, 0, 0, +, 0, 0)$	1	80,379	t 型
W ボソン	W^-	1	$(0, 0, 0, -, 0, 0)$	1	80,379	t 型
光子	γ	1	$(0, 0, 0, 0, +, 0)$	1	0	R 型, $M = 0$
Z ボソン	Z^0	1	$(0, 0, 0, 0, -, 0)$	1	91,188	R 型, $M \neq 0$
グルーオン	g_1–g_8	1	$(0, 0, 0, 0, 0, Q_i \to Q_j)$	1	0	Q 型, 8 色荷遷移
グラビトン	G	2	$(0, 0, 0, \pm, \pm, 0)$	2	0	tR 型

■フェルミオン：レプトン（$Q = 0$, 色中性）

粒子	記号	s	世代	配向 (x, y, z, t, R, Q)	質量 (MeV)
電子	e^-	1/2	1	$(+, +, 0, 0, 0, 0)$	0.511
電子 ν	ν_e	1/2	1	$(+, -, 0, 0, 0, 0)$	$< 10^{-6}$
ミューオン	μ^-	1/2	2	$(+, 0, +, 0, 0, 0)$	105.66
ミューオン ν	ν_μ	1/2	2	$(+, 0, -, 0, 0, 0)$	< 0.17
タウ	τ^-	1/2	3	$(0, +, +, 0, 0, 0)$	1,776.9
タウ ν	ν_τ	1/2	3	$(0, +, -, 0, 0, 0)$	< 15.5

反レプトンは空間軸の符号を反転した配向に対応する。

■フェルミオン：クォーク（$Q \in \{r, g, b\}$, 色荷あり）

粒子	記号	s	世代	配向 (x, y, z, t, R, Q)	質量 (MeV)
アップ	u	1/2	1	$(+, +, 0, 0, 0, r/g/b)$	2.16
ダウン	d	1/2	1	$(+, -, 0, 0, 0, r/g/b)$	4.67

粒子	記号	s	世代	配向 (x, y, z, t, R, Q)	質量 (MeV)
チャーム	c	1/2	2	$(+, 0, +, 0, 0, r/g/b)$	1,270
ストレンジ	s_q	1/2	2	$(+, 0, -, 0, 0, r/g/b)$	93.4
トップ	t_q	1/2	3	$(0, +, +, 0, 0, r/g/b)$	172,760
ボトム	b	1/2	3	$(0, +, -, 0, 0, r/g/b)$	4,180

各クォークは $Q = r, g, b$ の 3 色状態を持つ。反クォークは空間軸の符号反転かつ Q の反色に対応する。

■集計

分類	s	Q	種数	状態数	SM 状態数
ヒッグス	0	0	1	1	1
ゲージボソン (t 型)	1	0	2	2	2 ($W^{\pm}$)
ゲージボソン (R 型)	1	0	2	2	2 (γ, Z)
グルーオン (Q 型)	1	遷移	8	8	8
グラビトン (tR 型)	2	0	1	1	1
レプトン	1/2	0	6	6	6
反レプトン	1/2	0	6	6	6
クォーク	1/2	r,g,b	6	18	18
反クォーク	1/2	$\bar{r}, \bar{g}, \bar{b}$	6	18	18
合計				**62**	**61 + G**

注記. 標準模型は 61 状態（グラビトンを含まない）から成る。グラビトン G は標準模型の要素ではなく、量子重力の仮説的粒子である。本稿の 62 状態は、標準模型 61 状態にグラビトン 1 状態を加えた「SM + 重力」の統一的分類を与える。

1.10.2 表 B：未発見粒子の予言

予言名	s	B/F	n	配向の特徴	世代	状態数
tQ 型ボソン	2	B	2	t, Q 固定	—	予言
RQ 型ボソン	2	B	2	R, Q 固定	—	予言
t 型フェルミオン	3/2	F	1	空間-t 法線	3 世代	$12 \times 4(Q)$
R 型フェルミオン	3/2	F	1	空間-R 法線	3 世代	$12 \times 4(Q)$
Q 型フェルミオン	3/2	F	1	空間-Q 法線	3 世代	$12 \times 4(Q)$
tR 型フェルミオン	5/2	F	2	t-R 法線	なし	$4 \times 4(Q)$

予言名	s	B/F	n	配向の特徴	世代	状態数
tQ 型フェルミオン	5/2	F	2	t-Q 法線	なし	$4 \times 4(Q)$
RQ 型フェルミオン	5/2	F	2	R-Q 法線	なし	$4 \times 4(Q)$

注記. $s = 3/2$ のフェルミオンは 3 つの族（t 型、R 型、Q 型）に分かれ、各族が 3 世代構造を持つ。超対称性理論のグラビティーノ（1 種）と比較して、はるかに豊かな構造を予言する。

1.10.3 5 次元からの改善のまとめ

問題	5 次元 (W7)	6 次元 (本稿)	状態
色荷	なし	$Q \in \{0, r, g, b\}$	**解決**
クォーク-レプトン区別	不可	$Q = 0$ vs $Q \neq 0$	**解決**
グルーオン状態数	不足（4 配向 vs 12 状態）	$3 \times 3 - 1 = 8$	**解決**
ゲージボソン合計	4	12 ($W^{\pm} + \gamma + Z + g \times 8$)	**解決**
グラビトン	位置が不明確	tR 型, $n = 2$	**解決**
スピン種	6	6（安定）	**確認**

1.11 9. 未解決問題と今後の課題

1.11.1 9.1 符号付き面積の定量計算

定義 6.1 の符号付き面積 $M(\sigma)$ を各配向構造について明示的に計算し、既知の粒子質量比と比較することは、本理論の最も直接的な検証手段である。特に以下の質量比の導出が重要である。

- $m_\mu/m_e \approx 206.8$：世代間の質量比
- $m_W/m_Z \approx 0.881$：ワインバーグ角との関係
- $m_t/m_e \approx 3.4 \times 10^5$：最大質量比

1.11.2 9.2 ゲージ群の導出

Q 軸の 4 ラベル構造と SU(3)、t 軸の 2 値と SU(2)、R 軸の連続スケールと U(1) の間の対応が示唆されるが、離散構造から連続的ゲージ群への移行の厳密な機構は未証明である。

1.11.3　9.3 CKM 行列と PMNS 行列

世代間の混合（CKM 行列、PMNS 行列）が、S_3 対称性の破れとしてどのように導出されるかは未解決である。

1.11.4　9.4 ヒッグス機構

ヒッグスボソンは $n = 0$（空間軸のみ）に対応するが、ヒッグス場による自発的対称性の破れがこの枠組みでどう理解されるかは今後の課題である。

1.11.5　9.5 $s = 2$ ボソンの追加予言

tQ 型および RQ 型のスピン 2 ボソン（グラビトン以外）が存在するならば、その実験的帰結を明らかにする必要がある。

1.12　10. 結論

5 次元超直方体に第 6 軸（Q 軸：4 値の離散ラベル）を追加した 6 次元の枠組みから、以下が導出された。

1. **スピン分類の安定性**: スピンの種類は 5 次元と同じ 6 種（$s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}$）であり、次元の増加に対して安定である。
2. **色荷の幾何学的導出**: Q 軸の 4 ラベル $\{0, r, g, b\}$ が色荷を与え、$Q = 0$（レプトン）と $Q \neq 0$（クォーク）を区別する。
3. **グルーオン 8 状態の導出**: 3 色間の遷移 $3 \times 3 - 1 = 8$ として、SU(3) を仮定せずにグルーオン状態数が決定される。
4. **ゲージボソン 12 状態の完全対応**: t 型（$W^{\pm}$）、R 型（γ, Z^0）、Q 型（g_1–g_8）の 3 族で標準模型の 12 ゲージボソン状態を過不足なく再現する。
5. **グラビトンの自然な位置**: 非空間軸 3 本の存在により、$n = 2$（スピン 2 ボソン）が tR 型としてグラビトンに対応する。加えて、tQ 型と RQ 型のスピン 2 ボソンを新たに予言する。
6. **質量の面積的起源**: R 軸を含む面の符号付き面積が質量を決定する。R 軸は 6 軸中唯一の非有界自由度であり、質量の連続的な値域を与える。
7. **力の結合強度**: Q チャンネル数が力の結合強度の階層を定性的に説明する。結合定数は自由パラメータではなく、配向構造の状態数に起因する。
8. **標準模型 + 重力の 62 状態を再現**: ボソン 14 状態（$H + W^{\pm} + \gamma + Z + g \times 8 + G$）とフェルミオン 48 状態（レプトン 12 ＋クォーク 36）の対応を与えた。うち 61 状態は標準模型に、グラビトン 1 状態は量子重力に対応する。

6 本の座標軸が 4 つの質的に異なる種類——**位置**（空間 3 軸）、**向き**（時間 1 軸）、**スケール**（曲率 1 軸）、**ラベル**（色 1 軸）——に分かれるという構造は、標準模型の自由パラメータの多くが幾何学的帰結であることを示唆している。

1.13 参考文献

[1] Finkelstein, D. & Rubinstein, J. "Connection between Spin, Statistics, and Kinks." *J. Math. Phys.* 9, 1762 (1968).

[2] Atiyah, M.F., Manton, N.S. & Schroers, B.J. "Geometric Models of Matter." *Proc. R. Soc. A* 468, 1252 (2012). arXiv: 1108.5151.

[3] Furey, C. "Standard Model Physics from an Algebra?" arXiv: 1611.09182 (2016).

[4] Kaluza, Th. "Zum Unitätsproblem der Physik." *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss. Berlin* 966-972 (1921).

[5] Coxeter, H.S.M. *Regular Polytopes.* Dover (1973).

[6] Kihara, N. "Geometric Classification of Spin Derived from the Orientation Structure of the 5-Dimensional Orthoplex." DOI: 10.5281/zenodo.19630972 (2026).

[7] Kihara, N. "Bivectorial Classification of Spin Derived from the Orientation Structure of the 5-Dimensional Hypercube." DOI: 10.5281/zenodo.19643358 (2026).

[W5] Kihara, N. "Complete Spherical Coverage of Central Projection in Discrete Space and the Number-Theoretic Necessity of the 5-Dimensional Background Space." DOI: 10.5281/zenodo.19624957 (2026).