

Тренировочная работа в формате ОГЭ по МАТЕМАТИКЕ

9 КЛАСС

Дата: ____ 2023 г.

Вариант №: ____

Выполнена: ФИО _____


Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом. На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной. Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер. Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у вас останется время, вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.** Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа. При выполнении работы вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой. Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

1 Впишите правильный ответ.

В треугольнике ABC $\angle AB_1C_1 + \angle C_1B_1C = 180^\circ$
 угол $C\angle C_1BC = \angle C_1B_1C = 180^\circ$ равен
 $90^\circ 9^{\sin 2x} - 3^{2\sqrt{2}\sin x} = 0 \angle AB_1C_1 = \angle C_1BC = \angle ABC$
 $, AB = 103^{4\sin x \cdot \cos x} - 3^{2\sqrt{2}\sin x} = 0ABC,$
 $BC = \sqrt{19}3^{4\sin x \cdot \cos x} = 3^{2\sqrt{2}\sin x} AB_1C_1$. Найдите
 $\cos AABC$.



Ответ: 0.9


2 Впишите правильный ответ.

Даны векторы $\vec{a} (25; 0) AB_1C_1$ и $\vec{b} (1; -5) .k$ Найдите длину вектора
 $\vec{a} - 4\vec{b} .S_{ABC} : S_{AB_1C_1} = \frac{S + 5S}{S} = k^2$

Ответ: $11\vec{a}k = \sqrt{6}(4-1)$

3 Впишите правильный ответ.

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются
 вершины $ABC = \sqrt{6}B_1C_1 = 5\sqrt{6}, BAB_1 = x, CA B = x\sqrt{6},$
 $C_1\Delta ABB_1$ правильной треугольной призмы
 $ABCA_1B_1C_1 B_1 B^2 = A B_1^2 + A B^2 - 2 A B_1 \cdot \cos A,$
 площадь основания которой равна 6, а боковое ребро равно 9.



Ответ: 18

4-5 Впишите правильный ответ.

На олимпиаде по математике 550 участников разместили в четырёх аудиториях. В первых трёх удалось разместить по 110 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: 0.4

6 Впишите правильный ответ.

Найдите корень уравнения $\left(\frac{1}{7}\right)^{x+4} = 49 B_1 B^2 = x^2 + (x\sqrt{6})^2 - 2 \cdot x \cdot x\sqrt{6} \cos 30 = 7x^2 - x^2\sqrt{18}.$

Ответ: -8

7 Впишите правильный ответ.

Найдите значение выражения $\frac{2 \sin 136^\circ}{\sin 68^\circ \cdot \sin 22^\circ} B B_1 = x\sqrt{7 - 3\sqrt{2}}.$

Ответ: 4

8 Впишите правильный ответ.


На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. $\triangle ABB_1$ На оси абсцисс отмечено девять точек:

$$x_1 \frac{AB}{\sin \angle AB_1 B} = \frac{BB_1}{\sin \angle A}, x_2 \sin AB_1 B = \frac{AB \sin \angle A}{BB_1}, x_3 \sin \angle AB_1 B = \sin \angle BB_1 C,$$

$$x_4 \sin BB_1 C = \frac{AB \sin \angle A}{BB_1} = \frac{x \sqrt{6} \cdot \frac{1}{2}}{x \sqrt{7 - 3\sqrt{2}}}, x_5 \sin BB_1 C = \frac{\sqrt{6}}{2(7 - 3\sqrt{2})}, x_6 2R = \frac{BC}{\sin \angle BB_1 C},$$

$$x_7 R = \frac{BC}{\sin \angle BB_1 C} : 2 = \frac{5\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{7 - 3\sqrt{2}}}{2 \cdot \sqrt{6}} = 5\sqrt{7 - 3\sqrt{2}}, x_8 5\sqrt{6}, x_9 5\sqrt{7 - 3\sqrt{2}}. \text{ Найдите количество}$$

отмеченных точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.



Ответ: 4

9 Впишите правильный ответ.

При адиабатическом процессе для идеального газа выполняется закон $pV^k = 6,4 \cdot 10^6 \text{ Па} \cdot \text{м}^5$, где p — давление в газе в паскалях, V — объём

газа (в м^3), $k = \frac{5}{3}$. Найдите, какой объём V (в м^3) будет занимать газ

при давлении p , равном $2 \cdot 10^5 \text{ Па}$.

Ответ: 8


10 Впишите правильный ответ.

Призёрами городской олимпиады по математике стали 6 учеников, что составило 5% от числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде?

Ответ: 120

11 Впишите правильный ответ.

На рисунке изображён график функции вида $f(x) = \log_a x$. Найдите значение $f(8)$.



Ответ: -3

12 Впишите правильный ответ.

Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 28x + 96 \cdot \ln x + 31$.

Ответ: 8

13 Дайте развернутый ответ.

а) Решите уравнение $\frac{9^{\sin 2x} - 3^{2\sqrt{2}\sin x}}{\sqrt{11 \sin x}} = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{7\pi}{2}; 5\pi\right]$.

Ответ:

Находим ОДЗ:

Для знаменателя принимаем условие, что он больше 0, так как он под корнем и так как на корень делить нельзя. Тогда $\sin x$ больше 0 в I и II четверти, то есть

$$11 \sin x > 0 \Rightarrow 2\pi k < x < \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Тогда получается знаменатель равен 0

$$9^{\sin 2x} - 3^{2\sqrt{2}\sin x} = 0$$

$$9 = 3^2;$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$3^{4 \sin x \cdot \cos x} - 3^{2\sqrt{2}\sin x} = 0;$$

$$3^{4 \sin x \cdot \cos x} = 3^{2\sqrt{2}\sin x};$$

$$4 \sin x \cos x = 2\sqrt{2} \sin x$$

$$4 \sin x \cos x - 2\sqrt{2} \sin x = 0$$

$$2 \sin x \cdot (2 \cos x - \sqrt{2}) = 0$$

$$\sin x = 0 \text{ или } \cos x = \sqrt{2}/2$$

$$x = \pi k, k \in \mathbb{Z} \text{ или } x = \pm (\pi/4) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$x = \pi k, k \in \mathbb{Z} \text{ не принадлежит ОДЗ}$$

$$x = -(\pi/4) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \text{ не принадлежит ОДЗ}$$

О т в е т.

$$a) x = (\pi/4) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Указанному промежутку принадлежит корень

$$б) x = (\pi/4) + 4\pi = (17\pi/4)$$

14- Дайте развернутый ответ.

17 Окружность проходит через вершины B и C треугольника ABC и пересекает AB и AC в точках C_1 и B_1 соответственно.

а) Докажите, что треугольник ABC подобен треугольнику AB_1C_1 .

б) Вычислите длину стороны BC и радиус данной окружности, если $\angle A = 30^\circ$, $B_1C_1 = 5$ и площадь треугольника AB_1C_1 в пять раз меньше площади четырехугольника BCB_1C_1 .

Ответ:

а) Заметим, что $\angle AB_1C_1 + \angle C_1B_1C = 180^\circ$

Четырехугольник BCB_1C_1 вписан в окружность, отсюда:

$$\angle C_1BC = \angle C_1B_1C = 180^\circ$$

Значит, $\angle AB_1C_1 = \angle C_1BC = \angle ABC$.

Следовательно, треугольники ABC и AB_1C_1 подобны.



Задания №14 и 17 геометрия с развернутыми ответами ЕГЭ математика профиль, ФИПИ

б) Пусть коэффициент подобия треугольников ABC и AB_1C_1 равен k . Тогда имеем:

Отношение площадей двух подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия.

$$S_{ABC} : S_{AB_1C_1} = \frac{S + 5S}{S} = k^2$$

$$k = \sqrt{6}$$

Из подобия получаем

$$BC = \sqrt{6} B_1C_1 = 5\sqrt{6}$$

Пусть $AB_1 = x$, тогда $AB = x\sqrt{6}$

По теореме косинусов для $\triangle ABB_1$:

$$B_1B^2 = AB_1^2 + AB^2 - 2 AB_1 \cdot AB \cdot \cos A$$

$$B_1B^2 = x^2 + (x\sqrt{6})^2 - 2 \cdot x \cdot x\sqrt{6} \cos 30 = 7x^2 - x^2\sqrt{18}$$

$$BB_1 = x\sqrt{7 - 3\sqrt{2}}$$

По теореме синусов для ΔABB_1 :

$$\frac{AB}{\sin \angle AB_1B} = \frac{BB_1}{\sin \angle A}$$

$$\sin \angle AB_1B = \frac{AB \sin \angle A}{BB_1}$$

Но $\sin \angle AB_1B = \sin \angle BB_1C$, поскольку синусы смежных углов равны. Получаем

$$\sin \angle BB_1C = \frac{AB \sin \angle A}{BB_1} = \frac{x\sqrt{6} \cdot \frac{1}{2}}{x\sqrt{7-3\sqrt{2}}}$$

$$\sin \angle BB_1C = \frac{\sqrt{6}}{2(7-3\sqrt{2})}$$

Тогда радиус окружности, описанной около треугольника BB_1C :

$$2R = \frac{BC}{\sin \angle BB_1C}$$

$$R = \frac{BC}{\sin \angle BB_1C} : 2 = \frac{5\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{7-3\sqrt{2}}}{2 \cdot \sqrt{6}} = 5\sqrt{7-3\sqrt{2}}$$

Ответ:

$$6) 5\sqrt{6}; 5\sqrt{7-3\sqrt{2}}$$

15 Дайте развернутый ответ.

Решите неравенство $\log_{49}(x+4) + \log_{(x^2+8x+16)}\sqrt{7} \leq -\frac{3}{4}$.

Ответ: $x \in \langle -4, -277 \rangle \cup [\sqrt{77-4}, -3] \cup \langle -4, -277 \rangle \cup [77-4, -3] \cup \langle -4, -277/7 \rangle \cup [\sqrt{77/7-4}, -3]$

16 Дайте развернутый ответ.

В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на три года в размере S млн рублей, где S — **целое** число. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг увеличивается на 15 % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей.

Месяц и год	Июль 2016	Июль 2017	Июль 2018	Июль 2019
Долг (в млн рублей)	S	$0,8S$	$0,5S$	0

Найдите наибольшее значение S , при котором каждая из выплат будет меньше 4 млн рублей.

Ответ: : _____

18 Дайте развернутый ответ.

Найдите все значения a , для каждого из которых уравнение

$$4^x + (a - 6)2^x = (2 + 3|a|)2^x + (a - 6)(3|a| + 2)$$
 имеет единственное решение.

Ответ: : _____

19 Дайте развернутый ответ.

В школах №1 и №2 учащиеся писали тест. Из каждой школы тест писали

по крайней мере 2 учащихся, а суммарно тест писал 51 учащийся. Каждый учащийся, писавший тест, набрал натуральное количество баллов. Оказалось, что в каждой школе средний балл за тест был целым числом.

После этого один из учащихся, писавших тест, перешёл из школы №1 в школу №2,

а средние баллы за тест были пересчитаны в обеих школах.

а) Мог ли средний балл в школе №1 вырасти в 2 раза?

б) Средний балл в школе №1 вырос на 10%, средний балл в школе №2 также вырос на 10%. Мог ли первоначальный средний балл в школе №2 равняться 1?

в) Средний балл в школе №1 вырос на 10%, средний балл в школе №2 также вырос на 10%. Найдите наименьшее значение первоначального среднего балла в школе №2.

Ответ: а) нет _____