小兒既有錯題 22題重做版

115年第二次醫師二階 · 醫學（四）

抽出日期：2026-10-12 · 題目取自既有校正版彙編

使用方式

每題一頁。先圈選A、B、C或D，標記確定、猶豫或猜，再留下判斷依據。全部題目後才附答案表。

若要回看原有逐選項詳解，請使用同批HTML檔，作答後再展開該題答案與詳解。

範圍

Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q11, Q12, Q13, Q15, Q16, Q18, Q20, Q21, Q22, Q24, Q26, Q30, Q31, Q32

沿用既有小兒Q1–33分類，共22道真正錯題；Q14多答案題、Q28一律給分題按原規格排除。含既有分類中的跨科題，不另改分科。

圖像題

Q8需配官方原試卷第2頁附圖。既有彙編未收錄原圖，本冊也未補造圖片；題旁有官方試卷連結。

考選部正式試題 · 最終更正答案

01 / 22 · 原題Q2

貧血病人血液抹片發現有很多spherocytes，最不可能是下列何種疾病？

A. ABO血型不合引起的溶血性貧血

B. 自體免疫性溶血性貧血

C. 遺傳性球形紅血球症

D. G6PD缺乏症引起的溶血性貧血

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

02 / 22 · 原題Q3

關於兒童第1型糖尿病及第2型糖尿病，下列敘述何者最適當？

A. 第1型糖尿病病童比第2型糖尿病病童有較高比例的糖尿病家族史

B. 第1型糖尿病病童在40歲後或肥胖後會轉變成第2型糖尿病

C. 第1型糖尿病及第2型糖尿病病童均需要接受飲食控制及維持良好的運動習慣

D. 兒童第1型糖尿病為先天性，而兒童第2型糖尿病是飲食異常及肥胖造成

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

03 / 22 · 原題Q4

關於急性細支氣管炎（acute bronchiolitis）之敘述，下列何者最適當？

A. 病理機轉為細支氣管平滑肌收縮導致呼吸費力

B. 聽診時可聽見wheezing及crackles

C. 最重要的致病原為流行性感冒病毒

D. 最主要的治療方式為吸入性抗病毒藥物

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

04 / 22 · 原題Q5

關於痙攣性雙側麻痺（spastic diplegia）的描述，下列何者最不適當？

A. 是所有腦性麻痺中最常見之型態

B. 肢體障礙通常上肢比下肢嚴重

C. 早產兒的腦室旁白質軟化症是常見致病因

D. 要注意兒童的動作發展，尤其是爬行動作

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

05 / 22 · 原題Q6

有一個寶寶在1歲10個月時因川崎氏症而接受高劑量（2 g/kg）免疫球蛋白注射，今日滿2歲3個月。若想要注射日本腦炎活性減毒疫苗，下列建議何者最為適當？

A. 今日可以注射

B. 今日不可以注射，建議下個月再注射

C. 今日不可以注射，建議再過3個月就可以注射

D. 今日不可以注射，建議再過6個月就可以注射

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

06 / 22 · 原題Q7

下列何種狀況最容易造成Apgar score的偽陰性？

A. 母親被給予magnesium sulfate過後出生的新生兒

B. 新生兒先天性肌肉病變（congenital myopathy）

C. 胎兒的血液中catecholamine過高者

D. 早產兒

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

07 / 22 · 原題Q8

依異常發生的機轉命名與定義，附圖箭頭處造成的異常，最可能屬於哪一種先天缺陷分類？

A. 畸形（malformation）

B. 發育不良（dysplasia）

C. 形變（deformation）

D. 發育中斷（disruption）

> 附圖未收錄於原彙編。本題須配合 考選部官方試卷第2頁 箭頭所示圖片作答；不要只憑文字猜圖。

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

08 / 22 · 原題Q9

下列關於新生兒復甦術（neonatal resuscitation program）的敘述，何者最不適當？

A. 新生兒復甦術處置流程依循C（circulation）A（airway）B（breathing）的原則

B. 過程中若需要監測血氧（SpO_2），應監測右上肢血氧

C. 初始步驟後，若經適當正壓換氣後，心率仍為每分鐘50下，在考慮開始胸部按壓前，應先置放氣管內管

D. 胸部按壓與正壓換氣比為3：1

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

09 / 22 · 原題Q11

1歲大女嬰因為有心雜音，診斷為supravalvular aortic stenosis合併peripheral pulmonary stenosis。下列何種先天性症候群最需被優先考慮？

A. Noonan syndrome

B. William syndrome

C. Turner syndrome

D. CHARGE syndrome

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

10 / 22 · 原題Q12

足月男嬰出生體重為3.5公斤，1個月大時被聽到第3度收縮期的心雜音，懷疑是心室中隔缺損（ventricular septal defect）。下列何種臨床表現或是檢查結果暗示已有心臟衰竭的可能？

A. 目前體重為4公斤

B. 平靜時的呼吸次數為每分鐘40次

C. 平靜時的心跳次數為每分鐘120下

D. 右側肋骨下緣可摸到約1公分的肝臟

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

11 / 22 · 原題Q13

有關正常腸道發展，下列敘述何者最不適當？

A. 食道、胃及前段十二指腸是由前腸（foregut）發展而成

B. 降結腸及上段肛管是由後腸（hindgut）發展而成

C. 神經峭（neural crest）細胞的遷移是由顱部至尾部

D. 小腸及全段橫結腸是由中腸（midgut）發展而成

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

12 / 22 · 原題Q15

關於膽道閉鎖（biliary atresia）的敘述，下列何者最不適當？

A. 新生兒糞便如呈現淡黃色或灰白色，應懷疑是否有膽道閉鎖或肝內膽汁滯留的可能

B. 西方國家膽道閉鎖的發生率，比東亞國家為高

C. 膽道閉鎖在肝切片檢查最重要的特徵是膽管增生（bile ductular proliferation）

D. 膽道閉鎖宜及早完成診斷，建議在60天以內完成葛西手術（Kasai procedure）

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

13 / 22 · 原題Q16

有關嬰幼兒阻塞性尿路疾病（obstructive uropathy）之影像學檢查，下列何者最不適合？

A. 靜脈注射腎盂攝影（intravenous pyelogram）

B. 排尿時膀胱尿道攝影術（voiding cystourethrogram）

C. 前行性腎盂攝影（antegrade pyelogram）

D. 核醫掃描（renal scintigraphy）

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

14 / 22 · 原題Q18

有關兒童泌尿道感染（urinary tract infection）之危險因子（risk factors），下列何者最不適當？

A. 泌尿系統結構異常（anatomic abnormality）

B. 便秘（constipation）

C. 如廁訓練時（toilet training）

D. 割包皮男孩（circumcised male）

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

15 / 22 · 原題Q20

下列何者為 Henoch-Schönlein purpura 最不常見的臨床表現？

A. 關節痛（arthralgia）

B. 腹痛（abdominal pain）

C. 血尿或蛋白尿（hematuria or proteinuria）

D. 嗜中性白血球低下（neutropenia）

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

16 / 22 · 原題Q21

5歲女童流鼻水，咳嗽一週以上，最近3～4天高燒達39.5℃，且鼻水轉變為黃綠濃稠狀，伴有頭痛，夜間咳嗽較明顯，此外無其它症狀。最可能的診斷為：

A. 急性鼻咽炎（acute nasopharyngitis）

B. 急性鼻竇炎（acute sinusitis）

C. 急性支氣管炎（acute bronchiolitis）

D. 過敏性鼻炎（allergic rhinitis）

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

17 / 22 · 原題Q22

關於幼兒期接受癌症治療多年後，較常產生的延遲效應（late adverse effect），下列敘述何者最不適當？

A. Anthracyclines類藥物（如doxorubicin）：高頻為主的聽力下降

B. 頭部放療：影響執行功能、注意力、記憶力、處理速度、視力

C. Bleomycin：肺纖維化

D. Vincristine及vinblastine：周邊神經病變

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

18 / 22 · 原題Q24

關於肋膜積液是滲出液（exudate）或漏出液（transudate）的鑑別診斷，下列何者最不適當？

A. Exudate液體所含蛋白質經常 > 3.0 g/dL

B. Transudate液體pH值經常 < 7.2

C. Exudate液體中的LDH值經常 > 200 IU/L

D. Transudate液體中的葡萄糖經常 ≧ 60 mg/dL

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

19 / 22 · 原題Q26

下列何種狀況最不可能造成次發性腎上腺功能不全（secondary adrenal insufficiency）？

A. 先天性腎上腺增生症（congenital adrenal hyperplasia）

B. 突然停掉服用超過一個月的腎上腺皮質酮（prednisolone）

C. 前腦無裂畸形（holoprosencephaly）

D. 腦垂體（pituitary gland）曾接受過放射線治療（radiotherapy）

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

20 / 22 · 原題Q30

6歲男童，上課時常常坐不住，愛四處亂跑，無法專心學習，對老師的勸誡皆不聽從，同學們也都因此排擠他。醫師評估可能是注意力不足 / 過動症（ADHD），有關此病症，下列敘述何者最適當？

A. 診斷必要的條件包含腦波檢查結果是正常

B. 學齡前的孩子還太小，所以不應該有ADHD診斷

C. 大約60 ~ 80% ADHD的兒童到青春期症狀不會持續存在

D. 診斷上相關症狀應需持續超過6個月

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

21 / 22 · 原題Q31

下列何者不是5歲兒童下運動神經元（lower motor neuron）受損的症狀？

A. 肌肉無力

B. 無 Babinski sign

C. 肌肉不自主顫動（fasciculation）

D. 深層肌腱反射變強

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

22 / 22 · 原題Q32

意識改變是臨床上很重要的評估，Glasgow Coma Scale（GCS）昏迷指數≦8時，往往需要積極維持呼吸道之處理。下列關於兒童意識評估的描述，何者最不適當？

A. GCS中，「語言表達反應」在嬰幼兒與較大兒童意識評估上有所不同

B. 「坐立難安、激動（restless, agitated）」在嬰幼兒的GCS語言項目評為3分

C. 「可定位疼痛（localizes pain）」在嬰幼兒的GCS動作項目上評為5分

D. 長期臥床無反應的病患，開閉眼、肢體動作、腦幹反射與呼吸型態皆為Full Outline of Unresponsiveness score評估的項目

本次作答：A / B / C / D
把握度：確定 / 猶豫 / 猜

判斷依據 / 仍不確定的地方：

答案表 · 完成重做後再看

答案依醫學（四）官方最終更正及固定基準核對。此次抽出的22題均無特殊計分。

本冊序號	原題號	官方答案	上次作答
01	Q2	**D**	A
02	Q3	**C**	A
03	Q4	**B**	C
04	Q5	**B**	A
05	Q6	**D**	C
06	Q7	**C**	A
07	Q8	**D**	B
08	Q9	**A**	D
09	Q11	**B**	D
10	Q12	**A**	B
11	Q13	**D**	C
12	Q15	**B**	C
13	Q16	**A**	D
14	Q18	**D**	B
15	Q20	**D**	B
16	Q21	**B**	A
17	Q22	**A**	C
18	Q24	**B**	D
19	Q26	**A**	C
20	Q30	**D**	C
21	Q31	**D**	B
22	Q32	**B**	C