

2023年全国硕士研究生招生考试（西医综合）试题&答案

一、A型题：1~40题，每小题1.5分；41~115小题，每小题2分；共210分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，请选出最符合题目要求的一项。

1.下列选项属于前馈的是

- A.动脉血压在压力感受器作用下维持稳定
- B.脚踩铁钉引起肢体回撤动作
- C.长期大剂量使用可的松引起肾上腺皮质萎缩
- D.百米赛跑枪声未响运动员心率增加

【答案】D

2.单纯扩散的是

- A.葡萄糖
- B.肽类激素
- C.氨基酸
- D.甘油

【答案】D

3.横纹肌收缩中，与横桥结合的蛋白是

- A.肌钙蛋白
- B.原肌球蛋白
- C.肌动蛋白
- D.钙调蛋白

【答案】C

4.RH阳性的抗原

- A.A抗原
- B.B抗原
- C.H抗原
- D.D抗原

【答案】D

5.在一个心动周期里，第一心音出现在

- A.等容收缩期
- B.等容舒张期
- C.快速射血期
- D.减慢射血期

【答案】A

6.心室肌细胞静息电位和动作电位平台期都发挥作用的离子流是

- A. I_K
- B. I_{K1}



C. I_{Ca-L}

D. I_{Ca-T}

【答案】B

7.肺泡表面活性物质是哪个细胞分泌的

- A.肺泡上皮 I 型细胞
- B.肺泡上皮 II 型细胞
- C.肺间质细胞
- D.肥大细胞

【答案】B

8.胃和十二指肠黏膜含有抑制胃酸和胃蛋白酶原分泌的物质是

- A. HCO_3^-
- B.前列腺素
- C.缩胆囊素
- D.组胺

【答案】B

9.一般情况下，人体 24 小时内的不感蒸发量约为

- A.200ml
- B.600ml
- C.1000ml
- D.1500ml

【答案】C

10.肾脏在对尿液的浓缩和稀释、调节体内水平衡中，起关键作用的活性物质是

- A.肾素
- B.醛固酮
- C.血管升压素
- D.血管紧张素

【答案】C

11.肾小管通过泌酸，调节体内酸碱平衡中，其中起重要作用的酶

- A.环加氧酶
- B.碳酸酐酶
- C.磷酸二酯酶
- D.钠钾 ATP 酶

【答案】B

12.筒箭毒碱对于突触的影响

- A.影响突触前膜递质的融合
- B.影响突触前膜递质释放
- C.影响胆碱酶活性
- D.影响突触后膜受体活性



【答案】D

13.下列节后神经纤维中，属于交感肾上腺素能神经纤维的是

- A.支配全身小汗腺的神经纤维
- B.引发骨骼肌血管舒张的神经纤维
- C.引起大量稀薄唾液分泌的神经纤维
- D.寒冷时引起皮肤血管收缩的神经纤维

【答案】D

14.被视物体由远及近，不会出现的眼调节活动有

- A.双眼汇聚
- B.晶状体变凸
- C.瞳孔调节活动
- D.瞳孔对光反射

【答案】D

15.甲状腺功能亢进症患者，不会出现的表现有

- A.低血糖
- B.心力衰竭
- C.骨质疏松
- D.精神亢进

【答案】A

16.睾丸分泌的抑制素生理作用

- A.抑制 FSH
- B.抑制 睾酮
- C.抑制 LH
- D.抑制 GNRH 分泌

【答案】A

17.下列属于蛋白质结构域结构层次的是

- A.一级结构
- B. α 融合
- C. β 折叠
- D.三级结构

【答案】D

18.关于酶促反应调节的叙述，错误的是

- A.酶蛋白可以通过构象变化被调节
- B.酶蛋白可以通过共价修饰被调节
- C.酶原通过激活过程产生有活性的酶
- D.酶蛋白合成是酶的快速调节

【答案】D



19.NAD⁺和 NADP⁺所含的维生素是

- A.维生素 B₁
- B.维生素 B₂
- C.维生素 PP
- D.维生素 K

【答案】C

20.催化磷酸烯醇式丙酮酸转化为丙酮酸产生 ATP 的酶是

- A.醛缩酶
- B.磷酸甘油酸激酶
- C.丙酮酸激酶
- D.丙酮酸脱氢酶

【答案】C

21.脂肪酸 β 氧化途径的限速酶是

- A.脂酰 COA 合成酶
- B.肉碱脂酰转移酶 I
- C.脂酰 COA 脱氢酶
- D. β -酮脂酰 COA 硫解酶

【答案】B

22.呼吸链复合体中不存在氧化磷酸化偶联部位的是

- A.复合体 I
- B.复合体 II
- C.复合体 III
- D.复合体 IV

【答案】B

23.下列酶中，调节尿素合成的关键酶是

- A.鸟氨酸氨基甲酰转移酶
- B.精氨酸代琥珀酸合成酶
- C.精氨酸代琥珀酸裂解酶
- D.精氨酸酶

【答案】B

24.不直接参与合成嘌呤核苷酸的物质是

- A.谷氨酰胺
- B.天冬氨酸
- C.丝氨酸
- D.一碳单位

【答案】C

25.具有修复双链断裂 DNA 损伤的修复系统是

- A.错配修复



- B. 直接修复
- C. 重组修复
- D. 碱基切除修复

【答案】C

26. 下列密码子的特点中，与移码突变有关的是

- A. 通用性
- B. 方向性
- C. 连续性
- D. 摆动性

【答案】C

27. 真核生物转录因子结构中，属于转录激活结构域的是

- A. 锌指结构
- B. 螺旋-环-螺旋
- C. 亮氨酸拉链
- D. 富含谷氨酰胺结构域

【答案】D

28. 目前常用于分析体内 DNA 与蛋白质相互作用的分子生物学技术是

- A. 标签蛋白沉淀
- B. 凝胶迁移变动分析
- C. 蛋白质印迹技术
- D. 酵母双杂交

【答案】B

29. 在巨噬细胞内形成的色素是

- A. 脂褐素
- B. 黑色素
- C. 胆红素
- D. 含铁血黄素

【答案】D

30. 容易发生机化的病变是

- A. 肺脓肿
- B. 脑梗死灶
- C. Barrett 食管
- D. 宫颈管鳞状上皮化生

【答案】A

31. 左心房形成球状血栓的类型是

- A. 红色血栓
- B. 白色血栓
- C. 透明血栓



D.混合血栓

【答案】D

32.男性，62岁。体检时发现右锁骨上淋巴结肿大，无压痛。淋巴结切除送检，病理诊断：淋巴结内可见腺癌浸润。肿瘤原发部位最可能是

- A.食管
- B.胃
- C.肝
- D.肺

【答案】D

33.在微小病变性肾小球病中，肾小球在光镜下的主要特点

- A.局灶性节段性玻璃样变和硬化
- B.系膜细胞增生，系膜基质增厚
- C.新月体形成
- D.基本正常

【答案】D

34.与肝功能不全无直接关系的临床表现是

- A.出血倾向
- B.黄疸
- C.脾大
- D.蜘蛛痣

【答案】C

35.下列肿瘤中，不属于恶性肿瘤的是

- A.神经母细胞瘤
- B.髓母细胞瘤
- C.肾母细胞瘤
- D.骨母细胞瘤

【答案】D

36.胃体黏膜活检可见大量假幽门腺化生，病理诊断为

- A.慢性浅表性胃炎
- B.慢性萎缩性胃炎
- C.慢性肥厚性胃炎
- D.疣状胃炎

【答案】B

37.可伴有低钙血症表现的甲状腺癌是

- A.乳头状癌
- B.滤泡状癌
- C.髓样癌
- D.未分化癌



【答案】C

38.易累及骨旁组织形成“冷脓肿”的是

- A.骨肉瘤
- B.骨结核
- C.骨髓瘤
- D.骨髓炎

【答案】B

39.子宫颈息肉的病变性质是

- A.良性肿瘤
- B.癌前病变
- C.原位癌
- D.炎性病变

【答案】D

40.关于卵巢交界性浆液性囊腺瘤的叙述，正确的是

- A.由两个胚层组织构成
- B.由两种不同的上皮组织构成
- C.生物学行为介于良性与恶性之间
- D.有上皮组织和间叶组织构成

【答案】C

41.下列疾病中，最可能先出现意识障碍后发热的疾病有：

- A.流行性乙型脑炎
- B.中暑
- C.有机磷农药中毒
- D.中毒性痢疾

【答案】C

42.下列提示支气管哮喘重度急性发作的是：

- A.呼吸频率>30 次/分
- B.日间哮喘症状>4 次/周
- C.双肺散在呼气相哮鸣音
- D.PEF 占预计值百分比 65%

【答案】A

43.女性，40岁，低热，间断咯血2个月，每次3~4口，鲜红色，既往体检。查体：T 37.8°C，双肺叩诊清音，呼吸音清，未闻及干湿啰音，肺CT提示双上肺多发结节，内有空洞，最有助于确诊的检查是：

- A.PPD 试验可见水疱
- B.肺穿刺活检可见肉芽肿病变
- C.痰涂片抗酸染色阳性
- D.干扰素释放试验阳性



【答案】B

44.不适用于肺炎支原体肺炎治疗的抗生素是：

- A.大环内酯类
- B.喹诺酮类
- C.四环素
- D. β -内酰胺类

【答案】D

45.男，72岁，高血压，心动过缓，在当地医院诊断心房颤动，采用华法林治疗。1周来黑朦，RR间期大于2.5S。在华法林治疗的基础上，加用：

- A.胺碘酮转复
- B.植入DDD起搏器
- C.射频消融+ β 受体阻滞剂
- D.射频消融+起搏器

【答案】D

46.男，65岁，四小时前胸部疼痛，持续不缓解，医院诊断“右室心肌梗死”，血压82/55，四肢末梢体温正常，下列治疗措施应选用：

- A.静注硝酸甘油
- B.静脉补液
- C.静点多巴胺升压
- D.植入起搏器

【答案】B

47.可作为鉴别急性心肌炎和扩张性心肌病的检查是？

- A.胸部X线
- B.心肌损伤标志物
- C.血BNP
- D.超声心动图

【答案】B

48.24小时动态血压检查诊断高血压的标准：

- A.白天≥140/90或者夜间≥130/90
- B.白天≥140/90或者夜间≥130/80
- C.白天≥135/85或者夜间≥120/70
- D.白天≥130/80或者夜间≥120/80

【答案】C

49.女，38岁，反复反酸烧心，平卧位时更明显，近一年加重，最应选择哪种药物治疗？

- A.硫糖铝
- B.奥美拉唑
- C.法莫替丁
- D.多潘立酮



【答案】B

50.下列对诊断门脉高压腹水最有价值的检查是

- A.腹水 ADA
- B.腹水 LDH
- C.腹水白细胞
- D.血清腹水清蛋白梯度

【答案】D

51.女，64岁，饱餐后上腹痛并恶心呕吐4小时，吐后腹痛持续不缓解，并向腰背部放射，既往高血压病史，下列检查对病因最有价值的是

- A.血常规
- B.心电图
- C.血清淀粉酶
- D.急诊胃镜

【答案】C

52.急性肾盂肾炎最常见的感染途径

- A.上行性
- B.血行性
- C.淋巴道
- D.直接感染

【答案】A

53.男性，25岁，发热伴皮肤淤斑1周。查体：体温38.5℃，贫血貌，皮肤见数处瘀斑，胸骨压痛（+）。血常规：血红蛋白75g/l，wbc 16.2×10⁹，plt 25×10⁹。骨髓细胞学检查见原始细胞87%，原始细胞的mpo弱阳性，nse阳性，naf可抑制。该患者最可能的特异性表现是

- A.浅表淋巴结肿大
- B.脾大
- C.睾丸无痛性肿大
- D.牙龈增生、肿胀

【答案】D

54.关于cushing综合症的病因诊断，除了测血ACTH，以下最有价值检查项目是

- A.24小时游离皮质醇
- B.血皮质醇节律变化
- C.大剂量地塞米松抑制试验
- D.小剂量地塞米松抑制试验

【答案】C

55.以下风湿性疾病，分类属于脊柱关节炎的是

- A.银屑病关节炎
- B.骨关节炎



- C.风湿性关节炎
- D.类风湿性关节炎

【答案】A

56.女性，26岁，左下肢肿胀，疼痛。既往曾多次流产。血常规：Hb 115g/L，WBC $7 \times 10^9/L$ ，Plt 45×10^9 。为明确诊断，最有价值的检查为

- A.血抗核抗体
- B.血抗磷脂抗体
- C.血类风湿因子
- D.骨髓检查

【答案】B

57.关于术后腹部伤口裂开的原因，错误的是

- A.营养不良
- B.手术后剧烈咳嗽
- C.使用糖皮质激素
- D.行切口减张缝合

【答案】D

58.下列关于术前胃肠道准备的叙述，正确的是

- A.禁食4小时，禁饮水2小时
- B.禁食6小时，禁饮水2小时
- C.禁食12小时，禁饮水4小时
- D.禁食24小时，禁饮水12小时

【答案】C

59.男性，24岁。撞伤右季肋部1小时急诊就诊。初步诊断为失血性休克，肝破裂。在等待血型鉴定和交叉配血期间，首选的输注液体是

- A.5%葡萄糖液
- B.5%葡萄糖氯化钠溶液
- C.平衡盐溶液
- D.10%葡萄糖液

【答案】C

60.关于良性前列腺增生手术指征，错误的是

- A.反复尿潴留
- B.反复泌尿系感染
- C.血清PSA轻度升高
- D.继发膀胱结石

【答案】C

61.男性，23岁，因胸部钝挫伤2小时来诊，自诉呼吸困难，听诊右侧肺呼吸音消失，胸片提示右侧大量胸腔积液。为明确诊断，最有价值的检查是

- A.胸部CT



- B.胸部超声
- C.胸腔穿刺
- D.胸部MRI 难度

【答案】C

62.女性，40岁。发现颈部肿块伴疼痛3天就诊。查体：左颈前可触及直径3cm肿物，边界清，质韧，光滑，可随吞咽移动，触痛（+）。最可能的诊断是

- A.亚急性甲状腺炎
- B.甲状舌管囊肿
- C.甲状腺腺瘤囊内出血
- D.甲状腺癌

【答案】C

63.关于腹股沟直疝，以下说法正确的是

- A.疝内容物在腹壁下动脉外侧突出
- B.多见于青年男性
- C.堵住深环后站立疝仍可突出
- D.易嵌顿绞窄

【答案】C

64.男性，90岁，右上腹痛5天就诊，既往有心肌梗死、脑出血病史。查体T38°C，右上腹压痛明显，腹部B超提示胆囊10cm*5cm，壁厚0.5cm，腔内可见多发结石，直径最大1.5cm，胆总管直径0.6cm。化验血：WBC15*10^9/L。最适宜的治疗方案是

- A.急诊胆囊切除术
- B.急诊胆囊切除加胆总管引流术
- C.急诊经皮经肝胆囊穿刺引流术
- D.急诊开腹胆囊造瘘术

【答案】C

65.骨盆骨折合并尿道损伤和失血性休克患者，正确的处理顺序是

- A.骨盆骨折-尿道损伤-休克
- B.尿道损伤-休克-骨盆骨折
- C.休克-骨盆骨折-尿道损伤
- D.休克-尿道损伤-骨盆骨折

【答案】D

66.肩关节脱位中发生率最高的是

- A.后脱位
- B.上脱位
- C.前脱位
- D.下脱位

【答案】C

67.骨筋膜室综合症最早期的临床表现是



- A.患肢皮肤发黑
- B.患肢肌力减退
- C.患肢手指或足趾呈屈曲状态
- D.患肢持续性剧烈疼痛

【答案】D

68.男性，32岁，因发热、盗汗、咳嗽伴右胸痛2周，气短不能平卧3天来诊。既往有肺结核病史。查体：T 37.8°C，P 96次/分，R 20次/分，BP 110/70mmHg。气管向左偏斜，右中下肺叩诊浊音，呼吸音消失，双肺未闻及干湿性啰音，心律齐，心音正常，肝脾肋下未及，双下肢无水肿。最可能的诊断是

- A.右下肺炎
- B.右侧胸膜肥厚
- C.肺栓塞
- D.右侧胸腔积液

【答案】D

69.男性，32岁，因发热、盗汗、咳嗽伴右胸痛2周，气短不能平卧3天来诊。既往有肺结核病史，查体：T 37.8°C，P 96次/分，R 20次/分，BP 110/70mmHg。气管向左偏斜，右中下肺叩诊浊音，呼吸音消失，双肺未闻及干湿性啰音，心律齐，心音正常，肝脾肋下未及，双下肢无水肿。为尽快缓解该患者症状，制定下一步诊治方案，应首选的检查是

- A.胸部B超
- B.心电图
- C.胸部CT
- D.CTPA

【答案】A

70.男性，45岁，因4个月来乏力、食欲下降伴腹胀、尿少，1个月来低热，活动后气短、腹胀明显加重来诊。既往有肝炎病史。查体：T 37.5°C，P 98次/分，R 18次/分，BP 104/72mmHg。半卧位，上胸部可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺（-），全腹有压痛及反跳痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音（+），双下肢可凹性水肿（+）。化验：血Hb 106g/L，WBC $7.4 \times 10^9/L$ ，N 0.88，PLT $70 \times 10^9/L$ ，尿胆红素（+），血ALT 110U/L，AST 130U/L，T-Bil 98μmol/L，D-Bil 65μmol/L。应首先考虑的诊断是

- A.肝硬化并发自发性细菌性腹膜炎
- B.肝硬化并发门静脉血栓
- C.肝硬化并发结核性腹膜炎
- D.肝硬化并发肝癌

【答案】A

71.男性，45岁，因4个月来乏力、食欲下降伴腹胀、尿少，1个月来低热，活动后气短、腹胀明显加重来诊。既往有肝炎病史。查体：T 37.5°C，P 98次/分，R 18次/分，BP 104/72mmHg。半卧位，上胸部可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺（-），全腹有压痛及反跳痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音（+），双下肢可凹性水肿（+）。化验：血Hb 106g/L，WBC $7.4 \times 10^9/L$ ，N 0.88，PLT $70 \times 10^9/L$ ，尿胆红素（+），血ALT 110U/L，AST 130U/L，T-Bil 98μmol/L，D-Bil 65μmol/L。对该患者进行腹腔穿刺做腹水检查的最主要适应证是



- A.T 37.5℃，巩膜黄染，肝功能异常
- B.T 37.5℃，全腹有压痛及反跳痛，移动性浊音（+）
- C.巩膜黄染，肝脾触诊不满意
- D.肝疾病史，可见蜘蛛痣，巩膜黄染

【答案】B

72.男性，45岁，因4个月来乏力、食欲下降伴腹胀、尿少，1个月来低热，活动后气短、腹胀明显加重来诊。既往有肝炎病史。查体：T 37.5℃，P 98次/分，R 18次/分，BP 104/72mmHg。半卧位，上胸部可见蜘蛛痣，巩膜轻度黄染，心肺（-），全腹有压痛及反跳痛，肝脾触诊不满意，移动性浊音（+），双下肢可凹性水肿（+）。化验：血 Hb 106g/L，WBC 7.4×10⁹/L，N 0.88，PLT 70×10⁹/L，尿胆红素（+），血 ALT 110U/L，AST 130UL，T-Bil 98umol/L，D-Bil 65umol/L。下列支持该患者诊断的腹水检查结果是

- A.外观透明浅黄，比重 1.012，蛋白定量 15g/L
- B.外观混浊，白细胞数 600×10⁶/L，单核 98%，蛋白定量 35g/L
- C.外观混浊，白细胞数 900×10⁶/L，多核 60%，蛋白定量 45g/L
- D.外观混浊，比重 1.015，蛋白定量 25g/L，LDH 158U/L

【答案】C

73.男性，61岁，反复咳嗽、咳痰10余年，活动后气短1年，1周前受凉后出现气短加重，咳黄痰，伴发热，体温最高39℃，夜间可平卧。既往吸烟30年。查体：T 38.2℃，P 96次/分，R 23次/分，BP 150/80mmHg，神态清楚，球结膜水肿，口唇发绀，桶状胸，听诊双肺呼吸音低，可闻及散在湿罗音。未吸氧时动脉血气分析示 PH 7.31，PaCO₂ 78mmHg，PaO₂ 52mmHg。该患者出现 PaCO₂ 升高的原因不包括：

- A.肺泡通气量下降
- B.无效腔通气增加
- C.内源性 PEEP
- D.弥散功能障碍

【答案】D

74.男性，61岁，反复咳嗽、咳痰10余年，活动后气短1年，1周前受凉后出现气短加重，咳黄痰，伴发热，体温最高39℃，夜间可平卧。既往吸烟30年。查体：T 38.2℃，P 96次/分，R 23次/分，BP 150/80mmHg，神态清楚，球结膜水肿，口唇发绀，桶状胸，听诊双肺呼吸音低，可闻及散在湿罗音。未吸氧时动脉血气分析示 PH 7.31，PaCO₂ 78mmHg，PaO₂ 52mmHg。引起该患者病情加重最不可能的病原体是

- A.流感嗜血杆菌
- B.肺炎链球菌
- C.肺炎支原体
- D.铜绿假单胞菌

【答案】C

75.男性，61岁，反复咳嗽、咳痰10余年，活动后气短1年，1周前受凉后出现气短加重，咳黄痰，伴发热，体温最高39℃，夜间可平卧。既往吸烟30年。查体：T 38.2℃，P 96次/分，R 23次/分，BP 150/80mmHg，神态清楚，球结膜水肿，口唇发绀，桶状胸，听诊双肺呼吸音低，可闻及散在湿罗音。未吸氧时动脉血气分析示 PH 7.31，PaCO₂ 78mmHg，PaO₂ 52mmHg。

该患者经治疗后出现嗜睡，意识模糊。复查动脉血气分析（吸氧 2L/min）：PH 7.24, PaCO₂ 85mmHg, PaO₂ 62mmHg, 首选的治疗措施是

- A. 气管插管有创机械通气
- B. 无创机械通气
- C. 经鼻高流量氧疗
- D. 上调吸氧流量至 5L/min

【答案】A

76.女性，36岁，发热2周，体温波动在37.5-38.5°C，伴乏力、出汗，食欲不振，既往有甲亢、二尖瓣脱垂史，查体：T 38.1C, P 106次/分, BP 110/75mmHg, BMI 18kg/m², 左眼睑结膜可见淤点，咽充血，甲状腺无肿大，心界稍大，心律齐，心尖部内侧可闻及4/6级收缩期吹风样杂音，肝未及，脾肋下1cm，化验：血 Hb 98g/L, WBC 11.2*10⁹/L, ESR 85mm/h, 尿常规：蛋白（±），沉渣镜检 RBC 10-15个/HP。该患者最可能的诊断是

- A. 甲状腺功能亢进症
- B. 亚急性感染性心内膜炎
- C. 风湿热活动期
- D. 急性肾小球肾炎

【答案】B

77.女性，36岁，发热2周，体温波动在37.5-38.5°C，伴乏力、出汗，食欲不振，既往有甲亢、二尖瓣脱垂史，查体：T 38.1C, P 106次/分, BP 110/75mmHg, BMI 18kg/m², 左眼睑结膜可见淤点，咽充血，甲状腺无肿大，心界稍大，心律齐，心尖部内侧可闻及4/6级收缩期吹风样杂音，肝未及，脾肋下1cm，化验：血 Hb 98g/L, WBC 11.2*10⁹/L, ESR 85mm/h, 尿常规：蛋白（±），沉渣镜检 RBC 10-15个/HP。该患者还可能出现的体征是

- A. Osler 结节
- B. 环形红斑
- C. Janeway 损害
- D. Graefe 征

【答案】A

78.女性，36岁，发热2周，体温波动在37.5-38.5°C，伴乏力、出汗，食欲不振，既往有甲亢、二尖瓣脱垂史，查体：T 38.1C, P 106次/分, BP 110/75mmHg, BMI 18kg/m², 左眼睑结膜可见淤点，咽充血，甲状腺无肿大，心界稍大，心律齐，心尖部内侧可闻及4/6级收缩期吹风样杂音，肝未及，脾肋下1cm，化验：血 Hb 98g/L, WBC 11.2*10⁹/L, ESR 85mm/h, 尿常规：蛋白（±），沉渣镜检 RBC 10-15个/HP。下列检查中，最有可能为明确诊断提供重要依据的是

- A. 血 C 反应蛋白
- B. 胸部 CT 检查
- C. 甲状腺 B 超检查
- D. 超声心动图检查

【答案】D

79.男性，31岁，3个月来低热，右下腹痛，加重半个月，常有便秘，有时腹泻伴糊样便。既往有肺结核病史。查体：T 37.6°C，浅表淋巴结无肿大，心肺未见异常，腹软，右下腹可触

及一 $4\text{cm} \times 3\text{cm}$ 大小肿块，质中，中度压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音（-）。化验：血 Hb 135g/L，ESR 65mm/h。最可能的诊断是

- A. 右侧结肠癌
- B. 肠结核
- C. 克罗恩病
- D. 肠淋巴瘤

【答案】B

80. 男性，31岁，3个月来低热，右下腹痛，加重半个月，常有便秘，有时腹泻伴糊样便。既往有肺结核病史。查体：T 37.6°C ，浅表淋巴结无肿大，心肺未见异常，腹软，右下腹可触及一 $4\text{cm} \times 3\text{cm}$ 大小肿块，质中，中度压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音（-）。化验：血 Hb 135g/L，ESR 65mm/h。为明确诊断，最有意义的检查是

- A. 便常规+隐血
- B. 腹部 B 超
- C. 结肠镜
- D. X 线钡剂灌肠

【答案】C

81. 男性，31岁，3个月来低热，右下腹痛，加重半个月，常有便秘，有时腹泻伴糊样便。既往有肺结核病史，查体：T 37.6°C ，浅表淋巴结无肿大，心肺未见异常，腹软，右下腹可触及一 $4\text{cm} \times 3\text{cm}$ 大小肿块，质中，中度压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音（-），化验：血 Hb 135g/L，ESR 65mm/h，首选的治疗是

- A. 抗结核治疗
- B. 手术治疗
- C. 全身肿瘤联合化疗
- D. 应用柳氮磺吡啶

【答案】A

82. 男性，22岁，2周前发热伴咽痛，2天来双眼睑水肿和双下肢中度凹陷性水肿。血压 $150/95\text{mmHg}$ 。化验尿蛋白（++），尿沉渣镜检 RBC 30~50 个/Hp，血肌酐 $96\mu\text{mol/L}$ ，血尿素氮 7mmol/L 。下一步首选的辅助检查是

- A. 心电图
- B. 血常规
- C. 尿本周蛋白
- D. 尿相差显微镜检查

【答案】D

83. 男性，22岁。2周前发热伴咽痛，2天来双眼睑水肿和双下肢中度凹陷性水肿。血压 $150/95\text{mmHg}$ 。化验尿蛋白（++），尿沉渣镜检 RBC 30~50 个/Hp，血肌酐 $96\mu\text{mol/L}$ ，血尿素氮 7mmol/L 。该患者肾脏病理检查最可能的病变类型是

- A. 系膜毛细血管性肾小球肾炎
- B. 系膜增生性肾小球肾炎
- C. 毛细血管增生性肾小球肾炎
- D. 新月体肾炎



【答案】C

84.该患者血压增高最可能的原因是

- A.原发性高血压
- B.水、钠潴留
- C.肾动脉狭窄
- D.血醛固酮增高

【答案】B

85.男性，27岁。一个月来头晕、乏力，加重3天，既往体健。查体：贫血貌，巩膜轻度黄染，肺（-），心率96次/分，心律齐，腹软，肝肋下未触及，脾肋下1cm。血常规：Hb 75g/L，RBC $2.5 \times 10^12/L$ ，WBC $7.4 \times 10^9/L$ ，Plt $185 \times 10^9/L$ 。最可能的贫血诊断是

- A.缺铁性贫血
- B.巨幼细胞贫血
- C.再生障碍性贫血
- D.溶血性贫血

【答案】D

86.男性，27岁。一个月来头晕、乏力，加重3天，既往体健。查体：贫血貌，巩膜轻度黄染，肺（-），心率96次/分，心律齐，腹软，肝肋下未触及，脾肋下1cm。血常规：Hb 75g/L，RBC $2.5 \times 10^12/L$ ，WBC $7.4 \times 10^9/L$ ，Plt $185 \times 10^9/L$ 。首选最有意义的检查是

- A.红细胞沉降率
- B.血白细胞分类
- C.血网织红细胞计数
- D.粪常规+隐血试验检查

【答案】C

87.男性，27岁。一个月来头晕、乏力，加重3天，既往体健。查体：贫血貌，巩膜轻度黄染，肺（-），心率96次/分，心律齐，腹软，肝肋下未触及，脾肋下1cm。血常规：Hb 75g/L，RBC $2.5 \times 10^12/L$ ，WBC $7.4 \times 10^9/L$ ，Plt $185 \times 10^9/L$ 。骨髓细胞学检查中，幼红细胞最可能出现的异常是

- A.巨幼样变
- B.“核老浆幼”现象
- C.增生减低
- D.明显增生

【答案】D

88.女性，63岁。I型糖尿病25年，现用预混胰岛素每日2次注射治疗。2年前眼底检查发现视网膜有新生血管形成。半年来反复出现尿频、尿急，抗生素治疗有效。近2个月咳嗽时常有尿液不自主流出。来院检查发现：BP 160/100mmHg，尿糖（++），尿酮体（-），尿沉渣镜检白细胞5~10个/Hp，空腹血糖9.6mmol/L，HbA1C 8.6%，血Cr 203μmol/L。B超检查提示膀胱残余尿量增加。该患者糖尿病微血管并发症的诊断是

- A.糖尿病视网膜改变III期，糖尿病自主神经病变
- B.糖尿病视网膜改变III期，糖尿病周围神经病变



- C. 糖尿病视网膜改变 IV 期，糖尿病自主神经病变
- D. 糖尿病视网膜改变 IV 期，糖尿病周围神经病变

【答案】C

89. 女性，63岁。I型糖尿病25年，现用预混胰岛素每日2次注射治疗。2年前眼底检查发现视网膜有新生血管形成。半年来反复出现尿频、尿急，抗生素治疗有效。近2个月咳嗽时常有尿液不自主流出。来院检查发现：BP 160/100mmHg，尿糖（++），尿酮体（-），尿沉渣镜检白细胞5~10个/Hp，空腹血糖9.6mmol/L，HbA1C 8.6%，血Cr 203μmol/L。B超检查提示膀胱残余尿量增加。该患者首选的降压药物是

- A. 利尿剂
- B. 钙通道阻滞剂
- C. β受体拮抗剂
- D. 血管紧张素转换酶抑制剂

【答案】D

90. 女性，63岁。I型糖尿病25年，现用预混胰岛素每日2次注射治疗。2年前眼底检查发现视网膜有新生血管形成。半年来反复出现尿频、尿急，抗生素治疗有效。近2个月咳嗽时常有尿液不自主流出。来院检查发现：BP 160/100mmHg，尿糖（++），尿酮体（-），尿沉渣镜检白细胞5~10个/Hp，空腹血糖9.6mmol/L，HbA1C 8.6%，血Cr 203μmol/L。B超检查提示膀胱残余尿量增加。为改善血糖控制，最合适的治疗方案是

- A. 在原胰岛素治疗方案基础上，加用二甲双胍0.5g，每日3次
- B. 改用每日1次中长效基础胰岛素联合3次餐时胰岛素
- C. 改用每日1次中长效基础胰岛素联合3种口服降糖药
- D. 单用基础胰岛素

【答案】B

91. 男性，42岁，间断口腔溃疡5年，偶有阴囊溃疡，反复左侧眼炎三年，近一周自觉左眼视物不清，最可能的诊断是

- A. 系统性红斑狼疮
- B. 赖特（Reiter's）综合症
- C. 克罗恩病
- D. 贝赫切特（Behcet）病

【答案】D

92. 男性，42岁，间断口腔溃疡5年，偶有阴囊溃疡，反复左侧眼炎三年，近一周自觉左眼视物不清。该病较常见的其他临床表现是

- A. 尿道烧灼感
- B. 状形红斑
- C. 结节性红斑
- D. 心脏扩大

【答案】C

93.男性，76岁，腹痛，发热伴寒战10小时来诊。既往有心肌梗死，高血压病史，曾疑有胆总管结石。查体：T 38.6°C，P 100次/分，BP 90/60mmhg，巩膜黄染，右上腹压痛，肠鸣音正常。化验：血 WBC 17.5×10^9/L。最可能的诊断的是

- A.急性胆囊炎
- B.急性胃肠炎
- C.急性胰腺炎
- D.急性胆管炎

【答案】D

94.男性，76岁，腹痛，发热伴寒战10小时来诊。既往有心肌梗死，高血压病史，曾疑有胆总管结石。查体：T 38.6°C，P 100次/分，BP 90/60mmhg，巩膜黄染，右上腹压痛，肠鸣音正常。化验：血 WBC 17.5×10^9/L。为明确诊断，首选的检查是

- A.ERCP
- B.腹部平片
- C.MRCP
- D.PTC 难度

【答案】C

95.男性，76岁，腹痛，发热伴寒战10小时来诊。既往有心肌梗死，高血压病史，曾疑有胆总管结石。查体：T 38.6°C，P 100次/分，BP 90/60mmhg，巩膜黄染，右上腹压痛，肠鸣音正常。化验：血 WBC 17.5×10^9/L。最合适治疗方法是

- A.非手术治疗
- B.胆管切除
- C.经内镜鼻胆管引流术
- D.胆总管切开取结石

【答案】C

96.男，50岁，饮酒后上腹疼痛伴恶心呕吐6小时就诊，既往体健。查体 T 37°C，P 80次/分，BP 130/80mmHg，皮肤巩膜无黄染，上腹部压痛，无反跳痛及肌紧张。化验：血白细胞 11×10^9/L，血淀粉酶 1000U/L。最可能的诊断是

- A.急性胰腺炎
- B.急性胆管炎
- C.急性阑尾炎
- D.急性胃炎

【答案】A

97.男，50岁，饮酒后上腹疼痛伴恶心呕吐6小时就诊，既往体健。查体 T 37°C，P 80次/分，BP 130/80mmHg，皮肤巩膜无黄染，上腹部压痛，无反跳痛及肌紧张。化验：血白细胞 11×10^9/L，血淀粉酶 1000U/L。以下治疗措施中，不恰当的是

- A.禁食，补液
- B.使用抗生素
- C.使用生长抑素
- D.常用吗啡镇痛

【答案】D



98.男，64岁，因胃癌行“远端胃癌根治，毕II式吻合术”。术后一周出现上腹剧痛伴呕吐，呕吐物不含胆汁。查体：上腹部压痛，无反跳痛及肌紧张，化验：血WBC $12 \times 10^9/L$ 。最可能诊断

- A.倾倒综合征
- B.输入袢梗阻
- C.输出袢梗阻
- D.术后胃瘫

【答案】B

99.男，64岁，因胃癌行“远端胃癌根治，毕II式吻合术”。术后一周出现上腹剧痛伴呕吐，呕吐物不含胆汁。查体：上腹部压痛，无反跳痛及肌紧张，化验：血WBC $12 \times 10^9/L$ 。目前不宜采取的治疗方法

- A.胃肠减压
- B.灌肠通便
- C.手术治疗
- D.温盐水洗胃

【答案】B

100.女，24岁，间断上腹痛3个多月就诊。查体：右上腹略饱满，化验结果：肝功能正常。B超提示：胆总管扩张，直径5cm，肝内胆管未见扩张，拟诊先天性胆管扩张症。为明确诊断，进一步检查选择

- A.超声内镜
- B.ERCP
- C.MRCP
- D.PTC

【答案】C

101.女，24岁，间断上腹痛3个多月就诊。查体：右上腹略饱满，化验结果：肝功能正常。B超提示：胆总管扩张，直径5cm，肝内胆管未见扩张，拟诊先天性胆管扩张症。检查显示胆总管全长呈囊样扩张，其分型为

- A.I型
- B.II型
- C.III型
- D.IV型

【答案】A

102.女，24岁，间断上腹痛3个多月就诊。查体：右上腹略饱满，化验结果：肝功能正常。B超提示：胆总管扩张，直径5cm，肝内胆管未见扩张，拟诊先天性胆管扩张症。最适宜的治疗方式是

- A.囊肿-十二指肠吻合术
- B.囊肿切除，胆肠 Roux-en-Y 吻合术
- C.囊肿-空肠吻合术
- D.囊肿切除，肝管-十二指肠吻合术



【答案】B

103.男性，54岁，右颈肩部疼痛2年伴右手麻木3个月，颈部活动受限1周。查体：C5-6棘突间压痛，右手掌桡侧皮肤感觉减退，Eaton试验（+），Spurling征（+）。X线片显示颈椎生理弧度消失，C5-6椎体后缘骨质增生。初步诊断为颈椎病。下列选项中，最有诊断价值的是

- A.右颈肩部疼痛
- B.颈部活动受限
- C.右手麻木
- D.Eaton试验（+）

【答案】D

104.男性，54岁，右颈肩部疼痛2年伴右手麻木3个月，颈部活动受限1周。查体：C5-6棘突间压痛，右手掌桡侧皮肤感觉减退，Eaton试验（+），Spurling征（+）。X线片显示颈椎生理弧度消失，C5-6椎体后缘骨质增生。初步诊断为颈椎病。最需要鉴别的疾病是

- A.脊髓空洞症
- B.胸廓开口综合征
- C.肌萎缩侧索硬化症
- D.肩周炎

【答案】B

105.男性，54岁，右颈肩部疼痛2年伴右手麻木3个月，颈部活动受限1周。查体：C5-6棘突间压痛，右手掌桡侧皮肤感觉减退，Eaton试验（+），Spurling征（+）。X线片显示颈椎生理弧度消失，C5-6椎体后缘骨质增生。初步诊断为颈椎病。该患者MRI检查显示椎间盘突出，脊髓与神经根受压。目前不推荐的治疗是

- A.颈椎牵引
- B.颈部按摩和推拿
- C.手术治疗
- D.应用非甾体抗炎药

【答案】B

106.男性，28岁。与他人掰手腕的过程中，突发右上臂疼痛、肿胀、畸形，右上肢不能活动。X线片显示肱骨中、下1/3骨折。如伴有神经损伤体征，临幊上除骨折体征外，还可出现的体征

- A.伸腕功能正常，伸指功能丧失
- B.伸腕、伸指功能均丧失
- C.屈腕、屈指功能均丧失
- D.屈指、伸指功能均丧失

【答案】B

107.男性，28岁。与他人掰手腕的过程中，突发右上臂疼痛、肿胀、畸形，右上肢不能活动。X线片显示肱骨中、下1/3骨折。如伴有神经损伤体征，目前最正确的治疗是

- A.牵引复位，石膏固定
- B.手法复位，外固定板固定



C.切开复位，神经探查，接骨板固定

D.切开复位，髓内钉固定

【答案】C

108.医学专业是对公共所期待的责任有公共承诺的医学共同体，下列选项叙述不正确的是

A.医学专业不需要经过系统的训练

B.医学专业要求专业上共同体自律

C.医学专业通过强制实施行业标准获得社会信任

D.医学专业通过严格的准入制度以保证专业诚信

【答案】A

109.下列叙述中，不属于医患关系中患者义务的是

A.患者负有保证就医诚实性的义务

B.患者负有同意治疗后遵医的义务

C.传染病患者有防止疾病进一步扩散的义务

D.患者负有遵循即使不必要的治疗的义务

【答案】D

110.由于医患之间存在事实上的医学知识拥有的不平等，使患者处于脆弱并依赖医生的地位，

相信医生在专业上是胜任的，会将患者的健康利益置于首位。这样的医患关系是

A.消费关系

B.信托关系

C.依附关系

D.帮扶关系

【答案】B

111.男性，35岁。因桡骨骨折行钢板内固定术，术后三个月钢板断裂，患者要求医院赔偿。

院方不恰当的处理是

A.倾听患者抱怨，进行解释安抚

B.详细了解钢板断裂的相关情况

C.明确责任，给出解决方案

D.告知属于钢板质量问题，医院不负责处理

【答案】D

112.为患者保守秘密是重要的临床伦理原则，对患者医疗信息加以保护是医生的义务。下列医生的行为可以得到伦理学辩护的是

A.应保险公司要求向其提供可识别患者的任何医疗信息

B.应公司经理要求向其提供有关患者医疗过程的信息

C.应媒体要求向其提供有关患者医疗费用支付的信息

D.应同事要求向其提供已授权的匿名化医学研究信息

【答案】D

113.关于获取手术知情同意的伦理要求，下列说法不正确的是

A.知情同意的伦理要求体现了尊重患者自主性原则



- B. 知情同意权是获得患者对治疗同意的签字文件
- C. 知情同意书中应阐明手术预期受益与可能的风险
- D. 知情同意应当是一个医患之间坦诚交流的过程

【答案】B

114. 根据临床实验的伦理学原则，以下叙述正确的是
- A. 实验设计应该使受试者和社会均受益
 - B. 实验设计应该使受试者直接受益
 - C. 临床试验设计收益风险比应该合理
 - D. 受试者提出理由才允许其退出试验

【答案】C

115. 女性，23岁。妊娠7周，到某诊所要求做人工流产手术，诊所聘用人员王某为其进行了手术，术中患者出现大出血导致死亡。经查，王某为非医师行医。按照我国《医师法》相关规定，对其应适用
- A. 教育
 - B. 赔礼道歉
 - C. 警告
 - D. 依法追究刑事责任

【答案】D

二、B型题：116~135题，每小题1.5分，共30分。A、B、C、D是其下两道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。

116. 主要导致舒张压上升的因素是
- A. 外周阻力增加
 - B. 心输出量增加
 - C. 主动脉和大动脉硬化
 - D. 循环血量增加

【答案】A

117. 导致脉压增大的原因是
- A. 外周阻力增加
 - B. 心输出量增加
 - C. 主动脉和大动脉硬化
 - D. 循环血量增加

【答案】C

118. 能使血钙、血磷都升高的活性物质
- A. 甲状旁腺素
 - B. $1,25-(OH)_2-D_3$
 - C. 甲状腺素
 - D. 生长激素

【答案】B



119.能使血钙升高、血磷降低的活性物质

- A.甲状腺旁腺素
- B.1, 25-(OH)₂D₃
- C.甲状腺素
- D.生长激素

【答案】A

120.糖异生的重要中间产物

- A.6-磷酸葡萄糖酸
- B.磷酸戊糖
- C.果糖-6-磷酸
- D.尿苷二磷酸葡萄糖

【答案】C

121.糖原合成的重要中间产物

- A.6-磷酸葡萄糖酸
- B.磷酸戊糖
- C.果糖-6-磷酸
- D.尿苷二磷酸葡萄糖

【答案】D

122.参与酮体分解的酶

- A.HMG-CoA 合酶
- B.HMG-CoA 裂解酶
- C.HMG-CoA 还原酶
- D.琥珀酰 CoA 转硫酶

【答案】D

123.内源性胆固醇合成的关键酶是

- A.HMG-CoA 合酶
- B.HMG-CoA 裂解酶
- C.HMG-CoA 还原酶
- D.琥珀酰 CoA 转硫酶

【答案】C

124.可出现在动脉粥样硬化的细胞是

- A.Aschoff 细胞
- B.心衰细胞
- C.多核巨细胞
- D.泡沫细胞

【答案】D

125.可出现在手术缝线周围的细胞是



- A. Aschoff 细胞
- B. 心衰细胞
- C. 多核巨细胞
- D. 泡沫细胞

【答案】C

126. 与 Burkitt 淋巴瘤相关的病毒是

- A. HBV
- B. CMV
- C. HPV
- D. EBV

【答案】D

127. 艾滋病患者容易感染的病毒是

- A. HBV
- B. CMV
- C. HPV
- D. EBV

【答案】B

128. 上述疾病中，急性肺源性心脏病最常见的病因是

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 急性肺血栓栓塞症
- C. 特发性肺纤维化
- D. 重症肺炎

【答案】B

129. 上述疾病中，慢性肺源性心脏病最常见的病因是

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 急性肺血栓栓塞症
- C. 特发性肺纤维化
- D. 重症肺炎

【答案】A

130. 肝硬化导致性激素失调引起的临床表现是

- A. 黄疸
- B. 蜘蛛痣
- C. 腹水
- D. 牙龈增生

【答案】B

131. 门脉高压症的常见临床表现是

- A. 黄疸
- B. 蜘蛛痣



- C.腹水
- D.牙龈出血

【答案】C

132.老年人结肠梗阻最常见的病因

- A.结肠癌
- B.肠套叠
- C.乙状结肠冗长
- D.粘连性肠梗阻

【答案】A

133.儿童肠梗阻最常见的病因

- A.结肠癌
- B.肠套叠
- C.乙状结肠冗长
- D.粘连性肠梗阻

【答案】B

134.甲状腺术后，出现饮水呛咳的原因是

- A.损伤喉返神经
- B.损伤喉上神经内支
- C.损伤喉上神经外支
- D.损伤颈交感干

【答案】B

135.甲状腺术后，出现声音嘶哑的原因是

- A.损伤喉返神经
- B.损伤喉上神经内支
- C.损伤喉上神经外支
- D.损伤颈交感干

【答案】A

三、X型题：136~165小题，每小题2分，共60分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案，多选或少选均不得分。

136.影响静息电位因素

- A.细胞外K⁺浓度
- B.细胞外Ca²⁺浓度
- C.膜对Na⁺、K⁺的通透性
- D.Na⁺泵活动水平

【答案】ACD

137.属于生理性抗凝物质的有



- A. 蛋白质 C
- B. 组织因子途径抑制物
- C. 纤溶酶原激活物抑制物-1
- D. 肝素

【答案】ABD

138. 下列关于血红蛋白说法正确的是
- A. R 型 Hb 对氧气的亲和力高于 T 型对氧气的亲和力
 - B. Hb 浓度升高导致氧气与 Hb 亲和力下降
 - C. 氧气与 Hb 结合表现为樱桃红色
 - D. Hb 内主要为三价铁离子

【答案】AB

139. 大肠内细菌可产生的维生素有
- A. 维生素 C
 - B. 维生素 B
 - C. 维生素 E
 - D. 维生素 K

【答案】BD

140. 根据肾清除率原理，可测定的肾功能指标有
- A. 肾小球滤过率
 - B. 肾血流量
 - C. 肾小管重吸收钠量
 - D. 肾小管泌氢能力

【答案】AB

141. 库欣综合征患者循环血中血细胞计数的改变有
- A. 红细胞增多
 - B. 淋巴细胞减少
 - C. 中性粒细胞减少
 - D. 嗜酸性粒细胞减少

【答案】ABD

142. 成熟红细胞内的代谢途径有
- A. 糖酵解
 - B. 磷酸戊糖旁路
 - C. 脂肪酸 β 氧化
 - D. 尿素生成

【答案】AB

143. 参与肝生物转化 I 相反应的酶有
- A. 细胞色素 P450 单加氧酶
 - B. 醇脱氢酶



- C.单胺氧化酶
- D.UDP-葡萄糖醛酸基转移酶

【答案】ABC

144.原核生物基因表达调控的方式有

- A.阻遏蛋白封闭启动子的负性调控
- B.cAMP、CAP 介导的正调控
- C.转录衰减子调控
- D.RNA 编辑

【答案】ABC

145.下列属于蛋白质激酶偶联受体介导的信号转导通路有

- A.MAPK 通路
- B.JAK-STAT 通路
- C.PI3K 通路
- D.经典核受体通路

【答案】ABC

146.下列原癌基因中，编码的蛋白质属于转录因子的有

- A.MYC
- B.FOS
- C.HER-2
- D.EGF-R

【答案】AB

147.DNA 重组技术中常用的工具酶有

- A.限制性核酸内切酶
- B.DNA 聚合酶 I
- C.DNA 连接酶
- D.逆转录酶

【答案】ABCD

148.下列可见大量嗜酸性粒细胞浸润的病变有

- A.过敏性鼻炎
- B.血吸虫感染
- C.大叶性肺炎
- D.病毒性肝炎

【答案】AB

149.下列属于化脓性炎的疾病有

- A.急性肾盂肾炎
- B.伤寒
- C.流行性脑脊髓膜炎
- D.亚急性甲状腺炎



【答案】AC

150. 属于肝细胞桥接坏死的有

- A. 门管区-门管区连续的肝细胞坏死带
- B. 门管区-小叶中央静脉连续的肝细胞坏死带
- C. 肝细胞坏死占肝小叶的大部分
- D. 小叶中央静脉-小叶中央静脉连续的肝细胞坏死带

【答案】ABD

151. 关于慢性肺源性心脏病，下列正确的是

- A. 肺动脉圆锥显著膨隆
- B. 左心室壁增厚
- C. 右心室乳头肌及肉柱显著增粗
- D. 左心室扩大

【答案】AC

152. 可引起心肌坏死的病变有

- A. 病毒性心肌炎
- B. 主动脉粥样硬化
- C. 肺动脉狭窄
- D. 扩张性心肌病

【答案】ACD

153. 可引起大肠癌的癌前病变有

- A. 家族性腺瘤性息肉病
- B. 溃疡性结肠炎
- C. 幼年性息肉病
- D. 绒毛膜腺瘤

【答案】ABCD

154. 患者男，76岁，慢性咳嗽、咳痰30余年，活动后气促5天，加重伴发热3天入院，入院后行抗感染对症治疗后有所好转，今晨突然感左胸疼痛，呼吸困难。体格检查提示左胸呼吸性减低。下列可以进行的治疗有

- A. 胸片和心电图检查
- B. 吸氧
- C. 镇静药物治疗
- D. 无创呼吸机辅助治疗

【答案】AB

155. 治疗急性左心衰（急性肺水肿）可选用的药物是

- A. 毛花昔c
- B. 伊伐布雷定
- C. 奈西立肽
- D. 左西孟旦



【答案】ACD

156.可用2%碳酸氢钠溶液反复洗胃的是

- A.对硫磷
- B.敌百虫
- C.敌敌畏
- D.乐果

【答案】ACD

157.属于尿路刺激征的有

- A.尿潴留
- B.尿急
- C.尿痛
- D.排尿困难

【答案】BC

158.可引起APTT延长而TT正常的原因有

- A.V因子缺乏
- B.VII因子缺乏
- C.IX因子缺乏
- D.纤维蛋白原减少

【答案】AC

159.关于糖尿病酮症酸中毒的治疗，正确的措施有

- A.前4小时输入0.9%氯化钠2000ml
- B.血糖降至16.7mmol/L，补液需改为5%葡萄糖氯化钠溶液
- C.首次胰岛素静注负荷量10~20U，后静脉滴注每小时0.1U/kg
- D.血pH<7.1，HCO<5mmol/L时，需补碱治疗

【答案】CD

160.胆囊结石行胆囊切除术的手术指征，正确的有

- A.结石直径大于等于3cm，无症状
- B.儿童胆囊结石，无症状
- C.伴有胆囊息肉样病变，直径>1cm
- D.瓷性胆囊

【答案】ACD

161.急性阑尾炎可能出现的阳性体征有

- A.Rovsing征
- B.Cullen征
- C.Psoas征
- D.Obturator征

【答案】ACD

162.下列关于肠系膜上动脉栓塞的叙述正确的



- A. 腹痛症状多较剧烈
- B. 腹部体征早期较为轻微
- C. 栓塞多发在肠系膜上动脉根部
- D. 选择性腹腔动脉造影有助于明确诊断

【答案】ABD

163. 下列关于肛裂的叙述，正确的是

- A. 大多数发生于肛管前正中线
- B. 多见于青中年人
- C. 常与前哨痔、肛乳头肥大并存
- D. 常表现为腹胀便秘

【答案】BCD

164. 关于骨巨细胞瘤正确的是

- A. 瘤组织以单核基质细胞及多核巨细胞为主要成分
- B. 典型 X 线为骨端偏心位破坏，有明显骨膜反应
- C. 病变局部肿块有压痛，关节活动不受限
- D. 手术困难时，可采取放化疗，但放疗后易肉瘤变

【答案】AD

165. 下列不符合骨关节炎畸形的有

- A. 杵状指
- B. Heberden 结节
- C. 手指尺侧偏斜
- D. 天鹅颈样畸形

【答案】ACD