

**北京大学线性代数 (B) 期中考试**  
**2021-2022 年度第一学期**

考试时间：2021 年 11 月 8 日上午

1. (20 分) 求  $a$  为何值时, 下述线性方程组有惟一解、无解、有无穷多解? 在有无穷多解的情况下, 写出解集的结构.

$$\begin{cases} x_1 - ax_2 - 2x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + ax_3 = 2 \\ 5x_1 - 5x_2 - 4x_3 = 1 \end{cases}$$

2. (10 分) 判断  $\mathbb{R}^3$  中下列子集是否为  $\mathbb{R}^3$  的子空间, 并说明理由。

- (a)  $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$ ;
- (b)  $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$ ;
- (c)  $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : x_1x_2x_3 = 0\}$ ;
- (d)  $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 : (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + 5x_3)^2 = 0\}$ .

3. (10 分) 找出一个非零的  $3 \times 3$  矩阵  $P$  使得  $PA$  为简化行阶梯型矩阵, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

4. (20 分) 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  和线性无关的向量组  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  满足如下关系

$$\begin{cases} \beta_1 - 2\beta_2 - \beta_3 = \alpha_1, \\ -3\beta_1 + \beta_2 - 7\beta_3 = \alpha_2, \\ 5\beta_1 - 3\beta_2 + 9\beta_3 = \alpha_3 \\ -2\beta_1 + \beta_2 - 4\beta_3 = \alpha_4. \end{cases}$$

求出所有满足  $\ell_1\alpha_1 + \ell_2\alpha_2 + \ell_3\alpha_3 + \ell_4\alpha_4 = 0$  的向量  $(\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4)$ 。

**解答：** $\ell_1\alpha_1 + \ell_2\alpha_2 + \ell_3\alpha_3 + \ell_4\alpha_4 = 0$  当且仅当

$$(\ell_1 - 3\ell_2 + 5\ell_3 - 2\ell_4)\beta_1 + (-2\ell_1 + \ell_2 - 3\ell_3 + \ell_4)\beta_2 + (-\ell_1 - 7\ell_2 + 9\ell_3 - 4\ell_4)\beta_3 = 0.$$

因为  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性无关, 所以  $\ell_1\alpha_1 + \ell_2\alpha_2 + \ell_3\alpha_3 + \ell_4\alpha_4 = 0$  当且仅当  $(\ell_1, \ell_2, \ell_3, \ell_4)$  是下面方程组的解。

$$\begin{cases} \ell_1 & - & 3\ell_2 & + & 5\ell_3 & - & 2\ell_4 & = & 0 \\ -2\ell_1 & + & \ell_2 & - & 3\ell_3 & + & \ell_4 & = & 0 \\ -\ell_1 & - & 7\ell_2 & + & 9\ell_3 & - & 4\ell_4 & = & 0 \end{cases}$$

该方程组的解参见课本 86 页例 1 的解。

5. (10 分) 设  $\{E_{i,i+1}\}(i=1,\dots,n-1)$  为  $n \times n$  的基本矩阵。证明:

(1) 如果  $|i-j| > 1$ , 则  $E_{i,i+1}E_{j,j+1} = E_{j,j+1}E_{i,i+1}$ ;

(2) 如果  $|i-j| = 1$ , 则  $E_{i,i+1}^2 E_{j,j+1} - 2E_{i,i+1}E_{j,j+1}E_{i,i+1} + E_{i,i+1}E_{j,j+1}^2 = 0$ .

6. (10 分) 设  $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$  是  $n$  级方阵,  $A_{ij}$  是  $a_{ij}$  的代数余子式。证明:

$$\begin{vmatrix} a_{11}+x & a_{12}+x & \cdots & a_{1n}+x \\ a_{21}+x & a_{22}+x & \cdots & a_{2n}+x \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}+x & a_{n2}+x & \cdots & a_{nn}+x \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + x \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

7. (10 分) 令  $f(t) = \sum_{k=0}^{n-1} t^k x_k$ , 设  $\zeta^0, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{n-1} \in \mathbb{C}^*$  是所有的  $n$  次单位根。证明:

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_{n-1} & \cdots & x_1 \\ x_1 & x_0 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1} & x_{n-2} & \cdots & x_0 \end{vmatrix} = f(\zeta^0)f(\zeta)f(\zeta^2)\cdots f(\zeta^{n-1}).$$

解答: 方法 (一). 直接计算可知:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} x_0 & x_1 & \cdots & x_{n-1} \\ x_{n-1} & x_0 & \cdots & x_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \zeta & \cdots & \zeta^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \zeta^{n-1} & \cdots & \zeta^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \zeta & \cdots & \zeta^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \zeta^{n-1} & \cdots & \zeta^{(n-1)(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(\zeta) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f(\zeta^{n-1}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

对上式左右两端同时取行列式, 又由于

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \zeta & \zeta^2 & \cdots & \zeta^{n-1} \\ 1 & \zeta^2 & \zeta^4 & \cdots & \zeta^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \zeta^{n-1} & \zeta^{2(n-1)} & \cdots & \zeta^{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0,$$

故得到:

$$\begin{vmatrix} x_0 & x_1 & \cdots & x_{n-1} \\ x_{n-1} & x_0 & \cdots & x_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} f(\zeta^j).$$

方法 (二): 将第  $i$  行乘以  $\zeta^{ik}$  加到 1 行. 则  $(1, h)$  元素变成了

$$\zeta^{hk} \sum \zeta^{ik} x_i = \zeta^{hk} f(\zeta^k).$$

所以行列式可以被每个  $f(\zeta^k)$  除尽. 通过比较  $f(\zeta^0)f(\zeta)f(\zeta^2)\cdots f(\zeta^{n-1})$  与行列式两边  $x_1$  的次数知这是一个等式.

8. (10 分) 设矩阵  $A = (a_{ij})$  和  $P$  均为  $n$  级矩阵, 矩阵  $P$  为若干  $P(i, j)$  型初等矩阵的乘积, 令  $B = PAP'$ . 判断:  $a_{ij}$  在  $A$  中的代数余子式  $A_{i,j}$  是否等于  $a_{ij}$  在  $B$  中的代数余子式? 若相等, 给出证明; 若不相等举出反例.

**解答:** 结论是相等.  $PAP'$  的结果是矩阵  $A$  的行变成了  $123\cdots n$  的新排列  $i_1, \cdots, i_n$ , 列排列也变成了  $i_1, \cdots, i_n$ . 由第二章第一节定理 2 可知,  $123\cdots n$  可以经过一系列对换得到  $i_1, \cdots, i_n$ . 所以只要证明结论对一个对换  $\sigma$  成立即可. 下面考察对行和列同时做了对换  $\sigma$  后, 结论成立.

$\sigma$  把第  $i$  行换成第  $\sigma(i)$  行, 如果  $i \neq \sigma(i)$ , 则代数余子式对应的矩阵就做了  $|\sigma(i) - i| - 1$  次行对换, 相应地, 考虑列  $j \neq \sigma(j)$ , 做了  $|\sigma(j) - j| - 1$  次列对换. 分情况进行讨论

1.  $i = \sigma(i), j = \sigma(j)$ , 代数余子式对应的矩阵也是行列各做一次对换, 自然相等;

2.  $i \neq \sigma(i), j = \sigma(j)$ , 只矩阵相差  $(|\sigma(i) - i| - 1 + 1)$  个负号, 然后考虑到是代数余子式, 所以也相等;

3.  $i = \sigma(i), j \neq \sigma(j)$ , 情况和 2 相同.

4.  $i \neq \sigma(i), j \neq \sigma(j)$ , 只考虑矩阵就差了  $(|\sigma(i) - i| - 1 + |\sigma(j) - j| - 1)$  个符号, 然后考虑到是代数余子式, 所以还是相等