


Problema y datos



Tomografía CT



Máscara de 4 clases

929

cortes
etiquetados
Cortes con lesión

10

cortes de
prueba

512×512

píxeles

clases

Radiopaedia

MedSeg

35.83%

96.00%

GGO

Consol.

28.11%

78.00%

Distribución de píxeles en Radiopaedia





Consolidación 0.23%
GGO 1.02%
Pulmón 14.50%
Fondo 84.25%

GGO + consolidación = 1.25% de los píxeles

Lesiones pequeñas y distinta prevalencia entre Radiopaedia y MedSeg.

Método



Resultados

● Modelo anterior ● Variante

IoU GGO

0.4386

0.4581

+0.0195
cambio absoluto

IoU con-
solidación

0.2256

0.3896

+0.1640
cambio absoluto

mIoU lesiones

0.3321

0.4238

+0.0917
cambio absoluto

mIoU global, contexto secundario

Anterior 0.6215

Variante 0.6672

+0.0457

Mismos 24 cortes de validación

Conclusión

La estrategia de entrenamiento e inferencia aumentó el mIoU de lesiones en 0.0917. El mayor cambio ocurrió en consolidación (+0.1640).

La arquitectura U-Net EfficientNet-B2 permaneció sin cambios.

Alcance de la comparación

Evaluación homogénea sobre los mismos 24 cortes de validación. El resultado describe segmentación en validación y no establece utilidad clínica.