

组合数学作业 2

1. 证明

$$\sum_{0 \leq k \leq n} \binom{m-r+s}{k} \binom{n+r-s}{n-k} \binom{r+k}{m+n} = \binom{r}{m} \binom{s}{n}, \text{ 其中 } m, n \in \mathbb{N}$$

证明 首先, 我们有:

$$\begin{aligned} \binom{r}{k} \binom{k}{j} &= \frac{r!}{k!(r-k)!} \times \frac{k!}{j!(k-j)!} = \frac{r!}{(r-k)!(k-j)!j!} \\ &= \frac{r!}{j!(r-j)!} \times \frac{(r-j)!}{(k-j)!(r-k)!} \\ &= \binom{r}{j} \binom{r-j}{k-j} \end{aligned}$$

由 Vandermonnd 恒等式, 有

$$\binom{r+k}{m+n} = \sum_{j=0}^{m+n} \binom{r}{j} \binom{k}{m+n-j} = \sum_{j=-n}^m \binom{r}{n+j} \binom{k}{m-j}$$

$$\begin{aligned} LHS &= \sum_{0 \leq k \leq n} \binom{m-r+s}{k} \binom{n+r-s}{n-k} \sum_{j=-n}^m \binom{r}{n+j} \binom{k}{m-j} \\ &= \sum_{0 \leq k \leq n} \sum_{j=-n}^m \binom{m-r+s}{k} \binom{n+r-s}{n-k} \binom{r}{n+j} \binom{k}{m-j} \\ &= \sum_{j=m-n}^m \sum_{k=m-j}^n \binom{m-r+s}{k} \binom{n+r-s}{n-k} \binom{r}{n+j} \binom{k}{m-j} \\ &= \sum_{j=m-n}^m \sum_{k=m-j}^n \binom{n+r-s}{n-k} \binom{r}{n+j} \binom{m-r+s}{m-j} \binom{j-r+s}{k-m+j} \\ &= \sum_{j=m-n}^m \binom{r}{n+j} \binom{m-r+s}{m-j} \sum_{k=m-j}^n \binom{n+r-s}{n-k} \binom{j-r+s}{k-m+j} \\ &= \sum_{j=m-n}^m \binom{r}{n+j} \binom{m-r+s}{m-j} \sum_{k=m0}^{m+n-j} \binom{n+r-s}{n-m+j-k} \binom{j-r+s}{k} \\ &= \sum_{j=m-n}^m \binom{r}{n+j} \binom{m-r+s}{m-j} \binom{n+j}{n-m+j} \\ &= \sum_{j=0}^n \binom{r}{m+j} \binom{m-r+s}{n-j} \binom{m+j}{j} \\ &= \sum_{j=0}^n \binom{r}{j} \binom{r-j}{m} \binom{m-r+s}{n-j} \end{aligned}$$

(续上页)

$$\begin{aligned}
LHS &= \sum_{j=0}^n \frac{r!(r-j)!}{j!m!(r-j)!(r-m-j)!} \binom{m-r+s}{n-j} \\
&= \sum_{j=0}^n \frac{r!}{m!(r-m)!} \times \frac{(r-m)!}{j!(r-m-j)!} \binom{m-r+s}{n-j} \\
&= \binom{r}{m} \sum_{j=0}^n \binom{r-m}{j} \binom{m-r+s}{n-j} \\
&= \binom{r}{m} \binom{s}{n}
\end{aligned}$$

□

2. 独立重复地抛 n 次质地均匀的硬币, 将正面朝上的次数记为 ξ , 试估计 $Pr[\xi = \lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor]$

解 每次抛硬币, 正面朝上的概率为 $\frac{1}{2}$, 则有

$$\begin{aligned}
Pr[\xi = \lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor] &= \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n \\
&= \frac{n!}{\lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor! \lfloor \frac{n}{2} - 3\sqrt{n} \rfloor!} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n
\end{aligned}$$

根据 Stirling 公式, 有

$$\begin{aligned}
\text{原式} &= \frac{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}{\sqrt{2\pi \lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor} \left(\frac{\lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor}{e}\right)^{\lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor} \sqrt{2\pi \lfloor \frac{n}{2} - 3\sqrt{n} \rfloor} \left(\frac{\lfloor \frac{n}{2} - 3\sqrt{n} \rfloor}{e}\right)^{\lfloor \frac{n}{2} - 3\sqrt{n} \rfloor}} \\
&= \frac{\sqrt{2\pi n} \times n^n}{\sqrt{2\pi \lfloor \frac{n}{2} - 3\sqrt{n} \rfloor} \lfloor \frac{n}{2} - 3\sqrt{n} \rfloor^{\lfloor \frac{n}{2} - 3\sqrt{n} \rfloor} \sqrt{2\pi \lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor} \lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor^{\lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor}} \\
&= \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \times \frac{\sqrt{2\pi n} \times n^n}{\sqrt{2\pi \lfloor \frac{n}{2} - 3\sqrt{n} \rfloor} \lfloor \frac{n}{2} - 3\sqrt{n} \rfloor^{\lfloor \frac{n}{2} - 3\sqrt{n} \rfloor} \sqrt{2\pi \lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor} \lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor^{\lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor}}
\end{aligned}$$

当 n 很大时, 做近似运算, 有

$$\begin{aligned}
\text{原式} &\sim \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \times \frac{n^n}{\left(\frac{n}{2} - 3\sqrt{n}\right)^{\left(\frac{n}{2} - 3\sqrt{n}\right)} \left(\frac{n}{2} + 3\sqrt{n}\right)^{\left(\frac{n}{2} + 3\sqrt{n}\right)}} \times \sqrt{\frac{n}{\frac{n^2}{4} - 9n}} \\
&\sim \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \times \frac{n^n \times \left(\frac{n}{2} - 3\sqrt{n}\right)^{6\sqrt{n}}}{\left(\frac{n^2}{4} - 9n\right)^{\frac{n}{2} + 3\sqrt{n}}} \times \sqrt{\frac{4}{n}} \\
&\sim \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \times \frac{n^n \times \left(\frac{n}{2} - 3\sqrt{n}\right)^{6\sqrt{n}}}{\left(\frac{n}{2}\right)^{n+6\sqrt{n}}} \times \sqrt{\frac{4}{n}} \\
&\sim \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \times \frac{n^n \times \left(\frac{n}{2}\right)^{6\sqrt{n}}}{\left(\frac{n}{2}\right)^{n+6\sqrt{n}}} \times \sqrt{\frac{4}{n}}
\end{aligned}$$

(续上页)

$$\begin{aligned}\text{原式} &\sim \sqrt{\frac{1}{2\pi}} \times \frac{n^n}{(\frac{n}{2})^n} \times \sqrt{\frac{4}{n}} \\ &\sim \sqrt{\frac{1}{\pi}} \times 2^n \times \sqrt{\frac{2}{n}}\end{aligned}$$

综合上述估计, 有

$$Pr[\xi = \lfloor \frac{n}{2} + 3\sqrt{n} \rfloor] \sim \sqrt{\frac{2}{n\pi}}$$

3. Lucas 数 $l_0, l_1, \dots, l_n, \dots$ 的定义如下:

$$l_n = \begin{cases} l_{n-1} + l_{n-2}, & n \geq 2 \\ 2, & n = 0 \\ 1, & n = 1 \end{cases}$$

证明:

a. 对任意 $n \geq 2$, $l_n = f_n + f_{n-2}$;

b. 对任意 $n \geq 0$, $l_0^2 + l_2^2 + \dots + l_n^2 = l_n l_{n+1} + 2$

证明 对于 a

根据 Lucas 数的定义, 有 $l_0 = f_0 + 1, l_1 = f_1$, 于是有

$$l_2 = l_0 + l_1 = f_0 + f_1 + 1 = f_2 + f_0$$

$$l_3 = l_1 + l_2 = f_1 + f_2 + 1 = f_3 + f_1$$

假设 $l_n = f_n + f_{n-2}$ 对 $n = k, k-1$ 成立 ($k \geq 2$)

$$\begin{aligned}l_{k+1} &= l_k + l_{k-1} \\ &= f_k + f_{k-2} + f_{k-1} + f_{k-3} \\ &= (f_k + f_{k-1}) + (f_{k-2} + f_{k-3}) \\ &= f_{k+1} + f_{k-1}\end{aligned}$$

对于 b, 采用数学归纳法进行证明

$n=0$ 时

$$l_0^2 = 4 = l_0 l_1 + 2$$

$n=1$ 时

$$l_0^2 + l_1^2 = 5 = l_1 l_2 + 2$$

假设结论对 $n \geq 1$ 成立, 研究该式对 $n+1$ 是否成立

$$l_0^2 + l_2^2 + \cdots + l_n^2 + l_{n-1}^2$$

由归纳假设

$$\begin{aligned} \text{原式} &= l_n l_{n+1} + l_{n+1}^2 + 2 \\ &= l_{n+1}(l_n + l_{n+1}) + 2 \\ &= l_{n+1} l_{n+2} + 2 \end{aligned}$$

综上所述, 对任意 $n \geq 0$, $l_0^2 + l_2^2 + \cdots + l_n^2 = l_n l_{n+1} + 2$ 总是成立 □

4. 求解递推关系:

a.

$$\begin{cases} h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3} & n \geq 3 \\ h_0 = 0, h_1 = 1, h_2 = 2 \end{cases}$$

b.

$$\begin{cases} h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2} - 4h_{n-3} + 8h_{n-4} & n \geq 4 \\ h_0 = 0, h_1 = 1, h_2 = 1, h_3 = 2 \end{cases}$$

解 对于 a, 利用生成函数来解决

设生成函数 $h(x) = \sum_{n \geq 0} h_n x^n$, 则对于递推式, 有

$$\begin{aligned} h(x) - xh(x) - 9x^2h(x) + 9x^3h(x) &= x + x^2 \\ h(x)(1 - x - 9x^2 + 9x^3) &= x + x^2 \\ h(x) &= \frac{x + x^2}{1 - x - 9x^2 + 9x^3} = \frac{x + x^2}{(x-1)(3x-1)(3x+1)} \end{aligned}$$

进而, 我们得到

$$\begin{aligned} h(x) &= \frac{1}{4} \times \frac{1}{x-1} - \frac{1}{3} \times \frac{1}{3x-1} - \frac{1}{12} \times \frac{1}{3x+1} \\ &= -\frac{1}{4} \sum_{n \geq 0} x^n + \frac{1}{3} \sum_{n \geq 0} (3x)^n - \frac{1}{12} \sum_{n \geq 0} (1)^n (3x)^n \\ &= \sum_{n \geq 0} \left(\frac{1}{3} \times 3^n - \frac{1}{12} \times (-3)^n - \frac{1}{4} \right) x^n \end{aligned}$$

也即

$$h_n = \frac{1}{3} \times 3^n - \frac{1}{12} \times (-3)^n - \frac{1}{4}$$

对于 b, 利用特征方程来解决
根据递推式, 有特征方程

$$\begin{aligned} x^4 - 5x^3 + 6x^2 + 4x - 8 &= 0 \\ (x-2)^3(x+1) &= 0 \end{aligned}$$

该递推关系的特征根分别是 $x=2, x=-1$ 重数分别为 2 和 1, 于是我们有

$$h_n = a \times 2^n + b \times n2^n + c \times n^2 2^n + d \times (-1)^n$$

再将四条初始条件, $h_0=0, h_1=1, h_2=1, h_3=2$ 带入, 解得

$$\begin{cases} a = \frac{8}{27} \\ b = \frac{7}{72} \\ c = -\frac{1}{24} \\ d = -\frac{8}{27} \end{cases}$$

进而, 我们得到

$$h_n = \frac{8}{27} \times 2^n + \frac{7}{72} \times n2^n - \frac{1}{24} \times n^2 2^n - \frac{8}{27} \times (-1)^n$$

5. 求解递推关系:

a.

$$\begin{cases} h_n = 4h_{n-1} + 3 \times 2^n \\ h_0 = 1 \end{cases}$$

b.

$$\begin{cases} h_n = 2h_{n-1} + n \\ h_0 = 1 \end{cases}$$

解 对于 a, 利用生成函数来求解

设生成函数 $h(x) = \sum_{n \geq 0} h_n x^n$, $g(x) = \sum_{n \geq 0} 2^n x^n$ 则对于递推式, 有

$$\begin{aligned} h(x) - 4xh(x) - 3g(x) &= -2 \\ h(x)(1 - 4x) &= 3g(x) - 2 = \frac{4x + 1}{1 - 3x} \\ h(x) &= \frac{4x + 1}{(1 - 3x)(1 - 4x)} \\ h(x) &= (-3) \times \sum_{n \geq 0} (2x)^n + 4 \times \sum_{n \geq 0} (4x)^n \end{aligned}$$

于是我们得到

$$h_n = -3 \times 2^n + 4 \times 4^n$$

对于 b, 通过分配构造新数列来求解

整理递推关系得

$$h_n + (n + 2) = 2(h_{n-1} + (n + 1))$$

于是数列 $\{h_n + n + 2\}$ 构成等比函数, 进而我们可以得到

$$\begin{aligned} h_n + n + 2 &= 2^n(h_0 + 0 + 2) = 3 \times 2^n \\ h_n &= 3 \times 2^n - n - 2 \end{aligned}$$

6. 计算满足以下条件的 n 位数的个数; 每个数的各位数字都是 $1, 2, 3$ 之一, 允许有些数字不出现, 并且要求其中出现的数字 1 两两不相邻

解 本题利用递推关系求解, 分类讨论结尾数, 设这样满足条件的 n 位数, 以 $1, 2, 3$ 结尾的个数为 $h_1(n), h_2(n), h_3(n)$

$$\begin{cases} h_1(n+1) = h_2(n) + h_3(n) \\ h_2(n+1) = h_1(n) + h_2(n) + h_3(n) \\ h_3(n+1) = h_1(n) + h_2(n) + h_3(n) \end{cases}$$

观察到, $h_2(n) = h_3(n)$, 设 $h_2(n) + h_3(n) = h'_1(n)$, 于是我们有

$$\begin{cases} h_1(n+1) = h'_1(n) \\ h'_1(n+1) = 2h'_1(n) + 2h_1(n) \end{cases}$$

将 2 式带入 1 式, 得到

$$h'_1(n) - 2h'_1(n-1) - 2h'_1(n-2) = 0 (n \geq 2)$$

根据题目条件, 我们定义 $h'_1(1) = 2, h'_1(0) = 1$ 则根据该递推式对应的特征方程

$$\begin{aligned}x^2 - 2x - 2 &= 0 \\(x - (1 + \sqrt{3}))(x - (1 - \sqrt{3})) &= 0\end{aligned}$$

该递推关系的特征根分别是 $1 + \sqrt{3}, 1 - \sqrt{3}$, 所以

$$h'_1(n) = a(1 + \sqrt{3})^n + b(1 - \sqrt{3})^n$$

带入初始条件, 解得

$$\begin{cases} a = \frac{3+\sqrt{3}}{6} \\ b = \frac{3-\sqrt{3}}{6} \end{cases}$$

于是

$$\begin{aligned}h'_1(n) &= \frac{\sqrt{3}}{6}(1 + \sqrt{3})^{n+1} - \frac{\sqrt{3}}{6}(1 - \sqrt{3})^{n+1} \\h_1(n) &= \frac{\sqrt{3}}{6}(1 + \sqrt{3})^n - \frac{\sqrt{3}}{6}(1 - \sqrt{3})^n \\h(n) &= h'_1(n) + h_1(n) = \frac{2\sqrt{3}+3}{6}(1 + \sqrt{3})^n - \frac{2\sqrt{3}-3}{6}(1 - \sqrt{3})^n\end{aligned}$$

7. 请计数:

a. n 个平面最多能将三维空间划分成多少个区域?

b. n 个圆最多能将平面划分成多少个区域?

c. n 个球面最多能将三维空间划分成多少个区域?

解 对于 a, 我们首先考虑 n 条直线能够将平面分为几部分

设 n 条直线最多能将平面分为 $f(n)$ 部分, 再多一条直线, 和前 n 条直线都相交, 也就是说前 n 条直线将这条直线分为 $n+1$ 段, 这每段都对应一个平面的部分, 于是我们有

$$f(n+1) = f(n) + n + 1$$

又因为 $f(1) = 2$, 我们定义 $f(0) = 1$, 于是我们得到

$$f(n) = f(0) + 1 + 2 + \cdots + n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$$

我们可以利用该结论对平面分空间问题进行讨论, 同样假设 n 个平面能够将平面分为 $g(n)$ 部分, 再多一个平面, 和前 n 个平面都相交, 由于是最多的, 所以任意两个平面不平行, 因此产生的 n 个交线两两相交, 这 n 个交线将平面分为 $f(n)$ 个部分, 每个部分都对应一个空间的部分, 于是我们得到

$$g(n+1) = g(n) + f(n)$$

$g(1) = 2$, 进而我们有

$$\begin{aligned}
 g(n) &= g(n-1) + f(n-1) = g(1) + f(1) + f(2) + \cdots + f(n-1) = 2 + n + \frac{1}{2} \left(\sum_{k=1}^{n-1} k^2 + \sum_{k=1}^{n-1} k \right) \\
 &= 1 + n + \frac{n(n-1)(2n-1)}{12} + \frac{n(n-1)}{4} \\
 &= 1 + n + \frac{n(n-1)(n+1)}{6} \\
 &= \frac{1}{6}n^3 + \frac{5}{6}n + 1
 \end{aligned}$$

(实际上, 可以反复利用此方法来计算 $n-1$ 维超平面分割 n 维空间的问题)

对于 b, 设 n 个圆最多将平面分为 $c(n)$ 个部分, 我们考虑一个圆最多能被分割为几段圆弧, 每个圆弧都对应平面的一个部分, 而两个圆最多有两个交点, 一个圆上 n 个点对应 n 个弧, 于是我们有

$$\begin{aligned}
 c(n+1) &= c(n) + 2n = c(1) + 2 + 4 + \cdots + 2n = c(1) + n(n+1) = n^2 + n + 2 \\
 c(n) &= n^2 - n + 2
 \end{aligned}$$

对于 c, 这个问题与平面分割空间类似, 我们考虑在 n 个球的基础上多加一个球, 这个球产生的圆被原来 n 个圆分割, 我们得到

$$\begin{aligned}
 r(n+1) &= r(n) + c(n) \\
 r(n) &= r(1) + c(1) + c(2) + \cdots + c(n-1) \\
 &= \sum_{k=1}^{n-1} k^2 - \sum_{k=1}^{n-1} k + 2n = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} - \frac{n(n-1)}{2} + 2n \\
 &= \frac{n(n-1)(n-2)}{3} + 2n \\
 &= \frac{1}{3}n^3 - n^2 + \frac{8}{3}n
 \end{aligned}$$

8. 设 h_n 表示有 $n+2$ 条边的凸多边形被它的对角线分成的区域数, 其中假设没有三条对角线有公共点, 定义 $h_0 = 0$, 求 h_n 的通项公式

解 一个 $n+2$ 边型, 一共有 $\binom{n+2}{2} - n = \frac{(n+2)(n-1)}{2}$ 条对角线, 而 $n \rightarrow n+1$, 相当于在原有基础上多了一个一个顶点, 构成新的一个区域, 并从这个顶点出发连接其他非相邻顶点, 所产生的交点个数 + 新对角线条数 + 1 就是 h_{n+1} 下面只需要研究交点数即可, 列出前面几项

				1	$(n=2)$
			2	2	$(n=3)$
		3	4	3	$(n=4)$
	4	6	6	4	$(n=5)$
5	8	9	8	5	$(n=6)$

观察到, 斜线上成等差数列, 于是我们可以列出递推式

$$h(n) = h(n-1) + 1 + (n-1) + (n-1) \times 1 + (n-2) \times 2 + (n-3) \times 3 + \cdots + (1) \times (n-1)$$

当 n 为奇数时, 设 $n = 2k+1$

$$\begin{aligned} h(2k+1) &= h(2k) + 2k+1 + 2 \times (1 \times (2k) + 2 \times (2k-1) + \cdots + k \times (2k - (k-1))) \\ &= h(2k) + 2k+1 + 2 \times (k^2(k+1) + \frac{k(k+1)}{2} - \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}) \\ &= h(2k) + \frac{4}{3}k^3 + 2k^2 + \frac{8}{3}k + 1 \end{aligned}$$

也即

$$h(n) = h(h-1) + \frac{1}{6}n^3 + \frac{5}{6}n$$

当 n 为偶数时, 设 $n = 2k$

$$\begin{aligned} h(2k) &= h(2k-1) + 2k + 2 \times (1 \times (2k-1) + 2 \times (2k-2) + \cdots + (k-1) \times (2k - (k-1))) + k^2 \\ &= h(2k-1) + 2k + 2 \times (k^2(k-1) - \frac{k(k-1)(2k-1)}{6}) + \frac{k^2}{4} \\ &= h(2k-1) + \frac{2}{3}k^3 + \frac{5}{3}k \end{aligned}$$

也即

$$h(n) = h(h-1) + \frac{1}{6}n^3 + \frac{5}{6}n$$

所以, n 的奇偶性并不影响递推式, 进而我们可以得到

$$h(n) = \frac{n^4 + 2n^3 + 11n^2 + 10n}{24}$$

9. 给定向量 $\vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $|a_i| \geq 1, i \in [n]$, 记 $S = \{\vec{\epsilon} = \epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n : \epsilon_i \in \{-1, 1\}, i \in [n], \vec{\epsilon} \cdot \vec{a} \in (-1, 1)\}$, 证明 $|S| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$

证明 任取 $\vec{\epsilon} \in S$, 考虑 $|A_{\vec{\epsilon}}|$ 所构成的集族, 证明这个集族里的任意两个集合不能相互包含, 假设 $A_{\vec{\epsilon}} \subset A_{\vec{\epsilon}'}$ 则至少存在一对 $\epsilon'_j a_j > 0$ 且 $\epsilon_j a_j < 0$, 则有

$$\vec{\epsilon}' \cdot \vec{a} - \vec{\epsilon} \cdot \vec{a} \geq 2a_j \geq 2$$

则 ϵ' 和 ϵ 二者至多只有一个符合条件, 矛盾, 再根据课上所讲的引理

$$|S| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$$

□