

14

이제 왜 풀어야 할까.

Def: when $a > 0, a \neq 1, b > 0$

$\Rightarrow a^x = b \Leftrightarrow x = \log_a b$
 $\rightarrow$ 로그 하면 안된다.
 1영에서 b는 간을 만다.
 자꾸랑 해야하면 안돼.

~~자꾸 로그를 해서 안돼~~ shit.

왜 이렇게 생각하냐.
 왜 생각하냐.

$2^2 = 4$

예제 2는? 2인걸 누가 이해가 가능해.

$2^3 = 8$ 예제 3은? 3인걸 누가 이해가 가능해.

예제 $2^x = 9$ 예제 4는? 거기 로그 해야지 아니? 예제 4는 왜 풀어야 할까

$2^x = 9$ 이게 왜 풀어야 할까? 왜 로그를 해야 할까? 이게 왜 풀어야 할까!

2가야 32야.

$2^x = 9 \Leftrightarrow x = \log_2 9$
 대신 예제 $a = 2, b = 9$
 $\Rightarrow$ 밑이 2이고 진수가 9야.
 $a > 0, a \neq 1, b > 0$ 다
 성립하냐?
 왜 $2^x = 9$ 인거 아니냐고 왜. 그럼 이 1영은 왜 할 수 없어!
 (왜냐면 로그 배워서).

41)

$\log_3(x-1)$

$\Rightarrow$ 이렇게 풀려면 1영은 항상 간다 2영은 안다

$x-1 > 0 \Rightarrow x > 1$ 이걸 keep 하려고
 doing 해야함.

$\log_{x-1} 3$

$\Rightarrow$ 이렇게 풀 때는 단에...
 한번 보자.

$x-1 > 0$
 $x > 1$ 예제 4!

하는 건 해야함. $a \neq 1$

$\Rightarrow x \neq 2$ 로 해야함

$x = 1$ 이 되면 밑이 0이 됨.