Matemàtiques
3r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 2

Nombres reals

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat. Quan hi ha diverses respostes possibles, se'n mostra una d'exemple.

1 Potències d'exponent natural

1. ★☆☆

a) $5^3 = 125$ **b)** $(-2)^5 = -32$ **c)** $\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{81}$ **d)** $(-1)^7 = -1$

2. ★☆☆

a) 64 **b)** -27 **c)** 81 **d)** -81

e) 1 **f)** $-\frac{1}{8}$ **g)** 0 **h)** $10\,000\,000$

3. ★★☆

a) Positiu: base negativa i exponent parell.

b) Negatiu: base negativa i exponent imparell.

c) Negatiu: $(-2)^6 = 64$, i el signe de davant el canvia: -64.

d) Positiu: $(-4)^3 = -64$, i $-(-64) = 64$.

4. ★★☆

a) $-4 + 4 - (-8) = \boxed{8}$

b) $-1 + 1 - 1 = \boxed{-1}$

c) $9 - 8 + 1 = \boxed{2}$

d) $\frac{4}{9} \cdot \frac{27}{8} = \frac{108}{72} = \boxed{\frac{3}{2}}$

5. ★★★

a) $x = 6$ **b)** $x = 3$ **c)** $x = 3$ o $x = -3$ **d)** $x = 3$

2 Propietats de les potències

6. ★☆☆

a) 3^9 **b)** 7^4 **c)** 2^{15} **d)** 5^8 **e)** a^5 **f)** $(-2)^6 = 2^6$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. ★☆☆

a) $10^5 = 100\,000$ **b)** $3^4 = 81$ **c)** $6^3 = 216$ **d)** $1^2 = 1$

8. ★★☆

a) $\frac{2^{10}}{2^8} = 2^2 = \boxed{4}$ **b)** $\frac{3^{11}}{3^9} = 3^2 = \boxed{9}$ **c)** $\frac{5^9}{5^8} = \boxed{5}$ **d)** $\frac{6^8}{6^6} = 6^2 = \boxed{36}$

9. ★★☆

a) $\frac{2^6 \cdot 2^6}{2^8} = 2^4 = \boxed{16}$ **b)** $\frac{3^4 \cdot 3^3}{3^6} = \boxed{3}$

c) $\frac{5^6}{5^2 \cdot 5^3} = \boxed{5}$ **d)** $\frac{2^4 \cdot 3^4}{2^3 \cdot 3^2} = 2 \cdot 3^2 = \boxed{18}$

10. ★★★

a) $\frac{2^6 \cdot 3^3 \cdot 2^2 \cdot 3^4}{2^6 \cdot 3^6} = \frac{2^8 \cdot 3^7}{2^6 \cdot 3^6} = 2^2 \cdot 3 = \boxed{12}$ **b)** $\frac{3^2 \cdot 5^2 \cdot 2^3 \cdot 5^3}{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^4} = \frac{2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^5}{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^4} = 2 \cdot 5 = \boxed{10}$

c) $\frac{2^6 \cdot 5^3 \cdot 3^4}{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 2^4 \cdot 3} = \frac{2^6 \cdot 3^4 \cdot 5^3}{2^6 \cdot 3^3 \cdot 5^2} = 3 \cdot 5 = \boxed{15}$ **d)** $\frac{2^2 \cdot 7^2 \cdot 3^3 \cdot 7^3}{7^4 \cdot 2^2 \cdot 3^2} = \frac{2^2 \cdot 3^3 \cdot 7^5}{2^2 \cdot 3^2 \cdot 7^4} = 3 \cdot 7 = \boxed{21}$

11. ★★★

a) Vertadera: $8 + 8 = 16 = 2^4$.

b) Falsa: $3^2 \cdot 3^3 = 3^5$.

c) Falsa: $25 \neq 4 + 9 = 13$.

d) Vertadera: $(5 \cdot 2)^3 = 10^3$.

e) Vertadera: $2 \cdot 2^{10} = 2^{11}$.

f) Falsa: $4^5 : 4^5 = 4^0 = 1$.

3 Potències d'exponent enter negatiu

12. ★☆☆

a) $\frac{1}{9}$ **b)** $-\frac{1}{8}$ **c)** $\frac{1}{1000}$ **d)** 16 **e)** $\frac{27}{8}$ **f)** $\frac{25}{9}$ **g)** 1 **h)** $-\frac{1}{16}$

13. ★☆☆

a) 5^{-4} **b)** 3^{-3} **c)** 2^{-4} (o 4^{-2}) **d)** 10^{-3} **e)** 7^{-2}

14. ★★☆

a) 5^4 **b)** 2^{-7} **c)** 3^6 **d)** 7^2 **e)** 4^2 **f)** 10^{-4}

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

15. ★★☆

a) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\boxed{\frac{3}{4}}$ **b)** $\frac{1}{3}-\frac{1}{9}=\boxed{\frac{2}{9}}$ **c)** $4+3=\boxed{7}$ **d)** $1-\frac{1}{5}=\boxed{\frac{4}{5}}$

16. ★★★

a) $\dfrac{2^{-6}\cdot 2^{6}}{2^{-5}\cdot 2^{4}}=\dfrac{2^{0}}{2^{-1}}=\boxed{2}$

b) $\dfrac{3^{-2}\cdot 3^{6}}{3^{-2}\cdot 3^{4}}=\dfrac{3^{4}}{3^{2}}=\boxed{9}$

c) $\dfrac{2^{-2}\cdot 3^{-2}\cdot 2^{6}\cdot 3^{3}}{2^{-1}\cdot 3^{-2}\cdot 2^{5}}=\dfrac{2^{4}\cdot 3}{2^{4}\cdot 3^{-2}}=3^{3}=\boxed{27}$

d) $\dfrac{2^{-2}\cdot 5^{-2}\cdot 5^{6}}{5^{4}\cdot 2^{-3}}=\dfrac{2^{-2}\cdot 5^{4}}{2^{-3}\cdot 5^{4}}=\boxed{2}$

e) $\dfrac{3^{2}}{2^{2}}\cdot\dfrac{2^{2}}{3^{2}}=\boxed{1}$

f) $\left[2^{3}\cdot 2^{-4}\right]^{-1}=\left(2^{-1}\right)^{-1}=\boxed{2}$

4 Notació científica

17. ★☆☆

a) $4{,}5\cdot 10^{7}$ **b)** $7{,}2\cdot 10^{-4}$ **c)** $9{,}08\cdot 10^{5}$ **d)** $3\cdot 10^{-7}$ **e)** $-1{,}25\cdot 10^{4}$ **f)** $5\cdot 10^{-2}$

18. ★☆☆

a) $3\,200\,000$ **b)** $0{,}005$ **c)** $1\,070\,000\,000$ **d)** $0{,}000\,008\,45$ **e)** $-61\,000$

19. ★★☆ L'apartat a) ja està en notació científica. La resta, corregits:

b) $3{,}4\cdot 10^{7}$ **c)** $8\cdot 10^{-4}$ **d)** $1{,}05\cdot 10^{-1}$ **e)** $1{,}25\cdot 10^{-6}$ **f)** $4{,}2\cdot 10^{6}$

20. ★★☆

$$9\cdot 10^{-6} < 5\cdot 10^{-5} < 1{,}2\cdot 10^{-4} < 3{,}1\cdot 10^{-4} < 2{,}9\cdot 10^{-3}$$

21. ★★★

a) $3\cdot 10^{5}$ km/s **b)** $7{,}5\cdot 10^{-6}$ m **c)** $8\cdot 10^{9}$ persones

d) $1{,}67\cdot 10^{-24}$ g **e)** $9{,}46\cdot 10^{12}$ km

5 Radicals. Extracció i introducció de factors

22. ★☆☆

a) 9 **b)** -5 **c)** 2 **d)** No existeix en $\mathbb{R}$

e) -2 **f)** $\frac{5}{7}$ **g)** $\frac{2}{3}$ **h)** 1

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★☆☆

a) $2\sqrt{3}$ **b)** $3\sqrt{2}$ **c)** $3\sqrt{5}$ **d)** $7\sqrt{2}$ **e)** $2\sqrt[3]{2}$ **f)** $3\sqrt[3]{3}$

24. ★☆☆

a) $\sqrt{20}$ **b)** $\sqrt{27}$ **c)** $\sqrt{50}$ **d)** $\sqrt[3]{24}$ **e)** $\sqrt[4]{162}$ **f)** $\sqrt{a^2b}$

25. ★★☆

a) $\sqrt{2^3 \cdot 5^2} = 10\sqrt{2}$ **b)** $2^2 \cdot 3\sqrt{2 \cdot 3} = 12\sqrt{6}$ **c)** $2^2 \cdot 5\sqrt[3]{2 \cdot 5} = 20\sqrt[3]{10}$

d) $3^2\sqrt[4]{3} = 9\sqrt[4]{3}$ **e)** $a^3b^2\sqrt{a}$ **f)** $x\,y^3\sqrt[3]{x^2}$

26. ★★☆ $3\sqrt{5} = \sqrt{45}$, $4\sqrt{3} = \sqrt{48}$, $2\sqrt{11} = \sqrt{44}$, $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$. Per tant:

$$2\sqrt{11} < 3\sqrt{5} < 4\sqrt{3} < 5\sqrt{2}$$

27. ★★★

a) $\dfrac{5\sqrt{2}}{9}$ **b)** $2a\sqrt{3a}$ **c)** $-3\sqrt[3]{2}$ **d)** $2ab\sqrt[4]{2a^2b}$

6 Operacions amb radicals

28. ★☆☆

a) $5\sqrt{5}$ **b)** $4\sqrt{3}$ **c)** $5\sqrt[3]{6}$ **d)** $-2\sqrt{2}$

29. ★☆☆

a) $\sqrt{36} = 6$ **b)** $\sqrt{100} = 10$ **c)** $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ **d)** $\sqrt[3]{8} = 2$ **e)** $\sqrt{16} = 4$ **f)** $\sqrt[3]{27} = 3$

30. ★★☆

a) $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = \boxed{5\sqrt{2}}$ **b)** $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = \boxed{4\sqrt{3}}$

c) $4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = \boxed{5\sqrt{5}}$ **d)** $5\sqrt{2} - 8\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = \boxed{0}$

e) $2\sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{2} = \boxed{4\sqrt[3]{2}}$ **f)** $2\sqrt{7} + 3\sqrt{7} - \sqrt{7} = \boxed{4\sqrt{7}}$

31. ★★☆

a) $10\sqrt{18} = \boxed{30\sqrt{2}}$ **b)** $\sqrt{150} = \boxed{5\sqrt{6}}$ **c)** $9 \cdot 2 = \boxed{18}$

d) $3\sqrt{5}$ **e)** $\sqrt{3^5} = \boxed{9\sqrt{3}}$ **f)** $\sqrt{36} = \boxed{6}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. ★★★

a) $\sqrt{16}+\sqrt{36}=4+6=\boxed{10}$

b) $2\cdot 3-\sqrt{36}=6-6=\boxed{0}$

c) $\sqrt{12}+2=\boxed{2\sqrt{3}+2}$

d) $2\sqrt{3}+3\sqrt{3}-\sqrt{18}=\boxed{5\sqrt{3}-3\sqrt{2}}$

e) $\dfrac{5\sqrt{2}-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\dfrac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\boxed{3}$

7 Intervals: definició i tipus

33. ★☆☆

Interval	Desigualtat	Tipus d'interval
$(-3,\,5)$	$-3<x<5$	Obert
$[-1,\,4]$	$-1\leq x\leq 4$	Tancat
$(2,\,6]$	$2<x\leq 6$	Semiobert (obert per l'esquerra)
$[-2,\,+\infty)$	$x\geq -2$	Semirecta tancada
$(-\infty,\,0)$	$x<0$	Semirecta oberta
$[-5,\,-1)$	$-5\leq x<-1$	Semiobert (obert per la dreta)

34. ★☆☆

a) $(-4,\,+\infty)$; $x>-4$

b) $(-\infty,\,7]$; $x\leq 7$

c) $[0,\,10]$; $0\leq x\leq 10$

d) $(-2,\,3]$; $-2<x\leq 3$

35. ★★☆

a) No (el 3 no hi pertany)

b) Sí

c) Sí

d) Sí

e) No ($-7<-6$)

f) Sí ($\sqrt{2}\approx 1{,}41$)

36. ★★★

a) Per exemple, $1{,}1$; $1{,}5$ i $1{,}99$. L'interval conté infinits nombres reals.

b) Per exemple, $(-1,\,6)$ o $[0,\,5]$.

c) En $[-3,\,4)$ és el 3 (el 4 no hi pertany). En $(-3,\,4]$ és el 4.


d) $(-1,\,5)$, perquè $2-3=-1$ i $2+3=5$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Representació gràfica d'intervals

37. ★☆☆

a) $[-2, 3]$ 

b) $(0, 4)$ 

c) $(-\infty, 1]$ 

d) $(-3, +\infty)$ 

e) $[-4, -1)$ 

f) $x \leq 2$ 

38. ★★☆

a) $(-1, 4]$; $-1 < x \leq 4$

b) $[2, +\infty)$; $x \geq 2$

c) $(-\infty, -3)$; $x < -3$

d) $[-4, 0]$; $-4 \leq x \leq 0$

39. ★★★

a) $(-1, 5]$ 

b) $[-3, 2)$ 

c) $(-\infty, -1] \cup (4, +\infty)$ 

9 Unió i intersecció d'intervals

40. ★☆☆

A 

B 

$A \cup B = \boxed{[-2, 6)}$ $A \cap B = \boxed{(1, 4]}$

41. ★★☆

a) $A \cup B = \mathbb{R}$; $A \cap B = [0, 3)$

b) $A \cup B = [-5, 2)$; $A \cap B = (-3, -1]$

c) $A \cup B = (-\infty, -2] \cup (1, +\infty)$; $A \cap B = \varnothing$

d) $A \cup B = [0, 8]$; $A \cap B = \varnothing$

e) $A \cup B = (-4, 4)$; $A \cap B = [-1, 1]$

42. ★★★

a) Per exemple, $A = [0, 3]$ i $B = [2, 5]$.

b) $a = 1$.

c) $A \cap B = (0, 6]$, i per tant $A \cap B \cap C = (0, 3]$ i $(A \cap B) \cup C = (-\infty, 6]$.

d) $[-1, 7) = [-1, +\infty) \cap (-\infty, 7)$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Classificació dels nombres reals

43. ★☆☆

Nombre	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{I}$	$\mathbb{R}$
12	×	×	×		×
-5		×	×		×
$\frac{3}{7}$			×		×
$0{,}25$			×		×
$\sqrt{3}$				×	×
π				×	×
$-\sqrt{49} = -7$		×	×		×
$0{,}\overline{3}$			×		×
$1{,}234\,567\,891\,011\ldots$				×	×

44. ★★☆

a) $3 \in \mathbb{N}$ **b)** $-5 \in \mathbb{Z}$ **c)** $2\sqrt{2} \in \mathbb{I}$ **d)** $\mathbb{Q}$ **e)** $\mathbb{I}$

f) $-3 \in \mathbb{Z}$ **g)** $0{,}3 \in \mathbb{Q}$ **h)** $\mathbb{I}$ **i)** $-4 \in \mathbb{Z}$ **j)** $\mathbb{I}$

45. ★★☆

a) Vertadera: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

b) Falsa: per exemple, -3.

c) Vertadera: es pot escriure com a fracció.

d) Falsa: per exemple, $\sqrt{4} = 2$.

e) Falsa: $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \varnothing$.

f) Falsa: $\sqrt{2} = 1{,}414\ldots$ és decimal i irracional.

46. ★★★

a) Per exemple, π o $\sqrt{10} \approx 3{,}16$.

b) Per exemple, $1{,}5$, ja que $1{,}5^2 = 2{,}25$ està entre 2 i 3.

c) $n = 1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 25$ (els quadrats perfectes).

d) No. Per exemple, $\sqrt{2} + \left(-\sqrt{2}\right) = 0$, que és racional.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)