

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: CRM-SP 000000

Especialidade: Clínico Geral

Data: 09/02/2026 14:49

PACIENTE

Nome: Paula Mualoia

Idade: 52 anos

Gênero: feminino

DIAGNÓSTICO BASE PARA PRESCRIÇÃO

TIPO DE EXAME: Radiografia --- DESCRIÇÃO: hjhj --- OBSERVAÇÕES: hjh --- RESULTADO: Prezado(a) médico(a) responsável, Segue a análise detalhada da imagem fornecida, considerando o contexto clínico. --- ****Relatório de Análise Médica**** ****Nome do Paciente:**** Paula Mualoia ****Idade:**** 52 anos ****Gênero:**** Feminino ****Urgência para Análise:**** ALTA --- ****1.**

Descrição da imagem e qualidade técnica****** A imagem fornecida é uma micrografia de um esfregaço de sangue periférico, observada em alta ampliação (provavelmente com objetiva de imersão em óleo), e não uma radiografia, conforme indicado no contexto clínico.

A qualidade técnica da imagem é satisfatória, com boa resolução e coloração adequada, permitindo a visualização clara dos eritrócitos e de estruturas intracelulares. ****2.**

Achados principais****** ****Parasitemia Intraeritrocitária:**** O achado mais proeminente e patognomônico é a presença de numerosos parasitas intracelulares dentro dos eritrócitos.

Estes parasitas são corados em roxo e apresentam morfologia compatível com estágios de ***Plasmodium* spp.** ****Morfologia dos Parasitas:**** Predominantemente, são observadas formas em anel (trofozoítos jovens) nos eritrócitos.

... *[continua no sistema]*

PRESCRIÇÃO MÉDICA

PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

- Artemeter + Lumefantrina** (ex: Coartem®)
 - Princípio Ativo:** Artemeter 20mg + Lumefantrina 120mg (por comprimido)
 - Dosagem e Frequência:**
 - Dose Inicial:** 4 (quatro) comprimidos, via oral, imediatamente.
 - ^a Dose:** 4 (quatro) comprimidos, via oral, 8 (oito) horas após a dose inicial.
 - Doses Subsequentes:** 4 (quatro) comprimidos, via oral, de 12 (doze) em 12 (doze) horas, por mais 2 (dois) dias.
 - Duração do Tratamento:** 3 (três) dias (total de 6 doses).
 - Via de Administração:** Oral.
 - Quantidade Total a Dispensar:** 24 (vinte e quatro) comprimidos.
 - Observação Importante:** Ingerir os comprimidos com alimentos (especialmente alimentos gordurosos) ou bebidas lácteas para otimizar a absorção. Em caso de vômito na primeira hora após a administração, repetir a dose.
 - Paracetamol**
 - Princípio Ativo:** Paracetamol 750mg (por comprimido)
 - Dosagem e Frequência:** 1 (um) comprimido, via oral, de 6 (seis) em 6 (seis) horas, se necessário, para febre e dor.
 - Duração do Tratamento:** Enquanto houver sintomas.
 - Via de Administração:** Oral.
 - Quantidade Total a Dispensar:** 12 (doze) comprimidos (ou conforme a necessidade).
 -
 - Monitoramento Rigoroso:** A paciente deve ser rigorosamente monitorada clinicamente e laboratorialmente para avaliar a resposta ao tratamento e detectar precocemente possíveis complicações.
 - Hidratação:** Manter hidratação adequada, seja por via oral ou intravenosa, conforme a necessidade clínica.
6. **Repouso:** Recomenda-se repouso físico relativo durante a fase aguda da doença para auxiliar na recuperação.
- SINAIS DE ALERTA PARA RETORNAR AO MÉDICO/SERVIÇO DE EMERGÊNCIA IMEDIATAMENTE:**
 - Piora da febre ou calafrios.

- Dificuldade para respirar ou dor no peito.
- Dor de cabeça intensa e persistente.
- Confusão mental, sonolência ou alteração do nível de consciência.
- Vômitos incontrolláveis ou incapacidade de se alimentar/hidratar.
- Urina escura ou diminuição do volume urinário.
- Coloração amarelada da pele ou olhos (icterícia).
- Sangramentos anormais (nasal, gengival, manchas roxas na pele).
- Fraqueza extrema ou convulsões.
- Data para Retorno:** A paciente deve retornar para reavaliação clínica e laboratorial em **24 horas** após o início do tratamento e após a realização dos exames complementares solicitados, ou antes, se apresentar qualquer sinal de alerta.
-
- Contraindicações do Artemeter + Lumefantrina:** Não deve ser utilizado em casos de hipersensibilidade aos componentes, malária grave (requer tratamento intravenoso), pacientes com prolongamento do intervalo QT (ou histórico familiar), bradicardia ou outras arritmias cardíacas. Cautela em pacientes com insuficiência hepática ou renal graves. Em gestantes, a decisão deve ponderar risco/benefício e ser discutida com especialista.
- Interações Medicamentosas:** Informar o médico sobre todos os medicamentos em uso, incluindo fitoterápicos, pois o Artemeter + Lumefantrina pode interagir com outros fármacos, como indutores/inibidores de CYP3A4, medicamentos que prolongam o intervalo QT (ex: antiarrítmicos, alguns antidepressivos, antipsicóticos, macrolídeos, fluoroquinolonas).
- Efeitos Colaterais Comuns:** Dor de cabeça, tontura, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, dores musculares (mialgia), dores nas articulações (artralgia) e fadiga.
- Armazenamento:** Manter os medicamentos em temperatura ambiente (15-30°C), protegidos da luz e umidade, e fora do alcance de crianças.

•

Atenciosamente,

• Dr. Fernando**

Clínico Geral

CRM-SP 000000

[Carimbo do Consultório / Logotipo]

[Telefone de Contato: (XX) XXXX-XXXX]

[Endereço do Consultório]

-

RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÕES MÉDICAS ESPECÍFICAS

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE:

Esta receita foi baseada no diagnóstico completo do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

fernando

CRM: CRM-SP 000000

Clínico Geral

Receita gerada em 09/02/2026 14:49

ID da receita: 1

Sistema Médico - Receita eletrônica