

RECEITA MÉDICA

Médico: fernando

CRM: sfgh

Paciente: Xavier Tchongolola Cahupi Tchivela

PRESCRIÇÃO:

1. ****Artemether + Lumefantrine****

* Apresentação: Comprimido dispersível 20 mg Artemether / 120 mg Lumefantrine

* Posologia: 1 comprimido dispersível (para crianças com peso inferior a 5 kg)

* Frequência: 2 vezes ao dia (a cada 12 horas)

* Duração: 3 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 6 comprimidos

2. ****Paracetamol****

* Apresentação: Solução oral (gotas) 100 mg/mL

* Posologia: 0.4 mL (equivalente a 40 mg)

* Frequência: A cada 6 horas, se febre > 38.5°C ou desconforto

* Duração: Conforme necessidade, não exceder 5 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 1 frasco de 15 mL

3. ****Sulfato Ferroso****

* Apresentação: Solução oral (gotas) 25 mg de ferro elementar/mL

* Posologia: 0.5 mL (equivalente a 12.5 mg de ferro elementar)

* Frequência: 1 vez ao dia

* Duração: 3 meses (ou conforme reavaliação médica)

* Via: Oral

* Quantidade: 3 frascos de 30 mL



RECOMENDAÇÕES:

• ****Febre:**** Manter o bebê hidratado com líquidos adequados (leite materno ou fórmula). Realizar compressas mornas na testa e axilas se a febre persistir e não ceder com a medicação.

• ****Fadiga:**** Garantir repouso adequado em ambiente tranquilo e confortável. Evitar atividades que exijam esforço excessivo.

• ****Gerais:**** Monitorar rigorosamente a temperatura corporal e o estado geral do bebê. Oferecer alimentação frequente e em pequenas quantidades, se o bebê estiver aceitando. ****É IMPRESCINDÍVEL PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR IMEDIATAMENTE**** para avaliação da gravidade da malária, confirmação da espécie de *Plasmodium* e monitoramento intensivo, dada a idade do paciente e o alto risco de complicações.

• **Sinais de alerta:** Piora da febre ou febre que não cede com medicação, convulsões, dificuldade para respirar (respiração rápida, ruidosa ou com esforço), letargia extrema, sonolência excessiva ou dificuldade para acordar, recusa alimentar ou vômitos persistentes, pele pálida, amarelada ou azulada, sangramentos incomuns, diminuição da diurese (poucas fraldas molhadas), ou qualquer sinal de piora do estado geral.

• **Retorno:** Retorno ****IMEDIATO**** ao serviço de emergência ou hospital para reavaliação em 24 horas após o início do tratamento e conforme orientação da equipe médica hospitalar.



Assinatura do Médico

fernando

CRM: sfgh

