

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: sfgh

Especialidade: radiologista

Data: 22/02/2026 21:15

PACIENTE

Nome: xavier Tchivela

Idade: 24 anos

Gênero: masculino

DIAGNÓSTICO

TIPO DE EXAME:

Ressonância Magnética

DESCRIÇÃO:

nm

OBSERVAÇÕES:

m

RESULTADO:

****Relatório de Análise de Imagem Médica****

****Paciente:**** Xavier Tchivela

****Idade:**** 24 anos

****Gênero:**** Masculino

****1. Descrição da imagem e qualidade técnica****

A imagem fornecida é uma microfotografia de um esfregaço de sangue periférico corado (provavelmente com coloração tipo Romanowsky, como Giemsa ou Wright). A qualidade técnica da imagem é boa, com clareza adequada para a identificação dos elementos celulares e estruturas parasitárias. O campo de visão mostra uma população predominantemente de eritrócitos.

* ****Nota sobre o tipo de exame:**** É importante ressaltar que, embora o contexto clínico mencione "Ressonância Magnética" como tipo de exame, a imagem apresentada é inequivocamente um esfregaço de sangue periférico sob microscopia óptica, o que é fundamental para a análise hematológica e parasitológica.

****2. Achados principais****

* ****Eritrócitos (Glóbulos Vermelhos):**** Observa-se a presença de anisocitose (variação no tamanho dos eritrócitos) e poiquilocitose (variação na forma dos eritrócitos), com algumas células exibindo hipocromia (centro pálido aumentado).

* ****Parasitas Intraeritrocitários:**** O achado mais significativo é a presença de múltiplos parasitas dentro dos eritrócitos. Estes parasitas se apresentam principalmente como formas anelares (trofozoítos jovens), caracterizadas por pequenos anéis de citoplasma e um ponto de cromatina, e alguns trofozoítos mais maduros. Alguns parasitas parecem conter pigmento malárico (hemozoína). Em alguns eritrócitos, observa-se mais de um parasita.

****3. Diagnóstico sugerido****

Os achados são altamente sugestivos de ****Malária****. A presença de parasitas intraeritrocitários é o critério diagnóstico para infecção malárica. A morfologia predominante de formas anelares e trofozoítos jovens, por vezes múltiplos por eritrócito, é compatível com diversas espécies de *Plasmodium*, incluindo *Plasmodium falciparum*.
[Diagnóstico completo disponível no sistema]

PRESCRIÇÃO MÉDICA

A morfologia dos parasitas é compatível com diversas espécies de *Plasmodium*, com forte sugestão de ****_Plasmodium falciparum_****, que é uma causa comum de malária grave. A condição é classificada

como de ****ALTA URGÊNCIA / EMERGÊNCIA****, exigindo intervenção médica imediata e início do tratamento antimalárico sem demora, dada a rápida evolução potencial para quadros graves ou fatais.

****PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS:****

Com base na alta suspeita de Malária por *Plasmodium falciparum* e na urgência da situação, e considerando que esta prescrição deve ser validada e acompanhada por um médico clínico, iniciamos o tratamento empírico.

1. ****ARTEMETHER 20 mg / LUMEFANTRINE 120 mg**** (Nome Comercial Sugerido: Coartem® ou similar)

* ****Forma Farmacêutica:**** Comprimidos

* ****Dosagem:**** 4 comprimidos (totalizando 80 mg de Artemether e 480 mg de Lumefantrine)

* ****Frequência e Duração:****

* 1ª dose: 4 comprimidos, imediatamente.

* 2ª dose: 4 comprimidos, após 8 horas da 1ª dose.

* 3ª dose: 4 comprimidos, após 12 horas da 2ª dose (24 horas após a 1ª dose).

* 4ª dose: 4 comprimidos, após 12 horas da 3ª dose (36 horas após a 1ª dose).

* 5ª dose: 4 comprimidos, após 12 horas da 4ª dose (48 horas após a 1ª dose).

* 6ª dose: 4 comprimidos, após 12 horas da 5ª dose (60 horas após a 1ª dose).

* ****Via de Administração:**** Oral

* ****Observação:**** Ingerir com alimentos ricos em gordura (leite, iogurte) para otimizar a absorção.

* ****Quantidade Total a Ser Dispensada:**** 24 comprimidos.

2. ****PARACETAMOL 500 mg**** (Nome Comercial Sugerido: Tylenol®, Cimegripe® ou similar)

* ****Forma Farmacêutica:**** Comprimidos

* ****Dosagem:**** 1 comprimido (500 mg)

* ****Frequência:**** A cada 6 a 8 horas, se houver febre (temperatura corporal $\geq 37.8^{\circ}\text{C}$) ou dor.

* ****Duração:**** Conforme necessidade e orientação médica. Não exceder 4g (8 comprimidos) em 24 horas.

* ****Via de Administração:**** Oral

* ****Quantidade Total a Ser Dispensada:**** 12 comprimidos (para uso inicial).

* ****Novo Esfregaço de Sangue Periférico:**** Para confirmação da espécie de *Plasmodium* (se possível, por formas maduras ou gametócitos), contagem da parasitemia (para avaliar gravidade) e monitoramento da resposta ao tratamento.

* ****Hemograma Completo:**** Avaliar anemia (confirmar hipocromia, anisocitose), plaquetopenia (comum na malária) e leucograma.

* ****Função Renal:**** Creatinina, Ureia (para detectar insuficiência renal aguda).

* ****Função Hepática:**** TGO, TGP, Bilirrubinas totais e frações (para detectar disfunção hepática e icterícia).

* ****Glicemia:**** Monitorar, pois hipoglicemia é uma complicação da malária grave e do tratamento.

* ****Eletrólitos:**** (Sódio, Potássio).

* ****PCR para *Plasmodium* spp.:** Se disponível, para confirmação molecular e identificação precisa da espécie.

4. ****Monitorização Intensiva:****

* Sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura) regularmente.

* Nível de consciência (Escala de Coma de Glasgow).

* Débito urinário.

* Monitoramento diário da parasitemia no esfregaço sanguíneo.

5. ****Hidratação:**** Manter hidratação adequada, por via oral, com água, sucos ou soros de reidratação oral. Em caso de incapacidade de ingerir líquidos, considerar hidratação intravenosa.

6. ****Nutrição:**** Dieta leve, de fácil digestão e nutritiva.

7. ****Repouso:**** Repouso absoluto ou relativo, conforme o estado geral do paciente e orientação da equipe médica assistente.

8. ****Sinais de Alerta para Retornar ao Médico Imediatamente:**** Piora da febre, calafrios intensos, confusão mental, convulsões, desorientação, sonolência excessiva, dificuldade respiratória, icterícia (pele e olhos amarelados), diminuição significativa do volume urinário, sangramentos incomuns, vômitos persistentes que impedem a ingestão de medicamentos.

9. ****Retorno:**** O paciente deverá ser reavaliado diariamente pela equipe clínica enquanto estiver em tratamento e internação. A data para retorno ambulatorial será definida pelo médico assistente após a alta hospitalar e a confirmação da negatificação da parasitemia.

* ****Administração dos Medicamentos:**** Os medicamentos antimaláricos devem ser tomados rigorosamente conforme a prescrição para garantir a eficácia do tratamento e prevenir o desenvolvimento de resistência. A dose de Artemether/Lumefantrine deve ser tomada com alimentos.

* ****Efeitos Colaterais Comuns:**** Náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, tontura, dor de cabeça e palpitações são efeitos colaterais comuns do Artemether/Lumefantrine. Caso os vômitos ocorram até 1 hora após a dose, a dose deve ser repetida.

* ****Interações Medicamentosas:**** Informar o médico sobre todos os medicamentos em uso (incluindo fitoterápicos e suplementos), pois pode haver interações importantes, especialmente com medicamentos que afetam o ritmo cardíaco (prolongamento do intervalo QT) ou metabolização hepática.

* ****Contraindicações:**** Gravidez (pesar risco-benefício), amamentação, histórico de arritmias cardíacas ou uso concomitante de medicamentos que prolongam o intervalo QT. Essas condições devem ser avaliadas pelo médico assistente.

* ****Gestão Clínica:**** Ressalta-se que, como radiologista, minha função é primariamente diagnóstica a partir da análise de imagens. A gestão clínica completa, incluindo o acompanhamento da resposta ao tratamento, manejo de complicações e ajustes terapêuticos, deve ser realizada por um médico clínico ou infectologista.

Dr. Fernando

CRM: sfgh

Especialidade: Radiologista

****[Assinatura do Médico]****

****[Carimbo do Consultório / Instituição]****

****[Telefone para Contato em Caso de Emergência / Dúvidas]****

RECOMENDAÇÕES

****RECOMENDAÇÕES MÉDICAS ESPECÍFICAS:****

****OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:****

IMPORTANTE:

Esta receita foi baseada no diagnóstico do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

fernando

CRM: sfgh

radiologista

Receita gerada em 22/02/2026 21:15

ID da receita: 2

Sistema Médico - Receita eletrônica