

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: sfgh

Especialidade: radiologista

Data: 25/02/2026 08:00

PACIENTE

Nome: xavier Tchivela

Idade: 24 anos

Gênero: masculino

DIAGNÓSTICO

TIPO DE EXAME:

Parasitológico

DESCRIÇÃO:

vbh

OBSERVAÇÕES:

bn

RESULTADO:

****Relatório de Análise de Imagem Médica****

****1. Descrição da Imagem e Qualidade Técnica:****

A imagem apresentada é de um esfregaço de sangue periférico, provavelmente corado pelo método de Giemsa ou similar, sob alta magnificação (provavelmente imersão em óleo). A qualidade técnica da

imagem é boa, com coloração adequada, bom contraste e foco nítido, permitindo a visualização clara da morfologia dos eritrócitos e das estruturas parasitárias. O campo visual exibe uma população densa de glóbulos vermelhos.

****2. Achados Principais:****

* ****Presença de parasitas intraeritrocitários:**** Numerosos eritrócitos contêm estruturas parasitárias coradas em roxo, características de parasitas do gênero *Plasmodium*.*

* ****Morfologia dos parasitas:**** A maioria dos parasitas observados são formas aneladas (trofozoítos jovens), que são pequenas, delicadas e possuem um ponto de cromatina e um anel de citoplasma.

* ****Múltiplas infecções por eritrócito:**** Em vários campos, é possível observar mais de um parasita anelado dentro de uma única hemácia.

* ****Formas "accolé" (appliqué):**** Alguns anéis parasitas são vistos aderidos à margem do eritrócito (forma accolé ou appliqué), uma característica comum.

* ****Eritrócitos parasitados:**** Os eritrócitos infectados não demonstram aumento significativo de tamanho ou alterações de forma discerníveis que sugiram outras espécies de *Plasmodium* (como *P. vivax** ou *P. ovale**).

* ****Parasitemia:**** A densidade de parasitas no campo visual é significativa, indicando uma parasitemia moderada a alta.

* ****Ausência de outras formas:**** Não são observadas formas mais maduras como esquizontes ou gametócitos em quantidade proeminente neste campo específico, o que é comum em infecções por *P. falciparum**, onde a maturação ocorre principalmente em órgãos internos.

****3. Diagnóstico Sugerido:****

Os achados morfológicos, incluindo a predominância de formas aneladas peq...

[Diagnóstico completo disponível no sistema]

PRESCRIÇÃO MÉDICA

PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

****1. Artemeter + Lumefantrina (Ex: Coartem)****

* ****Princípio Ativo:**** Artemeter 80mg + Lumefantrina 480mg

* ****Forma Farmacêutica:**** Comprimidos

* ****Posologia:**** Iniciar com 4 (quatro) comprimidos em dose única. Após 8 (oito) horas, administrar mais 4 (quatro) comprimidos. A partir do segundo dia, administrar 4 (quatro) comprimidos a cada 12 (doze) horas (manhã e noite), por mais 2 (dois) dias.

* ****Frequência:**** 6 doses ao longo de 3 dias.

* ****Duração:**** 3 (três) dias.

* ****Via de Administração:**** Oral.

* ****Quantidade Total a Dispensar:**** 24 (vinte e quatro) comprimidos.

****2. Paracetamol (Acetaminofeno)****

* ****Princípio Ativo:**** Paracetamol

* ****Forma Farmacêutica:**** Comprimidos

* ****Dosagem:**** 750mg

* **Posologia:** Tomar 1 (um) comprimido a cada 6 (seis) a 8 (oito) horas, se necessário, para controle da febre ($>38,5^{\circ}\text{C}$) e dor.

* **Duração:** Enquanto persistirem os sintomas de febre ou dor.

* **Via de Administração:** Oral.

* **Quantidade Total a Dispensar:** 20 (vinte) comprimidos.

* **Controle de parasitemia:** Repetir esfregaço de sangue (gota espessa e fina) para quantificação da parasitemia e confirmação da espécie, idealmente a cada 12-24 horas, para monitorar a resposta ao tratamento.

* **Função renal e hepática:** Ureia, creatinina, bilirrubinas, TGO, TGP.

* **Eletrólitos.**

* **Glicemia.**

4. **Hidratação:** Manter hidratação adequada, por via oral se possível, ou intravenosa se houver vômitos ou incapacidade de beber.

5. **Repouso:** Repouso físico absoluto durante a fase aguda da doença.

6. **Dieta:** Oferecer dieta leve, de fácil digestão, rica em carboidratos, mesmo que em pequenas porções frequentes. Ingerir os medicamentos antimaláricos com alimentos ou leite para melhor absorção e tolerância.

7. **Sinais de Alerta para Retornar ao Médico (ou alertar equipe hospitalar):** Piora da febre, confusão mental, sonolência excessiva, convulsões, vômitos persistentes, icterícia (pele e olhos amarelados), urina escura ou diminuição acentuada da diurese, dificuldade para respirar, sangramentos incomuns, ou qualquer outro sintoma novo e preocupante.

* **Interações Medicamentosas:** Informar o médico sobre todos os medicamentos em uso, incluindo fitoterápicos, devido a possíveis interações (ex: com indutores/inibidores de CYP3A4, medicamentos que prolongam o intervalo QT).

* **Contraindicações:** Hipersensibilidade aos componentes, insuficiência hepática/renal grave, histórico de prolongamento do intervalo QT ou arritmias cardíacas.

* **Paracetamol:**

* **Advertência:** Não exceder a dose máxima diária recomendada (4g para adultos) para evitar risco de hepatotoxicidade.

* **Efeitos Colaterais:** Geralmente bem tolerado. Reações alérgicas são raras, mas podem ocorrer.

* **Armazenamento:** Manter os medicamentos em local seco, fresco e protegido da luz.

RODAPÉ PROFISSIONAL

Dr. Fernando

CRM: sfgh

Especialidade: Radiologista

Carimbo do Consultório/Hospital:

[Nome do Hospital/Clínica]

[Endereço do Hospital/Clínica]

[Telefone de Contato]

RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÕES MÉDICAS ESPECÍFICAS

1. ****Internação Hospitalar Imediata:**** Devido à classificação de EMERGÊNCIA MÉDICA e ao risco de rápida deterioração da malária por *P. falciparum*, o paciente deve ser ****internado imediatamente**** para monitoramento clínico intensivo e manejo adequado.

2. ****Monitoramento Clínico Contínuo:**** Acompanhamento rigoroso dos sinais vitais (temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória), nível de consciência, diurese e sinais de complicações (por exemplo, icterícia, convulsões, sangramentos, dificuldade respiratória).

3. ****Monitoramento Laboratorial:****

* ****Hemograma completo:**** Diariamente, para avaliar hemoglobina, hematócrito e plaquetas.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

* ****Artemeter + Lumefantrina:****

* ****Administração:**** É crucial tomar este medicamento com alimentos ou leite para garantir a máxima absorção e eficácia. Evitar ingeri-lo com o estômago vazio.

* ****Efeitos Colaterais Comuns:**** Dor de cabeça, tontura, náuseas, vômitos, dor abdominal, fadiga, mialgia, artralgia, palpitações, tosse e insônia. Em caso de vômito dentro de 1 hora após a dose, esta deve ser repetida.

IMPORTANTE:

Esta receita foi baseada no diagnóstico do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

fernando

CRM: sfgh

radiologista

Receita gerada em 25/02/2026 08:00

ID da receita: 2

Sistema Médico - Receita eletrônica