

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: CRM-SP 000000

Especialidade: Clínico Geral

Data: 09/02/2026 18:00

PACIENTE

Nome: Sukadas

Idade: 26 anos

Gênero: masculino

DIAGNÓSTICO BASE PARA PRESCRIÇÃO

TIPO DE EXAME: Exame de Sangue Completo --- DESCRIÇÃO: ghjkm --- OBSERVAÇÕES: gh ---

RESULTADO: **RELATÓRIO DE ANÁLISE DE ESFREGAÇO SANGUÍNEO PERIFÉRICO**

INFORMAÇÕES DO PACIENTE: * **Nome:** Sukadas * **Idade:** 26 anos * **Gênero:**

Masculino * **Tipo de exame:** Exame de Sangue Completo (Esfregaço Sanguíneo Periférico) *

Urgência Clínica (informada): URGENTE **1.

Descrição da Imagem e Qualidade Técnica:** A imagem fornecida é um esfregaço de sangue periférico visualizado sob alta magnificação (provavelmente objetiva de imersão em óleo, 100x).

A coloração (aparentemente Wright-Giemsa) é adequada, permitindo boa diferenciação dos componentes celulares.

O campo está bem focado e a distribuição das células vermelhas é satisfatória para análise morfológica e detecção de parasitas.

A qualidade técnica geral da imagem é boa para fins diagnósticos. **2.

... [continua no sistema]

PRESCRIÇÃO MÉDICA

O paciente Sukadas apresenta um quadro de **Malária**, confirmado pela presença de múltiplos parasitas intraeritrocitários compatíveis com *Plasmodium* sp. em esfregaço de sangue periférico. A parasitemia aparente é moderada. Observa-se também evidência de anemia com anisopoiquilocitose, hipocromia e microcitose, sugerindo deficiência de ferro ou outra hemoglobinopatia concomitante ou agravada pela infecção. O nível de urgência é considerado **EMERGÊNCIA**, exigindo avaliação clínica imediata e início rápido do tratamento para prevenir complicações graves. A especiação definitiva do *Plasmodium* e a quantificação precisa da parasitemia são cruciais para a condução terapêutica completa.

-

- **PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS:**

- **ATENÇÃO: INICIAR TRATAMENTO SOB SUPERVISÃO MÉDICA, PREFERENCIALMENTE EM AMBIENTE HOSPITALAR/PRONTO-SOCORRO DEVIDO À URGÊNCIA CLÍNICA.**

- Artemether + Lumefantrine (Nome Comercial: Coartem® ou similar)
- Apresentação: Comprimidos (20 mg Artemether + 120 mg Lumefantrine)
- Dosagem: 4 comprimidos (totalizando 80 mg Artemether + 480 mg Lumefantrine)
- Frequência: Via oral, a cada 12 horas (total de 6 doses)
- Duração: 3 dias
- Via de Administração: Oral
- Quantidade a Dispensar: 24 (vinte e quatro) comprimidos
- Instruções Específicas: Tomar com alimentos (leite, iogurte ou refeição gordurosa) para melhor absorção.
- Sulfato Ferroso (Nome Comercial: Sulfato Ferroso 300 mg® ou similar)
- Apresentação: Comprimidos (300 mg, equivalente a 60 mg de ferro elementar)
- Dosagem: 1 comprimido
- Frequência: Via oral, 1 vez ao dia, após a refeição principal
- Duração: Mínimo de 3 (três) meses, ou conforme reavaliação médica após controle da infecção malárica.
- Via de Administração: Oral
- Quantidade a Dispensar: 90 (noventa) comprimidos
- Ácido Fólico (Nome Comercial: Ácido Fólico 5 mg® ou similar)
- Apresentação: Comprimidos (5 mg)
- Dosagem: 1 comprimido

- Frequência:** Via oral, 1 vez ao dia
- Duração:** 30 (trinta) dias, ou conforme reavaliação médica.
- Via de Administração:** Oral
- Quantidade a Dispensar:** 30 (trinta) comprimidos
- Paracetamol (Nome Comercial: Tylenol® ou similar)**
- Apresentação:** Comprimidos (500 mg)
- Dosagem:** 1 a 2 comprimidos (500 mg a 1000 mg)
- Frequência:** Via oral, a cada 6 a 8 horas, se dor ou febre (prn)
- Duração:** Conforme necessidade para alívio sintomático
- Via de Administração:** Oral
- Quantidade a Dispensar:** 20 (vinte) comprimidos
-
- AVALIAÇÃO CLÍNICA URGENTE E HOSPITALIZAÇÃO:** Dada a urgência, o paciente deve ser encaminhado IMEDIATAMENTE para um pronto-socorro ou unidade de saúde de referência para malária para avaliação clínica completa, definição da gravidade, e monitoramento intensivo durante o início do tratamento.
- CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA:** Coletar amostras para:
 - Esfregaço Sanguíneo Periférico (Gota Espessa e Esfregaço Fino):** Para confirmação da espécie de *Plasmodium* (crucial para o manejo de *P. vivax* e *P. ovale* devido aos hipnozoítos hepáticos que exigem Primaquina), quantificação precisa da parasitemia e detecção de sinais de gravidade (ex: esquizontes, pigmento em neutrófilos).
 - Hemograma Completo:** Avaliar grau de anemia, contagem de leucócitos e plaquetas (trombocitopenia é comum).
 - Bioquímica Sanguínea:** Avaliar função renal, hepática, eletrólitos e glicemia.
 - Teste de G6PD (Glicose-6-Fosfato Desidrogenase):** Essencial antes de qualquer potencial uso de Primaquina, devido ao risco de hemólise em pacientes deficientes.
- HISTÓRIA DE VIAGEM:** Investigar detalhadamente o histórico de viagens recentes para áreas endêmicas de malária para guiar o manejo e a vigilância epidemiológica.
- REPOUSO:** Repouso relativo durante a fase aguda da doença.
- HIDRATAÇÃO:** Manter-se bem hidratado com água, sucos e soros de reidratação oral, se necessário.

6. **SINAIS DE ALERTA PARA RETORNAR AO MÉDICO/HOSPITAL IMEDIATAMENTE:**

- Piora da febre ou febre que não cede com medicação.
- Confusão mental, sonolência excessiva, convulsões ou qualquer alteração da consciência.
- Dificuldade para respirar.
- Dor abdominal intensa, vômitos persistentes.
- Urina escura ou diminuição da frequência urinária.
- Pele ou olhos amarelados (icterícia).
- Sangramentos (nariz, gengivas, pele).

7. ****MONITORAMENTO:**** Acompanhamento rigoroso da resposta ao tratamento, incluindo nova avaliação clínica e parasitológica (Gota Espessa) nas primeiras 24-48 horas e após o término do tratamento, conforme protocolo local.

- **Interações Medicamentosas:**** Evitar uso concomitante com medicamentos que prolongam o intervalo QT, fortes indutores ou inibidores de CYP3A4.
- **Efeitos Colaterais Comuns:**** Cefaleia, tontura, dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, febre, palpitações, mialgia, artralgia.
- **Instruções de Armazenamento:**** Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), proteger da luz e umidade.
- **Sulfato Ferroso:****
- **Efeitos Colaterais Comuns:**** Náuseas, vômitos, constipação, diarreia, dor abdominal, escurecimento das fezes.
- **Interações:**** Evitar tomar com antiácidos, cálcio, laticínios, café, chá (diminuem absorção). A Vitamina C pode aumentar a absorção.
- **Ácido Fólico:**** Geralmente bem tolerado.
- **Paracetamol:****
- **Contraindicações:**** Doença hepática grave.
- **Efeitos Colaterais Comuns:**** Raros em doses terapêuticas. Em doses elevadas, risco de hepatotoxicidade.
- **Não exceder a dose máxima diária de 4g.****

•

• Dr. Fernando**

Clínico Geral

CRM-SP 000000

•

[Carimbo do Consultório/Instituição Médica]

[Endereço do Consultório]

[Telefone de Contato]

[E-mail (opcional)]

RECOMENDAÇÕES

- RECOMENDAÇÕES MÉDICAS ESPECÍFICAS:**

8. **RETORNO:** O paciente deverá permanecer sob cuidados médicos e seguirá as orientações de retorno e acompanhamento da equipe que o atender no ambiente hospitalar.

-

- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**

- Artemether + Lumefantrine:**

- Contraindicações:** Hipersensibilidade aos componentes, pacientes com prolongamento do intervalo QT ou histórico familiar de prolongamento do QT, ou uso concomitante de drogas que prolongam o QT.

IMPORTANTE:

Esta receita foi baseada no diagnóstico completo do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

fernando

CRM: CRM-SP 000000

Clínico Geral

Receita gerada em 09/02/2026 18:00

ID da receita: 3

Sistema Médico - Receita eletrônica