

RECEITA MÉDICA

Médico: fernando

CRM: sfgH

Paciente: xavier Tchivela

PRESCRIÇÃO:

1. ****CLOROQUINA - Difosfato de Cloroquina****

* Apresentação: Comprimidos de 250 mg (equivalente a 150 mg de base)

* Posologia:

* Dia 1: 4 comprimidos (total de 1000 mg de sal / 600 mg de base)

* Dia 2: 2 comprimidos (total de 500 mg de sal / 300 mg de base)

* Dia 3: 2 comprimidos (total de 500 mg de sal / 300 mg de base)

* Frequência: Dose única diária

* Duração: 3 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 8 comprimidos

2. ****PRIMAQUINA - Difosfato de Primaquina****

* Apresentação: Comprimidos de 15 mg (base)

* Posologia: 1 comprimido

* Frequência: 1 vez ao dia

* Duração: 14 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 14 comprimidos

* ****OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:**** A Primaquina deve ser iniciada SOMENTE APÓS a realização e confirmação de resultado normal do teste de deficiência de Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6PD). Em caso de deficiência, o tratamento deve ser ajustado sob orientação médica.

3. ****SULFATO FERROSO****

* Apresentação: Comprimidos de 300 mg (equivalente a 60 mg de ferro elementar)

* Posologia: 1 comprimido

* Frequência: 1 vez ao dia

* Duração: 3 meses (ou conforme reavaliação médica)

* Via: Oral

* Quantidade: 90 comprimidos

4. ****ÁCIDO FÓLICO****

* Apresentação: Comprimidos de 5 mg

* Posologia: 1 comprimido

* Frequência: 1 vez ao dia

* Duração: 3 meses (ou conforme reavaliação médica)

* Via: Oral

* Quantidade: 90 comprimidos



RECOMENDAÇÕES:

- Manter hidratação adequada, ingerindo bastante líquidos.
- Repouso relativo, evitando esforços físicos intensos.
- Utilizar medidas de proteção individual contra picadas de mosquitos (repelentes, telas em janelas, mosquiteiros) para evitar a transmissão da doença.
- Realizar o teste de Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6PD) o mais breve possível, conforme orientação médica, antes de iniciar a Primaquina.
- Sinais de alerta: Procurar atendimento médico IMEDIATAMENTE em caso de piora da febre, calafrios intensos, dor de cabeça forte, confusão mental, dificuldade para respirar, urina escura, icterícia (pele e olhos amarelados), sangramentos incomuns ou fraqueza extrema.
- Retorno: Agendar retorno em 7 dias para avaliação da resposta ao tratamento, resultados do

CRM: sfah

[illegible]