

RECEITA MÉDICA

Médico: fernando

CRM: sfgh

Paciente: xavier Tchivela

PRESCRIÇÃO:

****Para Malária:****

1. ****CLOROQUINA (Fosfato de Cloroquina)****

* Apresentação: Comprimidos de 150 mg (base)

* Posologia:

* No Dia 1: Tomar 4 comprimidos (600 mg base) de uma só vez, seguidos de 2 comprimidos (300 mg base) 6 horas depois.

* No Dia 2: Tomar 2 comprimidos (300 mg base) uma vez ao dia.

* No Dia 3: Tomar 2 comprimidos (300 mg base) uma vez ao dia.

* Frequência: Conforme posologia

* Duração: 3 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 10 comprimidos

2. ****PRIMAQUINA (Fosfato de Primaquina)****

* Apresentação: Comprimidos de 15 mg (base)

* Posologia: Tomar 1 comprimido (15 mg)

* Frequência: 1 vez ao dia

* Duração: 14 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 14 comprimidos

* ****OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:**** A Primaquina só deve ser iniciada APÓS a realização e avaliação de um teste para deficiência de Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6PD).

****Para Anemia:****

3. ****SULFATO FERROSO****

* Apresentação: Comprimidos de 300 mg (equivalente a 60 mg de ferro elementar)

* Posologia: Tomar 1 comprimido

* Frequência: 2 vezes ao dia

* Duração: 3 meses

* Via: Oral

* Quantidade: 180 comprimidos

4. ****ÁCIDO FÓLICO****

* Apresentação: Comprimidos de 5 mg

* Posologia: Tomar 1 comprimido

* Frequência: 1 vez ao dia

* Duração: 3 meses

* Via: Oral

* Quantidade: 90 comprimidos



RECOMENDAÇÕES:

• ****Iniciar o tratamento antimalárico imediatamente**** conforme prescrição, após a confirmação da espécie de *Plasmodium* e avaliação clínica.

• ****Realizar o teste de Glicose-6-Fosfato Desidrogenase (G6PD)**** antes de iniciar a Primaquina para evitar complicações graves.

• Manter-se bem hidratado, ingerindo bastante líquidos (água, sucos naturais).

• Repousar adequadamente para auxiliar na recuperação.

• Evitar a automedicação e o uso de outros medicamentos sem orientação médica.

• Manter uma dieta equilibrada, rica em alimentos fontes de ferro (carnes vermelhas, feijão, vegetais verde-escuros) e vitamina C (para auxiliar na absorção do ferro).

- Sinais de alerta: Procurar atendimento médico de urgência se apresentar febre persistente ou alta, calafrios intensos, dor de cabeça intensa, confusão mental, convulsões, dificuldade para respirar, urina escura, icterícia (pele e olhos amarelados), sangramentos incomuns ou fraqueza extrema.
- Retorno: Agendar