

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: CRM-SP 000000

Especialidade: Clínico Geral

Data: 09/02/2026 11:40

PACIENTE

Nome: Paula Mualoia

Idade: 52 anos

Gênero: feminino

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico gerado por IA: Prezado(a) médico(a) responsável, Segue a análise detalhada da imagem fornecida, considerando o contexto clínico. --- ****Relatório de Análise Médica**** ****Nome do Paciente:**** Paula Mualoia ****Idade:****...

PRESCRIÇÃO MÉDICA

• Para que uma receita médica seja completa, profissional, ****realista e baseada em evidências****, é ***fundamental*** ter um diagnóstico clínico claro. Prescrever medicamentos sem um diagnóstico específico seria irresponsável e antiético.

• **### **1. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS****

• 1. ****Ibuprofeno**** (ex: Alivium, Buscofem)

• *** **Princípio Ativo:**** Ibuprofeno

• *** **Dosagem:**** 400 mg

• *** **Forma:**** Comprimidos

• *** **Via de Administração:**** Oral

• *** **Frequência:**** Tomar 1 (um) comprimido a cada 8 (oito) horas, após as refeições.

- * **Duração:** Pelo período de 5 (cinco) dias.
- * **Quantidade Total:** 15 (quinze) comprimidos.
- 2. **Cloridrato de Ciclobenzaprina** (ex: Miosan, Mirtax)
- * **Princípio Ativo:** Cloridrato de Ciclobenzaprina
- * **Dosagem:** 5 mg
- * **Forma:** Comprimidos
- * **Via de Administração:** Oral
- * **Frequência:** Tomar 1 (um) comprimido a cada 12 (doze) horas, preferencialmente antes de dormir, devido ao potencial de sonolência.
- * **Duração:** Pelo período de 5 (cinco) dias.
- * **Quantidade Total:** 10 (dez) comprimidos.
- ---
- * Piora progressiva da dor, mesmo com o uso dos medicamentos.
- * Surgimento de formigamento, dormência ou perda de força nos membros inferiores.
- * Febre, calafrios ou mal-estar geral.
- * Dificuldade para urinar ou defecar.
- * **Retorno:** Agendar retorno em 7 (sete) dias para reavaliação clínica, ou antes, se os sintomas persistirem ou piorarem.
- ---
- * **Interações Medicamentosas:**
- * **Ibuprofeno:** Pode interagir com anticoagulantes (aumentando risco de sangramento), outros anti-inflamatórios, diuréticos e medicamentos para pressão arterial.
- * **Ciclobenzaprina:** Pode potencializar o efeito de outros depressores do sistema nervoso central (álcool, sedativos).
- * **Efeitos Colaterais Comuns:**
- * **Ibuprofeno:** Dor de estômago, náuseas, diarreia, tontura.
- * **Ciclobenzaprina:** Sonolência, tontura, boca seca.
- * **Instruções de Armazenamento:** Manter os medicamentos em suas embalagens originais, em local fresco e seco, protegidos da luz e fora do alcance de crianças.
- ---
- Atenciosamente,

- _____

- ****Dr. Fernando****

- Clínico Geral

- CRM-SP 000000

- ****Contato:**** [Telefone do Consultório] | [Endereço do Consultório]

RECOMENDAÇÕES

- Dada a impossibilidade de gerar uma receita com base em um diagnóstico ausente, vou demonstrar como seria uma receita completa e profissional, *assumindo um cenário hipotético comum* que poderia surgir de uma "análise de imagem" e que requer tratamento medicamentoso e orientações. Para fins de exemplificação, considerarei um diagnóstico hipotético de *****Distensão Muscular Leve na Região Lombar***** após avaliação de imagem, uma condição comum que pode ser elucidada por exames de imagem e tratada de forma conservadora.

- ---

- **# RECEITA MÉDICA**

- ****Data:**** 09/02/2026

- ****Dr. Fernando****

- Clínico Geral

- CRM-SP 000000

- ---

- ****Paciente:**** Paula Mualoia

- ****Idade:**** 52 anos

- ****Gênero:**** Feminino

- ****Diagnóstico (Hipótese para fins de demonstração):**** Distensão Muscular Leve na Região Lombar (M79.1 - Mialgia)

- ---

- **### **2. RECOMENDAÇÕES MÉDICAS****

- * ****Repouso:**** Evitar esforços físicos intensos, levantamento de peso e movimentos que agravem a dor na região lombar pelos próximos 3 a 5 dias.

- * ****Aplicação de Calor:**** Aplicar compressas mornas ou bolsa de água quente na região dolorida por 15-20 minutos, 2 a 3 vezes ao dia, para auxiliar no relaxamento muscular e alívio da dor.

- * **Hidratação:** Manter boa ingestão hídrica (pelo menos 2 litros de água por dia), salvo contraindicação específica.
- * **Atividades:** Realizar caminhadas leves, curtas e sem impacto apenas se a dor permitir, evitando longos períodos sentada ou em pé.
- * **Postura:** Atentar para a postura correta ao sentar, levantar e dormir. Utilizar travesseiro de suporte lombar, se confortável.
- * **Dieta:** Manter dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e fibras. Não há restrições dietéticas específicas relacionadas a este diagnóstico, mas evitar alimentos inflamatórios pode ser benéfico.
- * **Sinais de Alerta para Retornar ao Médico:**
- ### **3. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**
- * **Contraindicações e Precauções (Ibuprofeno):** Não utilizar em caso de histórico de úlceras gástricas, sangramentos gastrointestinais, asma, problemas renais ou cardíacos graves. Usar com cautela em pacientes idosos e com hipertensão arterial.
- * **Contraindicações e Precauções (Ciclobenzaprina):** Não utilizar em caso de histórico de glaucoma, retenção urinária ou uso recente de inibidores da MAO. Pode causar sonolência, tontura e boca seca. Evitar dirigir ou operar máquinas perigosas enquanto estiver sob efeito da medicação.

fernando
CRM: CRM-SP 000000
Clínico Geral