

RECEITA MÉDICA

Médico: fernando

CRM: sfgH

Paciente: gabriel suku

PRESCRIÇÃO:

Artemeter + Lumefantrina (ACT)

* Apresentação: Comprimidos 20/120mg

* Posologia: 4 comprimidos por dose (adulto)

* Frequência: 2 vezes ao dia

* Duração: 3 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 24 comprimidos

* Terapia Combinada à Base de Artemisinina - primeira linha OMS

Primaquina

* Apresentação: Comprimidos 15mg

* Posologia: 1 comprimido ao dia

* Frequência: 1 vez ao dia

* Duração: 14 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 14 comprimidos

* APÓS teste G6PD - para eliminar formas hepáticas

Paracetamol

* Apresentação: Comprimidos 500mg

* Posologia: 1-2 comprimidos

* Frequência: 6/6 horas se febre

* Duração: Durante febre

* Via: Oral

* Quantidade: 20 comprimidos

* Para controle da febre e dor

Sulfato Ferroso

* Apresentação: Comprimidos 300mg

* Posologia: 1 comprimido

* Frequência: 2 vezes ao dia

* Duração: 90 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 180 comprimidos

* Primeira linha para anemia ferropriva

Ácido Fólico

* Apresentação: Comprimidos 5mg

* Posologia: 1 comprimido

* Frequência: 1 vez ao dia

* Duração: 90 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 90 comprimidos

* Associar ao ferro

Vitamina B12

* Apresentação: Comprimidos 1000mcg

* Posologia: 1 comprimido

* Frequência: 1 vez ao dia

* Duração: 90 dias

* Via: Oral

* Quantidade: 90 comprimidos

* Se anemia megaloblástica ou deficiência associada

RECOMENDAÇÕES:

- Seguir rigorosamente a posologia dos medicamentos prescritos
- Manter-se bem hidratado, ingerindo bastante líquidos
- Repousar adequadamente para auxiliar na recuperação
- Evitar automedicação e bebidas alcoólicas durante o tratamento
- ■■ CORAÇÃO LENTO: Evitar medicamentos que diminuem frequência cardíaca
- ■■ TEMPERATURA BAIXA: Manter-se aquecido, evitar exposição ao frio
- ■■ SATURAÇÃO BAIXA: Monitorar oxigenação, procurar emergência se piorar
- ■■ AÇÚCAR BAIXO: Fazer refeições frequentes, ter fonte de carboidrato disponível
- COMPLETAR O TRATAMENTO mesmo após melhora dos sintomas
- Realizar teste G6PD antes de iniciar Primaquina
- Usar mosquiteiro impregnado com inseticida

•

■■ SINAIS DE ALERTA - PROCURAR URGÊNCIA SE:

- Febre persistente ou alta (>24h sem melhora)
- Falta de ar ou dificuldade para respirar
- Confusão mental, sonolência excessiva ou desmaios
- Sangramentos incomuns (gengivas, nariz, urina escura)
- Vômitos persistentes

•

Retorno: Agendar em 7-10 dias ou antes se necessário

Assinatura do Médico

fernando

CRM: sfgh

Validade: 30 dias