

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: CRM-SP 000000

Especialidade: Clínico Geral

Data: 09/02/2026 11:40

PACIENTE

Nome: Paula Mualoia

Idade: 52 anos

Gênero: feminino

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico gerado por IA: Prezado(a) médico(a) responsável, Segue a análise detalhada da imagem fornecida, considerando o contexto clínico. --- ****Relatório de Análise Médica**** ****Nome do Paciente:**** Paula Mualoia ****Idade:****...

PRESCRIÇÃO MÉDICA

• ****PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS:****

• 1. ****Paracetamol**** (Nome Comercial Sugerido: Tylenol®)

• * ****Apresentação:**** Comprimidos de 750mg

• * ****Posologia:**** Tomar 1 (um) comprimido por via oral a cada 8 (oito) horas, se houver febre ou dor.

• * ****Duração do Tratamento:**** Utilizar por até 5 (cinco) dias ou conforme a persistência dos sintomas.

• * ****Quantidade a Dispensar:**** 15 (quinze) comprimidos.

• 2. ****Xarope expectorante/mucolítico**** (Nome Comercial Sugerido: Benflux® ou similar)

• * ****Princípio Ativo (Exemplo):**** Carbocisteína 50mg/mL

• * ****Posologia:**** Tomar 15mL (equivalente a 1 colher de sopa) por via oral a cada 8 (oito) horas.

- * **Duração do Tratamento:** Utilizar por até 5 (cinco) dias.
- * **Quantidade a Dispensar:** 1 (um) frasco de 120mL.
- ---
- * **Interações Medicamentosas:** Informar o médico e o farmacêutico sobre todos os outros medicamentos em uso, incluindo fitoterápicos e suplementos.
- * **Armazenamento:** Manter os medicamentos em suas embalagens originais, em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegidos da luz e umidade. Manter fora do alcance de crianças.
- ---
- **Dr. Fernando**
- Clínico Geral
- CRM-SP 000000
- **Contato do Consultório:** [Telefone do Consultório]
- **Endereço do Consultório:** [Endereço Completo do Consultório]

RECOMENDAÇÕES

- Agradeço a sua solicitação. No entanto, é crucial observar que o diagnóstico fornecido foi ***incompleto***, terminando em "Idade:...". Para elaborar uma receita médica completa, profissional, ****realista e baseada em evidências****, é indispensável ter um diagnóstico médico claro e específico. Prescrever medicamentos ou dar recomendações detalhadas sem um diagnóstico completo seria irresponsável e antiético.
- Dito isso, para demonstrar a ****estrutura e o formato profissional**** que você solicitou, vou criar uma receita médica utilizando um ****diagnóstico hipotético comum**** para uma paciente da idade e gênero mencionados (por exemplo, uma infecção do trato respiratório superior - ITRS). Por favor, entenda que os medicamentos e as recomendações abaixo são ****ilustrativos**** e ****não devem ser interpretados como um conselho médico real**** sem a avaliação completa por um profissional de saúde e um diagnóstico preciso.
- ---
- **### RECEITA MÉDICA**
- **Data:** 09/02/2026
- **MÉDICO RESPONSÁVEL:**
- Dr. Fernando
- Clínico Geral

- CRM-SP 000000

- ****PACIENTE:****

- Nome: Paula Mualoia

- Idade: 52 anos

- Gênero: Feminino

- ---

- ****DIAGNÓSTICO (HIPOTÉTICO PARA FINS DEMONSTRATIVOS):**** Infecção do Trato Respiratório Superior (ITRS)

- ---

- ****RECOMENDAÇÕES MÉDICAS:****

- * ****Repouso:**** Recomenda-se repouso relativo, evitando esforços físicos intensos, especialmente durante o período de sintomas mais agudos.

- * ****Hidratação:**** Ingerir bastante líquidos (água, chás, sucos naturais) para manter a hidratação e ajudar na fluidificação das secreções.

- * ****Alimentação:**** Manter uma dieta leve, nutritiva e balanceada.

- * ****Higiene:**** Realizar higiene nasal com soro fisiológico e lavar as mãos frequentemente para evitar a disseminação da infecção.

- * ****Evitar contato:**** Evitar locais aglomerados e o contato próximo com pessoas, especialmente idosos e crianças, para prevenir a transmissão.

- * ****Sinais de Alerta:**** Retornar ao atendimento médico imediatamente se apresentar:

- * Piora da falta de ar ou dificuldade para respirar.

- * Febre alta (>39°C) persistente por mais de 24 horas, apesar do uso de Paracetamol.

- * Dor no peito ou tosse com catarro purulento/sanguinolento.

- * Prostração importante ou confusão mental.

- * ****Retorno:**** Agendar retorno se os sintomas não apresentarem melhora significativa em 7 (sete) dias, ou se houver piora antes desse período.

- ---

- ****OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:****

- * ****Paracetamol:****

- * Não exceder a dose máxima diária de 4000mg (4g) em adultos, para evitar risco de lesão hepática.

- * Evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante o tratamento.

- * Efeitos colaterais comuns são raros, mas podem incluir reações cutâneas.
- * **Xarope (Carbocisteína):**
- * Geralmente bem tolerado. Pode causar distúrbios gastrointestinais leves em alguns casos.
- * Contraindicado em casos de úlcera gástrica ou duodenal ativa.

fernando

CRM: CRM-SP 000000

Clínico Geral