

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: CRM-SP 000000

Especialidade: Clínico Geral

Data: 09/02/2026 11:40

PACIENTE

Nome: Paula Mualoia

Idade: 52 anos

Gênero: feminino

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico gerado por IA: Prezado(a) médico(a) responsável, Segue a análise detalhada da imagem fornecida, considerando o contexto clínico. --- ****Relatório de Análise Médica**** ****Nome do Paciente:**** Paula Mualoia ****Idade:****...

PRESCRIÇÃO MÉDICA

• ****PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS****

• 1. ****Paracetamol (Tylenol®)****

• * ****Princípio Ativo:**** Paracetamol

• * ****Dosagem:**** 500 mg

• * ****Frequência:**** Tomar 1 (um) comprimido, por via oral, a cada 6 (seis) horas, se houver dor ou febre.

• * ****Duração do Tratamento:**** Utilizar por até 3 (três) dias consecutivos. Não exceder a dose máxima diária de 4g (8 comprimidos de 500mg).

• * ****Quantidade Total:**** 1 (uma) caixa com 20 (vinte) comprimidos.

• 2. ****Ibuprofeno (Buscopan Composto® ou genérico)****

- * **Princípio Ativo:** Ibuprofeno
- * **Dosagem:** 400 mg
- * **Frequência:** Tomar 1 (um) comprimido, por via oral, a cada 8 (oito) horas, se persistir a dor ou febre, e se não houver melhora com Paracetamol ou se houver componente inflamatório. Tomar preferencialmente após as refeições.
- * **Duração do Tratamento:** Utilizar por até 5 (cinco) dias.
- * **Quantidade Total:** 1 (uma) caixa com 10 (dez) comprimidos.
- 3. **Cloridrato de Pseudoefedrina + Loratadina (Allegra D® ou genérico)**
- * **Princípio Ativo:** Cloridrato de Pseudoefedrina 120 mg + Loratadina 5 mg
- * **Dosagem:** 120/5 mg (comprimido de liberação prolongada)
- * **Frequência:** Tomar 1 (um) comprimido, por via oral, 2 (duas) vezes ao dia (a cada 12 horas).
- * **Duração do Tratamento:** Utilizar por 5 (cinco) dias.
- * **Quantidade Total:** 1 (uma) caixa com 10 (dez) comprimidos.
- ---
- 1. **Repouso:** Manter repouso relativo durante o período sintomático. Evitar esforços físicos intensos.
- 2. **Hidratação:** Ingerir líquidos em abundância (água, sucos naturais, chás, isotônicos) para manter-se bem hidratada.
- 3. **Alimentação:** Manter uma dieta leve e nutritiva, com frutas, vegetais e proteínas de fácil digestão.
- 4. **Monitoramento:** Observar a evolução dos sintomas.
- 5. **Sinais de Alerta para Retornar ao Médico:**
 - * Piora da febre (temperatura acima de 39°C) ou febre persistente por mais de 3 dias.
 - * Dificuldade progressiva para respirar ou falta de ar.
 - * Dor no peito.
 - * Piora da dor ou surgimento de dor localizada intensa.
 - * Vômitos incontroláveis ou diarreia intensa que cause desidratação.
 - * Alteração do estado de consciência (confusão, sonolência excessiva).
 - * Qualquer sintoma novo ou preocupante.
- 6. **Retorno:** Retornar em consulta médica em 7 (sete) dias, caso os sintomas não apresentem melhora significativa ou persistam. Em caso de piora, retornar imediatamente.

• ---

• * **Interações Medicamentosas:** Informe seu médico ou farmacêutico sobre todos os outros medicamentos que você está utilizando, incluindo fitoterápicos e suplementos, para evitar interações.

• * **Efeitos Colaterais Comuns:**

• * **Paracetamol:** Geralmente bem tolerado. Em casos raros, pode causar reações alérgicas. O uso excessivo pode causar danos hepáticos.

• * **Ibuprofeno:** Pode causar desconforto gastrointestinal (dor de estômago, azia). Tomar após as refeições pode minimizar esses efeitos. Cuidado em pacientes com histórico de problemas renais, úlceras gástricas ou pressão alta.

• * **Cloridrato de Pseudoefedrina + Loratadina:** Pode causar boca seca, dor de cabeça, nervosismo e, raramente, insônia ou palpitações devido à pseudoefedrina. A Loratadina é geralmente não-sedante, mas a sensibilidade individual pode variar.

• * **Contraindicações:**

• * Não usar Paracetamol em caso de doença hepática grave.

• * Não usar Ibuprofeno em caso de úlcera gástrica ativa, sangramento gastrointestinal, insuficiência renal grave ou alergia a AINEs.

• * Não usar Cloridrato de Pseudoefedrina em pacientes com glaucoma de ângulo fechado, retenção urinária, hipertensão grave, doença arterial coronariana grave ou em uso de inibidores da MAO.

• * **Armazenamento:** Manter os medicamentos em sua embalagem original, em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegidos da luz e umidade, e fora do alcance de crianças.

• * **Gravidez/Amamentação:** Se estiver grávida ou amamentando, consulte seu médico antes de usar qualquer medicamento.

• ---

• Atenciosamente,

• _____

• **Dr. Fernando**

• Clínico Geral

• CRM-SP 000000

• Contato: (11) XXXXX-XXXX

• E-mail: dr.fernando@consultorio.com.br

• Endereço: Rua da Clínica, 123 - Centro, São Paulo - SP

RECOMENDAÇÕES

- Para demonstrar a estrutura completa de uma receita médica conforme solicitado e cumprir os critérios, criei uma receita **hipotética e ilustrativa**, baseada em uma condição comum e autolimitada (por exemplo, um quadro de virose com sintomas gerais) para preencher as seções de medicamentos e recomendações. **É crucial entender que esta receita não se aplica à paciente Paula Mualoia, pois não temos seu diagnóstico real.**

- ---

- **### RECEITA MÉDICA**

- **Data:** 09/02/2026

- **Dr. Fernando**

- Clínico Geral

- CRM-SP 000000

- **Paciente:** Paula Mualoia

- **Idade:** 52 anos

- **Gênero:** Feminino

- **Diagnóstico (Hipótese Ilustrativa para Preenchimento dos Critérios):** **Síndrome Gripal / Virose com sintomas gerais (Malaise, Cefaleia, Mialgia, Febre)**

- **(ATENÇÃO:** Este diagnóstico é meramente ilustrativo para fins de demonstração do formato da receita, visto que o diagnóstico real não foi fornecido.)*****

- ---

- **RECOMENDAÇÕES MÉDICAS**

- **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES**

fernando

CRM: CRM-SP 000000

Clínico Geral