

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: CRM-SP 000000

Especialidade: Clínico Geral

Data: 09/02/2026 11:40

PACIENTE

Nome: Paula Mualoia

Idade: 52 anos

Gênero: feminino

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico gerado por IA: Prezado(a) médico(a) responsável, Segue a análise detalhada da imagem fornecida, considerando o contexto clínico. --- ****Relatório de Análise Médica**** ****Nome do Paciente:**** Paula Mualoia ****Idade:****...

PRESCRIÇÃO MÉDICA

• ****PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS:****

• 1. ****Omeprazol 20 mg**** (ex: Losec, Gastrium)

• * ****Apresentação:**** Cápsulas

• * ****Posologia:**** 1 (uma) cápsula via oral, uma vez ao dia (preferencialmente 30 minutos antes do café da manhã).

• * ****Duração:**** 8 (oito) semanas.

• * ****Quantidade a dispensar:**** 56 (cinquenta e seis) cápsulas.

• 2. ****Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio**** (ex: Maalox Plus, Mylanta Plus)

• * ****Apresentação:**** Suspensão oral

- * **Posologia:** 10 mL (uma colher de sopa) via oral, até 3 (três) vezes ao dia, 30 minutos após as refeições ou ao deitar, se necessário, para alívio dos sintomas.
- * **Duração:** Conforme necessidade.
- * **Quantidade a dispensar:** 1 (um) frasco de 240 mL.
- ---
- * **Interações Medicamentosas:** Pode interagir com medicamentos como Clopidogrel (diminuindo sua eficácia), Metotrexato e alguns antifúngicos. Informe seu médico sobre todos os medicamentos que utiliza, incluindo os de venda livre.
- * **Armazenamento:** Manter em temperatura ambiente (15-30°C), protegido da luz e umidade, fora do alcance de crianças.
- * **Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio:**
- * **Efeitos Colaterais Comuns:** Diarreia (associado ao magnésio) ou constipação (associado ao alumínio).
- * **Interações Medicamentosas:** Pode diminuir a absorção de outros medicamentos (antibióticos como tetraciclina e fluoroquinolonas, digoxina, sais de ferro). Recomenda-se administrá-lo com um intervalo de pelo menos 2 (duas) horas de outros fármacos.
- * **Armazenamento:** Manter em temperatura ambiente, bem fechado. Agitar bem antes de usar.
- ---
- Atenciosamente,
- _____
- **Dr. Fernando**
- Clínico Geral
- CRM-SP 000000
- Tel: (XX) XXXX-XXXX
- E-mail: contato.dr.fernando@email.com
- [Carimbo do Consultório Médico]

RECOMENDAÇÕES

- **RECOMENDAÇÕES MÉDICAS:**
- * **Cuidados Específicos:**
- * Evitar deitar-se logo após as refeições; aguardar um mínimo de 2 a 3 horas.

- * Elevar a cabeceira da cama em aproximadamente 15-20 cm (com blocos ou cunha sob o colchão) para auxiliar na redução do refluxo noturno.
- * Evitar roupas apertadas na região abdominal.
- * **Orientações Dietéticas:**
- * Evitar alimentos gordurosos, frituras, chocolate, café, bebidas alcoólicas, bebidas gaseificadas, alimentos ácidos (frutas cítricas, tomate) e molhos picantes.
- * Realizar refeições menores e mais frequentes.
- * Reduzir o consumo de produtos à base de menta.
- * **Sinais de Alerta para Retornar ao Médico:**
- * Dificuldade ou dor persistente ao engolir (disfagia ou odinofagia).
- * Perda de peso inexplicável.
- * Vômitos persistentes ou presença de sangue no vômito.
- * Fezes escuras ou com presença de sangue.
- * Anemia.
- * Qualquer sintoma novo ou piora dos sintomas atuais.
- * **Data para Retorno:**
- * Reavaliar em 8 (oito) semanas após o início do tratamento para acompanhamento e ajuste da conduta, se necessário.
- ---
- **OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**
- * **Omeprazol:**
- * **Efeitos Colaterais Comuns:** Cefaleia, náuseas, diarreia, dor abdominal.

fernando

CRM: CRM-SP 000000

Clínico Geral