Panel

Romain CAPLIEZ

Théorie

Définition des données de panel

Des données dites de "panel" sont des données qui suivent un échantillon d'individus à travers le temps. Ces données permettent d'avoir de multiples observations pour chaque individu de l'échantillon (**Hsiao 2003)**).

On utilisera l'indexation i pour indiquer les individus (pays, régions, firmes…) et l'indexation t pour indiquer les unités temporelles (années, mois…).

On notera donc :

$$y_{it} \ \ \forall \ \ i = 1, \cdots, N \ ; \ \ t = 1, \cdots, T$$

Avantages des données de panel

Meilleure précision des estimateurs

Les données de panel permettent généralement d'obtenir un plus grand nombre de données que les données en temporelles ou en coupe transversales puisque les deux dimensions existent en panel. Le nombre d'observations disponibles pour des données de panel est de $(N \times T)$. Un plus grand nombre d'observations entraîne un plus grand nombre de degrés de libertés et une réduction de la colinéarité entre les différentes variables explicatives. Les données de panel sont ainsi censées permettre d'augmenter l'efficacité de l'analyse économétrique.

Cependant, plus d'observations n'implique pas nécessairement une augmentation de l'information. Les données de panel entraine en effet l'apparition de nouveaux biais, comme le biais d'hétérogénéité, qu'il faut prendre en compte.

Prise en compte de l'hétérogénéité

Les données de panel permettent de contrôler (dans une certaine mesure) pour des variables qui ne sont pas observables ou mesurables telles que les différences culturelles, pratiques commerciales, politiques nationales, crises globales etc… Ces données permettent de prendre en compte **l'hétérogénéité individuelle et/ou temporelle**.

Enfin, les données de panel permettent également d'inclure des variables à différents niveaux d'analyse (étudiants, écoles, état etc…) permettent ainsi des analyses multi-niveaux.

Considérons le modèle de régression suivant :

$$y_{it} = \alpha + \beta^{'} x_{it} + \rho^{'} z_{it} + \epsilon_{it}$$

Où : - $i = 1, \cdots, N$ - $t = 1, \cdots, T$ - x_{it} et z_{it} sont des variables exogènes - α, β et ρ sont des paramètres - ε_{it} est le vecteur d'erreurs du modèle. Les erreurs sont $i.i.d$ à travers les dimensions individuelles et temporelles avec $V(\varepsilon_{it}) = \sigma_{\varepsilon}^2$.

Supposons, que la variable z_{it} n'est pas observable et est corrélée d'une manière quelconque avec la variable x_{it} :

$$cov(x_{it}\ ,\ z_{it}) \neq 0$$

Dans un tel cas, le modèle estimé devient :

$$\begin{aligned} y_{it} &= \alpha + \beta^{'} x_{it} + u_{it} \\ u_{it} &= \rho^{'} z_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Puisque la variable x_{it} est corrélée avec la variable z_{it} ($cov(x_{it}\ ,\ z_{it}) \neq 0$) contenue désormais dans le terme d'erreur u_{it}, ce terme d'erreur devient corrélé avec la variable x_{it} :

$$cov(x_{it}\ ,\ u_{it}) \neq 0$$

Le coefficient β est donc biaisé puisque l'hypothèse d'exogénéité ne tient plus.

Si l'on suppose maintenant que $z_{it} = z_i$, c'est à dire que les valeurs de z sont constantes dans le temps pour chaque individu, mais diffèrent entre chaque individu, alors le modèle devient :

$$\begin{aligned} y_{it} &= \alpha + \beta^{'} x_{it} + u_{it} \\ u_{it} &= \rho^{'} z_i + \varepsilon_{it} \\ cov(x_{it}\ ,\ u_{it}) &\neq 0 \end{aligned}$$

Il est possible de purger l'effet inobservé de la variable z_i en prenant la première différence de chaque individu à travers le temps :

$$y_{it} - y_{i,t-1} = \beta^{'}\left(x_{i,t} - x_{i,t-1}\right) + u_{i,t} - u_{i,t-1}$$
$$u_{i,t} - u_{i,t-1} = \rho^{'} z_i - \rho^{'} z_i + \varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{i,t-1} = \varepsilon_{i,t} - \varepsilon_{i,t-1}$$

Puisque z_i est invariant dans le temps, $z_{i,t} = z_{i,t-1} = z_i$. Prendre la première différence temporelle pour chaque individu permet de purger l'effet de z_i pour chaque individu et ainsi prendre en compte une variable inobservable qui aurait biaiser notre modèle.

Il est possible de mener l'exact même raisonnement dans le cas où z serait le même entre tous les individus pour chaque période de temps, mais varierait à chaque période temporelle : $z_{i,t} = z_t$. La variable z_t est appelée **facteur commun**. Le modèle devient :

$$y_{it} = \alpha + \beta^{'} x_{it} + u_{it}$$
$$u_{it} = \rho^{'} z_t + \varepsilon_{it}$$
$$cov(x_{it}\ ,\ u_{it}) \neq 0$$

Pour prendre en compte cet effet inobservé, il suffit de prendre la différence entre la valeur observée et la moyenne entre les individus pour chaque période de temps :

$$y_{i,t} - \bar{y}_t = \beta^{'}\left(x_{i,t} - \bar{x}_t\right) + u_{i,t} - \bar{u}_t$$
$$u_{i,t} - \bar{u}_t = \rho^{'} z_t - \rho^{'} \bar{z}_t + \varepsilon_{i,t} + \bar{\varepsilon}_t = \varepsilon_{i,t} + \bar{\varepsilon}_t$$

Avec : $\bar{y}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_{i,t}$, $\bar{x}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_{i,t}$, $\bar{u}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} u_{i,t}$ et $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \varepsilon_{i,t}$.

Puisque z_t est constant entre les individu pour une période t donnée, on a $\bar{z}_t = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} z_t = \frac{1}{N} \times N \times z_t = z_t$. En prenant la différence à la moyenne entre les individus, on purge donc du facteur commun inobservé z_t.

Il est évidemment possible de combiner les deux approches pour purger des facteurs invariants dans le temps et des facteurs communs entre les individus.

Stationnarité

Tests de racines unitaires

Dans le cas de panel où la dimension T est large (grand nombre de périodes temporelles), la stationnarité redevient un enjeu tout comme pour les séries temporelles. Les données de panel vont cependant présenter un certain nombre d'avantages comparé aux séries temporelles.

Le premier avantage est l'ajout de la dimension individuelle à la dimension temporelle qui permet d'augmenter la **puissance** des tests de racines unitaires sur de petits échantillon (d'avantages de degrés de liberté par rapport aux séries temporelles). Le problème de pettis échantillons en séries temporelles peut être combattu en augmentant la période d'études, mais

cela suppose de prendre le risque d'avoir affaire à des changements de régimes ou des breaks structurels.

Les données de panel permettent d'augmenter l'information en incluant l'information de différents individus sans pour autant forcément augmenter la dimension temporelle. On peut donc travailler plus facilement sur de plus petits échantillons temporels.

Un autre avantage est que dans le cadre de données de panel, les statistiques des tests de racines unitaires vont admettre pour loi asymptotique des lois normales (bien que restant conditionné au modèle utilisé) évitant l'utilisation de tables de lois particulières.

Les données de panel permettent de prendre également en compte l'hétérogénéité dans la présence des racines unitaires.

Régressions fallacieuses

En séries temporelles, lorsque l'on régresse une variable non-stationaire sur un ensemble de variable non-stationaire non cointégrées, cela conduit à des régressions fallacieuses (coefficients qui paraissent hautement significatifs à tord) puisque l'estimateur MCO converge en probabilité vers une variable aléatoire et non plus une constante (et est biaisé). De plus, la distribution statistique de Student associée au tests de nullité du paramètre du modèle de régression est divergente avec la dimmension T : elle ne converge pas lorsque T augmente. Cela conduit à rejeter à tord la nullité du paramètre et donc à trouver un effet quand il ne devrait pas y en avoir.

En panel, le problème de régression fallacieuse est moins important qu'en séries temporelles. En panel, les estimateurs usuels convergent en probabilité vers la vraie valeur du paramètre même si l'on régresse des variables non-stationaires et non-cointégrées entre elles.

Le problème reste cependant toujours d'actualité pour l'inférence. En présence de régression fallacieuse en panel, les statistiques de test usuelles ont des distributions divergentes tout comme en séries temporelles.

Types d'hétérogénéité pris en compte

Aucune hétérogénéité

Les données de panel permettent d'inclure différents niveaux d'hétérogénéité au sein du modèle. Le modèle dit **pooled** va être un modèle dans lequel il n'existe pas d'hétérogénéité entre les agents et entre les périodes temporelles. La relation est identique pour tous les agents et toutes les périodes de temps et il n'existe ni facteurs commun ni facteurs individuels.

$$y_{i,t} = \alpha + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Il existe une relation linéaire entre y et x caractérisée par β. Lorsque $x_{i_t} = 0$, $y_{it} = \alpha$.



Hétérogénéité individuelle et/ou temporelle

Comme nous avons pu le voir, les modèles de panel permettent de prendre en compte les caractéristiques propres aux individus qui ne varient pas dans le temps, ainsi que les facteurs communs qui affectent tous les individus de la même manière à une période donnée.

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Dans ce modèle, les effets invariants dans le temps mais propres à chaque individu sont représentés par le terme α_i. Il s'agit tout simplement d'une différence systématique entre chaque individu. Cependant la relation entre la variable x et la variable y reste la même pour tous les individus : β. Chaque individu est caractérisé par une ordonnée à l'origine différente, maios la pente de la droite reste la même.



Le principe est identique pour les facteurs communs qui varient dans le temps, mais sont identiques pour chaque individus.

$$y_{i,t} = \lambda_t + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Il faut voir λ_t comme une ordonnée à l'origine spécifique pour chaque unité temporelle. Encore une fois, la force de la relation reste identique à chaque période de temps : β.

On peut évidemment inclure les facteurs invariants dans le temps et les facteurs commun au sein d'un même modèle :

$$y_{i,t} = \alpha_i + \lambda_t + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Les interprétations de α_i et λ_t restent inchangées.

Hétérogénéité totale

Finalement, il est possible d'avoir une hétérogénéité dans les constantes (individuelles et/ou temporelles) mais également il est possible que la relation entre x et y change entre les individus. La pente de la droite va dès lors dépendre de l'individu en question.

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta_i x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Dans ce modèle, il y a des effets invariants dans le temps et spécifiques à chaque individu (α_i), mais la pente (la force) de la relation liant x à y diffère également entre les individus. Il n'y a plus une relation unique. Il y a une relation par individu.



La représentation graphique ci-dessus nous montre que globalement la relation entre x est y est positive pour tous les individus à l'exception de l'individu 4 pour lequel la relation est négative. Il pourrait s'agir d'un individu qui n'appartient pas réellement au groupe étudié, ou alors il s'agit d'un outlier, d'un individu exceptionnel.

Biais d'hétérogénéité

Si les modèles de panel sont capables de prendre en compte différents niveaux d'hétérogénéité, cela signifie que si cette hétérogénéité n'est pas correctement prise en compte, elle est susceptible de biaiser nos estimations et de les rendre sans intérêt.

Suppoons que le modèle de la population comporte un paramètre de pente identique pour tous les individus, mais que des effects invariants dans le temps impactent chaque individu de manière différente :

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Supposons maintenant, que l'on utilise not NT observations pour estimer le modèle pooled suivant :

$$y_{i,t} = \alpha + \beta x_{i,t} + u_{i,t}$$

Si les effets individuels α_i sont corrélés avec $x_{i,t}$, alors les omettre dans l'estimation va biaiser β.



Le graphique ci-dessus montre que la relation entre les variables x et y est négative si l'on distingue correctement l'effet individuel de chaque individu. Ils sont gouvernés par la même relation, mais des effets individuels invariants dans le temps entraînent des différences systématiques entre les différents individus. Si ces effets individuels ne sont pas pris en compte (en faisant un modèle pooled par exemple), la relation estimée sera une relation fortement positive alors même que la vraie relation dans la population est négative (il s'agit ici d'un cas extrême).

Il faut donc faire attention à correctement modéliser l'hétérogénéité dans un modèle avec des données de panel.

Estimateur Pooled OLS

L'estimateur Pooled OLs (POLS) est un estimateur qui suppose qu'il n'y a pas d'hétérogénéité entre les différents individus et les différentes périodes du modèle. Le modèle à estimer est donc le modèle suivant :

$$y_{i,t} = \alpha + \beta^{'} x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

L'estimation d'un modèle pooled revient à effectuer une régression par les MCO classiques, simplement augmenté avec la dimension temporelle.

Les estimateurs sont donnés par la formule suivante :

$$\begin{cases} \hat{\beta}_{\text{OLS}} & = \left[\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left(x_{i,t}-\bar{x}\right)\left(x_{i,t}-\bar{x}\right)'\right]^{-1}\left[\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left(x_{i,t}-\bar{x}\right)\left(y_{i,t}-\bar{y}\right)'\right] \\ \hat{\alpha}_{\text{OLS}} & = \bar{y}-\hat{\beta}_{\text{OLS}}\times\bar{x} \end{cases}$$

Avec :

- $\bar{x} = \frac{1}{NT}\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T} x_{i,t}$
- $\bar{y} = \frac{1}{NT}\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T} y_{i,t}$

L'estimateur POLS est non-biaisé et consistant si $x_{i,t}$ est strictement exogène (non-corrélé de quelconque manière que ce soit avec le terme d'erreur) et si les constantes sont réellement homogènes. En cas d'hétérogénéité des constantes (et dans le cas où elles sont corrélées avec $x_{i,t}$), alors l'estimateur POL est biaisé.

Comme pour une estimation OLS classique, la présence d'hétéroscédasticité (variance nonc-constante des erreurs) ou d'auto-corrélation des erreurs n'affecte pas le biais de l'estimateur. Cela impact l'inférence en rendant la variance de l'estimateur non-minimale. Dans de tels cas des correction (White, Newey-West, etc…) peuvent être appliquées sur la matrice de variance-covariance.

Estimateur LDSV / Effets Fixes

Définition de l'estimateur

Considérons maintenant le cas où le modèle dans la population est caractérisé par des différences individuelles invariantes dans le temps, mais où la relation reste la même entre les individus et les périodes temporelles :

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta' x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Nous supposons également que les effets individuels sont corrélés d'une quelconque manière que ce soit avec la variable explicative $x_{i,t}$:

$$E(\alpha_i | x_{i,1}, \cdots, x_{i,T}) \neq 0$$

Estimateur LSDV

Dans ce cas ne pas modéliser ces différences individuelles entraînera un biais dans l'estimateur. On ne peut donc pas utiliser l'estimateur Pooled, qui omet complètement ces effets individuels, ni l'estimateur à effets aléatoires qui considère ces effets individuels comme étant des variables aléatoires présentes dans le terme d'erreur.

L'idée derrière l'estimateur à effets fixe revient à inclure une variable binaire par individu qui prend la valeur 1 quand il s'agit de l'individu concerné et la valeur 0 sinon. L'estimation est ensuite une estimation OLS classique. Cependant, inclure une dummy par individu peut être fastidieux et peu efficace.

Pour éviter cela, on peut transformer l'écriture du modèle précédent pour ne garder une écriture qui ne dépend que de la dimension individuelle. On obtient ainsi une équation par individu que l'on peut par la suite regrouper.

$$y_i = e\alpha_i + X_i\beta + \varepsilon_i \quad \forall \ i = 1, ..., N$$

Avec :

$$\underset{(T,1)}{y_i} = \begin{pmatrix} \mathbf{y}_{i,1} & \mathbf{y}_{i,2} & \cdots & \mathbf{y}_{i,T} \end{pmatrix}'$$

$$\underset{(T,1)}{\varepsilon_i} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{i,1} & \varepsilon_{i,2} & \cdots & \varepsilon_{i,T} \end{pmatrix}'$$

$$\underset{(T,1)}{e} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}'$$

$$\underset{(T,K)}{X_i} = \begin{pmatrix} x_{1,i,1} & x_{2,i,1} & \cdots & x_{K,i,1} \\ x_{1,i,2} & x_{2,i,2} & \cdots & x_{K,i,2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{1,i,T} & x_{2,i,T} & \cdots & x_{K,i,T} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \underset{(T,K=1)}{X_i} = \begin{pmatrix} x_{1,i,1} \\ x_{1,i,2} \\ \cdots \\ x_{1,i,T} \end{pmatrix}$$

La minimisation de la somme des carrés des résidus de ce modèle donne les estimateurs LSDV suivant :

$$\begin{cases} \hat{\beta}_{\text{LSDV}} = \left[\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right)\left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right)'\right]^{-1}\left[\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right)\left(y_{i,t} - \bar{y}_i\right)'\right] \\ \hat{\alpha}_i = \bar{y}_i - \hat{\beta}'_{\text{LSDV}}\bar{x}_i \end{cases}$$

Avec :

$$\bar{x}_i = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T} x_{i,t} \quad ; \quad \bar{y}_i = \frac{1}{T}\sum_{i=1}^{T} y_{i,t}$$

L'estimateur Least Square Dummy Variable (LSDV) correspond à un OLS classique dans lequel on a inclu une variable dummy pour chaque individu. On obtient donc une ordonnée à l'origine par individu. On peut voir que la différence par rapport à l'estimateur POLS est que l'écart est estimé par rapport à la moyenne (temporelle) de chaque individu et non plus à une moyenne globale.

L'estimateur LSDV permet de récupérer l'information de la valeur de la constante pour chaque individu. Cependant, lorsque le nombre d'individu grandi, estimer l'ensemble des constante peut être computationnellement inefficient, voir inutile selon la question de recherche.

Estimateur à Effets fixes / Within

L'estimateur par Effets fixes va transformer le modèle initial pour supprimer les effets individuels avant d'estimer les coefficients de pente β.

L'idée derrière l'estimateur à effets fixes est d'estimer β après avoir éliminer les effets individuels α_i en soustrayant à chaque valeur $x_{i,t}$ la moyenne (temporelle) de chaque individu $\bar{x}_i$.

Le modèle devient donc:

$$y_{i,t} - \bar{y}_t = (\alpha_i - \alpha_i) + \beta^{'}\left(x_{i,t} - \bar{x}_t\right) + (\varepsilon_{i,t} + \bar{\varepsilon}_t)$$

Et on peut appliquer l'estimateur Pooled OLS sur ces nouvelles données.

Au lieu de modifier les données puis d'estimer le modèle, on peut également modifier l'estimateur pour prendre en compte cette modification à effectuer.

Pour cela, on va considérer une matrice de taille $T \times T$ idempotent notée Q telle que :

$$Q = I_T - \frac{1}{T}ee^{'}$$

Il s'agit d'une matrice de transition (appelée opérateur within) qui permet de mesurer les observations par rapport à leur moyennes individuelles (pour chaque individu on fait la moyenne de toutes ses périodes temporelles). Cette matrice est dite idempotente c'est à dire que $Q \times Q = Q$ et $Q^{'} = Q$.

On va prémultiplier chaque équation individuelle par cette matrice Q, ce qui donne l'équation suivante :

$$Qy_i = Qe\alpha_i + QX_i\beta + Q\varepsilon_i \quad \forall \ i = 1, ..., N$$

On peut montrer que cela revient à mesurer les variables comme des déviations par rapport à leur moyenne individuelle :

$$Qy_i = \left(I_T - \frac{1}{T}ee'\right) y_i$$

$$\Leftrightarrow Qy_i = y_i - \left(\frac{1}{T}ee'y_i\right)$$

$$\Leftrightarrow Qy_i = y_i - e\left(\frac{1}{T}e'y_i\right)$$

$$\Leftrightarrow Qy_i = \begin{pmatrix} y_{i,1} \\ y_{i,2} \\ \dots \\ y_{i,T} \end{pmatrix} - \frac{1}{T}\left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{i,1} \\ y_{i,2} \\ \dots \\ y_{i,T} \end{pmatrix}\right] \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \dots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow Qy_i = y_{i,t} - \left(\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} y_{i,t}\right)$$

$$\Leftrightarrow Qy_i = y_{i,t} - \bar{y}_i$$

$$\Leftrightarrow Qy_i = \begin{pmatrix} y_{i,1} - \bar{y}_i \\ y_{i,2} - \bar{y}_i \\ \dots \\ y_{i,T} - \bar{y}_i \end{pmatrix}$$

Appliquer la matrice Q au vecteur e qui est constant (ou appliquer la matrice Q à une variable invariante dans le temps) revient au vecteur nul puisque :

$$Qe = \left(I_T - \frac{1}{T}ee^{'}\right) e$$

$$\Leftrightarrow Qe = e - \frac{1}{T}ee^{'}e$$

$$\Leftrightarrow Qe = e - \frac{T}{T}e$$

$$\Leftrightarrow Qe = e - e$$

$$\Leftrightarrow Qe = 0$$

Les variables/effets invariants dans le temps sont donc supprimés (puisqu'on leur retire leur moyenne qui est égale à leur valeur).

L'équation devient donc :

$$Qy_i = Qe\alpha_i + QX_i\beta + Q\varepsilon_i$$

$$\Leftrightarrow Qy_i = QX_i\beta + Q\varepsilon_i \quad \forall \ i = 1, ..., N$$

A partir de cette transformation on peut donc définir l'estimateur Whithin/Effet fixe (FE) comme l'estimateur OLS classique avec l'ajout de la matrice Q :

$$\hat{\beta}_{\text{FE}} = \left(X'QX\right)^{-1}\left(X'QY\right)$$

Ou encore :

$$\hat{\beta}_{\text{FE}} = \left[\sum_{i=1}^{N} X_i'QX_i\right]^{-1}\left[\sum_{i=1}^{N} X_i'QY_i\right]$$

La variance de l'estimateur à effet fixe est également similaire à la variance OLS classique :

$$V\left(\hat{\beta}_{\text{FE}}\right) = \sigma_\varepsilon^2\left[\sum_{i=1}^{N} X_i'QX_i\right]^{-1}$$

Il est important de noter que les méthodes LSDV ou FE donnent les mêmes estimations des paramètres de pente β :

$$\hat{\beta}_{\text{LSDV}} = \hat{\beta}_{\text{FE}} = \hat{\beta}_{\text{Within}}$$

L'estimateur $\hat{\beta}_{\text{LSDV}}$ permettra d'obtenir des estimations pour les effets individuels invariants dans le temps α_i qu'il suffira d'interpréter comme une variable binaire classique en référence à un individu de référence. L'estimateur FE (Within) ne donnera que l'estimation des paramètres de pente β.

Estimateur Two Ways Fixed Effect

On peut généraliser le modèle à effets fixes pour inclure également effets temporels spécifiques qui ne varient pas entre les individus. On considère ainsi le modèle suivant :

$$y_{i,t} = \alpha_i + \lambda_t + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

On peut introduire une variable binaire pour chaque individu et une variable binaire pour chaque période temporelle : $(N \times T)$ variables binaires, ou bien on peut comme pour l'estimateur FE, procéder à une transformation des variables telles que :

$$\tilde{y} = (y_{i,t} - \bar{y}_i - \bar{y}_t + \bar{y})$$

$$\tilde{x} = (x_{i,t} - \bar{x}_i - \bar{x}_t + \bar{x})$$

On va retrancher à chaque variable sa moyenne individuelle, sa moyenne temporelle et ajouter la moyenne globale individuelle et temporelle. Il ne reste plus qu'à estimer le modèle à partir de l'estimateur Pooled OLS.

Il est très important de noter que lorsque l'on utiliser un modèle à effets fixes, qu'il soit one way ou two ways, il n'est pas possible d'estimer les coefficients relatifs à des variables invariantes dans la dimension de l'effet fixe. Ces effets invariants se retrouveront dans les coefficients des variables binaires.

Hypothèses et propriétés

Pour que les estimateurs LSDV/FE aient les bonnes propriétés, certaines hypothèses doivent être respectée.

L'hypothèse d'exogénéité est toujours présente. Les variables explicatives ne doivent être corrélées d'aucune manière que ce soit avec le terme d'erreur :

$$E(u_{i,t}|x_{i,t}) = 0$$

Si cette hypothèse est respectée, alors les estimateurs sont sans biais. Egalement, l'hétérogénéité doit être correctement spécifiée. Si le vrai modèle comporte des effets fixes individuels et temporels, omettre l'un des deux dans l'estimation donnera lieu à des coefficients biaisés et inconsistants.

Tout comme un modèle OLS classique, on va placer des hypothèses sur le terme d'erreur. Outre sa supposée normalité, les erreurs du modèle doivent être de moyenne nulle, de variance constante à travers le temps, ne doivent pas être auto-corrélées dans le temps et ne doivent pas être corrélées entre les individus (l'erreur d'un individu spécifique ne doit pas être corrélée avec l'erreur d'un autre individu). ce jeu d'hypothèse est noté de la manière suivante :

$$E(\varepsilon_{i,t}) = 0$$

$$E(\varepsilon_{i,t}\varepsilon_{i,s}) = \begin{cases} \sigma_\varepsilon^2 & t = s \\ 0 & \forall t \neq s \end{cases}$$

$$E(\varepsilon_{i,t}\varepsilon_{j,s}) = 0 \quad \forall j \neq i \quad \forall (t,s)$$

Ainsi, les erreurs : - Ne doivent pas souffrir d'auto-corrélation - Doivent être homoskedastique - Ne Doivent pas souffrir corrélation inter-individuelle ou spatiale

Si ces hypothèses sont respectées alors la variance des estimateurs LSDV et FE est minimale.

Attention, le R^2 n'est pas interprétable/correct lorsqu'il est calculé à partir de l'estimateur FE/Within, mais l'est avec l'estimateur LSDV.

Estimateur Between

Les estimateurs à effets fixes permettent d'exploiter la variabilité des données qu sein de chaque groupe d'individus. Mais on peut être intéressés à ne regarder que la variation entre les différents groupes. C'est l'objectif de l'estimateur **Between**.

Cet estimateur va transformer les variables de telle sorte à retirer toute la variation au sein d'un individu. Cela conduit à n'estimer qu'une simple régression en coupe transversale.

Si l'on reprend le modèle :

$$y_i = e\alpha_i + X_i\beta + \varepsilon_i \quad \forall \ i = 1, ..., N$$

On définit l'opérateur Between comme suit :

$$B = e_T \times \left(e_T^{'} e_T\right) \times e_T^{'}$$

Et on prémultiplie les équation individuelles par l'opérateur Between :

$$By_i = Be\alpha_i + BX_i\beta + B\varepsilon_i \quad \forall \ i = 1, ..., N$$

Cette transformation revient à calculer la moyenne individuelle de chaque individu (pour chaque individu faire la moyenne des différentes périodes de temps).

On obtient :

$$\bar{y}_i = \alpha + \beta^{'}\bar{x}_i + \bar{\varepsilon}_i$$

On peut le voir en prenant y_i comme exemple :

$$
\begin{aligned}
By_i &= \left[e_T \times \left(e_T^{'} e_T\right) \times e_T^{'}\right] y_i \\
\Leftrightarrow By_i &= \left[e_T \times \left(\frac{1}{T}\right) \times e_T^{'}\right] y_i \\
\Leftrightarrow By_i &= \left(\frac{1}{T} e_T e_T^{'}\right) y_i \\
\Leftrightarrow By_i &= e_T \left(\frac{1}{T} e_T^{'} y_i\right) \\
\Leftrightarrow By_i &= e_T \left[\frac{1}{T} \begin{pmatrix} 1 & 1 & ... & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{i,1} \\ y_{i,2} \\ \vdots \\ y_{i,T} \end{pmatrix}\right] \\
\Leftrightarrow By_i &= e_T \left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} y_{i,t}\right) \\
\Leftrightarrow By_i &= e_T \bar{y}_i \\
\Leftrightarrow By_i &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \bar{y}_i \\
\Leftrightarrow By_i &= \begin{pmatrix} \bar{y}_i \\ \bar{y}_i \\ \vdots \\ \bar{y}_i \end{pmatrix} \\
\Leftrightarrow By_i &= \bar{y}_i
\end{aligned}
$$

L'estimateur between est le suivant :

$$
\hat{\beta}_{\text{Between}} = \left[N^{-1} \sum_{i=1}^{N} \left(\bar{x}_i - \bar{x}\right) \left(\bar{x}_i - \bar{x}\right)^{'}\right]^{-1} \left[N^{-1} \sum_{i=1}^{N} \left(\bar{x}_i - \bar{x}\right) \left(\bar{y}_i - \bar{y}\right)^{'}\right]
$$

Cet estimateur utilise seulement les données en coupe transversale. La variation temporelle intra-individuelle disparaît. On perd donc des observations et de la puissance statistique

puisque l'on garde seulement N points d'observation.

Sous les hypothèses classiques, cet estimateur est consistant et non-biaisé.

Estimateur à Effets Aléatoires

Définition et hypothèses des effets aléatoires

Nous supposons maintenant que les effets individuels et temporels ne sont corrélés d'aucune manière que ce soit avec la variable explicative $x_{i,t}$:

$$E(\alpha_i | x_{i,1}, \cdots, x_{i,T}) = 0$$

$$E(\lambda_t | x_{i,1}, \cdots, x_{i,T}) = 0$$

On considère donc que α_i est une variable aléatoire. Dans ce cas, le fait de considérer les effets inobservés comme une spécification aléatoire est un cas particulier d'un modèle à composante d'erreur dans lequel les erreurs sont supposées constituées de 3 composantes : les effets individuels et temporels et un terme d'erreur idiosyncratique $v_{i,t}$ qui comprend tous les effets non pris en compte affectant un individu i à la période t.

$$y_{i,t} = \beta' x_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad \forall i \ \ \forall t$$

$$\varepsilon_{i,t} = \alpha_i + \lambda_t + v_{i,t}$$

On peut dans ce cas décomposer la variance conditionnelle de $y_{i,t}$ comme étant la somme de 3 composantes :

$$V(y_{i,t} | x_{i,t}) = \sigma_y^2 = \sigma_\alpha^2 + \sigma_\lambda^2 + \sigma_v^2$$

On pose les hypothèses suivantes sur le terme d'erreur $\varepsilon_{i,t}$:

$$\alpha_i + \lambda_t + v_{i,t} \sim \text{i.i.d} \quad \forall i \ \ \forall t$$

$$E(\alpha_i) = E(\lambda_t) = E(v_{it}) = 0$$

$$E(\alpha_i \alpha_j) = \begin{cases} \sigma_\alpha^2 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

$$E(\lambda_t \lambda_s) = \begin{cases} \sigma_\lambda^2 & \text{si } t = s \\ 0 & \text{si } t \neq s \end{cases}$$

$$E(v_{it} v_{js}) = \begin{cases} \sigma_v^2 & \text{si } i = j \text{ et } t = s \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$E(\alpha_i \lambda_t) = E(\alpha_i v_{js}) = E(\lambda_t v_{is}) = 0$$

$$E(\alpha_i x_{i,t}^{'}) = E(\alpha_i x_{i,t}^{'}) = E(\lambda_t x_{i,t}^{'}) = 0$$

On suppose donc que les erreurs sont de moyennes nulles (en moyenne on ne fait pas d'erreur systématique de prévision). On suppose également que la variance des différents termes de l'erreur est constante pour chaque terme (hypothèse d'homoscédasticité individuelle et temporelle). On suppose qu'il n'existe pas d'auto-corrélation aussi bien temporelle qu'individuelle : les erreurs ne sont pas corrélées dans le temps au sein d'un individu et ne sont pas corrélées à une même période entre différents individus. On suppose également que les différents termes de l'erreur ne sont pas corrélés entre eux : les effets individuels n'ont pas de liens avec les effets temporels ou les chocs idiosyncratiques. Ces hypothèses permettent d'obtenir les propriétés désirables pour la variance des estimateurs.

La dernière hypothèse est l'hypothèse d'exogénéité. On suppose que les différents termes de l'erreur ne sont pas corrélés avec les variables explicatives. Cela permet d'obtenir des estimateurs sans biais. Cette hypothèse est d'autant plus forte dans le cadre des effets aléatoires puisque le terme d'erreur est constitué de davantage de composantes. Ainsi, aussi bien les effets individuel que temporels ne doivent âs être corrélés avec les variables explicatives sous peine de biaiser l'estimation.

On peut montrer que sous ces hypothèses, lorsque les effets inobservés individuels ou temporels sont traités comme des variables aléatoires, **l'estimateur LSDV n'est plus l'estimateur BLUE**. Il reste toujours sans-biais et consistant, mais il n'est plus l'estimateur de variance minimale. En effet, utiliser l'estimateur LSDV alors que les effets inobservés sont des variables aléatoires conduit à introduire de la corrélation sérielle (auto-corrélation temporelle) au sein des erreurs.

Lorsque les effets inobservés sont traités comme des variables aléatoires, **l'estimateur BLUE devient alors l'estimateur des moindres carrés généralisés (Generalized Least Square (GLS))**.

Rappel : Estimateur GLS pour une équation

Dans le cas d'un modèle à une équation (données de coupes transversales) :

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

$$V(\varepsilon) = E[\varepsilon\varepsilon^{'}] = \Omega \neq \sigma_{\varepsilon}^{2} I_{T}$$

L'estimateur GLS consiste à pondérer les observations par la matrice de variance-covariance Ω :

$$\hat{\beta}_{\text{GLS}} = \left(X^{'}\Omega^{-1}X\right)^{-1}\left(X^{'}\Omega^{-1}X\right)$$

$$V\left(\hat{\beta}_{\text{GLS}}\right) = \left(X^{'}\Omega^{-1}X\right)^{-1}$$

Ce qui revient au même que d'utiliser les OLS sur le modèle transformé suivant :

$$\tilde{Y} = \tilde{X}\beta + \tilde{\varepsilon}$$

$$\tilde{Y} = \Omega^{-1/2}Y$$

$$\tilde{X} = \Omega^{-1/2}X$$

Dans le cas de données de panel, il faut savoir : - Quelle est la transformation GLS de la matrice $\Omega^{-1/2}$ - l'estimateur Feasible GLS lorsque Ω est inconnue

Estimateur GLS dans le cas de données de panel

Considérons le modèle écrit pour chaque individu :

$$Y_i = \tilde{X}_i\gamma + \varepsilon_i \quad \forall i = 1, \cdots, N$$

Avec :

$$\varepsilon_i = \alpha_i e + v_i$$

$$\tilde{X}_i = (e, X_i)$$

$$\gamma^{'} = (\mu, \beta^{'})$$

$$V = E[\varepsilon_i \varepsilon_i^{'}] \quad \text{connue}$$

Dans ce modèle, on suppose qu'il n'y a pas d'effets temporels communs à tous les individus ($\lambda_t = 0$ mais on peut géénraliser pour inclure les effets temporels). On suppose également que les effets individuels inobservables sont caractérisés par une moyenne non-nulle que l'on prend en compte via l'ajout d'une constante μ.

Lorsque la matrice de variance covariance V est connue, et que l'on connait donc les composantes individuelles et idiosyncratiques de la variance : σ_α^2 et σ_v^2, l'estimateur GLS du vecteur de paramètres γ est :

$$\hat{\gamma}_{\text{GLS}} = \left[\sum_{i=1}^{N} \tilde{X}_i^{'} V^{-1} \tilde{X}_i\right]^{-1} \left[\sum_{i=1}^{N} \tilde{X}_i^{'} V^{-1} \tilde{Y}_i\right]$$

Sous les hypothèses données précédemment cet estimateur est BLUE.

On peut écrire la matrice V^{-1} comme :

$$V^{-1} = \frac{1}{\sigma_v^2}\left[Q + \Psi \frac{1}{T} ee^{'}\right]$$

$$Q = \left(I_T - \frac{ee^{'}}{T}\right)$$

$$\Psi = \left(\frac{\sigma_v^2}{\sigma_v^2 + T\sigma_\alpha^2}\right)$$

A partir de là, on peut réécrire l'estimateur GLS comme une moyenne pondérée de l'estimateur Within et de l'estimateur Between :

$$\hat{\beta}_{\text{GLS}} = \left[\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{N} X_i^{'} Q X_i + \Psi \sum_{i=1}^{N} \left(\bar{X}_i - \bar{X}\right)\left(\bar{X}_i - \bar{X}\right)^{'}\right]^{-1} \left[\frac{1}{T}\sum_{i=1}^{N} X_i^{'} Q Y_i + \Psi \sum_{i=1}^{N} \left(\bar{X}_i - \bar{X}\right)\left(\bar{Y}_i - \bar{Y}\right)\right]$$

Ce qui revient à écrire :

$$\hat{\beta}_{\text{GLS}} = \Delta\hat{\beta}_{\text{Between}} + (I_k - \Delta)\,\hat{\beta}_{\text{Within}}$$

$$\Delta = \Psi T \left[\sum_{i=1}^{N} X_i' Q X_i + \Psi T \sum_{i=1}^{N} \left(\bar{X}_i - \bar{X}\right)\left(\bar{X}_i - \bar{X}\right)'\right]^{-1} \left[\sum_{i=1}^{N} \left(\bar{X}_i - \bar{X}\right)\left(\bar{X}_i - \bar{X}\right)'\right]$$

- Lorsque $\Psi \to 1$ (faible variance individuelle, peu de différences entre les individus) ou $T \to 0$ (lorsque l'échantillon se réduit), l'estimateur GLS converge vers l'estimateur Pooled.
- Lorsque $\Psi \to 0$ (Forte variance individuelle. Il y a beaucoup de différences individuelles qu'on doit contrôler) ou $T \to \infty$ (lorsque l'échantillon devient très grand), l'estimateur GLS converge vers l'estimateur Within/LSDV/FE.
- Lorsque $0 < \Psi < 1$, la structure des effets aléatoires constitue une solution intermédiaire entre le modèle sans effets individuels et le modèle à effets fixes individuels.

La constante Ψ mesure le poids donné à la variation inter-groupe. Cette dimension est complètement ignorée par l'estimateur LSDV. Il ne prend en compte que la variation au sein d'un même groupe.

On peut montrer que la variance de l'estimateur GLS est :

$$V(\hat{\beta}_{\text{GLS}}) = \sigma_v^2 \left[\sum_{i=1}^{N} X_i' Q X_i + \Psi T \sum_{i=1}^{N} \left(\bar{X}_i - \bar{X}\right)\left(\bar{X}_i - \bar{X}\right)'\right]^{-1}$$

Lorsque le paramètre $\Psi > 0$, la variance de l'estimateur LGS est toujours inférieure à celle de l'estimateur Within :

$$V(\hat{\beta}_{\text{GLS}}) < V(\hat{\beta}_{\text{Within}})$$

Cette différence tend à se réduire à mesure que $T \to \infty$ puisque pour des panels de dimension infinie, l'estimateur GLS tend à devenir l'estimateur Within. Cela s'explique par le fait que dans un tel cas, on a un nombre infini d'observations pour chaque i. Dans ce cas, on peut considérer chaque α_i comme une variable aléatoire qui a été tirée une bonne fois pour toute et ainsi chaque α_i peut prétendre être comme un paramètre fixe.

Simplification de l'estimation GLS

On peut simplifier l'estimation GLS en introduisant une matrice de transformation P telle que :

$$P = \left[I_T - \left(1 - \Psi^{1/2}\right) \frac{1}{T} ee' \right]$$

$$\Rightarrow V^{-1} = \frac{1}{\sigma_v^2} P' P$$

On prémultiplie ensuite le modèle par cette matrice P :

$$PY_i = P\tilde{X}_i \beta + Pv_i$$

Cette transformation équivaut à préalablement transformer les données en leur retirant la fraction $\theta = (1 - \Psi^{1/2})$ de leur moyenne individuelle :

$$\left(Y_{i,t} - \theta \bar{Y}_i\right) = \bar{\omega} + \left(X_{i,t} - \theta \bar{X}_i\right) \beta + \left(\varepsilon_{i,t} - \theta \bar{\varepsilon}_i\right)$$

L'estimateur GLS est obtenu en appliquant l'estimateur OLS sur ce modèle transformé. Cette méthodologie s'appelle "Partial Group Mean deviation" ou "quasi-demeaning".

Estimateur FGLS

La méthodologie GLS fonctionne lorsque l'on connait la matrice de variance covariance et donc les composantes individuelles et idiosyncratiques de la variance : σ_α^2 et σ_ε^2. Lorsqu'on ne les connait pas, il faut recourir à une estimation GLS en deux étapes (Feasible GLS).

1) On estime les composantes de la variance en utilisant des estimateurs consistants
2) On substitue les estimations de ces composantes dans la formule :

$$\hat{\gamma}_{\text{GLS}} = \left[\sum_{i=1}^{N} \tilde{X}_i' \hat{V}^{-1} \tilde{X}_i \right]^{-1} \left[\sum_{i=1}^{N} \tilde{X}_i' \hat{V}^{-1} \tilde{Y}_i \right]$$

Ou bien dans le modèle modifié suivant :

$$\left(y_{i,t} - \theta \bar{Y}_i\right) = \bar{\omega} + \left(x_{i,t} - \theta \bar{X}_i\right) \beta + \left(\varepsilon_{i,t} - \theta \bar{\varepsilon}_i\right)$$

$$\theta = \left(1 - \Psi^{1/2}\right)$$

Pour cela il faut un estimateur consistant de θ. On va alors :

1) Estimer le modèle en dimension Within (estimateur Within) pour obtenir $\hat{\sigma}_v^2$
2) Estimer le modèle en dimension Between (estimateur Between) pour obtenir $\hat{\sigma}_\alpha^2 + \left(\frac{1}{T}\right) \hat{\sigma}_v^2$

3) Calculer l'estimateur $\hat{\Psi}$ tel que :

$$\hat{\Psi} = \left(\frac{\hat{\sigma}_v^2}{\hat{\sigma}_v^2 + T\hat{\sigma}_\alpha^2} \right) = \left[\frac{\text{RSS}^{\text{Within}}/(N(T-1)-K)}{T \times \text{RSS}^{\text{Between}}/(N-(K+1))} \right]$$

4) Calculer l'estimateur $\hat{\theta} = \left(1 - \hat{\Psi}^{1/2}\right)$

5) Obtenir l'estimateur FGLS en utilisant les MCO sur le modèle :

$$\left(y_{i,t} - \hat{\theta}\bar{Y}_i\right) = \bar{\omega} + \left(x_{i,t} - \hat{\theta}\bar{X}_i\right)\beta + \left(\varepsilon_{i,t} - \hat{\theta}\bar{\varepsilon}_i\right)$$

Déterminer la forme d'hétérogénéité : La procédure de Hsiao

Les formes d'hétérogénéité et principe du test

Déterminer la forme que prend l'hétérogénéité dans un modèle de données de panel est fondamental. En effet, si l'hétérogénéité est mal spécifiée elle peut se traduire par des biais conséquents sur les estimateurs, principalement lorsque les facteurs d'hétérogénéités non pris en compte sont corrélés avec les variables explicatives.

Si l'on prend la spécification la plus générale :

$$y_{i,t} = \alpha_{i,t} + \beta_{i,t}^{'} x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

On peut voir que l'on introduit de les effets individuels et temporels : il existe des effets communs à toutes les périodes de temps mais qui dépendent des individus et il existe des effets communs à tous les individus mais qui diffèrent à chaque période de temps. On voit également que la pente gouvernant la relation entre x et y varie à la fois pour chaque individu, mais aussi pour chaque période temps. On est dans une hétérogénéité totale.

A partir de cette spécification générale, on peut tester :

- l'absence d'hétérogénéité : constante et coefficient de pente qui ne varient pas
- l'homogénéité des coefficients de pente (pentes qui ne varient pas)
- l'homogénéité de la constante (constantes qui ne varient pas)
- la stabilité temporelle des estimateurs (pas abordé ici. Question qui n'est pas spécifique aux données de panel)

On va assumer ici que les paramètres sont constants dans le temps, mais qu'ils peuvent varier entre les individus (mais la procédure peut se généraliser en ajoutant des effets temporels). Cela donne la spécification générale suivante :

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta_i^{'} x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

On peut imposer trois types de restrictions sur cette spécification :

1) Les paramètres de pente sont identiques, mais les constantes diffèrent entre les individus. La relation est la même pour tous les individus mais il existe des facteurs individuels qui vont introduire des différences systématiques entre les différents individus (Modèle FE/RE)

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta^{'} x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

2) Les constantes sont identiques pour tous les individus, mais les coefficients de pente diffèrent. La force de la relation diffèrent pour chaque individu mais la valeur prédite lorsque $X = 0$ est la même pour tous les individus (Peu usuel)

$$y_{i,t} = \alpha + \beta_i^{'} x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

3) Les constantes et paramètres de pente sont les mêmes pour tous les individus. La relation est la même pour tous les individus et il n'existe pas d'effet individuel entrainant des différences systématiques entre les individus.

$$y_{i,t} = \alpha + \beta^{'} x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Le procédure de spécification de Hisao vise à discriminer parmi ces différents cas d'hétérogénéité. Il s'agit d'une procédure séquentielle qui va imposer différentes restrictions sur des modèles plus ou moins généraux (à l'aide de test contraints de Fisher) afin de déterminer quelles sont les contraintes les plus importantes.



Etape 1 : Tester l'homogénéité totale

La première étape consiste à tester l'hypothèse nulle d'homogénéité totale des pentes et des constantes.

$$\begin{cases} H0_1 : \alpha_i = \alpha \ ; \ \ \beta_i = \beta \quad \forall i \in [1, N] \\ H1_1 : \exists \ \alpha_i \neq \alpha \ \ | \ \ \exists \ \beta_i \neq \beta \end{cases}$$

Cela revient à tester :

$$\begin{cases} H0_1 : y_{i,t} = \alpha + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \\ H1_1 : y_{i,t} = \alpha_i + \beta_i x_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{cases}$$

Cela revient à poser $(K+1)(N-1)$ restrictions sur le modèle général. La statistique de test est donnée par :

$$F_1 = \frac{\left(\mathrm{RSS}_{1,c} - \mathrm{RSS}_1\right) / \left[(N-1)(K+1)\right]}{\mathrm{RSS}_1 / \left[NT - N(K+1)\right]} \sim \mathcal{F}\left([N-1][K+1], NT - N[K+1]\right)$$

Avec :

- RSS_1 la somme des résidus au carré du modèle non-contraint (celui de l'hypothèse alternative). Il s'agit de la somme des N sommes des carrés des résidus associées aux N régressions individuelles. Le modèle sous l'hypothèse alternative revient à estimer N régressions individuelles.
- $\text{RSS}_{1,c}$ la somme des résidus au carré du modèle contraint (celui de l'hypothèse nulle). Le modèle sous l'hypothsèe nulle revient à estimer un modèle pooled.

La somme des carrés des résidus du modèle non-contraint peut être calculée de la manière suivante :

$$\text{RSS}_1 = \sum_{i=1}^{N} \text{RSS}_{1,i} = \sum_{n=1}^{N} \left[S_{yy,i} - S_{xy,i}^{'} S_{xx,i}^{-1} S_{xy,i} \right]$$

$$S_{yy,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(y_{i,t} - \bar{y}_i \right)^2$$

$$S_{xy,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}_i \right) \left(y_{i,t} - \bar{y}_i \right)^{'}$$

$$S_{xx,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}_i \right) \left(x_{i,t} - \bar{x}_i \right)^{'}$$

$$\bar{y}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} y_{i,t}$$

$$\bar{x}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} x_{i,t}$$

La somme des carrés des résidus du modèle contraint peut être calculée de la manière suivante :

$$\mathrm{RSS}_{1,c} = S_{yy} - S_{xy}^{'} S_{xx}^{-1} S_{xy}$$

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} \left(y_{i,t} - \bar{y}\right)^2$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}\right) \left(y_{i,t} - \bar{y}\right)^{'}$$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}\right) \left(x_{i,t} - \bar{x}\right)^{'}$$

$$\bar{y} = \frac{1}{NT} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} y_{i,t}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{NT} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} x_{i,t}$$

La règle de décision est la suivante :

- Si $|F_1| \geq \mathcal{F}\left([N-1][K+1], NT - N[K+1]\right)$, alors on rejette l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients. Cependant, on ne sait pas si ce sont les constantes qui sont hétérogènes ou bien les pentes. **Il faut donc passer à la deuxième étape de la procédure**.
- Si $|F_1| < \mathcal{F}\left([N-1][K+1], NT - N[K+1]\right)$, alors on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients. Les coefficients de pente et de constantes sont identiques pour tous les individus. **Il faut donc estimer un modèle Pooled**.

Etape 2 : Tester l'homogénéité des pentes

La première étape permet simplement de discriminer entre un modèle complètement homogène et un modèle hétérogène. Mais il ne nous apprend rien sur la nature de l'hétérogénéité. Pour affiner l'analyse, on va tester si les coefficients de pente sont homogènes. On autorise donc la présence d'effets individuels.

On teste :

$$\begin{cases} H0_2 : \beta_i = \beta \quad \forall i \in [1, N] \\ H1_2 : \exists \ \beta_i \neq \beta \end{cases}$$

Cela revient à tester :

$$\begin{cases} H0_2 : y_{i,t} = \alpha_i + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \\ \\ H1_2 : y_{i,t} = \alpha_i + \beta_i x_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{cases}$$

On impose $(N-1)K$ restrictions sur le modèle général. La statistique de test est donnée par :

$$F_2 = \frac{\left(\mathrm{RSS}_{2,c} - \mathrm{RSS}_1\right) / \left[(N-1)K\right]}{\mathrm{RSS}_1 / \left[NT - N(K+1)\right]} \sim \mathcal{F}\left([N-1]K, NT - N[K+1]\right)$$

Avec :

- RSS_1 la somme des résidus au carré du modèle général non-contraint (celui de l'hypothèse alternative). Il s'agit de la somme des N sommes des carrés des résidus associées aux N régressions individuelles. Le modèle sous l'hypothèse alternative revient à estimer N régressions individuelles.
- $\mathrm{RSS}_{2,c}$ la somme des résidus au carré du modèle contraint (celui de l'hypothèse nulle). Le modèle sous l'hypothèse nulle revient à estimer un modèle avec des effets fixes individuels (FE/RE).

La somme des carrés des résidus du modèle non-contraint peut être calculée de la manière suivante (même chose que lors de l'étape 1):

$$\mathrm{RSS}_1 = \sum_{i=1}^{N} \mathrm{RSS}_{1,i} = \sum_{n=1}^{N} \left[S_{yy,i} - S'_{xy,i} S_{xx,i}^{-1} S_{xy,i}\right]$$

$$S_{yy,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(y_{i,t} - \bar{y}_i\right)^2$$

$$S_{xy,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right)\left(y_{i,t} - \bar{y}_i\right)'$$

$$S_{xx,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right)\left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right)'$$

$$\bar{y}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} y_{i,t}$$

$$\bar{x}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} x_{i,t}$$

La somme des carrés des résidus du modèle contraint peut être calculée de la manière suivante :

$$\mathrm{RSS}_{2,c} = \sum_{i=1}^{N} S_{yy,i} - \left(\sum_{i=1}^{N} S_{xy,i}\right)' \left(\sum_{i=1}^{N} S_{xx,i}\right)^{-1} \left(\sum_{i=1}^{N} S_{xy,i}\right)$$

$$S_{yy,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(y_{i,t} - \bar{y}_i\right)^2$$

$$S_{xy,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right)\left(y_{i,t} - \bar{y}_i\right)'$$

$$S_{xx,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right)\left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right)'$$

$$\bar{y}_i = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} y_{i,t}$$

$$\bar{x}_i = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} x_{i,t}$$

La règle de décision est la suivante :

- Si $|F_2| \geq \mathcal{F}\left([N-1]K, NT - N[K+1]\right)$, alors on rejette l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients de pente. On sait donc qu'il y a de l'hétérogénéité dans notre modèle et qu'au moins une partie de cette hétérogénéité s'explique par des relations différentes entre les individus (coefficients de pente différents). Comme il est très rare d'avoir des coefficients de pentes différents par individus mais des coefficients de constante égaux, alors on suppose dans ce cas qu'il y a une hétérogénéité totale aussi bien des constantes que des pentes. **Il faut donc estimer un modèle par individu ou utiliser un estimateur prenant en compte l'hétérogénéité des pentes : Estimatyeur Mean Group**.
- Si $|F_2| < \mathcal{F}\left([N-1]K, NT - N[K+1]\right)$, alors on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients pente. On sait donc grâce au test 1 qu'il semble y avoir de l'hétérogénéité dans notre modèle. Le test 2 nous informe que cette hétérogénéité ne s'explique pas par des coefficients de pente différents. On va donc devoir tester si cette hétérogénéité s'explique par des coefficients de constantes qui diffèrent selon les individus. **Il faut donc passer à l'étape 3 de la procédure**.

Etape 3 : Tester l'homogénéité des constantes

On sait désormais que les coefficients de pente ne diffèrent pas entre les individus. Normalement la seule source d'hétérogénéité restant concerne les coefficients de constante. On pourrait se dire que ne pas rejeter l'hypothèse nulle de l'étape 2 revient à considérer les constantes comme étant différentes pour chaque individu. Cependant, le test effectué lors de l'étape 1 est un tests avec un grand nombre de contraintes et le rejet de son hypothèse nulle n'est pas assez précis pour nous permettre d'être sûr que l'hétérogénéité qui semble s'observer est due à des constantes différentes même si les coefficients de pentes sont fixes.

On va donc utiliser le résultat du test de l'étape 2 afin de fixer les coefficients de pente pour qu'ils soient égaux entre tous les individus et tester l'homogénéité des pentes seules. Cela permet d'obtenir un test plus précis que celui à l'étape 1.

On teste :

$$\begin{cases} H083 : \alpha_i = \alpha \quad \forall i \in [1, N] \quad \text{sachant } \beta_i = \beta \\ H1_3 : \exists \ \alpha_i \neq \alpha \end{cases}$$

Cela revient à tester :

$$\begin{cases} H0_3 : y_{i,t} = \alpha + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \\ H1_3 : y_{i,t} = \alpha_i + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{cases}$$

La statistique de test est donnée par :

$$F_3 = \frac{\left(\mathrm{RSS}_{1,c} - \mathrm{RSS}_{2,c}\right) / (N-1)}{\mathrm{RSS}_{2,c} / \left[N(T-1) - K\right]} \sim \mathcal{F}\left(N-1, N(T-1) - K\right)$$

Avec :

- $\mathrm{RSS}_{2,c}$ la somme des résidus au carré du modèle général non-contraint (celui de l'hypothèse alternative). Le modèle sous l'hypothèse alternative revient à estimer un modèle avec des effets fixes individuels.
- $\mathrm{RSS}_{1,c}$ la somme des résidus au carré du modèle contraint (celui de l'hypothèse nulle). Le modèle sous l'hypothèse nulle revient à estimer un modèle Pooled.

La somme des carrés des résidus du modèle non-contraint peut être calculée de la manière suivante (même chose que lors de l'étape 2):

$$\mathrm{RSS}_{2,c} = \sum_{i=1}^{N} S_{yy,i} - \left(\sum_{i=1}^{N} S_{xy,i}\right)' \left(\sum_{i=1}^{N} S_{xx,i}\right)^{-1} \left(\sum_{i=1}^{N} S_{xy,i}\right)$$

$$S_{yy,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(y_{i,t} - \bar{y}_i\right)^2$$

$$S_{xy,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right) \left(y_{i,t} - \bar{y}_i\right)'$$

$$S_{xx,i} = \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right) \left(x_{i,t} - \bar{x}_i\right)'$$

$$\bar{y}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} y_{i,t}$$

$$\bar{x}_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} x_{i,t}$$

La somme des carrés des résidus du modèle contraint peut être calculée de la manière suivante (même chose qu'à l'étape 1):

$$\mathrm{RSS}_{1,c} = S_{yy} - S_{xy}' S_{xx}^{-1} S_{xy}$$

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} \left(y_{i,t} - \bar{y}\right)^2$$

$$S_{xy} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}\right) \left(y_{i,t} - \bar{y}\right)'$$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} \left(x_{i,t} - \bar{x}\right) \left(x_{i,t} - \bar{x}\right)'$$

$$\bar{y} = \frac{1}{NT} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} y_{i,t}$$

$$\bar{x} = \frac{1}{NT} \sum_{i=1}^{N} \sum_{t=1}^{T} x_{i,t}$$

La règle de décision est la suivante :

- Si $|F_3| \geq \mathcal{F}\left(N-1, N(T-1)-K\right)$, alors on rejette l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients de constante. On sait désormais que l'hétérogénéité observée lors de l'étape 1 est due à des effets individuels systématiques pour les individus (constantes différentes) et non pas à des relations différentes selon les individus. **Il faut donc estimer un modèle à effets individuels : FE/RE**.
- Si $|F_3| < \mathcal{F}\left(N-1, N(T-1)-K\right)$, alors on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients de constante. On n'avait pu déclarer l'absence d'hétérogénéité lors du premier test général. Cependant la batterie de tests suivante nous permet de dire qu'il ne semble pas y avoir des coefficients de pente ou de constantes différentes selon les individus. **Il faut donc estimer un modèle Pooled**.

Test d'Haussman : Effets fixes ou aléatoires ?

La procédure de Hsiao permet de déterminer la forme d'hétérogénéité à modéliser. Si l'on détermine que l'hétérogénéité se trouve dans des effets individuels / temporels, il reste encore à déterminer l'estimateur à utiliser pour modéliser au mieux cette hétérogénéité. Globalement le choix se fait entre l'estimateur à effets fixes (FE) et l'estimateur à effets aléatoires (RE).

Pour choisir entre ces deux estimateurs, on va utiliser le test de Haussman. Il s'agit d'un test permettant de comparer deux estimateurs ayant des consistances différentes. Avec ce test on cherche à comparer un estimateur convergent et asymptotiquement efficace sous l'hypothèse nulle avec un estimateur qui est toujours convergent aussi bien sous l'hypothèse nulle que sous l'hypothèse alternative.

Le modèle sous-jacent de chaque estimateur est le suivant :

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

On va tester l'hypothèse nulle d'absence de corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives :

$$\begin{cases} H0 : E[\alpha_i | x_{i,t} = 0] \\ H1 : E[\alpha_i | x_{i,t} \neq 0] \end{cases}$$

On sait que

- Si $E[\alpha_i | x_{i,t} = 0]$:
  - β_{LSDV} et β_{GLS} convergent : $\beta_{\text{LSDV}} - \beta_{\text{GLS}} \approx 0$. Comme les deux estimateur sont convergents, ils vont donner des valeurs à peu près similaires.

- $V(\beta_{\text{LSDV}}) > V(\beta_{\text{GLS}})$. L'estimateur GLS des effets aléatoires est BLUE lorsque les effets individuels sont aléatoires et non-corrélés avec les variables explicatives. Sa variance est donc plus faible que celle de l'estimateur LSDV.

- Si $E[\alpha_i | x_{i,t} \neq 0]$:
  - β_{LSDV} converge : $\beta_{\text{LSDV}} - \beta_{\text{GLS}} \neq 0$. Comme l'estimateur GLS devient biaisé lorsque les effets individuels sont corrélés avec les variables explciatives, on va observer un écart important entre les valeurs données par les deux estimateurs.
  - $V(\beta_{\text{LSDV}}) > V(\beta_{\text{GLS}})$

L'idée du test de Haussman est d'utiliser ces propriétés de convergence pour déterminer si les effets individuels sont effectivement corrélés avec les variables explicatives ou non. Si les effets individuels ne sont pas corrélés avec les variables explicatives, alors on observera peud d'écart entre les estimateurs LSDV et GLS. En revanche la variance de ce dernier sera plus faible. Si on observe un tel décalage significatif, alors on peut déterminer que les effets individuels sont corrélées avec les variables explicatives.

La statistique de test est donnée par :

$$W = \left(\hat{\beta}_{\text{LSDV}} - \hat{\beta}_{\text{GLS}}\right)' \left[V(\hat{\beta}_{\text{LSDV}} - V(\hat{\beta}_{\text{GLS}}))\right]^{-1} \left(\hat{\beta}_{\text{LSDV}} - \hat{\beta}_{\text{GLS}}\right) \sim \chi^2(K)$$

Avec K le nombre de variables explicatives du modèle.

La règle de décision est la suivante :

- Si $|W| \geq \chi^2(K)$: alors on rejette l'hypothèse nulle de non corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser l'estimateur GLS des effets aléatoires puisqu'il sera biaisé. Il faut donc utiliser un modèle permettant de modéliser les effets individuels comme des effets fixes : **estimateur LSDV**.

- Si $|W| < \chi^2(K)$: alors on ne peut rejeter l'hypothèse nulle de non corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives. Dans ce cas, il faut utiliser l'estimateur GLS des effets aléatoires puisqu'il sera non-biaisé et aura une variance plus faible que les autres estimateurs à effets fixes. **Il faut donc utiliser l'estimateur GLS des effets aléatoires**.

Hétérogénéité des pentes

Supposons un modèle général de la forme :

$$y_{i,t} = \beta'_{i,t} X_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Ce modèle capture des différences de relations entre les individus et entre les périodes temporelles. Bien qu'il semble assez réaliste, il manque d'utilité et de pouvoir explicatif puisque le nombre de paramètres à estimer excède le nombre d'observations disponibles. Des formulation plus réalistes sont :

$$y_{i,t} = \beta_i^{'} x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$y_{i,t} = \beta_t^{'} x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Dans ces modèles, seules une dimension va faire varier le coefficient de pente et donc la force de la relation. De la même manière que ne pour les effets fixes, ne pas prendre en compte l'hétérogénéité des pentes va biaiser les estimateurs et limiter la validité de l'analyse empirique.

Considérons le modèle dynamique suivant en supposant qu'il est estimé à partir d'un estimateur pooled ou à effets fixe :

$$y_{i,t} = \lambda_i y_{i,t-1} + \beta_i x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

$$\lambda_i = \lambda + \eta_{1,i}$$

$$\beta_i = \beta + \eta_{2,i}$$

Les paramètres de pente dispose d'une partie constante entre les individus (qui va être capturée par l'estimateur à effets fixes) et d'une partie aléatoire qui va varier entre les individus (qui ne va pas être prise en compte par l'estimateur à effets fixes et va donc se retrouver dans le terme d'erreur).

L'estimation par effets fixes va donner le modèle suivant :

$$y_{i,t} = \alpha_i \lambda y_{i,t-1} + \beta x_{i,t} + \mu_{i,t}$$

$$\mu_{i,t} = \eta_{1,i} y_{i,t-1} + \eta_{2,i} x_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Les parties individuelles des coefficients de pente vont se retrouver dans le terme d'erreur. Or ces parties individuelles sont par essence corrélées avec les variables explicatives. Les coefficients ne sont donc plus consistants à cause de l'endogénéité.

Pesaran et Smith (1995) ont montré que même si $\lambda_i = \lambda$ (coefficient de pente homogène pour la variable dépendante retardée), alors une hétérogénéité dans le coefficient de pente de la variable explicative x va amener λ à tendre vers 1 et β à tendre vers 0.

Ils ont également montré que lorsque des retards de la variable explicative sont inclus dans le modèle et que l'hétérogénéité des pentes n'est pas prise en compte :

- β_1 et le coefficient associé au retard de la variable explicaitive β_2 vont tendre vers des valeurs égales mais de signe opposé.
- λ va tendre vers 1.

Estimateur Mean Group

Différents estimateurs existent pour prendre en compte l'hétérogénéité des coefficients de pente. Pesaran et Smith (1995) proposent l'estimateur Mean-Group (MG). Cet estimateur est "simplement" une moyenne des régression OLS individuelles. Pour pouvoir l'utiliser correctement, il faut :

- Que toutes les variables explicatives soient strictement exogènes
- Que les dimensions individuelles et temporelles comportent suffisament d'observations pour pouvoir faire des régressions individuelles puis obtenir une moyenne de ces estimations.

Cet estimateur peut s'appliquer peu importe la nature de l'hétérogénéité des coefficients de pente (aléatoire ou fixe).

L'estimateur MG se définit comme :

$$\widehat{\beta}_{\mathrm{MG}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\widehat{\beta}_i^{\mathrm{OLS}}$$

$$\widehat{\beta}_i^{\mathrm{OLS}} = \left(x_i^{'}x_i\right)^{-1} x_i^{'}y_i$$

La variance de l'estimateur MG est donnée par :

$$V\left(\widehat{\beta}^{\mathrm{MG}}\right) = \frac{1}{N(N-1)}\sum_{i=1}^{N}\left(\widehat{\beta}_i^{\mathrm{OLS}} - \widehat{\beta}^{\mathrm{MG}}\right)\left(\widehat{\beta}_i^{\mathrm{OLS}} - \widehat{\beta}^{\mathrm{MG}}\right)^{'}$$

On peut également contraindre certains coefficients à être fixes (ne pas changer selon les individus) avec l'estimateur Pooled Mean group qui va contraindre un certain nombre de coefficient à être considéré comme fixes (Pooled).

Tester l'hétérogénéité des coefficients de pente

Pour tester l'hétérogénéité des coefficients de pente, on peut utiliser la procédure de Hsiao, qui par élimination nous permet de déduire que les coefficients de pente sont hétérogènes. Cependant cette procédure ne permet pas de déterminer les groupes de variables dont les coefficients de pente sont hétérogènes. Dans cette procédure l'ensemble des coefficients sont hétérogènes ou homogènes.

Test de Haussman

On peut utiliser le test de Haussman pour comparer l'estimateur Mean Group qui sera toujours consistant avec l'estimateur Pooled Mean group qui ne sera consistant que sous l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients de pente.

On peut tester l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients de pente de toutes les variables ou bien seulement l'homogénéité des coefficients d'un sous-ensemble de variables :

$$\begin{cases} H0 : \beta_1 = \cdots = \beta_N \quad \forall i \in [1, N] \\ H1 : \exists \ \beta_i \neq \beta_j \quad i \neq j \end{cases}$$

$$\begin{cases} H0 : \beta_{1,k} = \cdots = \beta_{N,k} \quad \forall i \in [1, N] \\ H1 : \exists \ \beta_{i,k} \neq \beta_{j,k} \quad i \neq j \end{cases}$$

Avec k un un sous-ensemble de variables. Les autres variables sont considérées comme ayant des coefficients hétérogènes.

Le problème de ce test réside dans son hypothèse d'erreurs homoskédastiques (variance constante et non-autocorrélation). De plus ce test performe assez mal à moins que $T > N$ ce qui est assez rare.

Delta Test

Pesaran et Yamagata (2008) ont proposé un test d'hétérogénéité des coefficients de pente dans le cas où T et N sont grands et où $N > T$. Ce test produit une statistique de test sous l'hypothèse nulle qui va suivre une loi standard. L'idée de ce test est de comparer la distance entre les coefficients obtenus par un estimateur à effet fixes (coefficients de pente constants) et les coefficients obtenus par des régressions individuelles. Cette différence entre les coefficients va être pondérée par les erreurs standard de chaque individu afin de relâcher l'hypothèse d'homosckédasticité des erreurs.

On va tester :

$$\begin{cases} H0 : \beta_{2,i} = \beta_2 \quad \forall i \\ H1 : \exists \ \beta_{2,i} \neq \beta_2 \end{cases}$$

$\beta_{2,i}$ correspond au sous-ensemble de variables dont on souhaite tester l'homogénéité des coefficients de pente. Les autres variables sont considérés comme ayant des coefficients de

pente hétérogènes. Le test a été étendu par Blomquist et Westerlund (2013) pour donner une statistique de teste robuste à l'hétéroskédasticité (HAC robust).

Dépendance Cross-Section (CSD)

L'étude de la corrélation entre les différents individus du panel se fait de plus en plus fréquente dans la littérature macroéconomique et financière à cause des forts liens qui sont relevés entre les différentes économies et les différents agents économiques. La littérature montre que ne pas corriger pour cette dépendance cross-section amène à estimer des coefficients inconsistants et biaisés (Pesaran 2006).

La littérature distingue deux types de dépendance cross-section :

- **La faible dépendance cross-section** : lorsque la corrélation entre individus converge vers 0 lorsque N tend vers l'infini. Un exemple courant de faible dépendance cross-section est la corrélation spatiale (traitée par l'économétrie spatiale).
- **La forte dépendance cross-section** : lorsque la corrélation entre les individus converge vers une constante différente de 0 lorsque N tend vers l'infini. Cette forte dépendance provient de facteurs communs inobservés qui vont lier les individus ensembles : pandémies, crises, changement technologique.

Traditionnellement, cette dépendance est prise en compte par l'utilisation des effets fixes temporels qui permettent d'isoler l'impact de facteurs commun sur l'ensemble des individus à une période de temps donnée. Cependant cette méthode suppose que les facteurs communs affectent tous les individus de la même manière. Hors un certain nombre d'études montrent que les facteurs structurels impactent différemment les individus. Dans un tel cas, les effets fixes ne permettent pas de correctement modéliser la dépendance cross-sectionnelle.

Ne pas prendre en compte la dépendance cross-section peut amener les coefficients à être biaisés et non consistants si les régresseurs ne sont pas strictement exogènes avec les facteurs commun non pris en compte. Ne pas prendre en compte ces facteurs commun peut également entrainer l'apparition de résidus corrélés entre les différents individus et donc augmenter la variance des individus.

Tester la présence de dépendance cross-section

Breush-Pagan LM test

Dans le cas d'un panel avec T large et N plus petit (pas si large), on peut tester la dépendance cross-section avec une statistique LM. On teste :

$$\begin{cases} H0 : \rho_{i,j} = 0 \quad \forall i \neq j \\ H1 : \exists \ \rho_{i,j} \neq 0 \quad i \neq j \end{cases}$$

Où $\hat{\rho}_{i,j}$ correspond à la corrélation cross-section (entre deux individus) :

$$\hat{\rho}_{i,j} = \frac{\sum_{t=1}^{T} \hat{\varepsilon}_{i,t}\hat{\varepsilon}_{j,t}}{\left(\sum_{t=1}^{T} \hat{\varepsilon}_{i,t}\right)^{1/2} \left(\sum_{t=1}^{T} \hat{\varepsilon}_{j,t}\right)^{1/2}}$$

ON utilise une statistique LM pour effectuer le test :

$$LM = T \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \hat{\rho}_{i,j}^2 \sim \chi^2(N[N-1]/2)$$

La règle de décision est la suivante :

- Si $|LM| \geq \chi^2(N[N-1]/2)$: alors on rejette l'hypothèse nulle de non-corrélation inter-individuelle. Il existe une corrélation significative entre les individus de notre panel. Il convient donc de la modéliser correctement.
- Si $|LM| < \chi^2(N[N-1]/2)$: alors on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de non-corrélation inter-individuelle. Il n'existe pas de corrélation inter-individuelle assez significative dans notre panel.

Ce tests souffre de plusieurs problèmes notamment lorsque N est extrême :

- ce test tend à être surestimé lorsque N est grand et $T \to \infty$.
- L'hypothèse nulle est très sensible dans le cas de petits panels : N faible et $T \to \infty$.

CD-LM test

Pesaran (2004) argumente sur le fait qu'imposer l'absence de corrélation inter-individuelle sur l'ensemble des individus du panel est trop restrictif. Il propose plutôt de tester si la corrélation inter-individuelle est suffisament faible pour être ignorée ou non. Il propose donc le test CD_{LM} qui est une version augmentée du test LM de Breush-Pagan.

On teste :

$$\begin{cases} H0 : \text{Faible CSD} \\ H1 : \text{Forte CSD} \end{cases}$$

Et on utilise la statistique de test :

$$CD_{LM} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=i+1}^{N} \left(T \times \hat{\rho}_{i,j} - 1\right) \sim \mathcal{N}(0,1)$$

La règle de décision est la suivante :

- Si $|CM_{LM}| \geq \mathcal{N}(0,1)$: alors on rejette l'hypothèse nulle de faible corrélation inter-individuelle. Il existe une forte corrélation entre les individus de notre panel. Il convient donc de la modéliser correctement.
- Si $|CM_{LM}| < \mathcal{N}(0,1)$: alors on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de faible corrélation inter-individuelle. La corrélation inter-individuelle n'est pas assez importante pour être prise en compte.

Ce test souffre lui aussi de différents problèmes :

- Il n'est pas correctement centré à 0 lorsque T est fini et il est probable qu'il subisse des distorsions de taille lorsque N augmente.
- La distribution normale peut être une mauvaise approximation de la loi suivie par la statistique sous l'hypothèse nulle amenant ainsi des distorsions de forte amplitudes.

Pour résoudre ces problèmes Pesaran et al (2008) on développé une statistique LM ajustée (LM_{Adj}) en utilisant des approximation en échantillons finis. Ces approximations ne sont cependant valides que dans le cas de régresseurs strictement exogènes et d'erreurs normalement distribuées.

CD test

Pesaran (2015) propose une statistique CD qui propose une moyenne d'exactement 0 pour des valeurs fixes de T et de N. Le jeu d'hypothèse est similaire :

$$\begin{cases} H0 : \text{Faible CSD} \\ H1 : \text{Forte CSD} \end{cases}$$

La statistique de test est donnée par :

$$CD = \sqrt{\frac{2T}{N(N-1)}} \left(\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=i+1}^{N} \hat{\rho}_{i,j} \right) \sim \mathcal{N}(0,1)$$

La règle de décision est la suivante :

- Si $|CM| \geq \mathcal{N}(0,1)$: alors on rejette l'hypothèse nulle de faible corrélation inter-individuelle. Il existe une forte corrélation entre les individus de notre panel. Il convient donc de la modéliser correctement.
- Si $|CM| < \mathcal{N}(0,1)$: alors on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de faible corrélation inter-individuelle. La corrélation inter-individuelle n'est pas assez importante pour être prise en compte.

Ce test dispose d'une taille correcte dans le cas de modèle dynamiques (modèles qui étaient problématiques avec les tests précédents) tant que les erreurs sont symétriquement distribuées.

Cependant, il aura tendance à sur-rejeter l'hypothèse nulle dans le cas de régresseurs faiblement exogènes lorsque N est bien plus grand que T.

Des corrections ont été apportées afin de corriger certain de ces problèmes :

- Weighted CD Test : CD_w
- Power enhanced CD_w Test : CD_{w+}
- Bias corrected CD Test : CD^*

Ces trois derniers tests doivent être appliqués sur les résidus d'un modèle estimé. Le test CD peut être appliqué sur le srésidus ou sur les données réelles.

Estimateur des effets communs corrélés (CCE) statique

En présence de corrélation inter-individuelle, on peut chercher à estimer le modèle suivant :

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta_i^{'} x_{i,t} + \mu_{i,t}$$

$$\mu_{i,t} = \sum_{l=1}^{m} \gamma_{l,t} f_{l,t} + e_{i,t} \equiv \gamma_i^{'} f_t + e_{i,t}$$

Ce modèle est caractérisé par des effets fixes individuels, des coefficients de pente hétérogènes aléatoires et un ensemble de facteurs communs inobservés temporels qui vont affecter tous les individus sur une période de temps, mais de manière hétérogène (impact du facteur commun hétérogène entre les individus).

L'estimateur des effets communs corrélés (CCE) proposé par Pesaran (2006) possède l'avantage de ne pas avoir besoin de connaître ou d'estimer les m facteurs communs.

Cet estimateur consiste à approximer la combinaison linéaire des facteurs inobservés en prenant les moyennes cross-sectionnelles (la moyenne de tous les individus pour chaque période de temps) des variables dépendante et explicatives, puis d'effectuer une régression panel standard en ajoutant ces moyennes cross-sectionnelle au modèle.

Le modèle estimé devient :

$$y_{i,t} = \alpha_i + \beta_i^{'} x_{i,t} + \gamma_1^{'} \bar{y}_t + \gamma_2^{'} \bar{x}_t + \varepsilon_{i,t}$$

$$\bar{y}_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} y_{i,t}$$

$$\bar{x}_t = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_{i,t}$$

On peut appliquer l'estimateur Mean Group (ou tout autre estimateur) sur l'équation précédente :

$$\hat{\beta}_{\text{CCEMG}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \hat{\beta}_{i,\text{CCE}}$$

Sous les conditions générales d'exogénéité des régresseurs, cet estimateur est asymptotiquement non biaisé pour β.

$$V\left(\hat{\beta}^{\text{CCMG}}\right) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N} \left(\hat{\beta}_i^{\text{CCE}} - \hat{\beta}^{\text{CCEMG}}\right) \left(\hat{\beta}_i^{\text{CCE}} - \hat{\beta}^{\text{CCEMG}}\right)^{'}$$

Estimateur des effets communs corrélés (CCE) dynamique

On peut également vouloir intégrer de la dynamique dans note modèle :

$$y_{i,t} = \alpha_i + \lambda_i y_{i,t-1} + \beta_i^{'} x_{i,t} + \mu_{i,t}$$

$$\mu_{i,t} = \sum_{l=1}^{m} \gamma_{l,t} f_{l,t} + e_{i,t} \equiv \gamma_i^{'} f_t + e_{i,t}$$

Dans un tel cas, l'hypothèse de stricte exogénéité posée pour l'estimateur CCE statique ne tient plus puisque la variable dépendante retardée n'est plus exogène. Chudik et Pesaran (2015) ont montré que l'estimateur pouvait être plus consistant si l'on ajoutait des retards aux moyennes cross-sectionnelles dans le modèle.

L'équation estimée devient :

$$y_{i,t} = \alpha_i + \lambda_i y_{i,t-1} + \beta_i^{'} x_{i,t} + \sum_{l=0}^{P_T} \gamma_{i,l}^{'} \bar{z}_{t-l} + \varepsilon_{i,t}$$

$$\bar{z}_t = (\bar{y}_t, \bar{x}_t)$$

On peut appliquer l'estimateur Mean-Group sur ce modèle. Selon des simulations, le nombre de retards optimal serait $P_T = T^{1/3}$.

Cette modélisation peut être augmenté pour intégrer d'avantages de retards des variables explicative ou dépendante.

Code

Setup

Charger les librairies et tous les objets de setup. Comme rien n'est chargé pour l'instant il faut :

- Utiliser la syntaxe `here::here()` pour dire que l'on utilise la fonction `here()` du package `here`
- Indiquer le chemin en entier jusqu'au script `setup.R`

```
# Exécute le script setup.R pour charger tous les éléments importants
source(here::here("02-codes", "utils", "setup.R"))
```

Préparation des données

On va s'intéresser au lien entre le prix de l'essence et la richesse d'un pays.

On veut modifier le prix de l'essence comme une fonction linéaire de la consommation d'essence, du nombre de voiture et de la richesse du pays.

Le modèle de base serait donc :

$$\text{lrpmg}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{lgaspcar} + \beta_2 \text{lcarpcap} + \beta_3 \text{lincomep} + \varepsilon_{i,t}$$

On va enregistrer cette spécification dans un objet formula afin de ne pas avoir à toujours la répéter :

```r
static_spec <- lrpmg ~ lgaspcar + lcarpcap + lincomep
class(static_spec) # Afficher le nom de la classe d'objet : formula
```

```
[1] "formula"
```

```r
# Importer les données Males du package plm
data(Gasoline, package = "plm")
df <-
  Gasoline |>
  as_tibble() |>
  print()
```

```
# A tibble: 342 x 6
   country  year lgaspcar lincomep  lrpmg lcarpcap
   <fct>   <int>    <dbl>    <dbl>  <dbl>    <dbl>
 1 AUSTRIA  1960     4.17    -6.47 -0.335    -9.77
 2 AUSTRIA  1961     4.10    -6.43 -0.351    -9.61
 3 AUSTRIA  1962     4.07    -6.41 -0.380    -9.46
 4 AUSTRIA  1963     4.06    -6.37 -0.414    -9.34
 5 AUSTRIA  1964     4.04    -6.32 -0.445    -9.24
 6 AUSTRIA  1965     4.03    -6.29 -0.497    -9.12
 7 AUSTRIA  1966     4.05    -6.25 -0.467    -9.02
 8 AUSTRIA  1967     4.05    -6.23 -0.506    -8.93
 9 AUSTRIA  1968     4.05    -6.21 -0.522    -8.85
10 AUSTRIA  1969     4.05    -6.15 -0.559    -8.79
# i 332 more rows
```

```r
# Information sur le nombre d'individus
nb_indiv <-
  df |>
  pull(country) |>
  unique() |>
  length()

# Information sur le nombre d'années
nb_temps <-
  df |>
  pull(year) |>
  unique() |>
  length()

# Information sur le nombre d'observations
```

```r
nb_obs <- nrow(df)

# Afficher les informations
cat("Le nombre d'individus du panel est de", nb_indiv, "\n")
```

```
Le nombre d'individus du panel est de 18
```

```r
cat("Le nombre d'années du panel est de", nb_temps, "\n")
```

```
Le nombre d'années du panel est de 19
```

```r
cat("Le nombre d'observations du panel est de", nb_obs)
```

```
Le nombre d'observations du panel est de 342
```

Le package que l'on va majoritairement utiliser pour l'estimation des modèles de panel est le package `plm`. Désormais ce package permet de travailler directement avec des dataframes classiques **tant que les deux premières colonnes sont respectivement les variable indiquant les individus et les périodes temporelles**. Ici c'est bien notre cas, puisque la première colonne `country` indique les pays (individus) du panel tandis que la deuxième colonne `year` indique les années (périodes temporelles) du panel.

On peut, si on le souhaite, créer un panel dataframe avec la fonction `plm::pdata.frame()` afin d'obtenir facilement les indices individuels et temporels de notre panel.

```r
# Créer un objet pdata.frame
df_panel <-
  df |>
  plm::pdata.frame(
    index = c("country", "year"), # Indiquer les colonnes contenant les
    indices
    drop.index = TRUE, # Les variables contenant les indices doivent-elles
    être retirées ?
    row.names = TRUE # Afficher les noms de ligne comme des identifiants i-t
  )

df_panel |>
  head() |>
  print()
```

```
             lgaspcar  lincomep      lrpmg  lcarpcap
AUSTRIA-1960 4.173244 -6.474277 -0.3345476 -9.766840
AUSTRIA-1961 4.100989 -6.426006 -0.3513276 -9.608622
AUSTRIA-1962 4.073177 -6.407308 -0.3795177 -9.457257
AUSTRIA-1963 4.059509 -6.370679 -0.4142514 -9.343155
AUSTRIA-1964 4.037689 -6.322247 -0.4453354 -9.237739
AUSTRIA-1965 4.033983 -6.294668 -0.4970607 -9.123903
```

```r
# Afficher les indices individuels et temporels du panel
head(attr(df_panel, "index"))
```

```
  country year
1 AUSTRIA 1960
2 AUSTRIA 1961
3 AUSTRIA 1962
4 AUSTRIA 1963
5 AUSTRIA 1964
6 AUSTRIA 1965
```

Il faut faire attention lorsque l'on veut modifier les données de panel pour y inclure des retards ou créer les données en différence. En effet les fonctions `lag()`, `diff()` etc… de `baseR` ou de `tidyverse` ne prennent pas en compte qu'il y a plusieurs individus dans le panel. Ces fonctions vont considérer qu'il ne s'agit que d'une série temporelle et on va donc parfois avoir le retard d'un autre individu.

Pour éviter ce problème, il faut soit grouper les données par individu, soit utiliser les fonctions `plm::lag()` et `plm::diff()` qui prennent en compte le fait que les données soient des données de panel.

```r
# Créer une variable pour le lag de lrpmg
df <-
  df |>
  mutate(
    .by = country, # Grouper les données par individu : les calculs sont
    appliqués par individus et non plus sur l'ensemble de df
    lag_lrpmg = lag(lrpmg) # Créer la variable en lag
  ) |>
  print()
```

```
# A tibble: 342 x 7
   country  year lgaspcar lincomep  lrpmg lcarpcap lag_lrpmg
   <fct>   <int>    <dbl>    <dbl>  <dbl>    <dbl>     <dbl>
 1 AUSTRIA  1960     4.17    -6.47 -0.335    -9.77    NA
```

```
 2 AUSTRIA  1961     4.10    -6.43 -0.351    -9.61    -0.335
 3 AUSTRIA  1962     4.07    -6.41 -0.380    -9.46    -0.351
 4 AUSTRIA  1963     4.06    -6.37 -0.414    -9.34    -0.380
 5 AUSTRIA  1964     4.04    -6.32 -0.445    -9.24    -0.414
 6 AUSTRIA  1965     4.03    -6.29 -0.497    -9.12    -0.445
 7 AUSTRIA  1966     4.05    -6.25 -0.467    -9.02    -0.497
 8 AUSTRIA  1967     4.05    -6.23 -0.506    -8.93    -0.467
 9 AUSTRIA  1968     4.05    -6.21 -0.522    -8.85    -0.506
10 AUSTRIA  1969     4.05    -6.15 -0.559    -8.79    -0.522
# i 332 more rows
```

La fonction `plm::lag()` permet facilement d'obtenir les retards d'une variables (ici les données en t et les deux retards qui suivent).

```r
head(plm::lag(df_panel$lgaspcar, 0:2))
```

```
                    0        1        2
AUSTRIA-1960 4.173244       NA       NA
AUSTRIA-1961 4.100989 4.173244       NA
AUSTRIA-1962 4.073177 4.100989 4.173244
AUSTRIA-1963 4.059509 4.073177 4.100989
AUSTRIA-1964 4.037689 4.059509 4.073177
AUSTRIA-1965 4.033983 4.037689 4.059509
```

```r
df_panel$lag_lrpmg <- plm::lag(df_panel$lrpmg, 1)

df_panel |>
  head() |>
  print()
```

```
             lgaspcar  lincomep      lrpmg  lcarpcap  lag_lrpmg
AUSTRIA-1960 4.173244 -6.474277 -0.3345476 -9.766840         NA
AUSTRIA-1961 4.100989 -6.426006 -0.3513276 -9.608622 -0.3345476
AUSTRIA-1962 4.073177 -6.407308 -0.3795177 -9.457257 -0.3513276
AUSTRIA-1963 4.059509 -6.370679 -0.4142514 -9.343155 -0.3795177
AUSTRIA-1964 4.037689 -6.322247 -0.4453354 -9.237739 -0.4142514
AUSTRIA-1965 4.033983 -6.294668 -0.4970607 -9.123903 -0.4453354
```

Tester l'hétérogénéité du model

Visualisation graphique

La stationnarité n'étant pas un problème ici (pas assez de données temporelles), la première chose à faire est de déterminer s'il existe de l'hétérogénéité dans nos données. On peut commencer par une analyse graphique en représentant la moyenne et l'écart-type individuel/temporel de nos données à l'aide de graphiques à barre d'erreur.

```
# Calculer les moyennes individuelles (une moyenne par individu) pour la
variable lgaspcar
df_country <-
  df |>
  # summarize permet d'appliquer des calculs sur un semble de ligne et
  retourne un dataframe plus petit
  summarize(
    .by = country, # Effectuer les calculs pour chaque individu
    mean_val = mean(lgaspcar, na.rm = TRUE), # Calculer la moyenne de
    lgaspcar
    sd_val = sd(lgaspcar, na.rm = TRUE), # Calculer l'écart-type de lgaspcar
    n = n(), # Calculer le nombre d'observations temporelles par individus
    (le nombre d'obs par groupe)
    se_val = sd_val / sqrt(n), # Calculer l'erreur-standard
    lower = mean_val - 1.96 * se_val, # Borne inférieure de l'IC (95%)
    upper = mean_val + 1.96 * se_val  # Borne supérieure de l'IC (95%)
  ) |>
  # On trie les pays par moyenne pour un graphique plus lisible
  arrange(mean_val) |>
  # Mettre les pays en factor
  mutate(country = factor(country, levels = country)) |>
  print(n = 6)
```

```
# A tibble: 18 x 7
  country mean_val sd_val     n  se_val lower upper
  <fct>      <dbl>  <dbl> <int>   <dbl> <dbl> <dbl>
1 ITALY       3.73 0.220     19 0.0505   3.63  3.83
2 FRANCE      3.82 0.0499    19 0.0114   3.79  3.84
3 GERMANY     3.89 0.0239    19 0.00548  3.88  3.90
4 BELGIUM     3.92 0.103     19 0.0237   3.88  3.97
5 U.K.        3.98 0.0479    19 0.0110   3.96  4.01
6 SWEDEN      4.01 0.0364    19 0.00835  3.99  4.02
# i 12 more rows
```

```r
# Calculer les moyennes temporelles (une moyenne par année) pour la variable
lgaspcar
df_year <-
  df |>
  # summarize permet d'appliquer des calculs sur un semble de ligne et
  retourne un dataframe plus petit
  summarize(
    .by = year, # Effectuer les calculs pour chaque individu
    mean_val = mean(lgaspcar, na.rm = TRUE), # Calculer la moyenne de
    lgaspcar
    sd_val = sd(lgaspcar, na.rm = TRUE), # Calculer l'écart-type de lgaspcar
    n = n(), # Calculer le nombre d'observations temporelles par individus
    (le nombre d'obs par groupe)
    se_val = sd_val / sqrt(n), # Calculer l'erreur-standard
    lower = mean_val - 1.96 * se_val, # Borne inférieure de l'IC (95%)
    upper = mean_val + 1.96 * se_val  # Borne supérieure de l'IC (95%)
  ) |>
  # On trie les années par ordre croissant
  arrange(year) |>
  print(n = 6)
```

```
# A tibble: 19 x 7
   year mean_val sd_val     n se_val lower upper
  <int>    <dbl>  <dbl> <int>  <dbl> <dbl> <dbl>
1  1960     4.57  0.639    18  0.151  4.27  4.86
2  1961     4.54  0.634    18  0.149  4.25  4.83
3  1962     4.47  0.623    18  0.147  4.19  4.76
4  1963     4.43  0.613    18  0.145  4.15  4.71
5  1964     4.41  0.601    18  0.142  4.13  4.69
6  1965     4.35  0.549    18  0.129  4.10  4.61
# i 13 more rows
```

```r
# Créer le graphique à barre d'erreur pour les individus
p_indiv <-
  # Df contenant les moyennes par individus calculés
  df_country |>
  ggplot(aes(x = country, y = mean_val)) +
  geom_point(color = "#2c3e50", size = 3) +
  geom_errorbar(aes(ymin = lower, ymax = upper), width = 0.2, color =
  "#e74c3c", linewidth = 0.8) +
  coord_flip() + # On tourne le graphique pour bien lire les noms des pays
  labs(
```

```r
    title = "Hétérogénéité individuelle",
    subtitle = "Moyenne et IC (95%) par pays",
    x = "Pays",
    y = "lgaspcar"
  )

# Créer le graphique à barre d'erreur pour les années
p_temp <-
  # Df contenant les moyennes par années calculées
  df_year |>
  ggplot(aes(x = year, y = mean_val)) +
  geom_line(color = "#2c3e50", alpha = 0.5) + # Ligne de tendance
  geom_point(color = "#2c3e50", size = 2) +
  geom_errorbar(aes(ymin = lower, ymax = upper), width = 0.3, color =
  "#3498db", linewidth = 0.8) +
  scale_x_continuous(breaks =
  seq(min(as.numeric(as.character(df_year$year))),

                                  max(as.numeric(as.character(df_year$year))),
                                  by = 2)) +
  labs(
    title = "Hétérogénéité temporelle",
    subtitle = "Moyenne et IC (95%) par année",
    x = "Année",
    y = "lgaspcar"
  )

# Associer les graphiques l'un à coté de l'autre (nécessite le package
patchwork pour fonctionner)
p_indiv + p_temp
```



Ces graphiques permettent d'observer s'il existe de forte disparité en moyenne entre les individus/années et donc de commencer à se rendre compte du degré d'hétérogénéité qu'il peut exister dans nos données. On remarque qu'il existe des différences de moyennes individuelles entre les pays. Ainsi le Japon, les USA, le Canada, la Grèce et la Turquie semble largement se démarquer des autres pays. Ces pays pourraient être une source d'hétérogénéité.

Concernant les années, on remarque une tendance décroissante avec les années. En moyenne il semblerait que les années soient assez différentes les une des autres ce qui pourrait être un signe d'hétérogénéité temporelle.

Ici, nous n'avons observé qu'une seule variable. En pratique, il faudrait observer toutes les variables pour se rendre bien compte de l'hétérogénéité présente dans chaque variable et donc dans celle potentiellement présente dans l'estimation panel.

Procédure de Hsiao

Pour s'assurer de la forme que prend l'hétérogénéité dans nos données, on va dans un premier temps effectuer la procédure de Hsiao grâce à la fonction `poobly::hsiao()` qui va effectuer les trois étapes de la procédure de manière automatique. Cette fonction (comme les fonctions du package `plm` peut prendre comme jeu de donnée un objet `pdata.frame` ou un normal `data.frame`. Dans ce dernier cas, il faudrait spécifier dans l'argument `index` les noms des variables contenant les indices individuels et temporels dans cet ordre).

```r
# Procédure de Hsiao en utilisant un objet pdata.frame
poobly::hsiao(
  formula = static_spec,
  data = df_panel
)
```

```
                    Hsiao Homogeneity Test

Hypothesis| Null |                  Alternative
----------+------+---------------------------------------------
    H1    |Pooled|                     H2
    H2    |  H3  |      Heterogeneous intercepts & slopes
    H3    |Pooled|Heterogeneous intercepts & homogeneous slopes
==============================================================

formula: lrpmg ~ lgaspcar + lcarpcap + lincomep

    Hypothesis  F-statistic     df1         df2       p-value
  1     H1        32.3321       68          270       < 0.001
  2     H2         8.2109       51          270       < 0.001
  3     H3        48.7940       17          321       < 0.001
```

```r
# Procédure de Hsiao en utilisant un objet data.frame
poobly::hsiao(
  formula = static_spec,
  data = df,
  index = c("country", "year")
)
```

```
                    Hsiao Homogeneity Test

Hypothesis| Null |                  Alternative
----------+------+---------------------------------------------
    H1    |Pooled|                     H2
    H2    |  H3  |      Heterogeneous intercepts & slopes
    H3    |Pooled|Heterogeneous intercepts & homogeneous slopes
==============================================================

formula: lrpmg ~ lgaspcar + lcarpcap + lincomep
```

```
  Hypothesis  F-statistic     df1         df2       p-value
1     H1        32.3321       68          270       < 0.001
2     H2         8.2109       51          270       < 0.001
3     H3        48.7940       17          321       < 0.001
```

La première étape consiste à tester s'il existe de l'hétérogénéité dans le modèle. On rejette l'hypothèse nulle à un seuil de 5% (p.value < 0.001). Il semble donc qu'il existe de l'hétérogénéité au sein de notre modèle. Il nous faut maintenant en découvrir la forme.

On passe donc à l'étape 2 qui teste l'homogénéité des coefficients de pente tout en autorisant des effets individuels. On rejette l'hypothèse d'homogénéité des coefficients de pente (p.value $<$ 0.001). L'hypothèse nulle étant rejetée, on conclu qu'il semble exister une hétérogénéité globale au sein de notre modèle. **Dans ce cas, on ne passe pas à l'étape 3**.

La procédure de Hsiao (notamment via l'utilisation de la fonction `poobly::hsiao()` ne test que pour la présence d'effets individuels (elle ne test pas la présence d'effet temporel). De plus, elle ne permet pas de prendre en compte la corrélation individuelle entre les individu. Or Cette corrélation individuelle peut être à même d'influer sur le résultat des tests en biaisant les coefficients.

Tests d'hétérogénéité avec plm

Pooled VS hétérogénéité complète

Le package `plm` comporte trois fonctions : `plm::pooltest()`, `plm::plmtest()` et `plm::pFtest()` qui permettent de tester l'hétérogénéité dans un model de panel.

On va dans un premier temps utiliser le fonction `plm::pooltest()` afin de comparer un modèle Pooled (sans hétérogénéité) dans l'hypothèse nulle avec un modèle complètement hétérogène selon les individus dans l'hypothèse alternative. Pour tester cette spécification, on va passer comme argument à la fonction `plm::pooltest()`, un modèle Pooled (avec la fonction `plm::plm()`) et un modèle où tous les coefficients vont différer pour chaque individu (avec la fonction `plm::pvcm()`).

On va donc tester s'il existe dans note modèle une hétérogénéité des constantes et des coefficients de pente dans la dimension individuelle (les constantes et les coefficients de pente diffèrent pour chaque individu).

```r
# Estimer un modèle Pooled
model_pooled <- plm::plm(
  static_spec, # Spécification du modèle
  data = df_panel, # Données du modèle
  model = "pooling" # Indiquer que l'on veut estimer un modèle Pooled
)
```

```r
# Estimer un modèle à coefficients variables pour chaque individu
# Cela revient à estimer une régression en série temporelle par individu
indiv_variable_coef_model <- plm::pvcm(
  static_spec, # Spécification du modèle
  data = df_panel, # Données du modèle
  model = "within", # Indiquer que les coefficients variables sont fixes
  effect = "individual" # Indiquer que l'on veut les coefficients variables
  par individu
)

# Effectuer le test de Poolability en comparant les deux modèles via un
F-test
pooltest(
  model_pooled, # Modèle pooled
  indiv_variable_coef_model # Modèle à coefficients variables
)
```

```
    F statistic

data:  static_spec
F = 32.332, df1 = 68, df2 = 270, p-value < 0.00000000000000022
alternative hypothesis: unstability
```

La p.value étant inférieure au seuil de 1%, on rejette l'hypothèse nulle d'homogénéité individuelle dans nos coefficients. Il semble donc que l'on ait une hétérogénéité individuelle dans nos coefficients (bien que l'on ne sache pas la forme prise par cette hétérogénéité).

On peut tester l'hétérogénéité temporelle : donc tester si les constantes et les coefficients de pentes varient selon les années :

```r
# Estimer un modèle Pooled
model_pooled <- plm::plm(
  static_spec, # Spécification du modèle
  data = df_panel, # Données du modèle
  model = "pooling" # Indiquer que l'on veut estimer un modèle Pooled
)

# Estimer un modèle à coefficients variables pour chaque année
# Cela revient à estimer une régression en coupe transversale par année
time_variable_coef_model <- plm::pvcm(
  static_spec, # Spécification du modèle
  data = df_panel, # Données du modèle
```

```r
  model = "within", # Indiquer que les coefficients variables sont fixes
  effect = "time" # Indiquer que l'on veut les coefficients variables par
  année
)

# Effectuer le test de Poolability en comparant les deux modèles via un
F-test
pooltest(
  model_pooled, # Modèle pooled
  time_variable_coef_model # Modèle à coefficients variables
)
```

```
    F statistic

data:  static_spec
F = 0.35184, df1 = 72, df2 = 266, p-value = 1
alternative hypothesis: unstability
```

On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle d'homogénéité temporelle des coefficients. Il semble donc que nos constantes et coefficients de pente ne varient pas selon les années. La relation serait donc stable dans le temps et il n'y aurait pas d'effet fixe temporel (à s'assurer).

Tester la présence d'effets fixes

Les tests de poolability nous indiquent la présence probable d'une hétérogénéité individuelle et peu probable d'une hétérogénéité temporelle. On va maintenant tester plus précisément la présence d'effets fixes individuels et/ou temporels. Pour cela on peut utiliser la fonction `plm::plmtest()` qui va tester la présence d'effets fixes dans les résidus d'un modèle pooled via un test LM. On peut également utiliser la fonction `plm::pFtest()` qui va comparer un modèle pooled et un modèle à effets fixes via un F-test.

Pour la fonction `plm::plmtest()` différentes sppécifications de test existent (à spécifier dans le paramètre `type`) :

- "honda" (defaut) pour Honda (1985),
- "bp" pour Breusch et Pagan (1980),
- "kw" pour King et Wu (1997)
- "ghm" pour Gourieroux et al. (1982) : ne s'utilise que pour les tests à deux effets fixes (temporels et individuels)

On va dans un pemier temps tester la présence d'effets fixes individuels (on va utiliser la méthode "bp" pour les exemples) :

```
# Estimer le modèle pooled
pooled_model <-
  plm::plm(
    static_spec, # Spécification du modèle
    data = df_panel, # Données du panel
    model = "pooling" # Indiquer que l'on estime un modèle pooled
  )

# Tester la présence d'effets fixes individuels dans les résidus du modèle
pooled
plm::plmtest(
  pooled_model, # Modèle pooled
  effect = "individual", # Indiquer que l'on teste pour la présence d'effets
  fixes individuels
  type = "bp" # Indiquer le test que l'on utilise
)
```

```
    Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan)

data:  static_spec
chisq = 1229.1, df = 1, p-value < 0.00000000000000022
alternative hypothesis: significant effects
```

On rejette l'hypothèse nulle de non-présence d'effets fixes individuels. Il semblerait donc qu'il existe des spécificités individuelles entre les pays de notre panel (culture de consommation différente, attrait pour différents types de voitures, présence pour le gasoil ou l'essence etc…).

On peut maintenant tester pour la présence d'effets fixes temporels :

```
# Tester la présence d'effets fixes temporels dans les résidus du modèle
pooled
plm::plmtest(
  pooled_model, # Modèle pooled
  effect = "time", # Indiquer que l'on teste pour la présence d'effets fixes
  temporels
  type = "bp" # Indiquer le test que l'on utilise
)
```

```
    Lagrange Multiplier Test - time effects (Breusch-Pagan)

data:  static_spec
chisq = 3.0528, df = 1, p-value = 0.0806
alternative hypothesis: significant effects
```

Ici on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle de non-présence d'effets fixes temporels au seuil de 5%. Mais on peut rejeter l'hypothèse nulle au seuil de 10%. La présence de facteurs commun temporels (qui affectent tous les individus à une période de temps donnée comme une crise par exemple) n'est pas sûre.

On peut également si on le souhaite tester la présence conjointe d'effets fixes individuels et temporels :

```r
# Tester la présence d'effets fixes temporels dans les résidus du modèle
pooled
plm::plmtest(
  pooled_model, # Modèle pooled
  effect = "twoways", # Indiquer que l'on teste pour la présence d'effets
  fixes individuels et temporels
  type = "bp" # Indiquer le test que l'on utilise
)
```

```
    Lagrange Multiplier Test - two-ways effects (Breusch-Pagan)

data:  static_spec
chisq = 1232.1, df = 2, p-value < 0.00000000000000022
alternative hypothesis: significant effects
```

Comme attendu on rejette l'hypothèse nulle de non-présence d'effets fixes. Il s'agit ici d'un test joint. C'est à dire que l'on teste simultanément pour la présence d'effets fixes individuels et temporels. Il suffit donc qu'il existe au moins l'un des deux pour que l'on rejette l'hypothèse nulle. On ne sait donc pas quel type d'effet fixe il y a précisément dans le modèle.

A la place (ou en complément) d'utiliser un test LM, on peut utiliser un F-test pour comparer le modèle pooled (sous l'hypothèse nulle) avec un modèle à effet fixe (individuel, temporel ou les deux) avec la fonction `plm::pFtest()` :

```r
# Estimer un modèle Pooled
model_pooled <- plm::plm(
  static_spec, # Spécification du modèle
  data = df_panel, # Données du modèle
  model = "pooling" # Indiquer que l'on veut estimer un modèle Pooled
```

```r
)

# Estimer un modèle à effets fixes individuels et temporels
FE_TW_model <-
  plm::plm(
    static_spec, # Spécification du modèle
    data = df_panel, # Données du panel
    model = "within", # Indiquer que l'on estime un modèle à effets fixes
    effect = "twoways" # Indiquer que le modèle est à effets fixes
    individuels et temporels
  )

# Comparer le modèle pooled avec le modèle à effets fixes individuels et
temporels
plm::pFtest(
  FE_TW_model, # Modèle à effets fixes
  model_pooled # Modèle pooled
)
```

```
    F test for twoways effects

data:  static_spec
F = 26.035, df1 = 35, df2 = 303, p-value < 0.00000000000000022
alternative hypothesis: significant effects
```

Le F-test rejette également l'homogénéité des constantes.

Il semble donc qu'il existe des effets fixes individuels et peut être temporels dans note panel. Dans le doute, inclure les effets fixes temporels n'est pas forcément une mauvaise chose. Si ces effets fixes existent bel et bien leur non-inclusion entraînerait un biais dans nos estimateurs. En revanche si ces effets fixes n'existent pas, alors leur inclusion entraînerait seulement une baisse des degrés de liberté et donc aune augmentation de la variance des estimateurs (ce qui est généralement moins grave même si cela peut empêche de trouver des effets significatifs).

Effets fixes VS effets aléatoires

La présence d'effets individuels et temporel semble être une information assez robustes peu importe le test utilisé. Il faut maintenant déterminer si ces effets seraient mieux modélisés à partir d'un estimateur à effets fixes ou à effets aléatoires (on cherche donc à savoir si ces effets sont corrélés avec les variables explicatives). On va pour cela effectuer un test de Haussman afin de comparer l'estimateur à effets fixes avec l'estimateur à effets aléatoires. On utilise pour cela la fonction `plm::phtest()`. L'hypothèse nulle est la non-corrélation entre les effets

individuels et temporels et les variables explicatives (utilisation de l'estimateur à effets aléatoire). L'hypothèse nulle est la présence de corrélation entre les effets individuels et temporels et les variables explicatives (utilisation d'un estimateur à effets fixes).

```
# Estimer un modèle à effets fixes individuels et temporels
FE_TW_model <-
  plm::plm(
    static_spec, # Spécification du modèle
    data = df_panel, # Données du panel
    model = "within", # Indiquer que l'on estime un modèle à effets fixes
    effect = "twoways" # Indiquer que le modèle est à effets fixes
    individuels et temporels
  )

# Estimer un modèle à effets aléatoires individuels et temporels
RE_TW_model <-
  plm::plm(
    static_spec, # Spécification du modèle
    data = df_panel, # Données du panel
    model = "random", # Indiquer que l'on estime un modèle à effets aléatoire
    effect = "twoways" # Indiquer que le modèle est à effets fixes
    individuels et temporels
  )

# Test de Haussman (l'ordre dans lequel on met les modèles n'importe pas)
plm::phtest(
  FE_TW_model,
  RE_TW_model
)
```

```
    Hausman Test

data:  static_spec
chisq = 81.228, df = 3, p-value < 0.00000000000000022
alternative hypothesis: one model is inconsistent
```

On rejette l'hypothèse nulle de non corrélation entre les effets individuels et temporels et les variables explicatives. L'estimateur par effets aléatoires n'est donc pas consistant. Il faut donc utiliser un modèle à effets fixe pour modéliser ces effets communs.

Tester l'homogénéité des coefficients de pente

Avec les résultats de la présence d'effets fixes en tête, on peut affiner le test de poolability vu précédemment. En effet on peut maintenant tester si en intégrant des effets fixes (donc une certaine hétérogénéité), il vaut mieux utiliser un modèle avec des coefficients de pente variables par individu ou non (on a déjà rejeté l'hétérogénéité temporelle donc on ne va pas tester si les coefficients de pente diffèrent par années). L'hypothèse nulle consiste en un modèle à effets fixes. l'hypothèse alternative consiste en un modèle avec des effets fixes et des coefficients de pente différents par individus :

```r
# Estimer le modèle à effets fixes individuels et temporels
FE_TW_model <-
  plm::plm(
    static_spec, # Spécification du modèle
    data = df_panel, # Données du panel
    model = "within", # Indiquer que l'on estime un modèle à effets fixes
    effect = "twoways" # Indiquer wue le modèle est à effets fixes
    individuels et temporels
  )

# Estimer un modèle à coefficients variables pour chaque individu
# Cela revient à estimer une régression en série temporelle par individu
indiv_variable_coef_model <- plm::pvcm(
  static_spec, # Spécification du modèle
  data = df_panel, # Données du modèle
  model = "within", # Indiquer que les coefficients variables sont fixes
  effect = "individual" # Indiquer que l'on veut les coefficients variables
  par année
)

# Effectuer le test de Poolability en comparant les deux modèles via un
F-test
pooltest(
  FE_TW_model, # Modèle pooled
  indiv_variable_coef_model # Modèle à coefficients variables
)
```

```
    F statistic

data:  static_spec
F = 10.485, df1 = 33, df2 = 270, p-value < 0.00000000000000022
alternative hypothesis: unstability
```

On rejette l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients de pente sachant que l'on a des

effets fixes individuels et temporels. Il semble donc que l'on ait un panel comportant des effets communs entre les individus et les années et que la relation entre le prix de l'essence et le reste des variable diffère selon les individus mais reste stable au fil des ans.

On peut compléter ce test de poolability par le test Delta de Pesaran. Ce test permet de corriger pour une possible hétérosckédasticité (et de prendre en compte si on le souhaite une corrélation inter-individuelle : voir infra). On teste l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients de pente dans la dimension individuelle contre l'hypothèse alternative de coefficients hétérogènes. Pour ce test, on utilise la fonction `xtbhst::xtbhst()` qui permet de faire le test Delta et le test Delta ajusté. **Attention, cette fonction nécessite un panel cylindré. Il faut que toutes les observations soient disponibles pour tous les individus et toutes les années**.

```r
# Faire le test Delta et le test Delta ajusté
xtbhst::xtbhst(
  formula = static_spec, # Spécification du modèle
  data = df, # Données à utiliser
  id = "country", # Index individuel
  time = "year", # Index temporel
  seed = 123 # Seed pour obtenir des résultats reproductibles
)
```

```
Bootstrap test for slope heterogeneity
(Blomquist & Westerlund, 2015. Empirical Economics)
H0: slope coefficients are homogeneous
---------------------------------------------
         Delta     BS p-value
        9.3908         0.0000
adj.   10.9399         0.0000
---------------------------------------------
Bootstrap replications: 999
Block length: 5
Panel: N = 18 , T = 19 , K = 3
Variables partialled out: 1
```

Ce test utilise une procédure de Bootstrap pour calculer la statistique de test. ici le nombre de réplication de la procédure de Bootstrap est de 999 (valeur par défaut qui peut être modifiée avec le paramètre `reps`). La statistique Delta est de 9.3908 et la p.value associée est inférieure à 0.001. Il en va de même pour la statistique Delta ajustée. On peut donc rejeter l'hypothèse nulle d'homogénéité des coefficients de pente. **Il semble donc qu'il faille utiliser une méthodologie pour prendre en compte une hétérogénéité individuelle complète**.

Corrélation inter-individuelle

La corrélation inter-individuelle est souvent présente dans les données de panel macroéconomiques et financières. En effet, les individus sont souvent interconnectés entre eux et peuvent partager des caractéristiques communes. Ne pas prendre en compte cette corrélation inter-individuelle (surtout quand elle est fortement présente) peut amener nos coefficients estimés à être biaisés. De même, les tests de spécification d'hétérogénéité que l'on a effectués ne prennent pas en compte la possible présence de corrélation inter-individuelle.

Il faut donc tester la présence de corrélation inter-individuelle puis corriger le test d'hétérogénéité si nécessaire.

Tester la présence de corrélation inter-individuelle

La fonction `plm::pcdtest()` permet d'effectuer différents tests de corrélation inter-individuelle. L'hypothèse nulle de ces tests est l'absence de corrélation inter-individuelle suffisamment forte tandis que l'hypothèse alternative indique la présence de corrélation inter-individuelle suffisamment forte.

Les tests disponibles sont :

- Le test LM de Breusch-Pagan (utilisable avec le paramètre `test = "lm"`) qui est valide lorsque $T \to \infty$ et n fixe. Ce test est donc valide lorsque la dimension temporelle est grande tandis que la dimension individuelle n'est pas si grande.
- Le test `SCLM` qui est une version augmentée du test LM (utilisable avec le paramètre `test = "sclm"`) qui est valide lorsque $T \to \infty$ puis que $N \to \infty$. Il faut donc une grande dimension temporelle suivie par une grande dimension individuelle.
- Le test $BCSCLM$ qui est une version du test $SCLM$ qui intègre une correction de biais (utilisable avec le paramètre `test = "bcsclm"`).
- Le test CD de Pesaran (utilisable avec le paramère `test = "cd"`)

```
# Tester la présence de corrélation inter-individuelle
plm::pcdtest(
  lrpmg ~ lgaspcar + lcarpcap + lincomep, # Spécification du modèle
  data = df_panel, # Données à utiliser. SI ce n'est pas un pdata.frame il
  faut indiquer les index
  test = "cd" # Le type de test à utiliser. Ici on fait le test CD
)
```

```
    Pesaran CD test for cross-sectional dependence in panels

data:  lrpmg ~ lgaspcar + lcarpcap + lincomep
z = 3.2395, p-value = 0.001198
alternative hypothesis: cross-sectional dependence
```

Les dimensions individuelles et temporelles étant assez faible (inférieures à 30), on utilise le test CD. Le résultat de ce test indique une p.value inférieure à 0.01. On rejette donc l'hypothèse nulle d'absence de corrélation inter-individuelle. Il semblerait donc qu'il existe une corrélation entre les différents pays de notre panel. Cela n'est pas une surprise. En effet, notre panel ne comporte que des pays développés avec des systèmes économiques relativement similaires. Il n'est pas étonnant de voir une corrélation entre eux.

Par défaut la fonction `plm::pcdtest()` va utiliser les résidus des N régressions en série temporelles (un régression par individu) pour tester la dépendance inter-individuelle. Si la dimension temporelle n'est pas assez grande ou si l'on suppose un type de modèle particulier de manière robuste (effet fixe etc…) on peut spécifier le type de modèle à utiliser de la même manière qu'on le ferait avec la fonction `plm::plm()` (voir infra) ou bien utiliser la fonction `plm::pcdtest()` sur l'objet du modèle.

```r
# Estimer le test CD sur un modèle à effets fixes individuels et temporels
plm::pcdtest(
  lrpmg ~ lgaspcar + lcarpcap + lincomep,
  data = df_panel,
  test = "cd",
  model = "within", # Indiquer que l'on utiliser un modèle within (Effets
  fixes)
  effect = "twoways" # Indiquer que l'on veut des effets fixes individuels et
  temporels
)
```

```
    Pesaran CD test for cross-sectional dependence in panels

data:  lrpmg ~ lgaspcar + lcarpcap + lincomep
z = -2.3272, p-value = 0.01996
alternative hypothesis: cross-sectional dependence
```

Ainsi, si l'on suppose que notre modèle est un modèle à effets fixes individuels et temporels, alors on remarque que l'on rejette toujours l'hypothèse nulle de dépendance inter-individuelle mais de manière moins prononcée puisque l'on passe "juste" le seuil de 5%.

Tester l'hétérogénéité corrigé de la CSD

Il semble donc qu'il existe de la dépendance inter-individuelle dans notre panel. On va donc ré-estimer le test Delta en essayant de prendre en compte cette hétérogénéité. Pour cela on va utiliser le paramètre `csa` pour prendre en intégrer les moyennes cross-sectionnelles dans le modèle (modélisation CCE). On va utiliser un nombre de retard égal à $P = T^{1/3} = 2.7 \approx 3$.

```r
# Faire le test Delta et le test Delta ajusté
xtbhst::xtbhst(
  formula = lrpmg ~ lgaspcar + lcarpcap + lincomep, # Spécification du modèle
  data = df, # Données à utiliser
  id = "country", # Index individuel
  time = "year", # Index temporel
  seed = 123, # Seed pour obtenir des résultats reproductibles,
  csa = ~ lgaspcar + lcarpcap + lincomep, # Variables pour lesquelles on
  suppose une corrélation interindividuelle et pour lesquelles on intègre les
  moyennes cross-sectionnelles
  csa_lags = 3
)
```

```
Bootstrap test for slope heterogeneity
(Blomquist & Westerlund, 2015. Empirical Economics)
H0: slope coefficients are homogeneous
---------------------------------------------
         Delta     BS p-value
        3.1316         0.0000
adj.    5.8586         0.0000
---------------------------------------------
Bootstrap replications: 999
Block length: 5
Panel: N = 18 , T = 19 , K = 3
Variables partialled out: 13
```

En ajoutant les moyennes cross-sectionnelles de nos variables, on remarque que nos statistiques de test diminuent mais leur p.value reste toujours largement inférieure à 1%.

En conclusion, notre panel présente de la corrélation inter-individuelle qu'il convient de prendre en compte. De plus, il semble y avoir une forte hétérogénéité individuelle avec la présence d'effets fixes individuels mais également une hétérogénéité dans les relations entre les variables. L'hétérogénité temporelle est moindre et semble se modéliser uniquement par la présence d'effets fixes temporels (dont la présence n'est pas certaine). Il semblerait donc qu'il faille utiliser un modèle à effets hétérogènes couplé avec une prise en compte des effets commun individuels : estimateur CCEMG.

Estimer la relation via l'estimateur CCEMG

On va utiliser l'estimateur CCEMG via la fonction `plm::pmg()` pour obtenir à la fois des coefficients moyens mais également des coefficients individuels de nos relations d'intérêt. Cet estimateur prend en compte les effets communs en intégrant les moyennes cross-sectionnelles (une moyenne par année) (similaire à ce que font les effets temporels mais ici l'impact de ces facteurs commun peut différer selon les individus). Il intègre également une constante par individu pour prendre en compte les spécificités individuelles.

```r
# Estimer le modèle CCEMG
CCEMG_model <-
  plm::pmg(
    formula = static_spec, # Spécification du modèle
    data = df_panel,
    model = "cmg"
  )

summary(CCEMG_model)
```

```
Common Correlated Effects Mean Groups model

Call:
plm::pmg(formula = static_spec, data = df_panel, model = "cmg")

Balanced Panel: n = 18, T = 19, N = 342

Residuals:
          Min.        1st Qu.         Median        3rd Qu.           Max.
-0.20048002853 -0.01822551603  0.00006167806  0.02209816820  0.31365010684

Coefficients:
             Estimate Std. Error z-value    Pr(>|z|)
(Intercept)   0.15263    1.84229  0.0828    0.933972
lgaspcar     -0.81592    0.25235 -3.2333    0.001224 **
lcarpcap     -0.57017    0.18621 -3.0619    0.002199 **
lincomep      0.14747    0.25826  0.5710    0.567985
y.bar         0.94967    0.17951  5.2904 0.000000122 ***
lgaspcar.bar  0.55932    0.47983  1.1657    0.243745
lcarpcap.bar  0.54941    0.28706  1.9139    0.055628 .
lincomep.bar -0.24105    0.52408 -0.4599    0.645555
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Total Sum of Squares: 156.86
```

```
Residual Sum of Squares: 0.61723
Multiple R-squared: 0.99606
```

L'estimation CCEMG nous indique que lorsque la consommation moyenne d'essence par voiture (lgaspcar) augmente de 1%, le prix réel de l'essence diminue en moyenne de 0.82% ce qui est étrange puisque l'on s'attendrait à ce que d'avantage de consommation fasse augmenter les prix. Le nombre de voiture dans le pays a également un effet moyen qui est négatif et de 0.57% sur le prix de l'essence. Encore une fois il s'agit d'un résultat étonnant. Le revenu du pays n'a pas d'impact significatif en moyenne sur le prix de l'essence.

Ces résultats sont les résultats moyens pour tous les pays. l'estimation CCEMG permet d'obtenir les résultats par pays issus des régressions en séries temporelles individuelles.

```r
CCEMG_model$indcoef
```

```
                AUSTRIA    BELGIUM     CANADA    DENMARK     FRANCE
                GERMANY
(Intercept)   1.3678503 -9.1794191  7.6990514 -2.1212995 -0.3307303
1.8660321
lgaspcar     -0.3948224 -0.8556216 -2.0854330  0.9296118 -0.2467680
-1.8624117
lcarpcap      0.6762589 -0.7504350 -1.3266289 -0.8866453 -1.7989258
-0.7787061
lincomep      0.5532496  1.3106272  0.8619839  0.2796780 -0.1734651
1.4014280
y.bar         1.0951499  1.2252838  0.1180571 -0.2157209  0.5194410
1.7517338
lgaspcar.bar  0.7369905  3.6960637 -0.4864622 -1.9126311 -1.6629272
1.9333126
lcarpcap.bar -0.5808246  2.1411151 -0.4625439  0.3427695  0.5172143
1.5420447
lincomep.bar -0.2072073 -2.8544356  1.0673775 -0.5002918  0.5068533
-2.1156556
                  GREECE     IRELAND      ITALY      JAPAN   NETHERLA
(Intercept)  14.21230858 -18.1019592 -9.4257814  6.9547506 -0.3326847
lgaspcar      0.14198162   1.2235774 -2.2517143 -1.0213825 -0.4266361
lcarpcap      0.01149866   0.9115735 -1.2064750 -0.9073984  0.1312238
lincomep      0.86487860   0.1713215  0.5803324 -0.1601536 -0.6602700
y.bar         2.09087674  -0.1350166  1.1393199  1.2015542  0.2841769
lgaspcar.bar -2.40145866   0.3181652  4.2120851 -1.1036966  0.3898325
lcarpcap.bar -1.47432539   1.1248453  3.3897414  0.4616239 -0.9137828
lincomep.bar  1.79508357  -4.9935777 -3.8857799  0.4759312  1.7650766
                 NORWAY      SPAIN     SWEDEN   SWITZERL     TURKEY
                 U.K.
```

```
(Intercept)   5.4725816  4.7110872 -8.3422162 -0.7452816  9.4502347
-2.0495257
lgaspcar     -1.4374048 -0.9097999 -0.4864916 -1.2222925 -0.6793794
-2.9877958
lcarpcap     -1.0350956 -0.5985680 -0.2301795 -1.7890254 -0.9315784
-0.2921854
lincomep      0.4821574 -1.1964825 -0.2745544  1.7425352 -0.3420708
-3.0682569
y.bar         0.2628635  1.9679719  0.5500385  0.8108875  1.2577164
2.3830955
lgaspcar.bar  0.6337570  1.6486297  0.7049581  1.8490789 -2.2557296
3.7915966
lcarpcap.bar -0.3088859  0.6842317  0.7729245  2.0381059 -0.5987364
1.0324581
lincomep.bar  1.8763455  2.0858700 -1.2679560 -1.7884217  2.4652081
2.1445879
                  U.S.A.
(Intercept)   1.64235130
lgaspcar     -0.11370770
lcarpcap      0.53821576
lincomep      0.28156924
y.bar         0.78664825
lgaspcar.bar -0.02376052
lcarpcap.bar  0.18139132
lincomep.bar -0.90786773
```

On remarque que le Danemark, la Grèce et l'Irlande sont les seuls pays pour lesquels la consommation d'essence moyenne des voiture a un impact positif sur le prix de l'essence. Cet effet est très faible pour la Grèce (0.14%) mais bien plus fort pour les deux autres pays (0.93% et 1.23%).

Si on remarque l'impact des facteurs communs, on peut voir qu'ils sont bien différents selon les pays. Il semble donc que le choix de modéliser ces facteurs communs via un modèle CCEMG soit plus intéressante que par l'estimation via effets fixes.

Autres estimateurs

Voici simplement une démonstration d'estimation avec les autres estimateurs vu dans le cours.

Modèle Pooled

```r
plm::plm(
    formula = static_spec,
    data = df_panel,
    model = "pooling"
  ) |>
  summary()
```

```
Pooling Model

Call:
plm::plm(formula = static_spec, data = df_panel, model = "pooling")

Balanced Panel: n = 18, T = 19, N = 342

Residuals:
     Min.   1st Qu.    Median   3rd Qu.      Max.
-0.521957 -0.121154 -0.023379  0.082356  0.695881

Coefficients:
             Estimate Std. Error t-value              Pr(>|t|)
(Intercept)  2.164551   0.117475  18.426 < 0.00000000000000022 ***
lgaspcar    -0.806386   0.027411 -29.418 < 0.00000000000000022 ***
lcarpcap    -0.753218   0.013912 -54.142 < 0.00000000000000022 ***
lincomep     0.982776   0.020508  47.921 < 0.00000000000000022 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    156.86
Residual Sum of Squares: 13.477
R-Squared:      0.91408
Adj. R-Squared: 0.91332
F-statistic: 1198.64 on 3 and 338 DF, p-value: < 0.000000000000000222
```

Les signes sont les mêmes, mais les résultats sont bien plus significatif. L'effet du revenu du pays devient significatif et bien plus élevé.

Modèle FE individuel

```r
plm::plm(
    formula = static_spec,
    data = df_panel,
    effect = "individual",
    model = "within"
  ) |>
  summary()
```

```
Oneway (individual) effect Within Model

Call:
plm::plm(formula = static_spec, data = df_panel, effect = "individual",
    model = "within")

Balanced Panel: n = 18, T = 19, N = 342

Residuals:
      Min.    1st Qu.     Median    3rd Qu.       Max.
-0.4126288 -0.0507743 -0.0055338  0.0615692  0.4216689

Coefficients:
          Estimate Std. Error t-value          Pr(>|t|)
lgaspcar -0.442048   0.060596 -7.2950 0.000000000002355 ***
lcarpcap -0.322220   0.051409 -6.2678 0.000000001179178 ***
lincomep  0.165015   0.095879  1.7211            0.0862 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    5.541
Residual Sum of Squares: 3.7602
R-Squared:      0.32139
Adj. R-Squared: 0.2791
F-statistic: 50.6742 on 3 and 321 DF, p-value: < 0.000000000000000222
```

Intégrer des effets fixes individuels fait largement diminuer l'effet des coefficients et le revenu du pays n'est significatif qu'au seuil de 10%.

Modèle FE temporel

```r
plm::plm(
```

```r
    formula = static_spec,
    data = df_panel,
    effect = "time",
    model = "within"
  ) |>
  summary()
```

```
Oneway (time) effect Within Model

Call:
plm::plm(formula = static_spec, data = df_panel, effect = "time",
    model = "within")

Balanced Panel: n = 18, T = 19, N = 342

Residuals:
    Min.  1st Qu.   Median  3rd Qu.     Max.
-0.51587 -0.13235 -0.02760  0.07779  0.66953

Coefficients:
          Estimate Std. Error t-value              Pr(>|t|)
lgaspcar -0.803014   0.027853 -28.830 < 0.00000000000000022 ***
lcarpcap -0.747919   0.014522 -51.504 < 0.00000000000000022 ***
lincomep  0.987278   0.021022  46.964 < 0.00000000000000022 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    154.94
Residual Sum of Squares: 13.126
R-Squared:      0.91528
Adj. R-Squared: 0.90972
F-statistic: 1152.44 on 3 and 320 DF, p-value: < 0.000000000000000222
```

Intégrer uniquement des effets commun dont l'impact est le même pour tous les pays (effets fixes temporels) ne changement pas vraiment par rapport à l'estimation du modèle Pooled.

Modèle FE twoways (FE temporels et individuels)

```r
plm::plm(
    formula = static_spec,
    data = df_panel,
```

```r
    effect = "twoways",
    model = "within"
  ) |>
  summary()
```

```
Twoways effects Within Model

Call:
plm::plm(formula = static_spec, data = df_panel, effect = "twoways",
    model = "within")

Balanced Panel: n = 18, T = 19, N = 342

Residuals:
       Min.     1st Qu.      Median     3rd Qu.        Max.
-0.46495101 -0.04900742  0.00062483  0.04922169  0.38016210

Coefficients:
          Estimate Std. Error t-value    Pr(>|t|)
lgaspcar -0.324777   0.072180 -4.4995 0.000009718 ***
lcarpcap -0.246369   0.055195 -4.4636 0.000011379 ***
lincomep  0.208368   0.118051  1.7651     0.07856 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    3.6223
Residual Sum of Squares: 3.3631
R-Squared:      0.07157
Adj. R-Squared: -0.044866
F-statistic: 7.78585 on 3 and 303 DF, p-value: 0.000050406
```

```r
plm::plm(
  formula = static_spec,
  data = df_panel,
  effect = "twoways",
  model = "within"
) |>
  fixef(effect = "individual")
```

```
  AUSTRIA   BELGIUM    CANADA   DENMARK    FRANCE   GERMANY    GREECE
  IRELAND
 0.032609  0.146986 -0.193376  0.193609  0.231792 -0.024729  0.376469
 0.246573
```

```
    ITALY     JAPAN  NETHERLA    NORWAY     SPAIN    SWEDEN  SWITZERL
    TURKEY
 0.313284  0.197268  0.122436  0.202154  0.896674 -1.706465 -0.288864
 0.016291
     U.K.    U.S.A.
 0.087876 -0.318448
```

Modèle RE twoways

```r
plm::plm(
    formula = static_spec,
    data = df_panel,
    effect = "twoways",
    model = "random"
  ) |>
  summary()
```

```
Twoways effects Random Effect Model
   (Swamy-Arora's transformation)

Call:
plm::plm(formula = static_spec, data = df_panel, effect = "twoways",
    model = "random")

Balanced Panel: n = 18, T = 19, N = 342

Effects:
                     var    std.dev share
idiosyncratic 0.01109923 0.10535290 0.255
individual    0.03231849 0.17977345 0.743
time          0.00006121 0.00782373 0.001
theta: 0.8668 (id) 0.04622 (time) 0.0461 (total)

Residuals:
      Min.    1st Qu.     Median    3rd Qu.       Max.
-0.4239801 -0.0577904 -0.0012438  0.0559023  0.4511603

Coefficients:
             Estimate Std. Error  z-value              Pr(>|z|)
(Intercept)  0.951989   0.233606   4.0752            0.00004598 ***
lgaspcar    -0.617092   0.054234 -11.3783 < 0.00000000000000022 ***
```

```
lcarpcap    -0.573366   0.036902 -15.5375 < 0.00000000000000022 ***
lincomep     0.652858   0.065615   9.9499 < 0.00000000000000022 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    8.0542
Residual Sum of Squares: 4.4216
R-Squared:      0.45102
Adj. R-Squared: 0.44614
Chisq: 277.682 on 3 DF, p-value: < 0.000000000000000222
```

L'estimation par effets aléatoires nous permet de décomposer la variance imputable aux dimensions individuelles et temporelles de la variance imputable uniquement aux chocs spécifiques des différents individus. La majorité de cette variance s'explique (74%) par les effets individuels tandis que 25% de la variance est imputable aux chocs idiosyncratiques. La dimenssion temporelle ne compte presque pour rien dans la variance.

Modèle PCCE (pooled CCE)

```r
plm::pcce(
  formula = static_spec,
  data = df_panel,
  model = "p"
) |>
  summary()
```

```
Common Correlated Effects Pooled model

Call:
plm::pcce(formula = static_spec, data = df_panel, model = "p")

Balanced Panel: n = 18, T = 19, N = 342

Residuals:
         Min.       1st Qu.        Median       3rd Qu.          Max.
-0.2776556090 -0.0209408050  0.0006877686  0.0264735659  0.2924634568

Coefficients:
         Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|)
lgaspcar -0.54724    0.23324 -2.3463 0.018963 *
lcarpcap -0.67490    0.24344 -2.7723 0.005566 **
```

```
lincomep  0.14013    0.19449  0.7205 0.471194
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Total Sum of Squares: 156.86
Residual Sum of Squares: 0.9405
HPY R-squared: 0.77914
```

Modèle PMG

```r
plm::pmg(
  formula = static_spec,
  data = df_panel,
  model = "mg"
) |>
  summary()
```

```
Mean Groups model

Call:
plm::pmg(formula = static_spec, data = df_panel, model = "mg")

Balanced Panel: n = 18, T = 19, N = 342

Residuals:
        Min.      1st Qu.       Median      3rd Qu.         Max.
-0.249882273 -0.034802350  0.002482562  0.026205410  0.268328074

Coefficients:
            Estimate Std. Error z-value         Pr(>|z|)
(Intercept)  0.60578    0.80152  0.7558          0.44978
lgaspcar    -0.95295    0.14046 -6.7845 0.00000000001165 ***
lcarpcap    -0.52726    0.11365 -4.6392 0.00000349707811 ***
lincomep     0.31316    0.17952  1.7445          0.08108 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Total Sum of Squares: 156.86
Residual Sum of Squares: 1.474
Multiple R-squared: 0.9906
```