

1. 开始接受服务时间服从参数为 λ 的泊松分布过程, 接受服务的的时长服从参数为 λ 的指数分布。

已知每个人接受服务的时间是独立的并服从均值为 20 分钟的指数分布

$$\frac{1}{\lambda} = 20 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{20}, P(N(t) = n) = e^{-\frac{t}{20}} \frac{(\frac{t}{20})^n}{n!}, E(N(t)) = \frac{t}{20}$$

$$E(N(4 \times 60)) = 12, P(N(4 \times 60) = 9) = e^{-12} \frac{12^9}{9!} \approx 0.0874$$

2. 已知天文台观测到的流星流是一个泊松分布过程, 且平均每小时观察到 3 颗流星

$$\Rightarrow E(N(1)) = \lambda 1 = 3, \lambda = 3, P(N(t) = n) = e^{-3t} \frac{(3t)^n}{n!}$$

$$P(N(4) = 0) = e^{-3 \times 4} \frac{(3 \times 4)^0}{0!} = e^{-12}$$

3. 已知乘客按照强度为 λ 强度的泊松分布过程到达火车站

$$\Rightarrow P(N(t) = n) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

$$E\left(\sum_{i=1}^{N(t)} (t - T_i)\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} E\left(\sum_{i=1}^{N(t)} (t - T_i) | N(t) = n\right) P(N(t) = n)$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} E\left(\sum_{i=1}^n (t - T_i)\right) e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(n \cdot t - \sum_{i=1}^n E(T_i)\right) e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (n \cdot t - n \cdot \lambda \cdot t) e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} = t \cdot (1 - \lambda) \cdot e^{-\lambda t} \sum_{n=0}^{+\infty} n \cdot \frac{(\lambda t)^n}{n!}$$

$$= t \cdot (1 - \lambda) \cdot e^{-\lambda t} \cdot (\lambda t) \cdot e^{\lambda t} = \lambda t^2 (1 - \lambda)$$

4. 已知顾客以 6 分钟的平均速率进入某商场, 这一过程可以用泊松分布过程来描述。

\Rightarrow 设 $N_1(t)$ 表示在时间 $(0, t]$ 进入商城的人数, 服从强度为 6 的泊松分布过程

$$P(N_1(t) = n) = e^{-6t} \frac{(6t)^n}{n!}$$

已知进入该商场的每位顾客买东西的概率为 0.9

\Rightarrow 设 $Y(i)$ 表示第 i 位顾客是否购买东西, 1 表示买, 0 表示不买; $Y(i)$ 服从于概率为 0.9 的 0-1 分布

$$\text{设 } X(t) \text{ 表示 } t \text{ 时刻在商场买东西的顾客数, } X(t) = \sum_{i=0}^{N_1(t)} Y(i)$$

$$E(X(t)) = \sum_{n=0}^{+\infty} E(X(t) | N_1(t) = n) P(N_1(t) = n) = \sum_{n=0}^{+\infty} E\left(\sum_{i=0}^n Y(i)\right) e^{-6t} \frac{(6t)^n}{n!} = e^{-6t} \sum_{n=0}^{+\infty} n \cdot 0.9 \cdot \frac{(6t)^n}{n!}$$

$$= e^{-6t} \cdot 0.9 \cdot (6t) \cdot e^{6t} = 5.4t$$