

Análisis Descriptivo información proporcionada por SIVIGILA del 2013 al 2024.

2025-11-13

Contents

Conclusiones generales	2
Perfil de las víctimas	2
Características del hecho y contexto del agresor	2
Atención del hecho	2
Lectura de la base de datos y adaptación de la base de datos	3
Esquema general de la base de datos	3
Análisis descriptivo	5
Análisis univariado	5
Análisis multivariado	12

Conclusiones generales

El siguiente análisis permite identificar patrones relevantes tanto en las características de las víctimas como en los factores asociados a la ocurrencia, contexto y atención de los hechos

Perfil de las víctimas

- La mayoría de las víctimas pertenece al régimen de salud subsidiado, lo que sugiere vulnerabilidad socioeconómica. Dado también a que se este factor se asocia con la posibilidad de hospitalización y atención en salud mental.
- La edad promedio de las víctimas se concentra entre los 14 y 50 años, destacando que la violencia afecta fuertemente a mujeres jóvenes y adultas.

Características del hecho y contexto del agresor

- Se observa una tendencia creciente en los casos reportados por año, con cierta estacionalidad mensual.
- La mayoría de los casos se notifican el mismo día o al día siguiente, aunque en ciertos años (2016, 2019) hubo retrasos significativos.
- El porcentaje de casos de violencia que se informan a las autoridades competentes depende del sexo del agresor, siendo menor cuando el agresor es mujer (36%) frente a hombre (56%), lo que podría reflejar subregistro o sesgos sociales en la denuncia.
- Los diagnósticos CIE-10 más asociados al fallecimiento de las víctimas (choque hipovolémico, paro cardíaco, violencia física, desnutrición severa, sepsis, muerte sin asistencia) indican que la violencia tiene efectos letales directos e indirectos.

Atención del hecho

- Se identifican grandes diferencias departamentales en la remisión a protección y atención en salud mental, con valores superiores al 60% en Vaupés, San Andrés, Guainía y Nariño, y menores al 40% en Sucre, Bogotá y Santander.
- La violencia física es la más frecuente (51.3%), pero solo el 41.8% de las víctimas recibe atención en salud mental, a diferencia de los casos de violencia sexual (69%), donde la atención es mayor.

Lectura de la base de datos y adaptación de la base de datos

La base de datos utilizada para este análisis descriptivo es el resultado de juntar y depurar las bases de datos proporcionadas por SIVIGILA, la cual recopila información sobre los casos sospechosos de violencia de género que fueron reportados. Así, la base depurada tiene un total 862195 de filas y se seleccionaron 59 columnas de interés, las cuales son:

```
## [1] "origen" "consecutive"
## [3] "sexo" "orient_sex"
## [5] "edad_" "grupo_edad"
## [7] "tip_ss" "per_etn"
## [9] "nom_grupo" "gp_discapa"
## [11] "gp_desplaz" "gp_migrant"
## [13] "gp_carcela" "gp_gestan"
## [15] "gp_indigen" "gp_pobicfb"
## [17] "gp_mad_com" "gp_desmovi"
## [19] "gp_psiquia" "gp_vic_vio"
## [21] "gp_otros" "mujer_cabf"
## [23] "antec" "consum_spa"
## [25] "cod_pais_r" "pais_residencia"
## [27] "cod_dpto_r" "departamento_residencia"
## [29] "cod_mun_r" "municipio_residencia"
## [31] "dist_esp_r" "fec_hecho"
## [33] "def_naturaleza" "cod_dpto_o"
## [35] "departamento_ocurrencia" "cod_mun_o"
## [37] "municipio_ocurrencia" "dist_esp_o"
## [39] "area" "zona_conf"
## [41] "escenario" "ambito_lug"
## [43] "sust_vict" "sexo_agre"
## [45] "conv_agre" "fec_not"
## [47] "fec_con" "cod_dpto_n"
## [49] "departamento_notificacion" "cod_mun_n"
## [51] "municipio_notificacion" "dist_esp_n"
## [53] "pac_hos" "con_fin"
## [55] "cbmte" "ac_mental"
## [57] "remit_prot" "inf_aut"
## [59] "evi_mlegal"
```

Para conocer más sobre las variables se cuenta con un diccionario de datos que enviaron junto a las bases. Adicional, se cuenta con algunas de las fichas de notificación al SIVIGILA que contienen indicaciones sobre muchas variables, la más actualizada es la ficha de 2024 (Ver aquí).

IMPORTANTE: Como se indicó anteriormente, este análisis es incluyendo los valores faltantes.

Esquema general de la base de datos

Table 1: Data summary

Name	%>%(...)
Number of rows	862195
Number of columns	29

Column type frequency:	
factor	29
Group variables	None

Variable type: factor

skim_variable	n_missing	complete_rate	ordered	n_unique	top_counts
orient_sex	218909	0.75	FALSE	3	Het: 555329, Otr: 59470, OSI: 28487
tip_ss	0	1.00	FALSE	7	Sub: 450432, Con: 327117, No : 40197, Ind: 30716
per_etn	0	1.00	FALSE	7	Otr: 805466, Neg: 30935, Ind: 21316, ROM: 2727
nom_grupo	8822	0.99	FALSE	96	No : 840875, Emb: 2099, Nas: 1902, Way: 1176
mujer_cabf	0	1.00	FALSE	3	No: 673232, Sí: 113876, Sin: 75087
antec	0	1.00	FALSE	3	No: 691027, Sí: 171130, Sin: 38
consum_spa	0	1.00	FALSE	3	No: 765236, Sin: 81005, Sí: 15954
pais_residencia	1342	1.00	FALSE	56	Col: 860529, Ven: 132, Bra: 41, Ecu: 19
departamento_residencia	1342	1.00	FALSE	88	Ant: 144071, Bog: 105358, Val: 101732, Cun: 65308
dist_esp_r	0	1.00	FALSE	4	No: 588359, Sí: 270840, Sin: 2610, No : 386
def_naturaleza	0	1.00	FALSE	11	Fís: 442110, Acc: 160758, Neg: 94826, Psi: 84119
departamento_ocurrencia	0	1.00	FALSE	33	Ant: 144064, Bog: 105554, Val: 101495, Cun: 65329
dist_esp_o	0	1.00	FALSE	2	No: 591394, Sí: 270801
area	0	1.00	FALSE	3	Cab: 682658, Rur: 112720, Cen: 66817
zona_conf	0	1.00	FALSE	3	No: 837537, Sí: 19189, Sin: 5469
escenario	0	1.00	FALSE	11	Viv: 646202, Vía: 105659, Otr: 61169, Edu: 12402
ambito_lug	0	1.00	FALSE	8	Hog: 455911, Sin: 218856, Otr: 125608, Com: 33287
sust_vict	0	1.00	FALSE	3	No: 811829, Sí: 44847, Sin: 5519
sexo_agre	0	1.00	FALSE	4	Mas: 683997, Fem: 158904, Sin: 18270, Int: 1024
conv_agre	0	1.00	FALSE	3	Sí: 425940, No: 405049, Sin: 31206
departamento_notificacion	2	1.00	FALSE	33	Ant: 144388, Bog: 106622, Val: 102638, Cun: 64315
dist_esp_n	0	1.00	FALSE	3	No: 583104, Sí: 279089, Sin: 2
pac_hos	0	1.00	FALSE	3	No: 733851, Sí: 128340, Sin: 4
con_fin	0	1.00	FALSE	3	Sí: 861043, No: 805, Sin: 347
cbmte	525	1.00	FALSE	260	No : 861043, R57: 35, I46: 30, R45: 30
ac_mental	0	1.00	FALSE	3	No: 444551, Sí: 412134, Sin: 5510
remit_prot	0	1.00	FALSE	3	No: 464900, Sí: 356653, Sin: 40642
inf_aut	0	1.00	FALSE	3	Sí: 443302, No: 418856, Sin: 37
evi_mlegal	0	1.00	FALSE	4	No : 680003, No: 125258, Sí: 36002, Sin: 20932

Del resumen anterior se concluye que la mayoría de las víctimas pertenecen al régimen de salud subsidiado y

no son amas de casa. Además, Antioquia es el departamento con mayor número de casos, siendo la vivienda el escenario más frecuente, y generalmente la víctima convive con el agresor.


Análisis descriptivo

Análisis univariado

Análisis edad

Estadístico	Valor
Min.	0.00
1st Qu.	13.00
Median	22.00
Mean	24.24
3rd Qu.	33.00
Max.	131.00


Se observa que los valores de la edad incluyen casos atípicos (máximo de 131 años). Para comprender mejor la distribución, se analiza gráficamente:




se obtiene que el 65% de los casos se concentra entre los 14 y 50 años.

Edad(años)	Casos	F.relativa	F.acumulada
<14	240248	0.2786469	0.2786469
14-50	562048	0.6518804	0.9305273
>50	59899	0.0694727	1.0000000

Con lo anterior surge la pregunta: ¿este comportamiento es constante en el tiempo? La respuesta es sí. Este análisis muestra que a lo largo del período ha aumentado el número de casos, especialmente en personas de 12 a 59 años.




Análisis temporal



El gráfico anterior indica que la fecha de consulta y la fecha del hecho presentan una tendencia creciente, mientras que la fecha de notificación muestra una caída pronunciada en 2024. Sin embargo, esto puede deberse a que se está analizando hechos hasta 2023.


A continuación, se analiza el comportamiento de la fecha hecho dado que es la fecha de interés. Primero se toma la serie mensual para separar tendencia, estacionalidad y residuales:



Se confirma la tendencia general de crecimiento y se evidencia un comportamiento estacionario. Por ello, se calcula la estacionalidad promedio por mes para identificar los períodos en que los casos aumentan o disminuyen regularmente.

Mes (número)	Efecto promedio	Mes
1	567.03507	Jan
5	510.78090	May
3	480.60174	Mar
9	155.56424	Sep
8	119.28090	Aug
2	96.73924	Feb
7	65.23507	Jul
6	-33.20243	Jun
10	-120.89410	Oct
4	-137.50660	Apr
11	-670.32326	Nov
12	-1033.31076	Dec


El primero de enero es una día donde ocurren muchos casos de violencia a comparación del resto de día del año. Para este día se obtiene un total de 12342 casos. Por este motivo, el siguiente gráfico se hace excluyendo este día para entender mejor el comportamiento general:



Los gráficos anteriores permiten concluir que los casos de violencia tienden a concentrarse en los días 5, 10 y 25 de cada mes. Finalmente, se analiza la diferencia en días entre la fecha del hecho y fecha de notificación:

Estadístico	Valor
Min.	0.0
1st Qu.	0.0
Median	1.0
Mean	14.9
3rd Qu.	6.0
Max.	1096.0

Debido a que la distribución presenta asimetría positiva, se opta por continuar el análisis considerando únicamente los registros con valores menores o iguales al percentil 80 (10), con el fin de excluir la cola derecha como se observa en el gráfico de la derecha



La distribución de la diferencia entre la fecha del hecho y la fecha de notificación (gráfico derecho) muestra que la mayoría de los casos se notifican el mismo día o, en promedio, con un día de diferencia. Sin embargo, este comportamiento no ha sido constante en todos los años: en 2016 y 2019 aumentó el tiempo de notificación, disminuyó en 2020 y comenzó a recuperarse en 2022.

Pertenencia a grupo poblacional especial

Para identificar la pertenencia de la víctima a un grupo poblacional especial se cuenta con un conjunto de variables donde cada uno representa un grupo en específico. Se consideran: - Persona en situación de discapacidad

- Desplazada
- Migrante
- Privada de la libertad
- Gestante
- Habitante de calle
- Población a cargo del ICBF
- Madre comunitaria
- Desmovilizada
- En centro psiquiátrico
- Víctima de violencia armada
- Otro grupo poblacional

A este último grupo pertenecen las víctimas que no se identificaron con ninguno de los grupos anteriores.

##		gp_discapa		gp_desplaz		gp_migrant
##	No	:856923	No	:851994	No	:844891
##	Sí	: 5268	Sí	: 10197	Sí	: 17300
##	Sin información:	4	Sin información:	4	Sin información:	4
##		gp_carcela		gp_gestan		gp_indigen
##	No	:860754	No	:808957	No	:860516
##	Sí	: 1437	Sí	: 53234	Sí	: 1675
##	Sin información:	4	Sin información:	4	Sin información:	4
##		gp_pobicfb		gp_mad_com		gp_desmovi
##	No	:857422	No	:861398	No	:861578
##	Sí	: 4769	Sí	: 793	Sí	: 613
##	Sin información:	4	Sin información:	4	Sin información:	4
##		gp_psiquia		gp_vic_vio		
##	No	:860279	No	:835637		
##	Sí	: 1912	Sí	: 26554		
##	Sin información:	4	Sin información:	4		

Una vez conocida la distribución de los grupos, se identifica el número de víctimas que pertenecen a más de un grupo

Nota: cantidad de grupos igual a 0 indica que pertenece al grupo *otros* o no se tiene información.


Se observa que el 90% de las víctimas no se identificaron con alguno de los grupos anteriores. Entre quienes sí lo hacen, predomina la pertenencia a uno o dos grupos simultáneamente.

Cantidad de grupos	Cantidad de registros
0	749689
1	104198
2	7382
3	534
4	100
5	20
6	15
7	33
8	9
9	13
10	44
11	158

Modalidad de violencia

Tipo de violencia	Número casos	Proporción
Física	442110	51.3
Acceso carnal	160758	18.6
Negligencia y abandono	94826	11.0
Psicológica	84119	9.8
Actos sexuales	36589	4.2
Acoso sexual	22359	2.6
Otras violencias sexuales	20135	2.3
Explotación sexual	924	0.1
Trata de personas	185	0.0
Mutilación genital	111	0.0
Sin información	79	0.0

El 51.3% de los casos de violencia corresponde a violencia física, seguido de acceso carnal (18.6%) y negligencia o abandono (11%).



Del gráfico anterior se concluye que, en general, todos los tipos de violencia han aumentado sus casos durante 2025. Sin embargo, el acceso carnal ha disminuido, mientras que otras formas de violencia sexual han incrementado su frecuencia.

Escenario

Escenario	Número casos	Proporción
Vivienda	646202	74.9
Vía Pública	105659	12.3
Otro	61169	7.1
Educativo	12402	1.4
Espacios abiertos	10803	1.3
Expendio alcohol	7083	0.8
Comercio	7076	0.8
Lugar trabajo	6134	0.7
Institución salud	3097	0.4
Sin información	1435	0.2
Deportivo/recreativo	1135	0.1

Se evidencia que la proporción de casos ocurridos en la vivienda es muy alta (74.9%) en comparación con los escenarios de espacio público. Por tanto, se sugiere reagrupar la variable *escenario* en dos categorías: vivienda y espacio público, para facilitar el análisis.

Análisis multivariado

A continuación, se seleccionan 4 variables principales y un conjunto de variables (“predictores”) para cada una, con el fin de encontrar posibles relaciones. Para ello, se aplican pruebas no paramétricas dependiendo del tipo de variables.

Para los predictores cualitativos, se construyen tablas de contingencia y, dependiendo de las frecuencias esperadas, se aplica una prueba de Chi-cuadrado o en caso de valores bajos, la prueba exacta de Fisher. Pero si la tabla es demasiado grande para el cálculo exacto, se recurre a una versión simulada de Fisher basada en Monte Carlo.

En cambio, para predictores cuantitativos se utiliza la correlación de Kruskal–Wallis, ya que no requiere supuestos de normalidad y permite detectar relaciones monotónicas.

Finalmente, los resultados de cada análisis se organizan en una tabla que muestra la variable evaluada, la prueba realizada, los valores estadísticos y de significancia, junto con una interpretación clara sobre si existe o no evidencia estadística de relación con la variable de respuesta.

Hospitalización

La variable de respuesta del primer conjunto de variables analizadas es si la víctima fue o no hospitalizada. Los resultados indican que todas las variables predictoras presentan asociación con esta variable, siendo las más fuertes las que indican el tipo de seguridad social de la víctima y su pertenencia a grupos poblacionales, con un coeficiente de Cramer de 0.7.

Variable	Prueba	Estadístico	Valor p	Coef. Cramer	Decisión asociación
tip_ss	Fisher (simulación)		1e-05	0.71	Posible asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)		1e-05	0.709	Posible asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)		1e-05	0.708	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)		1e-05	0.708	Posible asociación
per_etn	Fisher (simulación)		1e-05	0.707	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)		1e-05	0.707	Posible asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)		1e-05	0.707	Posible asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)		1e-05	0.707	Posible asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)		1e-05	0.707	Posible asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)		1e-05	0.707	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)		1e-05	0.707	Posible asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)		1e-05	0.707	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)		1e-05	0.707	Posible asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)		1e-05	0.707	Posible asociación
antec	Fisher (simulación)		1e-05	0.23	Posible asociación
def_naturaleza	Fisher (simulación)		1e-05	0.225	Posible asociación
sexo_agre	Fisher (simulación)		1e-05	0.054	Posible asociación
consum_spa	Fisher (simulación)		1e-05	0.048	Posible asociación
mujer_cabf	Fisher (simulación)		1e-05	0.034	Posible asociación
sust_vict	Fisher (simulación)		1e-05	0.027	Posible asociación
orient_sex	Fisher (simulación)		1e-05	0.016	Posible asociación
edad__	Kruskal–Wallis	41174.928	0e+00		Posible asociación

Condición final

La variable de respuesta del segundo conjunto de variables corresponde a la condición final de la víctima (viva o muerta). Los resultados muestran que todas las variables predictoras tienen algún grado de asociación, aunque con una fuerza de relación baja según el coeficiente de Cramer (0.0 – 0.08).

Variable	Prueba	Estadístico	Valor p	Coef. Cramer	Decisión asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)		0.00001	0.078	Posible asociación
per_etn	Fisher (simulación)		0.00001	0.077	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)		0.00001	0.077	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
def_naturaleza	Fisher (simulación)		0.00001	0.03	Posible asociación
orient_sex	Chi-cuadrado	1078.998	0.00000	0.029	Posible asociación
antec	Fisher (simulación)		0.00001	0.025	Posible asociación
mujer_cabf	Chi-cuadrado	1043.974	0.00000	0.025	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	1018.591	0.00000	0.024	Posible asociación
sexo_agre	Fisher (simulación)		0.00001	0.019	Posible asociación
sust_vict	Fisher (simulación)		0.00067	0.003	Posible asociación
edad__	Kruskal–Wallis	202.671	0.00000		Posible asociación

Antecedente de violencia

En el tercer conjunto de variables, la variable de respuesta es si la víctima presenta antecedentes de violencia. Se encontró asociación con todas las variables predictoras, siendo la más fuerte aquella que indica si el caso fue informado a las autoridades, con un coeficiente de Cramer de 0.6.

Variable	Prueba	Estadístico	Valor p	Coef. Cramer	Decisión asociación
inf_aut	Fisher (simulación)		1e-05	0.586	Posible asociación
def_naturaleza	Fisher (simulación)		1e-05	0.418	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)		1e-05	0.23	Posible asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)		1e-05	0.23	Posible asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)		1e-05	0.23	Posible asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)		1e-05	0.23	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)		1e-05	0.23	Posible asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)		1e-05	0.23	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)		1e-05	0.23	Posible asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)		1e-05	0.229	Posible asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)		1e-05	0.229	Posible asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)		1e-05	0.229	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)		1e-05	0.229	Posible asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)		1e-05	0.229	Posible asociación
mujer_cabf	Fisher (simulación)		1e-05	0.206	Posible asociación
cod_dpto_r	Fisher (simulación)		1e-05	0.19	Posible asociación
ambito_lug	Fisher (simulación)		1e-05	0.156	Posible asociación
escenario	Fisher (simulación)		1e-05	0.125	Posible asociación
conv_agre	Fisher (simulación)		1e-05	0.105	Posible asociación
sexo_agre	Fisher (simulación)		1e-05	0.08	Posible asociación
zona_conf	Fisher (simulación)		1e-05	0.058	Posible asociación
ac_mental	Fisher (simulación)		1e-05	0.058	Posible asociación
orient_sex	Fisher (simulación)		1e-05	0.054	Posible asociación
consum_spa	Fisher (simulación)		1e-05	0.046	Posible asociación
edad__	Kruskal-Wallis	23232.856	0e+00		Posible asociación

Atención en salud mental

En el cuarto conjunto de variables, la variable de respuesta es si la víctima recibió o no atención en salud mental. Los resultados indican asociación con todas las variables predictoras, siendo la más fuerte la que indica si la víctima convive o no con el agresor, con un coeficiente de Cramer de 0.3.

Variable	Prueba	Estadístico	Valor p	Coef. Cramer	Decisión asociación
conv_agre	Chi-cuadrado	158067.085	0e+00	0.303	Posible asociación
cod_dpto_n	Chi-cuadrado	84064.847	0e+00	0.221	Posible asociación
def_naturaleza	Fisher (simulación)		1e-05	0.218	Posible asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	34103.765	0e+00	0.141	Posible asociación
mujer_cabf	Chi-cuadrado	31943.035	0e+00	0.136	Posible asociación
sexo_agre	Chi-cuadrado	24117.071	0e+00	0.118	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)		1e-05	0.112	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)		1e-05	0.112	Posible asociación
pac_hos	Fisher (simulación)		1e-05	0.09	Posible asociación
zona_conf	Chi-cuadrado	5380.341	0e+00	0.056	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)		1e-05	0.038	Posible asociación
per_etn	Fisher (simulación)		1e-05	0.034	Posible asociación
orient_sex	Fisher (simulación)		1e-05	0.029	Posible asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)		1e-05	0.024	Posible asociación
gp_pobiefb	Fisher (simulación)		1e-05	0.024	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)		1e-05	0.023	Posible asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)		1e-05	0.022	Posible asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)		1e-05	0.022	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)		1e-05	0.019	Posible asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)		1e-05	0.017	Posible asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)		1e-05	0.015	Posible asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)		1e-05	0.015	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)		1e-05	0.014	Posible asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)		1e-05	0.014	Posible asociación
edad__	Kruskal-Wallis	5575.832	0e+00		Posible asociación

Remisión a protección

En el quinto conjunto de variables, la variable de respuesta es si la víctima fue remitida a protección. Todas las variables predictoras muestran asociación, siendo la más fuerte la que indica si la persona es consumidora de SPA, con un coeficiente de Cramer de 0.4.

Variable	Prueba	Estadístico	Valor p	Coef. Cramer	Decisión asociación
consum_spa	Chi-cuadrado	294063.305	0e+00	0.413	Posible asociación
mujer_cabf	Chi-cuadrado	239315.617	0e+00	0.373	Posible asociación
inf_aut	Fisher (simulación)		1e-05	0.276	Posible asociación
sust_vict	Chi-cuadrado	114043.657	0e+00	0.257	Posible asociación
conv_agre	Chi-cuadrado	39125.87	0e+00	0.151	Posible asociación
cod_dpto_n	Chi-cuadrado	38087.07	0e+00	0.149	Posible asociación
def_naturaleza	Fisher (simulación)		1e-05	0.125	Posible asociación
zona_conf	Chi-cuadrado	9641.01	0e+00	0.075	Posible asociación
sexo_agre	Chi-cuadrado	9161.245	0e+00	0.073	Posible asociación
pac_hos	Fisher (simulación)		1e-05	0.072	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)		1e-05	0.065	Posible asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)		1e-05	0.047	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)		1e-05	0.038	Posible asociación
area	Chi-cuadrado	2120.02	0e+00	0.035	Posible asociación
orient_sex	Fisher (simulación)		1e-05	0.033	Posible asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)		1e-05	0.032	Posible asociación
antec	Fisher (simulación)		1e-05	0.03	Posible asociación
per_etn	Fisher (simulación)		1e-05	0.029	Posible asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)		1e-05	0.022	Posible asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)		1e-05	0.02	Posible asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)		1e-05	0.02	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)		1e-05	0.011	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)		1e-05	0.011	Posible asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)		1e-05	0.008	Posible asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)		1e-05	0.007	Posible asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)		1e-05	0.007	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)		2e-05	0.006	Posible asociación
edad_	Kruskal-Wallis	5833.707	0e+00		Posible asociación

Informe a autoridades competentes

En el último conjunto de variables, la variable de respuesta es si el caso fue informado a las autoridades competentes. Se encontró que todas las variables predictoras están asociadas, siendo la de antecedentes de violencia la de mayor fuerza de relación con un coeficiente de Cramer de 0.6.

Variable	Prueba	Estadístico	Valor p	Coef. Cramer	Decisión asociación
antec	Fisher (simulación)		0.00001	0.586	Posible asociación
def_naturaleza	Fisher (simulación)		0.00001	0.421	Posible asociación
cod_dpto_n	Fisher (simulación)		0.00001	0.245	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)		0.00001	0.136	Posible asociación
tip_ss	Fisher (simulación)		0.00001	0.136	Posible asociación
sexo_agre	Fisher (simulación)		0.00001	0.125	Posible asociación
conv_agre	Fisher (simulación)		0.00001	0.079	Posible asociación
zona_conf	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
zona_conf	Fisher (simulación)		0.00001	0.076	Posible asociación
area	Fisher (simulación)		0.00001	0.075	Posible asociación
sust_vict	Fisher (simulación)		0.00001	0.075	Posible asociación
gp_gestan	Fisher (simulación)		0.00001	0.073	Posible asociación
gp_vic_vio	Fisher (simulación)		0.00001	0.072	Posible asociación
pac_hos	Fisher (simulación)		0.00001	0.068	Posible asociación
per_etn	Fisher (simulación)		0.00001	0.064	Posible asociación
per_etn	Fisher (simulación)		0.00001	0.064	Posible asociación
gp_desplaz	Fisher (simulación)		0.00001	0.061	Posible asociación
gp_discapa	Fisher (simulación)		0.00001	0.059	Posible asociación
gp_pobicfb	Fisher (simulación)		0.00001	0.059	Posible asociación
gp_otros	Fisher (simulación)		0.00001	0.059	Posible asociación
gp_migrant	Fisher (simulación)		0.00019	0.058	Posible asociación
gp_carcela	Fisher (simulación)		0.00021	0.058	Posible asociación
gp_indigen	Fisher (simulación)		0.00011	0.058	Posible asociación
gp_mad_com	Fisher (simulación)		0.00001	0.058	Posible asociación
gp_desmovi	Fisher (simulación)		0.00005	0.058	Posible asociación
gp_psiquia	Fisher (simulación)		0.00001	0.058	Posible asociación
mujer_cabf	Fisher (simulación)		0.00001	0.057	Posible asociación
consum_spa	Fisher (simulación)		0.00001	0.037	Posible asociación
consum_spa	Fisher (simulación)		0.00001	0.037	Posible asociación
orient_sex	Fisher (simulación)		0.00001	0.024	Posible asociación
edad__	Kruskal–Wallis	1159.06	0.00000		Posible asociación


Tipo de seguridad social

Tipo de aseguramiento	Atención en salud mental	Porcentaje
Contributivo	No	52.79
Especial	No	52.64
Excepción	No	29.19
Indeterminado	No	86.58
No asegurado	No	52.82
Sin información	No	25.00
Subsidiado	No	48.67
Contributivo	Sí	46.15
Especial	Sí	45.85
Excepción	Sí	70.81
Indeterminado	Sí	13.40
No asegurado	Sí	45.78
Sin información	Sí	0.00
Subsidiado	Sí	51.01
Contributivo	Sin información	1.06
Especial	Sin información	1.51
Excepción	Sin información	0.00
Indeterminado	Sin información	0.02
No asegurado	Sin información	1.41
Sin información	Sin información	75.00
Subsidiado	Sin información	0.32

Se observa que la mayoría de las víctimas afiliadas a regímenes especiales reciben atención en salud mental (Especial;46%,Excepción;71%), mientras que las víctimas con afiliación indeterminada presentan una cobertura menor (13%).

Modalidad de violencia

Como se evidenció anteriormente, más de la mitad de los casos de violencia contra mujeres corresponde a violencia física (51%). Sin embargo, solo el 41.8% de estas víctimas recibe atención en salud mental, en contraste con los casos de violencia sexual, donde el 69% de las víctimas sí recibió este tipo de atención.



Departamento de notificación

La siguiente tabla muestra la proporción de víctimas que remitieron a protección por departamento.

	No	Sí	Sin información
Amazonas	40.30	56.74	2.96
Antioquia	43.17	52.52	4.31
Arauca	57.66	37.94	4.41
Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina	34.58	63.80	1.62
Atlántico	42.50	54.06	3.45
Bogotá, D.C.	69.29	25.39	5.31
Bolívar	52.85	42.92	4.23
Boyacá	50.38	42.27	7.35
Caldas	48.83	47.11	4.06
Caquetá	51.99	43.85	4.16
Casanare	73.72	20.75	5.53
Cauca	41.35	54.78	3.87
Cesar	56.92	37.70	5.39
Chocó	39.59	55.30	5.12
Córdoba	58.54	38.23	3.22
Cundinamarca	53.55	41.89	4.56
Guainía	48.50	46.20	5.30
Guaviare	44.78	51.87	3.34
Huila	56.01	38.71	5.28
La Guajira	61.43	33.70	4.88
Magdalena	58.25	37.61	4.14
Meta	46.80	48.27	4.93
Nariño	39.74	55.96	4.31
Norte De Santander	63.33	32.76	3.92
Putumayo	45.26	52.48	2.26
Quindío	40.67	54.03	5.30
Risaralda	56.28	39.31	4.41
Santander	66.96	26.63	6.41
Sucre	56.04	38.30	5.65
Tolima	59.92	36.63	3.45
Valle Del Cauca	56.35	38.84	4.81
Vaupés	33.33	65.60	1.07
Vichada	38.51	56.61	4.89

La siguiente tabla muestra la proporción de víctimas remitidas a protección por departamento. Aunque esta atención aplica para todos los tipos de violencia, no se cumple de manera uniforme: algunos departamentos presentan más del 60% de remisiones [Vaupés (66%), San Andrés (64%)], mientras que en otros el porcentaje no supera el 30% [Casanare (21%), Bogotá (26%), Santander (27%)].

Ahora bien, al analizar el porcentaje de víctimas que recibieron atención en salud mental, se observa que en San Andrés (62%) y Vaupés (72%) los valores también son altos. En Casanare el porcentaje mejora respecto a la remisión a protección, pero Bogotá y Santander continúan con niveles bajos. Además, destacan Guanía y Nariño con porcentajes superiores al 70%, frente a Sucre, donde menos del 40% recibió atención.

	No	Sí	Sin información
Amazonas	32.38	67.62	0.00
Antioquia	58.36	41.63	0.01
Arauca	43.65	56.35	0.00
Archipiélago De San Andrés, Providencia Y Santa Catalina	37.70	62.30	0.00
Atlántico	38.60	61.40	0.00
Bogotá, D.C.	63.11	31.70	5.18
Bolívar	49.54	50.46	0.00
Boyacá	50.40	49.60	0.01
Caldas	42.24	57.75	0.00
Caquetá	42.15	57.84	0.01
Casanare	42.89	57.10	0.01
Cauca	35.37	64.61	0.01
Cesar	54.85	45.15	0.00
Chocó	34.47	65.49	0.04
Córdoba	59.04	40.95	0.01
Cundinamarca	58.44	41.56	0.00
Guainía	26.15	73.73	0.12
Guaviare	42.57	57.43	0.00
Huila	43.60	56.40	0.00
La Guajira	59.52	40.47	0.01
Magdalena	51.89	48.11	0.00
Meta	51.19	48.81	0.00
Nariño	21.63	78.37	0.00
Norte De Santander	57.18	42.79	0.03
Putumayo	12.31	87.69	0.00
Quindío	50.78	49.22	0.00
Risaralda	52.09	47.91	0.00
Santander	63.37	36.62	0.01
Sucre	65.62	34.38	0.01
Tolima	58.41	41.58	0.01
Valle Del Cauca	41.86	58.13	0.00
Vaupés	28.31	71.69	0.00
Vichada	43.20	56.80	0.00

Informe a las autoridades

Se encontró que cuando el agresor es mujer, solo el 36% de los casos se informa a las autoridades, mientras que cuando el agresor es hombre, el porcentaje asciende a 56%

	No	Sí	Sin información
Femenino	64.47	35.53	0.0
Intersexual	40.04	59.96	0.0
Masculino	44.26	55.74	0.0
Sin información	72.48	27.32	0.2

Diagnósticos

Los cinco principales diagnósticos CIE-10 asociados al fallecimiento de las víctimas fueron: choque hipovolémico, paro cardíaco, violencia física, desnutrición proteico-calórica severa, sepsis y muerte sin asistencia.

Diagnóstico	Número de casos	Proporción
R571	35	5.582
I469	30	4.785
R456	30	4.785
E43X	18	2.871
A419	17	2.711
R98X	17	2.711