数学分析 A3 作业

林晓烁

https://xiaoshuo-lin.github.io

2023 年 10 月 21 日

目录

第十四章 数项级数 **1**

§14.1 无穷级数的基本性质 1

§14.2 正项级数的比较判别法 1

§14.3 正项级数的其他判别法 3

§14.4 任意项级数 4

§14.5 绝对收敛和条件收敛 6

§14.6 级数的乘法 9

§14.7 无穷乘积 11

第十五章 函数项级数 **12**

§15.1 问题的提出 12

§15.2 一致收敛 13

§15.3 极限函数与和函数的性质 16

§15.4 由幂级数确定的函数 18

第十四章　数项级数

§14.1　无穷级数的基本性质

练习 (14.1.6(2)(4)) 证明下列级数发散：

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2+1}{3n^2-2}$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$.

证明 (2) 由 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left|(-1)^n\frac{n^2+1}{3n^2-2}\right|=\frac{1}{3}\neq 0$ 可知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2+1}{3n^2-2}$ 发散.

(4) 由 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n=\exp\left(\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}}\right)\xlongequal[x=\frac{1}{n}]{\text{L'Hospital 法则}}\exp\left(\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x-1}\right)=\frac{1}{\mathrm{e}}\neq 0$ 可知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$ 发散. □

练习 (14.1.7) 设 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. 证明：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$ 也收敛. 试举例说明其逆命题不成立. 但若 $a_n>0$，则逆命题也成立，试证之.

证明 由定理 (14.1.5)，$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_{n+1}$ 收敛，再由定理 (14.1.2) 即得 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$ 收敛.

逆命题不成立的例子：取 $a_n=(-1)^n$，则 $a_n+a_{n+1}=0$，$\forall n$，但 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ 发散.

若 $a_n>0$，由定理 (14.1.5)，从 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$ 收敛可得 $\displaystyle a_1+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$ 收敛. 再由 $a_n>0$ 及定理 (14.1.4)、定理 (14.1.3) 得 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}2a_n$ 收敛. 由定理 (14.1.2) 得 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\cdot 2a_n$ 收敛. □

练习 (14.1.8) 设数列 $\{na_n\}$ 与级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n+1})$ 都收敛. 证明：级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 也收敛.

证明 由

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty}a_n&=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N}[n-(n-1)]\,a_n=\lim_{N\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N}na_n-\sum_{n=1}^{N}(n-1)a_n\right)\\&=\lim_{N\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N}na_n-\sum_{n=1}^{N-1}na_{n+1}\right)=\lim_{N\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{N-1}n(a_n-a_{n+1})+Na_N\right)\\&=\sum_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n+1})+\lim_{N\to\infty}Na_N\end{aligned}$$

即知 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. □

§14.2　正项级数的比较判别法

练习 (14.2.2(1)(3)(5)(7)(9)) 用比较判别法讨论下列级数的敛散性：

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3n^2+5}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n^2}{3n^2+1}\right)^n$；

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+1}{n(n+2)}$；

(7) $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}}$；

(9) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(n^{1/(n^2+1)}-1\right)$.

解 (1) 因为 $\dfrac{1}{3n^2+5}<\dfrac{1}{3n^2}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{3n^2}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{3n^2+5}$ 也收敛.

(3) 因为 $\left(\dfrac{n^2}{3n^2+1}\right)^n<\dfrac{1}{3^n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{3^n}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n^2}{3n^2+1}\right)^n$ 也收敛.

(5) 因为 $\dfrac{n+1}{n(n+2)}>\dfrac{n+1}{(n+1)^2}=\dfrac{1}{n+1}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+1}{n(n+2)}$ 也发散.

(7) 对于充分大的 n，$\dfrac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}}=\dfrac{1}{\mathrm{e}^{(\ln\ln n)^2}}>\dfrac{1}{\mathrm{e}^{\ln n}}=\dfrac{1}{n}$，而 $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=3}^{\infty}\dfrac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}}$ 也发散.

(9) 由 $n^{1/(n^2+1)}-1=\mathrm{e}^{\frac{\ln n}{n^2+1}}-1\sim\dfrac{\ln n}{n^2+1}\ (n\to\infty)$ 及 $\dfrac{\frac{\ln n}{n^2+1}}{n^{-\frac{3}{2}}}\sim\dfrac{\ln n}{\sqrt{n}}\to 0\ (n\to\infty)$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(n^{1/(n^2+1)}-1\right)$ 收敛. □

练习 (14.2.8) 问 p,q 取何值时，级数

$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{1}{n(\ln n)^p(\ln\ln n)^q}$$

收敛？

解 由 Cauchy 积分判别法，此级数与积分

$$\int_3^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^p(\ln\ln x)^q}\,\mathrm{d}x=\int_{\ln 3}^{+\infty}\frac{1}{t^p(\ln t)^q}\,\mathrm{d}t$$

同敛散.

① 若 $p=1$，则由

$$\int_{\ln 3}^{+\infty}\frac{1}{t(\ln t)^q}\,\mathrm{d}t=\int_{\ln\ln 3}^{+\infty}\frac{1}{u^q}\,\mathrm{d}u$$

知当 $q>1$ 时级数收敛，而当 $q\leqslant 1$ 时级数发散.

② 若 $p>1$，设 $p=\alpha+\varepsilon$，其中 $\alpha>1$，$\varepsilon>0$，则对充分大的 t 有 $t^{\varepsilon}(\ln t)^q>1$，从而

$$\frac{1}{t^p(\ln t)^q}=\frac{1}{t^{\alpha}(t^{\varepsilon}(\ln t)^q)}<\frac{1}{t^{\alpha}},$$

由 $\int_{\ln\ln 3}^{+\infty}\dfrac{1}{t^{\alpha}}\,\mathrm{d}t$ 收敛得 $\int_{\ln\ln 3}^{+\infty}\dfrac{1}{t^p(\ln t)^q}\,\mathrm{d}t$ 收敛，从而级数收敛.

③ 若 $p<1$，设 $p=\alpha-\varepsilon$，其中 $\alpha<1$，$\varepsilon>0$，则对充分大的 t 有 $\dfrac{t^{\varepsilon}}{(\ln t)^q}>1$，从而

$$\frac{1}{t^p(\ln t)^q}=\frac{t^{\varepsilon}}{t^{\alpha}(\ln t)^q}>\frac{1}{t^{\alpha}},$$

由 $\int_{\ln\ln 3}^{+\infty}\dfrac{1}{t^p(\ln t)^q}\,\mathrm{d}t$ 发散得 $\int_{\ln\ln 3}^{+\infty}\dfrac{1}{t^p(\ln t)^q}\,\mathrm{d}t$ 发散，从而级数发散. □

练习 (14.2.12) 设 $a_n>0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n<+\infty$，$\alpha>0$，$\beta>0$ 且 $\alpha+\beta>1$. 证明：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n^{\alpha}}{n^{\beta}}<+\infty.$$

证明 ① 当 $0<\alpha<1$ 时，$\dfrac{\beta}{1-\alpha}>1$. 令 $\alpha=\dfrac{1}{p}$，$1-\alpha=\dfrac{1}{q}$，则对共轭指数 p,q 用 Young 不等式有

$$\frac{a_n^{\alpha}}{n^{\beta}}=\frac{a_n^{\frac{1}{p}}}{\left(n^{\frac{\beta}{1-\alpha}}\right)^{\frac{1}{q}}}\leqslant\frac{a_n}{p}+\frac{1}{q}n^{-\frac{\beta}{1-\alpha}}=\alpha a_n+\frac{1-\alpha}{n^{\frac{\beta}{1-\alpha}}}.$$

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1-\alpha}{n^{\frac{\beta}{1-\alpha}}}$ 均收敛可得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n^{\alpha}}{n^{\beta}}$ 收敛.

② 当 $\alpha\geqslant 1$ 时，由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n<+\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，即对充分大的 n 有 $a_n\in(0,1)$ 且 $n^{\beta}>1$，此时 $0<a_n^{\alpha}\leqslant a_n$，从而 $0<\dfrac{a_n^{\alpha}}{n^{\beta}}\leqslant a_n^{\alpha}\leqslant a_n$，故由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n^{\alpha}}{n^{\beta}}$ 收敛. □

§14.3　正项级数的其他判别法

练习 (14.3.1(1)(3)(5)(7)) 讨论下列级数的敛散性：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n\tan\dfrac{\pi}{2^{n+1}}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^5}{3^n}\left(\sqrt{3}+(-1)^n\right)^n$；

(5) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{n+(1/n)}}{(n+1/n)^n}$；

(7) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n-4}{3n+1}\right)^n$.

解 (1) 因为 $\sqrt[n]{n\tan\dfrac{\pi}{2^{n+1}}}\sim\sqrt[n]{\dfrac{n\pi}{2^{n+1}}}=\dfrac{1}{2}\sqrt[n]{\dfrac{n\pi}{2}}\to\dfrac{1}{2}<1\ (n\to\infty)$，所以由 Cauchy 判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n\tan\dfrac{\pi}{2^{n+1}}$ 收敛.

(3) 因为 $\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{n^5}{3^n}\left(\sqrt{3}+(-1)^n\right)^n}=\limsup\limits_{n\to\infty}\left[n\sqrt[n]{n^5}\dfrac{\sqrt{3}+(-1)^n}{3}\right]=\dfrac{\sqrt{3}+1}{3}<1$，所以由 Cauchy 判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^5}{3^n}\left(\sqrt{3}+(-1)^n\right)^n$ 收敛.

(5) 因为 $\dfrac{n^{n+(1/n)}}{(n+1/n)^n}=\dfrac{\sqrt[n]{n}}{\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^n}=\dfrac{\sqrt[n]{n}}{\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}}}\to 1\ (n\to\infty)$，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^{n+(1/n)}}{(n+1/n)^n}$ 发散.

(7) 因为 $\sqrt[n]{\left(\dfrac{n-4}{3n+1}\right)^n}=\dfrac{n-4}{3n+1}\to\dfrac{1}{3}\ (n\to\infty)$，所以由 Cauchy 判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{n-4}{3n+1}\right)^n$ 收敛. □

练习 (14.3.2(2)) 利用 Raabe 判别法，讨论下列级数的敛散性：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!n^{-p}}{q(q+1)\cdots(q+n)}\quad(p>0,q>0).$$

解 因为

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=n\left[\frac{(n+1)^{p-1}(q+n+1)}{n^p}-1\right]=\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{p-1}-1}{\frac{1}{n}}+\left(1+\frac{1}{n}\right)^{p-1}(q+1)\to p+q,\quad n\to\infty,$$

所以当 $p+q>1$ 时级数收敛，当 $p+q<1$ 时级数发散. 当 $p+q=1$ 时，因为

$$\begin{aligned}n\ln n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1-\frac{1}{n}\right)&=\ln n\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-q}(q+n+1)-n-1\right]\\&=\ln n\left[\left(1-\frac{q}{n}+\frac{q(q+1)}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)(q+n+1)-n-1\right]\\&=\ln n\left[\frac{q(q+1)^2}{2n^2}-\frac{q(q+1)}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right]\\&=0,\quad n\to\infty,\end{aligned}$$

所以

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=1+\frac{1}{n}+o\left(\frac{1}{n\ln n}\right),\quad n\to\infty.$$

由 Gauss 判别法得此时级数发散.

综上，当 $p+q>1$ 时级数收敛，当 $p+q\leqslant 1$ 时级数发散. □

§14.4　任意项级数

练习 (14.4.1(3)(4)) 利用 Cauchy 收敛原理，讨论下列级数的敛散性：

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n!}{n(n+1)}$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a\cos n+b\sin n}{n(n+\sin n!)}$.

解 (3) 对任意 $\varepsilon>0$，取 $N=\left\lfloor\frac{1}{\varepsilon}\right\rfloor$，则当 $k>N$ 时，对任意 $p\in\mathbb{N}^*$，有

$$\left|\sum_{n=k}^{k+p}\frac{\cos n!}{n(n+1)}\right|\leqslant\sum_{n=k}^{k+p}\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+p+1}<\frac{1}{k}<\frac{1}{N}<\varepsilon.$$

由 Cauchy 收敛原理知级数收敛.

(4) 对任意 $\varepsilon>0$，取 $N=\left\lfloor\frac{|a|+|b|}{\varepsilon}\right\rfloor+2$，则当 $k>N$ 时，对任意 $p\in\mathbb{N}^*$，有

$$\left|\sum_{n=k}^{k+p}\frac{a\cos n+b\sin n}{n(n+\sin n!)}\right|\leqslant\sum_{n=k}^{k+p}\frac{|a|+|b|}{n(n-1)}=\frac{|a|+|b|}{k-1}-\frac{|a|+|b|}{k+p}<\frac{|a|+|b|}{k-1}<\frac{|a|+|b|}{N-1}<\varepsilon.$$

□

练习 (14.4.5(2)(4)) 讨论下列级数的敛散性：

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$；

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$.

证明 (2) 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$ 知 $\left|(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right|\to 1\neq 0\ (n\to\infty)$，因此数列发散.

(4) 当 $x \neq 2k\pi$ $(k \in \mathbb{N})$ 时，因为数列 $\{\frac{1}{n}\}_{n=1}^{\infty}$ 单调趋于 0，且 $\sum\limits_{n=1}^{N} \sin nx = \left|\dfrac{\cos\frac{x}{2} - \cos\left(N+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}\right| \leqslant \dfrac{1}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|}$ 有界，所以由 Dirichlet 判别法知级数收敛. 当 $x = 2k\pi$ $(k \in \mathbb{N})$ 时，通项均为 0，级数仍收敛. □

练习 (14.4.8) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 证明：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} = 0.$$

证明 设 $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$. 则

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{nS_n - \sum\limits_{k=1}^{n-1} S_k}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n-1} S_k}{n} \\ &\xlongequal{\text{Stolz 定理}} \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = 0.\end{aligned}$$

□

练习 (14.4.11(2)) 讨论下列级数的敛散性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right) \frac{\sin nx}{n}.$$

解 设 $b_k = \dfrac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{k}}{k}$. 先说明 $b_k > b_{k+1}$. 只需证

$$\frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}{n} \cdot \frac{n+1}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}} > 1,$$

即只需证

$$1 + \frac{1}{n} = \frac{n+1}{n} > \frac{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}},$$

而这由

$$\frac{1}{n} > \frac{\frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}}$$

即可得. 再由 Stolz 定理，$\lim\limits_{k\to\infty} b_k = \lim\limits_{k\to\infty} \dfrac{1}{k} = 0$. 因此 $\{b_k\}$ 单调趋于 0.

① 当 $x \neq 2k\pi$ $(k \in \mathbb{N})$ 时，因为 $\sum\limits_{n=1}^{N} \sin nx = \left|\dfrac{\cos\frac{x}{2} - \cos\left(N+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}\right| \leqslant \dfrac{1}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|}$，由 Dirichlet 判别法即得数列收敛.

② 当 $x = 2k\pi$ $(k \in \mathbb{N})$ 时，数列通项均为 0，级数收敛. □

练习 (14.4.12) 设 $a_n > 0$. 证明：如果

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \lambda > 0,$$

那么交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

证明 由所给条件可知当 n 充分大时，$\{a_n\}$ 为递减数列，故可不妨设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 就是递减数列. 因为

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)=\lambda>0,$$

所以存在 $N_1\in\mathbb{N}$，使得当 $n>N$ 时，$n\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)>\dfrac{\lambda}{2}$，即 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}>1+\dfrac{\lambda}{2n}$. 又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\frac{\lambda}{4}}-1}{\frac{1}{n}}=\frac{\lambda}{4},$$

所以存在 $N_2\in\mathbb{N}$，使得当 $n>N_2$ 时，$\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\frac{\lambda}{4}}-1}{\frac{1}{n}}<\dfrac{\lambda}{2}$，即 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{\frac{\lambda}{4}}<1+\dfrac{\lambda}{2n}$.

设 $N=\max\{N_1,N_2\}$，则当 $n>N$ 时，

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}>\left(\frac{n+1}{n}\right)^{\frac{\lambda}{4}}.$$

于是

$$\frac{a_N}{a_n}>\left(\frac{n}{N}\right)^{\frac{\lambda}{4}},\quad \forall n>N,$$

即

$$0<a_n<\left(\frac{N}{n}\right)^{\frac{\lambda}{4}}a_N\to 0,\quad n\to\infty.$$

因此 $\{a_n\}$ 是趋于 0 的递减数列. 由 Leibniz 判别法知交错级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛. □

§14.5　绝对收敛和条件收敛

练习 (14.5.1(2)(4)(6)) 在下列级数中，哪些是绝对收敛的？哪些是条件收敛的？

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^n}\cos nx$;

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n(n-1)/2}\frac{n^{10}}{a^n}$ $(a>1)$;

(6) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{4}}{\ln n}$.

解 (2) 因为 $\left|\dfrac{(-1)^{n-1}}{2^n}\cos nx\right|\leqslant\dfrac{1}{2^n}$，而 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 收敛，所以级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^n}\cos nx$ 绝对收敛.

(4) 由 $a>1$ 知对充分大的 n 有 $a^n>n^{12}$，此时 $\left|(-1)^{n(n-1)/2}\dfrac{n^{10}}{a^n}\right|=\dfrac{n^{10}}{a^n}<\dfrac{1}{n^2}$，而 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，故级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n(n-1)/2}\frac{n^{10}}{a^n}$ 绝对收敛.

(6) 因为数列 $\left\{\dfrac{1}{\ln n}\right\}_{n=2}^{\infty}$ 单调趋于 0，部分和序列 $\left\{\displaystyle\sum_{k=2}^{n}\sin\frac{k\pi}{4}\right\}$ $(n=2,3,\cdots)$ 有界 $1+\sqrt{2}$，所以由 Dirichlet 判别法知级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{4}}{\ln n}$ 收敛. 再由 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\left|\frac{\sin\frac{n\pi}{4}}{\ln n}\right|\geqslant\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin\frac{(8n-6)\pi}{4}}{\ln(8n-6)}=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{\ln(8n-6)}\geqslant\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{8n-7}=+\infty$ 知级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{4}}{\ln n}$ 条件收敛. □

练习 (14.5.2(2)(3)(4)) 讨论下列级数的绝对收敛性和条件收敛性：

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\cos 2n}{n^p}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)$；

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n^{1/n}-1\right)$.

解 (2) ① 若 $p\leqslant 0$，则通项 $(-1)^n\dfrac{\cos 2n}{n^p}$ 不趋于 0，级数发散.

② 若 $0<p\leqslant 1$，注意到 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\cos 2n}{n^p}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos(2+\pi)n}{n^p}$，由部分和序列 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n}\cos(2+\pi)k\right\}$ $(n=1,2,\cdots)$ 有界及数列 $\left\{\dfrac{1}{n^p}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 单调趋于 0，根据 Dirichlet 判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\cos 2n}{n^p}$ 收敛. 下证它不绝对收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{|\cos 2n|}{n^p}=+\infty$. 只需证 $p=1$ 时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{|\cos 2n|}{n}=+\infty$，这是因为

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|\cos 2n|}{n}\geqslant\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos^2 2n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 4n+1}{2n},$$

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\cos 4n}{2n}$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n}$ 发散. 故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\cos 2n}{n^p}$ 条件收敛.

③ 若 $p>1$，则取 $\varepsilon>0$ 使得 $p>1+\varepsilon$，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{|\cos 2n|}{n^p}\leqslant\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\varepsilon}}<+\infty$ 知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{\cos 2n}{n^p}$ 绝对收敛.

(3) 数列 $\left\{\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right\}_{n=1}^{\infty}$ 单调递减趋于 0，由 Leibniz 判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)$ 收敛. 由于

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n&=\exp\left(n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)=\exp\left(n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\right)=\exp\left(1-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\\&=\mathrm{e}\cdot\exp\left(-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)=\mathrm{e}\left(1-\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right),\quad n\to\infty,\end{aligned}$$

此级数通项的绝对值

$$\left|\mathrm{e}-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right|=\frac{\mathrm{e}}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right),\quad n\to\infty.$$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，由比较判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)$ 发散，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(\mathrm{e}-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right)$ 条件收敛.

(4) 当 n 充分大时，数列 $\left\{n^{1/n}-1\right\}$ 单调递减趋于 0，由 Leibniz 判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n^{1/n}-1\right)$ 收敛. 对充分大的 n，$\left|n^{1/n}-1\right|=n^{1/n}-1$，而

$$\sqrt[n]{n}-1=\mathrm{e}^{\frac{\ln n}{n}}-1=\frac{\ln n}{n}+o\left(\frac{\ln n}{n}\right),\quad n\to\infty,$$

由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\ln n}{n}\geqslant\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}=+\infty$ 知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|n^{1/n}-1\right|$ 发散，即级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n^{1/n}-1\right)$ 条件收敛. □

练习 (14.5.5) 把级数

$$1-\frac{1}{2^\alpha}+\frac{1}{3^\alpha}-\frac{1}{4^\alpha}+\frac{1}{5^\alpha}-\frac{1}{6^\alpha}+\cdots\quad(0<\alpha<1)$$

的项重新安排如下：先依次取 p 个正项，接着依次取 q 个负项，再接着依次取 p 个正项，如此继续下去. 证明：所得的新级数收敛的充分必要条件为 $p=q$；当 $p>q$ 时，新级数发散到 $+\infty$，当 $p<q$ 时，新级数发散到 $-\infty$.

证明 设重排之后的新级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$. 对任意给定的正整数 N，记 $m=\left\lfloor \dfrac{N}{p+q} \right\rfloor$，则当 $N\to\infty$ 时，有 $m\to\infty$，且

$$m(p+q)\leqslant N<(m+1)(p+q).$$

把级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和写成

$$\sum_{n=1}^{N} a_n=\sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n+\sum_{n=m(p+q)+1}^{N} a_n.$$

因为 $N-m(p+q)<p+q$，所以上式中第二个和式求和项不超过 $p+q$ 项，从而当 $N\to\infty$ 时，有

$$\left|\sum_{n=m(p+q)+1}^{N} a_n\right|\leqslant \sum_{n=m(p+q)+1}^{N} |a_n|\leqslant \frac{p+q}{[m(p+q)]^{\alpha}}\to 0.$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=1}^{N} a_n=\lim_{m\to\infty}\sum_{n=1}^{m(p+q)} a_n=\lim_{m\to\infty}\left(\sum_{n=1}^{mp}\frac{1}{(2n-1)^{\alpha}}-\sum_{n=1}^{mq}\frac{1}{(2n)^{\alpha}}\right).$$

设 $f(x)=\dfrac{1}{(2x-1)^{\alpha}}$，$g(x)=\dfrac{1}{(2x)^{\alpha}}$. 则由 Euler-Maclaurin 求和公式得

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{mp}\frac{1}{(2n-1)^{\alpha}}&=\sum_{n=1}^{mp} f(n)=\int_1^{mp} f(x)\,\mathrm{d}x+\frac{f(1)+f(mp)}{2}+\int_1^{mp}\widetilde{B}_1(x)f'(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{(2mp-1)^{1-\alpha}-1}{2(1-\alpha)}+\frac{1+\frac{1}{(2mp-1)^{\alpha}}}{2}+\int_1^{mp}\widetilde{B}_1(x)f'(x)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{mq}\frac{1}{(2n)^{\alpha}}&=\sum_{n=1}^{mq} g(n)=\int_1^{mq} g(x)\,\mathrm{d}x+\frac{g(1)+g(mq)}{2}+\int_1^{mq}\widetilde{B}_1(x)g'(x)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{(2mq)^{1-\alpha}-2^{1-\alpha}}{2(1-\alpha)}+\frac{\frac{1}{2^{\alpha}}+\frac{1}{(2mq)^{\alpha}}}{2}+\int_1^{mq}\widetilde{B}_1(x)g'(x)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

其中 $\widetilde{B}_1(x)$ 是第一个 Bernoulli 多项式 $B_1(x)=x-\dfrac{1}{2}$ 在 $[0,1)$ 上的限制函数在 $\mathbb{R}$ 上以 1 为周期的延拓. 由于 $f'(x)=\dfrac{-2\alpha}{(2x-1)^{\alpha+1}}$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增趋于 0，且对任意 $x>1$，积分 $\int_1^{x}\widetilde{B}_1(s)\,\mathrm{d}s$ 存在且有界，根据广义积分的 Dirichlet 判别法即得广义积分 $\int_1^{+\infty}\widetilde{B}_1(x)f'(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 同理可知 $\int_1^{+\infty}\widetilde{B}_1(x)g'(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛. 又有 $\lim\limits_{m\to\infty}\dfrac{1}{(2mp-1)^{\alpha}}=0$ 与 $\lim\limits_{m\to\infty}\dfrac{1}{(2mq)^{\alpha}}=0$. 因此，为判断 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性，只需分析极限

$$\lim_{m\to\infty}\left[(2mp-1)^{1-\alpha}-(2mq)^{1-\alpha}\right].$$

设 $h(x)=x^{1-\alpha}$，则 $h'(x)=\dfrac{1-\alpha}{x^{\alpha}}$. 由有限增量公式，存在 $2mp-1$ 与 $2mq$ 之间的数 ξ，使得

$$(2mp-1)^{1-\alpha}-(2mq)^{1-\alpha}=h(2mp-1)-h(2mq)=(2mp-2mq-1)h'(\xi).$$

- 若 $p=q$，则当 $m\to\infty$ 时，$\xi\to\infty$，上式等于 $-h'(\xi)=\dfrac{\alpha-1}{\xi^{\alpha}}\to 0$. 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

- 若 $p>q$，则当 $m\to\infty$ 时，上式可放缩为

$$\begin{aligned}(2mp-2mq-1)h'(\xi)&\geqslant(2mp-2mq-1)h'(2mq)\geqslant\frac{2mp-2mq-1}{(2mq)^\alpha}\\&\geqslant\frac{2(p-q)m^{1-\alpha}}{(2q)^\alpha}\to+\infty,\quad m\to\infty.\end{aligned}$$

故此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=+\infty$.

- 若 $p<q$，则当 $m\to\infty$ 时，上式可放缩为

$$\begin{aligned}(2mp-2mq-1)h'(\xi)&\leqslant(2mp-2mq-1)h'(2mp-1)\leqslant\frac{2m(p-q)(1-\alpha)}{(2mp)^\alpha}\\&=\frac{2(p-q)(1-\alpha)m^{1-\alpha}}{(2p)^\alpha}\to-\infty,\quad m\to\infty.\end{aligned}$$

故此时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=-\infty$. □

§14.6　级数的乘法

问题 (14.6.1) 证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^\alpha},\quad\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n^\beta}\quad(\alpha>0,\beta>0)$$

的 Cauchy 乘积当 $\alpha+\beta>1$ 时收敛，当 $\alpha+\beta\leqslant1$ 时发散.

证明 由 Leibniz 判别法知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n^\alpha}$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n^\beta}$ 均收敛，设它们的和分别为 A 与 B. 记 $a_n=(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n^\alpha}$，$b_n=(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n^\beta}$，$c_n=\sum\limits_{k=1}^{n}a_kb_{n+1-k}=(-1)^{n-1}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k^\alpha(n+1-k)^\beta}$.

当 $\alpha+\beta\leqslant1$ 时，对充分大的 n，有

$$|c_n|=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^\alpha(n+1-k)^\beta}\geqslant\frac{n}{n^\alpha(n+1-1)^\beta}=n^{1-(\alpha+\beta)}\geqslant1,$$

故 Cauchy 乘积 $\sum\limits_{n=1}^{c_n}$ 发散.

当 $\alpha+\beta>1$ 时，先证明 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=0$.

$$|c_n|=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^\alpha(n+1-k)^\beta}=\sum_{k=1}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}\frac{1}{k^\alpha(n+1-k)^\beta}+\sum_{k=\lfloor\frac{n}{2}\rfloor+1}^{n}\frac{1}{k^\alpha(n+1-k)^\beta},$$

因为当 $1\leqslant k\leqslant\left\lfloor\dfrac{n}{2}\right\rfloor$ 时，$n+1-k\geqslant\left\lfloor\dfrac{n}{2}\right\rfloor$，所以

$$|c_n|\leqslant\frac{1}{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor^\beta}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^\alpha}+\frac{1}{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor^\alpha}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^\beta}.$$

当 $\beta\neq1$ 时，

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^\beta}\sim\int_1^n\frac{\mathrm{d}x}{x^\beta}=\frac{1}{1-\beta}\left(\frac{1}{n^{\beta-1}}-1\right),$$

当 $\beta=1$ 时，

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\sim\ln n,\quad n\to\infty.$$

因此存在常数 $M>0$，使得

$$\frac{1}{\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor^{\beta}}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\alpha}}\leqslant\begin{cases}\dfrac{M}{n^{\alpha+\beta-1}}, & \alpha\neq 1,\\ \dfrac{M}{n^{\beta}}\ln n, & \alpha=1,\end{cases}$$

$$\frac{1}{\left\lfloor\frac{n}{2}\right\rfloor^{\alpha}}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\beta}}\leqslant\begin{cases}\dfrac{M}{n^{\alpha+\beta-1}}, & \beta\neq 1,\\ \dfrac{M}{n^{\alpha}}\ln n, & \beta=1.\end{cases}$$

由 $\alpha>0,\beta>0,\alpha+\beta-1>0$ 即知 $\lim\limits_{n\to\infty}|c_n|=0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=0$.

下证 Cauchy 乘积 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 收敛. 记 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}c_k$. 由

$$\begin{aligned}c_{2n}&=-\sum_{k=1}^{2n}\frac{1}{k^{\alpha}(2n+1-k)^{\beta}}\\&=-\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\alpha}(2n+1-k)^{\beta}}+\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k^{\alpha}(2n+1-k)^{\beta}}\right)\\&=-\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\alpha}(2n+1-k)^{\beta}}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\beta}(2n+1-k)^{\alpha}}\right),\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}c_{2n+1}&=\sum_{k=1}^{2n+1}\frac{1}{k^{\alpha}(2n+2-k)^{\beta}}\\&=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\alpha}(2n+2-k)^{\beta}}+\sum_{k=n+1}^{2n+1}\frac{1}{k^{\alpha}(2n+2-k)^{\beta}}\\&=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\alpha}(2n+2-k)^{\beta}}+\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k^{\beta}(2n+2-k)^{\alpha}},\end{aligned}$$

两式相加得

$$\begin{aligned}|c_{2n}+c_{2n+1}|=&\left|\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\alpha}}\left(\frac{1}{(2n+1-k)^{\beta}}-\frac{1}{(2n+2-k)^{\beta}}\right)\right.\\&\left.+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\beta}}\left(\frac{1}{(2n+1-k)^{\alpha}}-\frac{1}{(2n+2-k)^{\alpha}}\right)-\frac{1}{(n+1)^{\alpha+\beta}}\right|\\\leqslant&\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{1}{k^{\alpha}}\left(\frac{1}{(2n+1-k)^{\beta}}-\frac{1}{(2n+2-k)^{\beta}}\right)+\frac{1}{k^{\beta}}\left(\frac{1}{(2n+1-k)^{\alpha}}-\frac{1}{(2n+2-k)^{\alpha}}\right)\right]\\&+\frac{1}{(n+1)^{\alpha+\beta}}.\end{aligned}$$

易知当 $\gamma>0$ 时，函数 $\dfrac{1}{x^{\gamma}}-\dfrac{1}{(x+1)^{\gamma}}$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格单调递减，于是

$$\frac{1}{(2n+1-k)^{\gamma}}-\frac{1}{(2n+2-k)^{\gamma}}<\frac{1}{(n+1)^{\gamma}}+\frac{1}{(n+2)^{\gamma}}.$$

故

$$|c_{2n}+c_{2n+1}|\leqslant\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\alpha}}\left(\frac{1}{(n+1)^{\beta}}-\frac{1}{(n+2)^{\beta}}\right)+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\beta}}\left(\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}-\frac{1}{(n+2)^{\alpha}}\right)+\frac{1}{(n+1)^{\alpha+\beta}}.$$

由有限增量公式，存在 $\xi\in(n+1,n+2)$，使得

$$\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}-\frac{1}{(n+2)^{\alpha}}=\frac{\alpha}{\xi^{\alpha+1}}\sim\frac{1}{n^{\alpha+1}},\quad n\to\infty.$$

因此存在常数 $M'>0$，使得

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\alpha}}\left(\frac{1}{(n+1)^{\beta}}-\frac{1}{(n+2)^{\beta}}\right)\leqslant\begin{cases}\dfrac{M'}{n^{\alpha+\beta}}, & \alpha\neq 1,\\ \dfrac{M'\ln n}{n^{\beta+1}}, & \alpha=1,\end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^{\beta}}\left(\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}-\frac{1}{(n+2)^{\alpha}}\right)\leqslant\begin{cases}\dfrac{M'}{n^{\alpha+\beta}}, & \beta\neq 1,\\ \dfrac{M'\ln n}{n^{\alpha+1}}, & \beta=1,\end{cases}$$

由此及 $\alpha+\beta>1$，$\alpha+1>1$ 得 $S_{2n+1}=c_1+(c_2+c_3)+\cdots+(c_{2n}+c_{2n+1})$ 收敛，又 $S_{2n+2}=S_{2n+1}+c_{2n+2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}c_{2n+2}=0$，故 S_n 收敛. □

§14.7　无穷乘积

补充题 1 设 $\Gamma(x):=\dfrac{1}{x}\prod\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{x}}{1+\frac{x}{n}}$，$x\neq 0,-1,-2,\cdots$. 证明：

(1) $\Gamma(x)$ 有意义；

(2) $\Gamma(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!n^{x}}{x(x+1)\cdots(x+n)}$；

(3) $\Gamma(x+1)=x\Gamma(x)$；

(4) $\Gamma(1-x)\Gamma(x)=\dfrac{\pi}{\sin(\pi x)}$.

证明 (1) 从

$$\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{x}}{1+\frac{x}{n}}=1+\frac{x(x-1)}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

可知此无穷乘积绝对收敛，因此 $\Gamma(x)$ 的上述定义是有意义的.

(2) 写出上述无穷乘积的部分乘积

$$\frac{(n+1)^{x}}{x(1+x)\left(1+\frac{x}{2}\right)\cdots\left(1+\frac{x}{n}\right)}=\left(\frac{n+1}{n}\right)^{x}\cdot\frac{n!n^{x}}{x(x+1)\cdots(x+n)},$$

就得到

$$\Gamma(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{n!n^{x}}{x(x+1)\cdots(x+n)}.$$

(3) 由 (2) 公式可得

$$\frac{\Gamma(x+1)}{\Gamma(x)}=\lim_{n\to\infty}\frac{nx}{x+n+1}=x,$$

即

$$\Gamma(x+1)=x\Gamma(x).$$

(4) 在定义中将 x 换成 $-x$ 并利用 (3) 公式，得到

$$\Gamma(1-x)=-x\Gamma(-x)=\prod_{n=1}^{\infty}\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{-x}}{1-\frac{x}{n}},$$

再利用正弦函数的无穷乘积公式

$$\sin x=x\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2\pi^2}\right),$$

在其中将 x 换为 πx，就得到

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x)=\frac{1}{x}\prod_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1-\frac{x^2}{n^2}}=\frac{\pi}{\sin\pi x}.$$

□

第十五章　函数项级数

§15.1　问题的提出

练习 (15.1(3)(6)) 求下列函数项级数的收敛点集：

(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x(x+n)}{n}\right)^n$；

(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^ny^n}{x^n+y^n}$ $(x>0,y>0)$.

解 (3) 因为 $\left(\dfrac{x(x+n)}{n}\right)^n=x^n\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n$，而 $\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n\to \mathrm{e}^x$，所以 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x(x+n)}{n}\right)^n$ 收敛当且仅当 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}x^n=0$，即 $x\in(-1,1)$.

(6) 因为

$$\frac{\min\{x^n,y^n\}}{2}=\frac{x^ny^n}{2\max\{x^n,y^n\}}\leqslant\frac{x^ny^n}{x^n+y^n}\leqslant\frac{x^ny^n}{\max\{x^n,y^n\}}=\min\{x^n,y^n\},$$

所以 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^ny^n}{x^n+y^n}$ $(x>0,y>0)$ 与 $\min\{x^n,y^n\}$ 同敛散，故收敛点集为 $\{(x,y)\mid x\in(0,1)$ 或 $y\in(0,1)\}$. □

问题 (15.1.1) 设函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在有界闭区间 $[a,b]$ 上收敛于 $S(x)$. 如果 $u_n(x)$ $(n=1,2,\cdots)$ 都是 $[a,b]$ 上的非负连续函数，证明：$S(x)$ 必在 $[a,b]$ 上取到最小值.

证明 记 $S_n(x)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}u_k(x)$，则 $0\leqslant S_n(x)\leqslant S_{n+1}(x)\leqslant S(x)$，因此集合 $\{S(x)\mid x\in[a,b]\}$ 有下确界 α. 由下确界的定义，对任意 $n\in\mathbb{N}$，存在 $x_n\in[a,b]$，使得 $S(x_n)\in\left[\alpha,\alpha+\dfrac{1}{n}\right)$. 于是 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}S(x_n)=\alpha$. 又因为 $x_n\in[a,b]$，由 Bolzano-Weierstrass 引理，存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于 $x_0\in[a,b]$. 对任意 $m\in\mathbb{N}$，有

$$S_m\left(x_{n_k}\right)\leqslant S\left(x_{n_k}\right)<\alpha+\frac{1}{n_k},$$

令 $k\to\infty$，由于 $S_m(x)$ 在 x_0 处连续，可得 $S_m(x_0)\leqslant\alpha$. 再令 $m\to\infty$ 可得 $S(x_0)\leqslant\alpha$. 结合 α 的定义即得 $S(x_0)=\alpha$. 故 $S(x)$ 在 $[a,b]$ 上可取到最小值. □

问题 (15.1.2) 第 1 题中的 $S(x)$ 是否一定能取到最大值？

解 不一定，反例如下. 设

$$f_n(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant 1-\dfrac{1}{n},\\ (1-n)(x-1), & 1-\dfrac{1}{n}<x\leqslant 1,\end{cases}\quad n\geqslant 1,$$

并规定 $f_0(x)\equiv 0$. 取 $u_n(x)=f_n(x)-f_{n-1}(x)$，则

$$S(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 0, & x=1.\end{cases}$$

故 $S(x)$ 在 $[0,1]$ 上取不到最大值. □

问题 (15.1.3) 把第 1 题中的有界闭区间换成开区间或无穷区间，结论是否还成立？

解 不成立，反例如下.

① 设 $u_n(x)=x^{n-1}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $(0,1)$ 上收敛于 $S(x)=\dfrac{1}{1-x}$，$S(x)$ 在 $(0,1)$ 上取不到最小值.

② 设 $f_n(x)=\begin{cases}\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n, & n\geqslant 1,\\ 0, & n=0.\end{cases}$ 取 $u_n(x)=f_n(x)-f_{n-1}(x)$，则 $S(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f_n(x)=\mathrm{e}^x$ 在 $(0,+\infty)$ 上取不到最小值.【若要求在 $(-\infty,+\infty)$ 上，可取 $u_n(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^x, & n=1,\\ 0, & n\geqslant 2.\end{cases}$】 □

§15.2　一致收敛

练习 (15.2.1) 研究下列函数列在指定区间上的一致收敛性：

(1) $f_n(x)=\dfrac{1}{1+nx}$：(a) $0<x<+\infty$；(b) $0<\lambda<x<+\infty$.

(2) $f_n(x)=\dfrac{x^n}{1+x^n}$：(a) $0\leqslant x\leqslant 1-\lambda$；(b) $1-\lambda\leqslant x\leqslant 1+\lambda$；(c) $1+\lambda\leqslant x<+\infty$ $(\lambda>0)$.

(3) $f_n(x)=\mathrm{e}^{-(x-n)^2}$：(a) $-l<x<l$ $(l>0)$；(b) $-\infty<x<+\infty$.

解 (1) 当 $n\to\infty$ 时，$f_n(x)\to f(x)=\begin{cases}1, & x=0,\\ 0, & x\neq 0.\end{cases}$

(a) 因为对任意 n 都有 $f_n\left(\dfrac{1}{n}\right)=\dfrac{1}{2}$，所以 $\sup\limits_{x\in(0,+\infty)}|f_n(x)-f(x)|\geqslant\dfrac{1}{2}$，故 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛.

(b) 因为 $\sup\limits_{x\in(\lambda,+\infty)}|f_n(x)-f(x)|=\sup\limits_{x\in(\lambda,+\infty)}\dfrac{1}{1+nx}<\dfrac{1}{1+n\lambda}$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in(\lambda,+\infty)}|f_n(x)-f(x)|=0$，故 $\{f_n(x)\}$ 在 $(\lambda,+\infty)$ 上一致收敛.

(2) 当 $n\to\infty$ 时，$f_n(x)\to f(x)=\begin{cases}0, & x\in[0,1),\\ \dfrac{1}{2}, & x=1,\\ 1, & x\in(1,+\infty).\end{cases}$

(a) 对任意的 $n\in\mathbb{N}$，$f_n(x)=1-\dfrac{1}{1+x^n}$ 在 $[0,1)$ 上单调减，因此 $|f_n(x)-f(x)|=f(x)\leqslant f(1-\lambda)=1-\dfrac{1}{1+(1-\lambda)^n}$，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in[0,1-\lambda]}|f_n(x)-f(x)|=0$，故 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1-\lambda]$ 上一致收敛.

(b) 对充分大的 n，$2^{\frac{1}{n}}\in[1-\lambda,1+\lambda]$，而 $f\left(2^{\frac{1}{n}}\right)=\dfrac{2}{3}$，所以 $\sup\limits_{x\in[1-\lambda,1+\lambda]}|f_n(x)-f(x)|\geqslant\dfrac{1}{6}$，故 $\{f_n(x)\}$ 在 $[1-\lambda,1+\lambda]$ 上不一致收敛.

(c) 对 $x\in[1+\lambda,+\infty)$，$|f_n(x)-f(x)|=\dfrac{1}{1+x^n}\leqslant\dfrac{1}{1+(1+\lambda)^n}$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in[1+\lambda,+\infty)}|f_n(x)-f(x)|=0$，故 $\{f_n(x)\}$ 在 $[1+\lambda,+\infty)$ 上一致收敛.

(3) 当 $n\to\infty$ 时，$f_n(x)\to f(x)\equiv 0$.

(a) 对 $x\in(-l,l)$，当 $n>l$ 时，$|f_n(x)-f(x)|=\mathrm{e}^{-(x-n)^2}<\mathrm{e}^{-(l-n)^2}$，因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in(-l,l)}|f_n(x)-f(x)|=0$，故 $\{f_n(x)\}$ 在 $(-l,l)$ 上一致收敛.

(b) 因为对任意 n 都有 $f_n(n)=1$，所以 $\sup\limits_{x\in(-\infty,+\infty)}|f_n(x)-f(x)|\geqslant 1$，故 $\{f_n(x)\}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上不一致收敛. □

练习 (15.2.2(4)(5)(6)(7)) 研究下列级数在指定区间上的一致收敛性：

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}$，$(-\infty,+\infty)$；

(5) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left(1+\frac{x}{n\ln^2 n}\right)$，$(-l,l)$ $(l>0)$；

(6) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+\sin x}$，$[0,2\pi]$；

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{1}{3^n x}$，$(0,+\infty)$.

解 (4) 因为 $\left|\dfrac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}\right|\leqslant\dfrac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$,而级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ 收敛,所以由 Weierstrass 判别法得级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 一致收敛.

(5) 因为 $\left|\ln\left(1+\dfrac{x}{n\ln^2 n}\right)\right|\leqslant-\ln\left(1-\dfrac{l}{n\ln^2 n}\right)\sim\dfrac{l}{n\ln^2 n}$ $(n\to\infty)$，而由 Cauchy 积分判别法可知级数 $\displaystyle\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^2 n}$ 收敛，所以由 Weierstrass 判别法得级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left(1+\frac{x}{n\ln^2 n}\right)$ 在区间 $(-l,l)$ $(l>0)$ 上一致收敛.

(6) 对任意 $x\in[0,2\pi]$，$\left|\dfrac{1}{n+\sin x}\right|\leqslant\dfrac{1}{n-1}$，故数列 $\left\{\dfrac{1}{n+\sin x}\right\}_{n=2}^{\infty}$ 一致单调递减趋于 0，又级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n$ 的部分和一致有界 1，所以由 Dirichlet 判别法知级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+\sin x}$ 在区间 $[0,2\pi]$ 上一致收敛.

(7) 记 $u_n(x)=2^n\sin\dfrac{1}{3^n x}$，则对任意正整数 n，$u_n\left(\dfrac{2}{3^n\pi}\right)=2^n>1$，因此 $u_n(x)\not\rightrightarrows 0$. 由 Cauchy 收敛原理知级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{1}{3^n x}$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上不一致收敛. □

练习 (15.2.7) 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上的连续函数列. 证明：如果 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b)$ 内的每一点收敛，但 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(b)$ 发散，那么 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b)$ 上不一致收敛.

证明 若 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b)$ 上一致收敛，由 Cauchy 收敛原理，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $N\in\mathbb{N}$，使得对任意 $n>N$ 与 $p\in\mathbb{N}$，有 $\left|\displaystyle\sum_{k=n}^{n+p}u_k(x)\right|<\varepsilon$. 由 $u_k(x)$ 的连续性，令 $x\to b^-$ 就有 $\left|\displaystyle\sum_{k=n}^{n+p}u_k(b)\right|\leqslant\varepsilon$. 这说明级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(b)$ 收敛，与已知矛盾. 故 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b)$ 上不一致收敛. □

练习 (15.2.11) 证明：函数列

$$f_n(x)=xn^{-x}(\ln n)^{\alpha}\quad(n=1,2,\cdots)$$

在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $\alpha<1$.

证明 当 $n\to\infty$ 时，$f_n(x)\to f(x)\equiv 0$. 因为 $f_n'(x)=\dfrac{1-x\ln n}{n^x}$，所以 $f_n(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最大值为 $f\left(\dfrac{1}{\ln n}\right)=\dfrac{(\ln n)^{\alpha-1}}{n^{\frac{1}{\ln n}}}=\dfrac{(\ln n)^{\alpha-1}}{\mathrm{e}}$. 于是 $f_n(x)\rightrightarrows f(x)\iff\dfrac{(\ln n)^{\alpha-1}}{\mathrm{e}}\to 0\iff\alpha<1$. □

问题 (15.2.1) 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}$$

在区间 $[0,\delta]$ 和 $[\delta,+\infty)$ 上的一致收敛性，其中 $\delta>0$.

解 记 $S_n(x)=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{kx}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+kx)}$，则当 $n\geqslant 2$ 时，

$$\begin{aligned}S_n(x)&=\frac{x}{1+x}+\sum_{k=2}^{n}\left[\frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+(k-1)x)}-\frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+kx)}\right]\\&=1-\frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}.\end{aligned}$$

因此当 $n\to\infty$ 时，$S_n(x)\to S(x)=\begin{cases}0, & x=0,\\ 1, & x>0.\end{cases}$

当 $x>0$ 时，$|S_n(x)-S(x)|=\dfrac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}$. 令 $x\to 0^+$，则 $|S_n(x)-S(x)|\to 1\neq 0$，因此级数在 $[0,\delta]$ 上不一致收敛.

当 $x\in[\delta,+\infty)$ 时，

$$|S_n(x)-S(x)|=\frac{1}{(1+x)(1+2x)\cdots(1+nx)}\leqslant\frac{1}{(1+\delta)(1+2\delta)\cdots(1+n\delta)}<\frac{1}{1+n\delta},$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in[\delta,+\infty)}|S_n(x)-S(x)|=0$，故级数在 $[\delta,+\infty)$ 上一致收敛. □

补充题 2 设 $f(x)\in\mathcal{C}(\mathbb{R})$. 令

$$f_n(x)=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n}f\left(x+\frac{k}{n}\right).$$

试证：$\{f_n(x)\}$ 在任何有限闭区间 $[a,b]$ 上一致收敛.

证明 由 $f(x)\in\mathcal{C}(\mathbb{R})$ 知 $f(x)\in\mathcal{R}([a,b+1])$. 由 Riemann 积分的定义知

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=\int_x^{x+1}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1 f(x+t)\,\mathrm{d}t,\quad\forall x\in[a,b].$$

因此

$$\begin{aligned}\left|f_n(x)-\int_0^1 f(x+t)\,\mathrm{d}t\right|&=\left|\sum_{k=0}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}}f\left(x+\frac{k}{n}\right)\mathrm{d}t-\int_0^1 f(x+t)\,\mathrm{d}t\right|\\&=\left|\sum_{k=0}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}}\left[f\left(x+\frac{k}{n}\right)-f(x+t)\right]\mathrm{d}t\right|\\&\leqslant\sum_{k=0}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}}\left|f\left(x+\frac{k}{n}\right)-f(x+t)\right|\mathrm{d}t\\&\leqslant\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n}\sup_{t\in\left[\frac{k}{n},\frac{k+1}{n}\right]}\left|f\left(x+\frac{k}{n}\right)-f(x+t)\right|\\&\leqslant\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n}\omega_k(x),\end{aligned}$$

其中 $\omega_k(x):=\sup\limits_{s,t\in\left[x+\frac{k}{n},x+\frac{k+1}{n}\right]}|f(s)-f(t)|$ 是 $f(x)$ 在区间 $\left[x+\dfrac{k}{n},x+\dfrac{k+1}{n}\right]$ 上的振幅. 记 π_x 为将区间 $[x,x+1]$ 作 n 等分的分割，再将此分割延拓为区间 $[a,b]$ 的分割 π，使得 π 限制在 $[x,x+1]$ 上恰为 π_x，且 $\|\pi\|\leqslant\dfrac{1}{n}$. 则当 $n\to\infty$ 时，$\|\pi\|\to 0$，根据定理 6.5.3，f 在分割 π 上的各段振幅与区间长度乘积之和 $\to 0$，从而 $\sum\limits_{k=0}^{n-1}\dfrac{1}{n}\omega_k(x)\to 0$. 也即是说，对任意 $\varepsilon>0$，存在与 x 无关的 $N\in\mathbb{N}$，使得当 $n>N$ 时，

$$\left|f_n(x)-\int_0^1 f(x+t)\,\mathrm{d}t\right|\leqslant\sum_{k=0}^{n-1}\frac{1}{n}\omega_k(x)<\varepsilon.$$

故 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. □

补充题 3 设可微函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上收敛，且存在 $M>0$，使得

$$|f_n'(x)| \leqslant M, \quad \forall n=1,2,\cdots,\forall x\in[a,b].$$

试证：$\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛.

证明 对任意取定的 $x_0\in[a,b]$，由 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上收敛可知，对任意 $\varepsilon>0$，存在 $N(x_0)\in\mathbb{N}$，使得对任意 $n>N(x_0)$ 与正整数 p，有

$$|f_n(x_0)-f_{n+p}(x_0)|<\frac{\varepsilon}{3}.$$

现设 $I_{x_0}=\left(x_0-\dfrac{\varepsilon}{3M},x_0+\dfrac{\varepsilon}{3M}\right)$. 由 Lagrange 中值定理，对任意 $m\in\mathbb{N}$ 与 $x\in I_{x_0}$ 都有

$$|f_m(x)-f_m(x_0)|\leqslant M|x-x_0|<M\cdot\frac{\varepsilon}{3M}=\frac{\varepsilon}{3}.$$

于是对 $x\in I_{x_0}$ 就有

$$|f_n(x)-f_{n+p}(x)|\leqslant|f_n(x)-f_n(x_0)|+|f_n(x_0)-f_{n+p}(x_0)|+|f_{n+p}(x_0)-f_{n+p}(x)|<3\cdot\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon.$$

因为 $\bigcup\limits_{x_0\in[a,b]} I_{x_0}$ 构成 $[a,b]$ 的一个开覆盖，由有限覆盖定理，存在 $k\in\mathbb{N}$，使得 $I_{x_1},\cdots,I_{x_k}$ 是其对应的有限子覆盖. 同上所述，每一个 x_i 都给出一个 $N(x_i)$，现设 $N:=\max\limits_i\{N(x_i)\}$，则当 $n>N$ 时，

$$|f_n(x)-f_{n+p}(x)|<\varepsilon$$

对任意正整数 p 与 $x\in\bigcup\limits_{i=1}^{k} I_{x_i}\supset[a,b]$ 成立. 由 Cauchy 收敛原理知 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛. □

§15.3　极限函数与和函数的性质

练习 (15.3.1) 确定下列函数的存在域，并研究它们的连续性：

(1) $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(x+\dfrac{1}{n}\right)^n$；

(2) $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x+(-1)^n n}{x^2+n^2}$.

解 (1) 由 Cauchy 判别法，从 $\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|x+\dfrac{1}{n}\right|^n}=\limsup\limits_{n\to\infty}\left|x+\dfrac{1}{n}\right|=|x|$ 可知当 $|x|<1$ 时 $f(x)$ 绝对收敛，当 $|x|>1$ 时 $f(x)$ 发散. 而当 $x=1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\to\mathrm{e}$，当 $x=-1$ 时，$\left(-1+\dfrac{1}{n}\right)^n\not\to 0\ (n\to\infty)$，故 $f(x)$ 的存在域为 $(-1,1)$. 对任意的 $\delta\in(0,1)$，当 $x\in[-1+\delta,1-\delta]$ 时，取 $N=\left\lfloor\dfrac{2}{\delta}\right\rfloor+1$，则当 $n>N$ 时，

$$\left|x+\frac{1}{n}\right|^n\leqslant\left(|x|+\frac{1}{n}\right)^n\leqslant\left(|x|+\frac{\delta}{2}\right)^n\leqslant\left(1-\delta+\frac{\delta}{2}\right)^n=\left(1-\frac{\delta}{2}\right)^n,$$

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\dfrac{\delta}{2}\right)^n$ 收敛，由 Weierstrass 判别法即得 $f(x)$ 在 $[-1+\delta,1-\delta]$ 上一致收敛，从而 $f(x)$ 在 $[-1+\delta,1-\delta]$ 上连续，再由 δ 的任意性知 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 上连续.

(2) 对任意 $x \in \mathbb{R}$，只要 $n^2+n \geqslant x^2$，就有 $\dfrac{n}{x^2+n^2}$ 单调递减，且由 $\left|\dfrac{n}{x^2+n^2}\right| \leqslant \dfrac{1}{n}$ 可知 $\dfrac{n}{x^2+n^2}$ 一致趋于 0，又级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ 的部分和一致有界 1，由 Dirichlet 判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n n}{x^2+n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. 由 $\dfrac{x}{x^2+n^2} \sim \dfrac{x}{n^2}$ $(n \to \infty)$ 可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x}{x^2+n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上收敛，故 $f(x)$ 的存在域为 $\mathbb{R}$. 对任意 $\delta > 0$，当 $|x| \leqslant \delta$ 时，$\left|\dfrac{x}{x^2+n^2}\right| \leqslant \dfrac{\delta}{n^2}$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x}{x^2+n^2}$ 在 $[-\delta,\delta]$ 上一致收敛，从而 $f(x)$ 在 $[-\delta,\delta]$ 上连续. 再由 δ 的任意性知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续. □

练习 (15.3.5) 已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$. 证明：

$$\lim_{x\to 1}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^x} = \ln 2.$$

证明 对任意 $x \in \left[\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}\right]$，$\dfrac{1}{n^x}$ 都是单调递减的，且由 $\left|\dfrac{1}{n^x}\right| \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 知 $\dfrac{1}{n^x}$ 一致收敛于 0，又级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$ 一致有界 1，故由 Dirichlet 判别法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^x}$ 在 $\left[\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}\right]$ 上一致收敛，从而

$$\lim_{x\to 1}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to 1}\frac{(-1)^{n-1}}{n^x} = \ln 2.$$

□

练习 (15.3.6) 设 E 是 $(-\infty,+\infty)$ 中的一个点集，x_0 是 E 的一个极限点 (x_0 可以是 $\pm\infty$). 如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 E 上一致收敛，而且 $\lim\limits_{x\to x_0}u_n(x) = a_n$ $(x \in E, n = 1,2,\cdots)$. 证明：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛；

(2) $\lim\limits_{x\to x_0}\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ $(x \in E)$.

证明 (1) 对任意 $x \in E$ 与任意 $\varepsilon > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使得对任意 $n > N$ 与 $p \in \mathbb{N}$，有

$$|u_n(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon.$$

由于 x_0 是 E 的极限点，有

$$\lim_{x\to x_0}|u_n(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| = |a_n + \cdots + a_{n+p}| \leqslant \varepsilon.$$

根据 Cauchy 收敛原理，这意味着级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

(2) 对任意 $\varepsilon > 0$，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 E 上一致收敛，存在 $N_1 \in \mathbb{N}$，使得 $\left|\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}u_n(x)\right| < \dfrac{\varepsilon}{3}$ 对任意 $x \in E$ 均成立；再由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，存在 $N_2 \in \mathbb{N}$，使得 $\left|\sum\limits_{n=N_2+1}^{\infty}a_n\right| < \dfrac{\varepsilon}{3}$. 令 $N := \max\{N_1, N_2\}$，则

$$\left|\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x) - \sum_{n=1}^{\infty}a_n\right| \leqslant \sum_{n=1}^{N}|u_n(x) - a_n| + \left|\sum_{n=N+1}^{\infty}u_n(x)\right| + \left|\sum_{n=N+1}^{\infty}a_n\right| < \sum_{n=1}^{N}|u_n(x) - a_n| + \frac{2\varepsilon}{3}, \quad \forall x \in E.$$

再令 $E \ni x \to x_0$，就得到

$$\left|\lim_{E\ni x\to x_0}\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)-\sum_{n=1}^{\infty}a_n\right|\leqslant\frac{2\varepsilon}{3}<\varepsilon.$$

这就完成了证明.

□

练习 (15.3.7) 设 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{x}{1+2x}\right)^n\cos\dfrac{n\pi}{x}$. 计算：$\lim\limits_{x\to1}f(x)$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

解 对任意 $x\in\left[\dfrac{1}{2},+\infty\right)$，$\left|\left(\dfrac{x}{1+2x}\right)^n\cos\dfrac{n\pi}{x}\right|\leqslant\dfrac{1}{2^n}$，而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}$ 收敛，故由 Weierstrass 判别法知 $f(x)$ 在 $\left[\dfrac{1}{2},+\infty\right)$ 上一致收敛. 因此

$$\lim_{x\to1}f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to1}\left(\frac{x}{1+2x}\right)^n\cos\frac{n\pi}{x}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^n}=-\frac{1}{4},$$
$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x}{1+2x}\right)^n\cos\frac{n\pi}{x}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}=1.$$

□

问题 (15.3.5) 设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{x+2^n}$ $(0\leqslant x<+\infty)$. 证明：

(1) f 在 $[0,+\infty)$ 上连续；

(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$；

(3) 对一切 $x\in(0,+\infty)$，有

$$0<f(x)-\frac{\ln(1+x)}{x\ln2}<\frac{1}{1+x}.$$

证明 (1) 由于 $\left|\dfrac{1}{x+2^n}\right|\leqslant\dfrac{1}{2^n}$，而级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{2^n}$ 收敛，由 Weierstrass 判别法即得 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致收敛，因此 $f(x)$ 连续.

(2) 由练习 (15.3.6) 结论，

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x+2^n}=0.$$

(3) 等价于证明对任意 $t\in(0,+\infty)$，

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{t+2^n}>\frac{\ln(1+t)}{t\ln2}>\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{t+2^n}.$$

注意到

$$\int_0^{+\infty}\frac{1}{t+2^x}\,\mathrm{d}x\xlongequal{y=2^x}\frac{1}{\ln2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{y(y+t)}\,\mathrm{d}y=\frac{\ln(1+t)}{t\ln2},$$

由面积原理即得证. □

§15.4　由幂级数确定的函数

练习 (15.4.1) 求下列幂级数的收敛半径，并研究它们在收敛区间端点处的性质：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}x^n$；

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)x^n$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a^n}{n}+\frac{b^n}{n^2}\right)x^n$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n x^n$.

解 (1) 因为 $\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\mathrm{e}$，所以收敛半径 $R=\frac{1}{\mathrm{e}}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\left[\frac{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\pm\mathrm{e}}\right]^n\not\to 0$，因此当 $x=\pm\frac{1}{\mathrm{e}}$ 时级数不收敛.

(2) 因为 $1=\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n}\cdot n}\leqslant\limsup\sqrt[n]{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}\leqslant\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1\cdot n}=1$，所以收敛半径 $R=1$. 当 $n\to\infty$ 时，$\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\not\to 0$，因此当 $x=\pm1$ 时级数不收敛.

(3) 因为

$$\sqrt[n]{\frac{(\max\{a,b\})^n}{n^2}}\leqslant\sqrt[n]{\frac{a^n}{n}+\frac{b^n}{n^2}}\leqslant\sqrt[n]{\frac{(\max\{a,b\})^n}{n}+\frac{(\max\{a,b\})^n}{n^2}},$$

再利用 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^2}=1$ 及 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n}}{\left(\sqrt[n]{n}\right)^2}=1$ 可得 $\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{a^n}{n}+\frac{b^n}{b^2}}=\max\{a,b\}$，因此收敛半径 $R=\frac{1}{\max\{a,b\}}=\min\left\{\frac{1}{a},\frac{1}{b}\right\}$.

① 若 $a\geqslant b$，则 $R=\frac{1}{a}$. 因为 $\left(\frac{a^n}{n}+\frac{b^n}{n^2}\right)\left(\frac{1}{a}\right)^n=\frac{1}{n}+\frac{\left(\frac{b}{a}\right)^n}{n^2}$ 单调递减趋于 0，所以当 $x=-\frac{1}{a}$ 时，由 Leibniz 判别法知级数收敛；当 $x=\frac{1}{a}$ 时，由调和级数发散知级数不收敛.

② 若 $a<b$，则 $R=\frac{1}{b}$. 因为 $\left(\frac{a^n}{n}+\frac{b^n}{n^2}\right)\left(\frac{1}{b}\right)^n=\frac{\left(\frac{a}{b}\right)^n}{n}+\frac{1}{n^2}$ 单调递减趋于 0，所以当 $x=-\frac{1}{b}$ 时，由 Leibniz 判别法知级数收敛；当 $x=\frac{1}{b}$ 时，由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a}{b}\right)^n$ 收敛及数列 $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ 单调有界，根据 Abel 判别法知级数收敛.

(4) 因为 $\limsup\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n}=+\infty$，所以收敛半径 $R=0$. 当 $x=0$ 时级数收敛. □

练习 (15.4.4) 求下列级数在区间 $(-1,1)$ 上的和：

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}$;

(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$.

解 所给 3 个幂级数的收敛半径均为 1.

(1) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\int_0^x t^{2n}\,\mathrm{d}t=\int_0^x\sum\limits_{n=0}^{\infty}t^{2n}\,\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{1}{1-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$.

(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\int_0^x(-1)^{n-1}t^{2n}\,\mathrm{d}t=\int_0^x\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^{n-1}t^{2n}\,\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{-1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=-\arctan x$.

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}=\frac{1}{x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^x\int_0^s t^{n-1}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s=\frac{1}{x}\int_0^x\int_0^s\sum\limits_{n=1}^{\infty}t^{n-1}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s=1+\frac{1-x}{x}\ln(1-x)$. □

问题 (15.4.5) 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R，且 $a_n \geqslant 0$.

(1) 证明：$\lim\limits_{x\to R^-}\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n R^n$；

(2) 由 (1)，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n} = +\infty$.

证明 (1) 若 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n R^n < +\infty$，则由 Abel 第二定理得等式成立. 下面假设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n R^n = +\infty$，则对任意 $M > 0$，存在 $N \in \mathbb{N}$，使得 $\sum\limits_{n=0}^{N} a_n R^n > 2M$. 于是对 $x \in \left(\dfrac{R}{\sqrt[N]{2}}, R\right)$ 就有

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \geqslant \sum_{n=0}^{N} a_n x^n \geqslant \sum_{n=0}^{N} a_n \left(\frac{R}{\sqrt[n]{2}}\right)^n > M,$$

这说明 $\lim\limits_{x\to R^-}\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n = +\infty$. 故等式得证.

(2) 因为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛半径为 1，由 (1)，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n} = \lim_{x\to 1^-}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} = \lim_{x\to 1^-}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x t^{n-1}\,\mathrm{d}t = \lim_{x\to 1^-}\int_0^x \frac{1}{1-t}\,\mathrm{d}t = -\lim_{x\to 1^-}\ln(1-x) = +\infty.$$

□