

《量子力学教程》课后习题——第一章 绪论

物理 (4+4) 1801 胡喜平 学号 U201811966

网站 <https://hxp.plus/> 邮件 hxp201406@gmail.com

2020 年 9 月 13 日

1.1 黑体辐射公式为

$$\rho_\nu d\nu = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{\exp\left[\frac{h\nu}{k_B T}\right] - 1} d\nu$$

其中 $\rho_\nu d\nu$ 是频率在 ν 到 $\nu + d\nu$ 之内辐射能量密度。频率 ν 和波长 λ 的关系为

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

因此

$$d\nu = -\frac{c}{\lambda^2} d\lambda$$

设波长在 λ 到 $\lambda + d\lambda$ 之间的辐射能量密度为 ρ_λ , 则

$$\rho_\lambda d\lambda = \frac{8\pi h}{c^3} \cdot \frac{c^3/\lambda^3}{\exp\left[\frac{hc}{k_B} \cdot \frac{1}{\lambda T}\right] - 1} \cdot \left(\frac{c}{\lambda^2} d\lambda\right) = 8\pi hc \cdot \frac{\lambda^{-5}}{\exp\left[\frac{hc}{k_B} \cdot \frac{1}{\lambda T}\right] - 1} d\lambda$$

求极大值需要 $\frac{d\rho_\lambda}{d\lambda} = 0$, 即

$$\left\{ \exp\left[\frac{hc}{k_B} \cdot \frac{1}{\lambda T}\right] - 1 \right\} (-5\lambda^{-6}) - \lambda^{-5} \cdot \exp\left[\frac{hc}{k_B} \cdot \frac{1}{\lambda T}\right] \cdot \frac{hc}{k_B} \cdot \frac{1}{T} \cdot \left(-\frac{1}{\lambda^2}\right) = 0$$

化简后得到

$$\left\{ 5 - \frac{hc}{k_B} \cdot \frac{1}{\lambda T} \right\} \cdot \exp\left[\frac{hc}{k_B} \cdot \frac{1}{\lambda T}\right] = 5$$

令 $\alpha = \frac{hc}{k_B} \cdot \frac{1}{\lambda T}$, 化简得到

$$5 + (-\alpha) = 5e^{-\alpha}$$

用计算器解得 $\alpha = 4.96$, 即

$$\frac{hc}{k_B} \cdot \frac{1}{\lambda T} = 4.96$$

则

$$\lambda T = \frac{hc}{k_B \alpha} = 2.9 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{K}$$

1.2 电子的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE}} = 0.708 \text{ nm}$$

1.3 氦原子由两个质子两个中子组成, 它的质量为

$$m = 2m_p + 2m_n$$

氦原子的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE}} = \frac{h}{\sqrt{6(m_p + m_n)k_B T}} = 1.26 \text{ nm}$$

1.4 (1) 波尔-索末菲量子化条件为

$$\oint m \frac{dx}{dt} dx = \oint m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 dt = \left(n + \frac{1}{2} \right) h$$

即

$$\oint E - E_p dt = \oint E_k dt = \oint \frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 dt = (2n + 1) h$$

其中 E 是简谐振子总能量, E_k 是动能, E_p 是势能, 设简谐运动

$$m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 = kx$$

则

$$x = A \cos(\omega t)$$

其中

$$\omega^2 = \frac{k}{m}$$

量子化条件可以展开为

$$\oint E dt - \oint \frac{1}{2} k x^2 dt = \frac{2\pi E}{\omega} - \oint \frac{1}{2} k \cdot A^2 \cos^2(\omega t) dt = \frac{2\pi E}{\omega} - \frac{\pi}{\omega} \cdot \frac{1}{2} k A^2 = \frac{2\pi}{\omega} E - \frac{\pi}{\omega} E = \frac{\pi}{\omega} E$$

因此

$$\frac{\pi}{\omega} E = (2n + 1) h$$

简谐振子能量表达式

$$E = (2n + 1) \hbar \cdot \frac{\omega}{2} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$$

1.5 光子波长最大的情况下能量最小, 恰好等于电子能量

$$\frac{hc}{\lambda_{max}} = m_e c^2$$

计算得出光子最大波长

$$\lambda_{max} = \frac{h}{m_e c} = 2.243 \times 10^{-12} \text{ m}$$