

理论力学复习

胡喜平

2019 年 12 月 31 日

1 达朗贝尔原理

对于稳定的系统，有

$$\sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = 0 \quad (1)$$

将 \mathbf{F}_{α} 分解为外力 \mathbf{F}_{α}^e 和内力（约束力） \mathbf{f}_{α} ，其中

$$\sum_{\alpha} \mathbf{f}_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = 0 \quad (2)$$

因此有

$$\sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^e \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = 0 \quad (3)$$

当问题不是静力学问题的时候，我们添加一个惯性力使之化为静力学问题，由于 $\mathbf{F}_{\alpha} - \dot{\mathbf{p}}_{\alpha} = 0$

$$\sum_{\alpha} (\mathbf{F}_{\alpha}^e - \dot{\mathbf{p}}_{\alpha}) \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = 0 \quad (4)$$

这就是达朗贝尔准则

2 拉格朗日方程

2.1 广义坐标

位置 \mathbf{r}_{α} 可以由坐标 q_j 表示

$$\mathbf{r}_{\alpha} = \mathbf{r}_{\alpha}(q_j, t) \quad (5)$$

对它求导

$$\dot{\mathbf{r}}_{\alpha} = \frac{d\mathbf{r}_{\alpha}}{dt} = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial t} \quad (6)$$

进而得到

$$\delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \delta q_j \quad (7)$$

2.2 拉格朗日方程的推导

又方程 4 可以得到

$$\sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^e \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \dot{\mathbf{p}}_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} \quad (8)$$

对左边进行展开，代入 7

$$\sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^e \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^e \cdot \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_j \sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^e \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \delta q_j \quad (9)$$

定义广义力 Q_j

$$\sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^e \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} = Q_j \quad (10)$$

则式 8 左边可以化为

$$\sum_{\alpha} \mathbf{F}_{\alpha}^e \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_j Q_j \delta q_j \quad (11)$$

下面我们对右边进行展开，同样，代入 7

$$\sum_{\alpha} \dot{\mathbf{p}}_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \dot{\mathbf{p}}_{\alpha} \cdot \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \ddot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \delta q_j = \sum_{\alpha} \sum_j m_{\alpha} \ddot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \delta q_j \quad (12)$$

运用复合函数求导法则

$$\frac{d}{dt} \left(m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \right) = m_{\alpha} \ddot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} + m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \right) \quad (13)$$

即

$$m_{\alpha} \ddot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} = \frac{d}{dt} \left(m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \right) - m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \right) \quad (14)$$

把 14 代入 12，得到

$$\sum_{\alpha} \dot{\mathbf{p}}_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \sum_j \left[\frac{d}{dt} \left(m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \right) - m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \right) \right] \delta q_j \quad (15)$$

因为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \right) = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}}{\partial q_j} \quad (16)$$

我们得到

$$\sum_{\alpha} \dot{\mathbf{p}}_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \sum_j \left[\frac{d}{dt} \left(m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \right) - m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}}{\partial q_j} \right] \delta q_j \quad (17)$$

对 6 求偏导

$$\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \quad (18)$$

带入 17

$$\sum_{\alpha} \dot{\mathbf{p}}_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_{\alpha} = \sum_{\alpha} \sum_j \left[\frac{d}{dt} \left(m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \right) - m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}}{\partial q_j} \right] \delta q_j \quad (19)$$

将 11 和 19 代入 8

$$\sum_{\alpha} \sum_j \left[\frac{d}{dt} \left(m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{\alpha}}{\partial q_j} \right) - m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}}{\partial q_j} \right] \delta q_j = \sum_j Q_j \delta q_j \quad (20)$$

定义动能 $T = \sum_{\alpha} \frac{1}{2} m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}^2$

$$\partial T = \partial \left(\sum_{\alpha} \frac{1}{2} m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha}^2 \right) = \sum_{\alpha} m_{\alpha} \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \cdot \partial \dot{\mathbf{r}}_{\alpha} \quad (21)$$

将 21 代入 20

$$\sum_j \left[\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} \right] \delta q_j = \sum_j Q_j \delta q_j \quad (22)$$

因此

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j \quad (23)$$

即

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} \right) - \left(\frac{\partial T}{\partial q_j} + Q_j \right) = 0 \quad (24)$$

当 Q_j 是保守力, 势能为 U 时

$$-\frac{\partial U}{\partial q_j} = Q_j \quad (25)$$

$$\frac{\partial U}{\partial \dot{q}_j} = 0 \quad (26)$$

方程 24 可以化为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial (T - U)}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial (T - U)}{\partial q_j} = 0 \quad (27)$$

定义 $L = T - U$, 则

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0 \quad (28)$$

3 哈密顿量的守恒

对 $L(q, \dot{q}, t)$ 求导

$$\frac{dL}{dt} = \sum_j \frac{\partial L}{\partial q_j} \dot{q}_j + \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j + \frac{\partial L}{\partial t} \quad (29)$$

式 28 告诉我们

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) = \frac{\partial L}{\partial q_j} \quad (30)$$

将 30 代入 29

$$\frac{dL}{dt} = \sum_j \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) \dot{q}_j + \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \ddot{q}_j + \frac{\partial L}{\partial t} \quad (31)$$

即

$$\frac{dL}{dt} = \sum_j \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \quad (32)$$

交换求和与积分顺序

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \quad (33)$$

移项

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L \right) + \frac{\partial L}{\partial t} = 0 \quad (34)$$

定义系统的哈密顿量

$$H = \sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j - L \quad (35)$$

当 $\frac{\partial L}{\partial t} = 0$ 时

$$\frac{dH}{dt} = 0 \quad (36)$$

哈密顿量守恒

4 Noether 定理，广义动量

由 33

$$\frac{dL}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \dot{q}_j \right) + \frac{\partial L}{\partial t} \quad (37)$$

可以得到

$$\delta L = \frac{d}{dt} \left(\sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j \right) \quad (38)$$

当空间具有平移不变性时，即虚位移的产生对于拉格朗日量没有影响时

$$\delta L = 0 \quad (39)$$

因此

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j \right) = 0 \quad (40)$$

即

$$\sum_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \delta q_j = \text{const} \quad (41)$$

因此定义广义动量

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \quad (42)$$

则 $p_j = \text{const}$ ，广义动量守恒