

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20175001

特殊医学用途婴儿氨基酸配方食品

纽康特

neocate

【产品类别】氨基酸配方

【配料表】植物油葡萄糖浆喷雾干燥粉（葡萄糖浆粉、葵花籽油、中链甘油三酯、菜籽油、柠檬酸脂肪酸甘油酯、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂、抗坏血酸棕榈酸酯、dl- α -生育酚）、L-亮氨酸、L-赖氨酸醋酸盐、L-谷氨酰胺、L-脯氨酸、L-精氨酸、L-缬氨酸、甘氨酸、L-异亮氨酸、L-天冬氨酸、L-苏氨酸、L-苯丙氨酸、L-酪氨酸、L-丝氨酸、L-组氨酸、L-丙氨酸、L-胱氨酸、L-色氨酸、L-蛋氨酸、L-天冬氨酸镁、麦芽糊精、葡萄糖浆粉、醋酸维生素 A、维生素 D₃、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化钠、柠檬酸钾、磷酸氢二钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、柠檬酸钙、磷酸氢钙、磷酸三钙、甘油磷酸钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化铬、钼酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、5'-单磷酸胞苷、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2020	279	100
蛋白质（等同物）(g)	14.6	2	0.72
脂肪(g)	24.5	3.4	1.2
亚油酸(g)	4.2	0.58	0.21
α -亚麻酸(mg)	419	57.8	20.8
亚油酸与 α -亚麻酸比值	10:1	10:1	10:1
碳水化合物(g)	50.9	7	2.5

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
维生素 A($\mu\text{g RE}$)	406	56	20.1
维生素 D(μg)	8.8	1.2	0.44
维生素 E($\text{mg } \alpha\text{-TE}$)	4.6	0.63	0.23
维生素 K ₁ (μg)	42.5	5.9	2.1
维生素 B ₁ (μg)	540	74.5	26.7
维生素 B ₂ (μg)	540	74.5	26.7
维生素 B ₆ (μg)	540	74.5	26.7
维生素 B ₁₂ (μg)	1.3	0.18	0.06
烟酸(μg)	4900	676	243
叶酸(μg)	64	8.8	3.2
泛酸(μg)	2900	400	144
维生素 C(mg)	51.6	7.1	2.6
生物素(μg)	19	2.6	0.94
钠(mg)	205	28.3	10.1
钾(mg)	575	79.4	28.5
铜(μg)	450	62.1	22.3
镁(mg)	56	7.7	2.8
铁(mg)	8	1.1	0.4
锌(mg)	5.8	0.8	0.29
锰(μg)	210	29	10.4
钙(mg)	615	84.9	30.4
磷(mg)	430	59.3	21.3
碘(μg)	100	13.8	5
氯(mg)	420	58	20.8
硒(μg)	16	2.2	0.79
铬(μg)	11.7	1.6	0.58
钼(μg)	12.5	1.7	0.62

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
胆碱(mg)	95.4	13.2	4.7
肌醇(mg)	108	14.9	5.3
牛磺酸(mg)	30	4.1	1.5
左旋肉碱(mg)	9.5	1.3	0.5
二十二碳六烯酸（DHA）(mg)	81.6	11.3	4
二十二碳六烯酸（DHA）(%总脂肪酸)	0.35	0.35	0.35
二十碳四烯酸（AA）(mg)	81.6	11.3	4
二十碳四烯酸（AA）(%总脂肪酸)	0.35	0.35	0.35
核苷酸(mg)	23.32	3.22	1.15

备注：100mL 标准冲调液由 13.8g 产品加 90mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】配方中不含食物蛋白，蛋白质全部由氨基酸提供。配方中添加了 81.52g/1000g 的中链甘油三酯作为脂肪的部分来源，以及二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸和核苷酸，未添加乳糖（含量低于 0.5g/100g）。

【组织状态】粉状

【适用人群】食物蛋白过敏婴儿

【食用方法和食用量】口服，食用量和调配方法应在医生或临床营养师的指导下，根据婴儿的年龄、体重和医学状况等综合确定。调配方法：每 1 平匙本品（约 4.6g）需用 30mL 温开水（约 40℃）冲调成标准冲调液。

【净含量和规格】400 克

【保质期】18 个月

【贮存条件】请置于阴凉干燥处存放，食用完后盖上盖子。开罐后，请在一个月内食用完。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.对于 0-6 月的婴儿本品可作为单一营养来源单独食用；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。添加辅助食品（特别是鸡蛋、海产品及其他奶制品）时，应遵从医生或临床营养师的建议。
- 3.不适用于非目标人群使用。
- 4.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。

5.调配本品时只可用罐内所附的专用量匙。配制不当和使用不当可能引起健康危害。未经过医生建议切勿改变调配方法。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。