

附件 2

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20180004

特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方食品

优博敏佳

【产品类别】乳蛋白部分水解配方

【配料表】乳糖、部分水解乳清蛋白粉（添加量 23.7%）、植物油（葵花籽油、大豆油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油）、固体淀粉糖、麦芽糊精、无水奶油、矿物质（磷酸氢钙、氯化钾、硫酸镁、磷酸三钙、氯化钠、碳酸钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠）、低聚果糖、维生素（L-抗坏血酸钠、肌醇、氯化胆碱、抗坏血酸棕榈酸酯、混合生育酚浓缩物、d1- α -醋酸生育酚、醋酸视黄酯、烟酰胺、盐酸硫胺素、D-泛酸钙、胆钙化醇、核黄素、盐酸吡哆醇、叶酸、植物甲萘醌、D-生物素、氰钴胺）、单，双甘油脂肪酸酯、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、牛磺酸、磷脂、左旋肉碱酒石酸盐。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2138	289	100
蛋白质(g)	11.8	1.6	0.55
脂肪(g)	27	3.6	1.26
亚油酸(g)	4	0.5	0.19
α -亚麻酸(mg)	570	77	27
亚油酸与 α -亚麻酸比值	7:1	7:1	7:1
碳水化合物(g)	54.4	7.3	2.5
维生素 A(μ g RE)	465	63	22
维生素 D(μ g)	7.5	1.0	0.35

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
维生素 E(mg α -TE)	9. 5	1. 3	0. 44
维生素 K ₁ (μ g)	45	6. 1	2. 1
维生素 B ₁ (μ g)	510	69	24
维生素 B ₂ (μ g)	1320	178	62
维生素 B ₆ (μ g)	370	50	17. 3
维生素 B ₁₂ (μ g)	1. 5	0. 2	0. 070
烟酸(μ g)	5500	743	257
叶酸(μ g)	85	11. 5	4. 0
泛酸(μ g)	4880	659	228
维生素 C(mg)	70	9. 5	3. 3
生物素(μ g)	15	2. 0	0. 7
钠(mg)	180	24. 3	8
钾(mg)	540	73	25
铜(μ g)	390	53	18. 2
镁(mg)	42	5. 7	2. 0
铁(mg)	5. 5	0. 7	0. 26
锌(mg)	4. 5	0. 6	0. 21
锰(μ g)	100	13. 5	4. 7
钙(mg)	430	58	20
磷(mg)	250	33. 8	12
碘(μ g)	75	10. 1	3. 5
氯(mg)	330	44. 6	15
硒(μ g)	14	1. 9	0. 65
胆碱(mg)	125	16. 9	5. 8
肌醇(mg)	135	18. 2	6. 3
牛磺酸(mg)	35	4. 7	2
左旋肉碱(mg)	15	2. 0	0. 7

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
低聚果糖(mg)	1600	216	74.8
核苷酸(mg)	35	4.7	1.6

备注：100mL 标准冲调液用 13.5g 配方粉加 90mL 温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本产品将大分子乳蛋白酶解为小分子乳蛋白、肽段和氨基酸，以降低乳蛋白的致敏性，易消化。添加氯化胆碱、左旋肉碱酒石酸盐，添加核苷酸。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄乳蛋白过敏高风险婴儿

【食用方法和食用量】本产品适用于口服，食用量和产品稀释程度由医生或临床营养师决定，取决于婴儿的年龄、体重和身体状况，所附喂哺表仅供参考。冲调时请用专用量匙，1 平匙配方粉约为 3.8g，需用 25mL 温开水冲调成标准冲调液。

	婴儿年龄	每日喂哺次数	每次喂哺量	
			温开水量（mL）	粉匙数（平匙）
建 议 喂 哺 表	0~2 周	9	50	2
	2~4 周	7	75	3
	1~2 月	6	100	4
	2~3 月	6	125	5
	3~4 月	6	150	6
	4~6 月	5	200	8
	6 个月以上	4~5	200	8

冲调方法如下：

1. 准备冲调前，请彻底洗净双手。
2. 将洗净的奶瓶、奶嘴和瓶盖放入沸水中煮沸 5 分钟。
3. 将饮用水煮沸 5 分钟，冷却至 40℃~50℃待用。
4. 参照食用量将正确量的冲调用水倒入奶瓶。
5. 使用专用量匙量取正确量的配方粉加入水中。
6. 盖紧瓶盖，轻摇至配方粉充分溶解，待液体温度适宜时，及时哺喂。

【净含量和规格】700g，300g

【保质期】24 个月

【贮存条件】开罐前：①请常温保存，本产品包装中含有保护性气体，有利于产品长期保存。

②请在保质期前使用该产品。开罐后：①请将盖子盖紧，并放置于阴凉干燥处。②请于 1 个月内将本产品食用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或临床营养师指导下使用。
2. 不适用于非目标人群使用。
3. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
4. 本品可以作为单一营养来源满足 6 月龄以下目标人群的营养需求；6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
5. 未经医生或临床营养师建议请勿擅自改变液体的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养。
6. 使用期间应避免细菌污染；哺喂剩余的液体请弃掉，勿留于下次食用。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。