

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20185001

特殊医学用途婴儿氨基酸代谢障碍配方食品

纽贝瑞

Periflex

【产品类别】氨基酸代谢障碍配方

【配料表】植物脂肪粉（葡萄糖浆粉、葵花籽油、椰子油、菜籽油、柠檬酸脂肪酸甘油酯、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂、抗坏血酸棕榈酸酯）、葡萄糖浆粉、L-亮氨酸、L-赖氨酸醋酸盐、L-酪氨酸、L-谷氨酰胺、L-脯氨酸、L-精氨酸、L-缬氨酸、甘氨酸、L-异亮氨酸、L-天冬氨酸、L-苏氨酸、L-丝氨酸、L-组氨酸、L-丙氨酸、L-胱氨酸、L-色氨酸、L-蛋氨酸、L-天冬氨酸镁、麦芽糊精、醋酸维生素 A、维生素 D₃、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化钠、柠檬酸钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、柠檬酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化铬、钼酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2020	279	100
蛋白质（等同物） (g)	13.0	1.8	0.64
脂肪(g)	24.5	3.4	1.21
亚油酸(g)	3.50	0.48	0.17
α -亚麻酸(mg)	350	48.3	17.3
亚油酸与 α -亚麻	10: 1	10:1	10:1

酸比值			
碳水化合物(g)	52. 5	7. 2	2. 6
维生素 A(μ g RE)	406	56. 0	20. 1
维生素 D(μ g)	8. 8	1. 2	0. 44
维生素 E(mg α - TE)	4. 8	0. 67	0. 24
维生素 K ₁ (μ g)	42. 5	5. 9	2. 1
维生素 B ₁ (μ g)	540	74. 5	27
维生素 B ₂ (μ g)	540	74. 5	27
维生素 B ₆ (μ g)	540	74. 5	26. 7
维生素 B ₁₂ (μ g)	1. 3	0. 18	0. 064
烟酸(μ g)	4900	676	243
叶酸(μ g)	64. 0	8. 8	3. 2
泛酸(μ g)	2900	400	144
维生素 C(mg)	63. 8	8. 8	3. 2
生物素(μ g)	19. 0	2. 6	0. 9
钠(mg)	189	26. 1	9
钾(mg)	525	72. 5	26
铜(μ g)	410	56. 6	20. 3
镁(mg)	51. 0	7. 0	2. 5
铁(mg)	5. 8	0. 80	0. 29
锌(mg)	5. 3	0. 73	0. 26
锰(μ g)	200	27. 6	9. 9
钙(mg)	475	65. 6	24
磷(mg)	341	47. 1	17
碘(μ g)	100	13. 8	5. 0
氯(mg)	386	53. 3	19
硒(μ g)	13. 8	1. 9	0. 68

铬(μg)	10.6	1.5	0.5
钼(μg)	11.3	1.6	0.6
胆碱(mg)	95.4	13.2	4.7
肌醇(mg)	108	14.9	5.3
牛磺酸(mg)	27	3.73	1
左旋肉碱(mg)	8.0	1.10	0.40
二十二碳六烯酸 (DHA) (mg)	82	11.3	4.04
二十二碳六烯酸 (DHA) (%总脂肪 酸)	0.35	0.35	0.35
二十碳四烯酸 (AA) (mg)	82	11.3	4.04
二十碳四烯酸 (AA) (%总脂肪酸)	0.35	0.35	0.35

备注：100mL 标准冲调液需用 13.8g 粉末加 90mL 的温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本品为不添加苯丙氨酸的特殊医学用途婴儿配方粉，应在医生或者临床营养师指导下使用。适用于 0~12 月龄的苯丙酮尿症婴儿。

【组织状态】粉状

【适用人群】0~12 月龄苯丙酮尿症婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重、医学状况（包括血苯丙氨酸水平）、母乳、普通婴儿配方食品或者辅食的摄入量等综合确定。

冲调方法：每 1 平匙本品（约 4.6g）需用 30mL 温开水（约 40° C）冲调成标准冲调液。

【净含量和规格】400g

【保质期】18 个月

【贮存条件】请置于阴凉干燥处存放，食用后盖上盖子。开罐后，请在 1 个月内食用完。

【警示说明和注意事项】

1. 请在医生或者临床营养师指导下使用。

2. 本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
3. 不适用于非目标人群使用。
4. 不可作为单一蛋白质来源使用，应根据适用人群个体对苯丙氨酸的耐受程度，适当搭配少量母乳或普通婴儿配方食品，以满足婴儿生长发育的需要。
5. 对于 0~6 月龄婴儿最理想的食品是母乳。苯丙酮尿症婴儿需要在医生或者临床营养师指导下食用无苯丙氨酸的特殊医学用途配方食品和少量母乳或者普通婴儿配方食品。6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。请在医生或者临床营养师指导下添加辅助食品。
6. 配制不当和使用不当可能引起健康危害。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。