

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20185003

特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方奶

喜康宝贝初

Similac Neo

【产品类别】早产/低出生体重婴儿配方

【配料表】水、淀粉糖、脱脂奶粉、浓缩乳清蛋白粉、中链甘油三酯、大豆油、椰子油、葵花籽油、乳糖、棕榈酸维生素 A、维生素 D₃、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、柠檬酸钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸三钙、碳酸钙、亚硒酸钠、酒石酸氢胆碱、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5'-单磷酸胞苷、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、氢氧化钾、磷脂、单甘油脂肪酸酯、卡拉胶。

【营养成分表】

营养成分	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	284	100
蛋白质(g)	2.04	0.72
脂肪(g)	3.53	1.24
亚油酸(g)	0.59	0.21
α -亚麻酸(mg)	46.9	16.5
亚油酸与 α -亚麻酸比值	13:1	13:1
碳水化合物(g)	7.00	2.46
维生素 A(μ g RE)	175	61
维生素 D(μ g)	2.55	0.90
维生素 E(mg α -TE)	2.5	0.88

营养成分	每 100mL	每 100kJ
维生素 K ₁ (μg)	10.2	3.6
维生素 B ₁ (μg)	117	41
维生素 B ₂ (μg)	163	57
维生素 B ₆ (μg)	95	33
维生素 B ₁₂ (μg)	0.19	0.07
烟酸(μg)	677	238
叶酸(μg)	27	9
泛酸(μg)	762	268
维生素 C(mg)	11.6	4.1
生物素(μg)	2.4	0.8
钠(mg)	35	12
钾(mg)	105	37
铜(μg)	64	22
镁(mg)	7.9	2.8
铁(mg)	1.5	0.5
锌(mg)	0.85	0.30
锰(μg)	5.2	1.8
钙(mg)	139	49
磷(mg)	78	27
碘(μg)	9.2	3.2
氯(mg)	64	22
硒(μg)	3.8	1.3
胆碱(mg)	8.2	2.9
肌醇(mg)	12.0	4.2
牛磺酸(mg)	5.2	1.8
左旋肉碱(mg)	4.7	1.6
二十二碳六烯酸（DHA）(mg)	9	3

营养成分	每 100mL	每 100kJ
二十二碳六烯酸（DHA）(%总脂肪酸)	0.3	0.3
二十碳四烯酸（ARA）(mg)	14	5
二十碳四烯酸（ARA）(%总脂肪酸)	0.4	0.4
核苷酸(mg)	5.4	1.9

无。【配方特点/营养学特征】本品每 100mL 含 68kcal 能量，每 100kcal 含 3.0g 蛋白质，中链甘油三酯的添加量为 1.44g/100g，帮助满足早产儿追赶生长的营养需求。

【组织状态】液态

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】本品可用于口服或管饲，请在医生或临床营养师指导下使用本品。

口服食用说明：本品开瓶即食，无需加水，使用前请摇晃瓶身，使产品更均匀。充分清洗并消毒喂奶器具，装上奶嘴和套环（不含）或倾倒至喂奶容器中进行喂食，喂后将瓶内剩下的奶液弃掉。食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的矫正月龄、体重和医学状况等综合确定。

管饲食用说明：管饲用法及用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

【净含量和规格】48×59 mL

【保质期】12 个月

【贮存条件】本品应避光保存。未开封前，贮藏在阴凉干燥的条件下。开封后请立即使用。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 3.本品不适用于非目标人群使用。
- 4.对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，早产/低出生体重婴儿应在医生或临床营养师指导下，在母乳不足或无母乳时食用本品。
- 5.6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
- 6.根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿的正常范围时，可在医生或临床营养师指导下转为普通婴儿配方奶粉或配合添加辅助食品。
- 7.本品勿用微波炉加热，以免烫伤。

8.本品仅供医院内使用。

9.每个瓶上有一个分离环。如分离环缺失或破裂，请勿使用。

10.不恰当的使用不利于婴儿的健康。使用时无需加水，如果稀释使用，可能无法提供适当的营养，长期稀释使用可能引发疾病。

11.在肠道适应本品前，喂养可能会引发吐奶、胃潴留、腹胀、大便或排便性状异常，或其他肠道功能紊乱。在首次出现相关临床表现时，应减慢或停止肠道喂养。

12.本品适用于喂养成长中的早产/低出生体重婴儿。极低出生体重婴儿更容易发生胃肠道并发症，因此，应慎重进行喂养。

13.本品渗透压约为 215mOsmol/L，供使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。