

附件 2

国家市场监督管理总局
特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20185010

特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品

纽荃星

Infatrini

【产品类别】早产/低出生体重婴儿配方

【配料表】浓缩脱脂乳、食用植物调和油（棕榈油、椰子油、葵花籽油、大豆油、磷脂、抗坏血酸棕榈酸酯）、脱盐乳清粉、葡萄糖浆粉、低聚半乳糖、浓缩乳清蛋白粉、麦芽糊精、棕榈酸维生素 A、胆钙化醇、d1- α -生育酚、d1- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、L-抗坏血酸钠、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、磷酸氢镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘化钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、5'-单磷酸胞苷、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、多聚果糖、 β -胡萝卜素、氢氧化钾。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2096	418	100
蛋白质(g)	13.1	2.62	0.63
脂肪(g)	27.2	5.4	1.30
亚油酸(g)	4.26	0.851	0.203
α -亚麻酸(mg)	364	73	17.4
碳水化合物(g)	49.6	9.9	2.37
维生素 A(μ g RE)	417	83	19.9
维生素 D(μ g)	10	2	0.48
维生素 E(mg α -TE)	4.53	0.9	0.22

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
维生素 K ₁ (μg)	30	5.9	1.43
维生素 B ₁ (μg)	750	150	35.78
维生素 B ₂ (μg)	750	150	35.78
维生素 B ₆ (μg)	300	60	14.31
维生素 B ₁₂ (μg)	2.1	0.41	0.100
烟酸(μg)	6000	1200	286.26
叶酸(μg)	75	15	3.58
泛酸(μg)	2500	500	119.27
维生素 C(mg)	66	13	3.15
生物素(μg)	12	2.3	0.57
钠(mg)	210	42	10.02
钾(mg)	502	100	23.95
铜(μg)	300	60	14.31
镁(mg)	38	7.5	1.81
铁(mg)	5	1	0.24
锌(mg)	4.5	0.9	0.21
锰(μg)	250	50	11.93
钙(mg)	506	101	24.14
磷(mg)	283	57	13.5
碘(μg)	78	16	3.72
氯(mg)	313	62	14.93
硒(μg)	13	2.5	0.62
胆碱(mg)	70	14	3.34
肌醇(mg)	125	25	5.96
牛磺酸(mg)	35	6.9	1.67
二十二碳六烯酸(DHA)(mg)	50	10	2.39
二十二碳六烯酸（DHA）(%总脂	0.2	0.2	0.2

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
肪酸)			
二十碳四烯酸(AA)(mg)	90	18	4.29
二十碳四烯酸 (AA) (%总脂肪酸)	0.35	0.35	0.35
核苷酸(mg)	22	4.3	1.05
低聚半乳糖(g)	2.4	0.48	0.11
多聚果糖(g)	0.4	0.08	0.02
β-胡萝卜素(μg)	176	35	8.40

备注：100mL 标准冲调液需用约 20g 配方粉加 90 mL 的温开水冲调而成。

【配方特点/营养学特征】本品标准冲调液能量值为 100kcal/100mL，产品配方采用了中链脂肪作为脂肪的部分来源（约 16%总脂肪）。添加了二十二碳六烯酸（DHA）、二十碳四烯酸（AA）、核苷酸、低聚半乳糖和多聚果糖。

【组织状态】粉状

【适用人群】早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】口服。食用方法和食用量应在医生或临床营养师指导下，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。冲调方法：每 4 平勺本品（约 20 克）需用 90mL 约 40℃温开水冲调成 100mL 标准冲调液。

【净含量和规格】400g

【保质期】18 个月

【贮存条件】请置于阴凉干燥处存放，食用完后盖上盖子。开罐后，请在 1 个月内食用完。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或临床营养师指导下使用。
- 2.对于 0~6 月龄的早产/低出生体重婴儿本品可作为单一营养来源单独食用，6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
- 3.不适用于非目标人群使用。
- 4.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 5.调配本品时只可用罐内所附的专用量匙。配制不当和使用不当可能引起健康危害。未经过医生建议切勿改变调配方法。
- 6.对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，早产/低出生体重婴儿应在医生或临床营养师

指导下，在母乳不足或无母乳时食用本品。

7.根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿的正常范围时，可在医生或临床营养师指导下转为普通婴儿配方食品或配合添加辅助食品。

8.本品标准冲调液渗透压约为 380mOsmol/kg，供使用参考。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。