

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20190005

特殊医学用途婴儿营养补充剂

昔倍护

【产品类别】母乳营养补充剂

【配料表】麦芽糊精、水解乳清蛋白粉、中链甘油三酯粉（中链甘油三酯、葡萄糖浆、酪蛋白、单，双甘油脂肪酸酯、柠檬酸钾）、磷酸氢钙、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钠、柠檬酸钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘化钾、亚硒酸钠。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100kJ	每份
能量(kJ)	1630	100	16
蛋白质(g)	20.0	1.23	0.20
脂肪(g)	5.0	0.31	0.05
碳水化合物(g)	65.0	4.0	0.65
维生素 A(μ g RE)	3375	207	33.75
维生素 D(μ g)	50.0	3.07	0.5
维生素 E(mg α -TE)	75.0	4.60	0.75
维生素 K ₁ (μ g)	100.0	6.1	1.0

营养成分	每 100g	每 100kJ	每份
维生素 B ₁ (μg)	2300	141	23
维生素 B ₂ (μg)	3750	230	37.5
维生素 B ₆ (μg)	2000	122.7	20.0
维生素 B ₁₂ (μg)	4.50	0.276	0.045
烟酰胺(μg)	20000	1227	200
叶酸(μg)	600.0	36.8	6.0
泛酸(μg)	15000	920	150
维生素 C(mg)	250.0	15.3	2.5
生物素(μg)	75.0	4.6	0.75
钠(mg)	260	16	2.6
钾(mg)	500	31	5
铜(μg)	1000.0	61.3	10.0
镁(mg)	75.0	4.6	0.75
铁(mg)	28.0	1.72	0.28
锌(mg)	12.5	0.77	0.125
锰(μg)	120.0	7.4	1.2
钙(mg)	900	55	9
磷(mg)	600	37	6
碘(μg)	375.0	23.0	3.75
氯(mg)	410	25	4.1
硒(μg)	50.0	3.07	0.50

备注：1 份即 1 条包母乳营养补充剂，净含量 1g。

【配方特点/营养学特征】 本产品为母乳营养补充剂，与母乳配合使用，为早产/低出生体重婴儿提供能量和营养素。本品以水解乳清蛋白粉作为蛋白质来源，中链甘油三酯作为脂肪来源，添加了多种维生素和矿物质。

【组织状态】 粉状

【适用人群】 早产/低出生体重婴儿

【食用方法和食用量】

口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下，根据早产/低出生体重婴儿矫正月龄、体重和医学状况等综合确定。通常情况下，每 25mL 母乳添加 1g 本品。冲调方法：

1.遵照医生的指导准备母乳（即时挤出，或者摇匀已经挤出保存的母乳）。2.将需要量的母乳倒入已经消毒的容器中。加热母乳到喂养温度 37℃。3.按照冲调比例，加入相应量的母乳营养补充剂。4.轻轻摇晃，使母乳营养补充剂完全溶解。喂哺前请先将奶液滴在手腕内侧测试温度，以确保适合早产/低出生体重婴儿食用。

【净含量和规格】 50 克（1 克×50）

【保质期】 18 个月

【贮存条件】 请存放在清洁阴凉干燥处。开封后的小条包一次性冲调完毕。

【警示说明和注意事项】

- 1.请在医生或者临床营养师指导下使用。
- 2.不适用于非目标人群使用。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.配制不当和使用不当可能引起健康危害。
- 5.1g 本品溶于 25mL 水中的渗透压约为 50mOsmol/kg（该数值仅供参考，本品的正确食用方法为直接加入母乳中摇匀后进行喂哺）。
- 6.本品并非无菌制品，如需用于可能有免疫缺陷的早产儿，请务必在医生的指导和监督下使用。
- 7.冲调本品时，要保证环境、器具和操作过程的清洁卫生。
- 8.建议每次只冲调一次的食用量，每次喂哺后残留奶液要及时倒掉。
- 9.冲调好的奶液，不可在微波炉内加热。使用期间应避免细菌污染。
- 10.本品不可作为早产/低出生体重婴儿的单一营养来源，应配合母乳食用。6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
- 11.根据不同早产/低出生体重婴儿情况，当生长发育各项指标达到相应矫正月龄婴儿的正常范围时，可在医生或者临床营养师指导下转为母乳、普通婴儿配方食品或配合添加辅助食品。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。