

附件 2

国家市场监督管理总局

特殊医学用途配方食品产品标签、说明书

国食注字 TY20195010

特殊医学用途婴儿乳蛋白深度水解配方食品

肽敏舒 ALTH RA

【产品类别】乳蛋白深度水解配方

【配料表】乳糖、植物油（葵花籽油、椰子油、低芥酸菜籽油）、麦芽糊精、乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、磷酸二氢钠、氯化钠、柠檬酸钾、磷酸二氢钾、氯化钾、硫酸铜、氯化镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、氯化钙、甘油磷酸钙、碘化钾、硒酸钠、酒石酸氢胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂、花生四烯酸油脂、L-组氨酸、柠檬酸脂肪酸甘油酯、柠檬酸。

【营养成分表】

营养成分	每 100g	每 100mL	每 100kJ
能量(kJ)	2118	280	100
蛋白质(g)	12.5	1.7	0.59
脂肪(g)	26	3.4	1.23
亚油酸(g)	3.15	0.4	0.15
α -亚麻酸(mg)	315	42	15
碳水化合物(g)	55.5	7.3	2.6
维生素 A(μ g RE)	481	63	23
维生素 D(μ g)	7.6	1	0.36
维生素 E(mg α -TE)	12	1.58	0.57

维生素 K ₁ (μg)	44. 15	5. 8	2. 08
维生素 B ₁ (μg)	440	58	21
维生素 B ₂ (μg)	1050	139	50
维生素 B ₆ (μg)	460	61	21. 7
维生素 B ₁₂ (μg)	1. 65	0. 22	0. 078
烟酸(μg)	5500	726	260
叶酸(μg)	80	11	3. 8
泛酸(μg)	3000	396	142
维生素 C(mg)	65	8. 6	3. 07
生物素(μg)	12. 5	1. 7	0. 6
钠(mg)	190	25	9
钾(mg)	570	75	27
铜(μg)	410	54	19. 36
镁(mg)	42	6	2. 0
铁(mg)	5	0. 66	0. 24
锌(mg)	5	0. 66	0. 24
锰(μg)	65	9	3. 1
钙(mg)	480	63	23
磷(mg)	315	42	15
碘(μg)	65	8. 6	3. 07
氯(mg)	385	51	18
硒(μg)	12	1. 6	0. 57
胆碱(mg)	55	7. 3	2. 6
肌醇(mg)	32	4. 2	1. 5
牛磺酸(mg)	45	6	2
左旋肉碱(mg)	8. 1	1. 1	0. 4
二十二碳六烯酸 (DHA)(mg)	62. 8	8	3. 0

二十碳四烯酸 (ARA)(mg)	62.8	8	3.0
---------------------	------	---	-----

【配方特点/营养学特征】 本产品通过水解工艺将大分子乳蛋白水解成肽和氨基酸。乳清蛋白粉添加量约为 **159.21g/1000g**，可作为 **0~6 月龄** 食物蛋白过敏婴儿的单一营养来源。

【组织状态】 粉状

【适用人群】 0~12 月龄食物蛋白过敏婴儿

【食用方法和食用量】 口服。食用方法和食用量应在医生或者临床营养师指导下使用，根据适用人群的年龄、体重和医学状况等综合确定。

冲调方法：**1** 平勺配方粉约为 **4.4g**，**100mL** 标准冲调液是由约 **13.2g** 配方粉加 **90mL** 温开水冲调而成。配制时请使用罐内所附专用量匙。**1.**冲调前请洗净双手；彻底洗净奶瓶、奶嘴及瓶盖，并将奶具放入沸水中煮 **5** 分钟待用；冲调用水应煮沸 **5** 分钟，待冷却至 **45℃** 以下进行冲调；依照医生或者临床营养师的推荐用量加入准确份量的水和本品，摇动奶瓶至本品完全溶解。**2.**奶嘴尺寸及开孔大小要合适，喂哺时可稍作休息，轻拍后再喂，避免吐奶，不要强迫孩子吸吮。喂养时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会导致婴儿窒息。**3.**请按需冲调，不要将未喝完的液体存留。

【净含量和规格】 400g

【保质期】 24 个月

【贮存条件】 放置于阴凉干燥的地方。开罐后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。

【警示说明和注意事项】

- 1.适用于 **0~12 月龄** 食物蛋白过敏婴儿，请在医生或者临床营养师指导下使用。
- 2.6 月龄以上特殊医学状况婴儿食用本品时，应配合添加辅助食品。
- 3.本品禁止用于肠外营养支持和静脉注射。
- 4.本品不适用于非目标人群使用。
- 5.本品禁止用于乳糖不耐受、半乳糖血症、乳糖吸收不良及慢性腹泻的婴儿。
- 6.母乳是婴儿最好的食物，在您决定选用本产品之前，请先听取医生或者临床营养师的意见。
- 7.本品乳糖含量约为 **28g/100g**，标准冲调液的渗透压约为 **263mOsmol/L**，供使用参考。
- 8.配制不当和使用不当可能引起健康危害。

注：企业上市产品的标签、说明书，还应当符合相关法律、法规、规章和食品安全国家标准的规定。